

| GRUPO                   | PRINCIPIO ACTIVO | MECANISMO DE ACCIÓN                                                                                                           | INDICACIONES TÍPICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia al alcohol  | clometiazol      | Hipnótico<br>Sedante<br>anticonvulsivo                                                                                        | <p>Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcohol</li> <li>• Opioides</li> <li>• Cannabinoides</li> <li>• Sedantes hipnóticos</li> <li>• Cocaína</li> <li>• Otros estimulantes</li> <li>• Alucinógenos</li> <li>• Tabaco</li> <li>• Disolventes volátiles</li> <li>• Policonsumo</li> </ul> |
|                         | Tiapride         | Inhibe dopamina, disminuye hiperactividad autonómica, reduce el craving                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Tetrabamato      | Disminuye hiperactividad autonómica                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Disulfiram       | Inhibe aldehído deshidrogenasa que interfiere con el alcohol, acumulación de acetaldehído que produce síntomas desagradables. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Carbamida        | Inhibe aldehído deshidrogenasa que interfiere con el alcohol, acumulación de acetaldehído que produce síntomas desagradables. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Acamprosato      | Agonista receptor GABA, acción anti craving.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dependencia de opiáceos | Clonidina        | Agonista del receptor presináptico alfa 2 adrenérgico.                                                                        | <p>Tanto para lo que se refiere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intoxicación aguda.</li> <li>• Sd. Dependencia.</li> <li>• Sd. abstinencia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Buprenorfina     | Agonista parcial de los receptores opiáceos                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Metadona         | Agonista de los receptores opiáceos mu, kappa y sigma. Sustituye el efecto de la heroína con mayor tiempo de acción.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Naloxona         | Antago. Receptores opiáceos                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Naltrexona       | Antago. Competitivo de los receptores opiáceos mu, kappa y sigma. Bloquea mecanismo craving.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |