

SEEA-AI. Nuevo modelo de cuantificación del capital natural para medir el impacto económico ambiental, mediante IA y Remote Sensing

Ivan Vilar Ramirez ^{1,2,3} ; Maria Fernanda González ^{2,3} ; Miquel Bastons Prat ¹

¹ Universitat Internacional de Catalunya

² PlanetAI Nature Space

³ PlanetAI Space

RESUMEN

Este artículo propone SEEA-AI, un nuevo modelo económico integrado para cuantificar el capital natural mediante inteligencia artificial, big data e imágenes satelitales, dentro del marco del System of Environmental-Economic Accounting – Ecosystem Accounting (SEEA-EA). El modelo parte de una limitación central de la economía ambiental: la dificultad de incorporar de forma precisa, dinámica y verificable el valor de los ecosistemas en la contabilidad económica y en la toma de decisiones públicas y privadas.

La propuesta unifica tres componentes metodológicos. En primer lugar, incorpora un modelo económico de stock-flujo-valor, donde el capital natural se entiende como un activo dinámico formado por la extensión de los ecosistemas, su condición ecológica y los flujos de servicios ecosistémicos que generan. En segundo lugar, integra datos de observación de la Tierra e inteligencia artificial para estimar variables biofísicas como NDVI, biomasa, carbono y cambios en la cobertura del suelo. En tercer lugar, utiliza el benchmark del Murray–Darling Basin (CSIRO; Smith et al., 2025) como sistema de referencia para calibrar el modelo y evaluar su transferibilidad metodológica entre una cuenca semiárida (Murray–Darling) y una cuenca tropical (río Sinú), no como prueba de transferibilidad global.

El modelo formaliza la relación entre condición ecológica y valor económico mediante un índice satelital de condición, denominado K_t , que permite estimar variaciones del capital natural en el tiempo. De este modo, una mejora en la condición ecosistémica se interpreta como acumulación de capital natural, mientras que una pérdida de condición representa depreciación ambiental. Esta estructura permite construir cuentas de extensión, condición, flujos físicos, flujos monetarios y activos ecosistémicos monetarios, en coherencia con el SEEA-EA.

La aplicación empírica a la cuenca del río Sinú (Colombia) muestra una mejora agregada de la condición vegetal entre 2020 y 2024, reflejada en el aumento del NDVI (0,563→0,622) y del índice de condición ecosistémica (0,642→0,714; +11,2 %). No obstante, el análisis espacialmente explícito identifica pérdidas localizadas de capital natural asociadas a deforestación, degradación e incendios, que no son visibles en los promedios regionales. Esta combinación evidencia la utilidad de SEEA-AI para distinguir entre tendencias agregadas de enverdecimiento y depreciaciones localizadas del activo ecosistémico. El modelo se calibra en una región de referencia (Murray–Darling, Australia; 2018–19) con cuentas SEEA-EA consolidadas y se transfiere a territorios con menor disponibilidad de datos.

La contribución principal del artículo es económica: SEEA-AI convierte el capital natural en una variable cuantificable, comparable y actualizable, capaz de integrarse en cuentas nacionales, políticas públicas, mercados de carbono, planificación territorial y evaluación de inversiones sostenibles. En conclusión, el modelo permite avanzar hacia una contabilidad económica ampliada, donde el crecimiento y el bienestar incorporen explícitamente la conservación, mejora o degradación de los ecosistemas.

Palabras clave: capital natural; teledetección; servicios ecosistémicos; contabilidad ambiental; modelado espacial; valoración económica

CONTRIBUCIÓN DE LOS ACTORES

Conceptualización, IVR y MFGG; curación de datos, IVR y MFGG; investigación, IVR; metodología, IVR y MFGG; administración del proyecto, IVR ; recursos, IVR y MFGG; supervisión, IVR; MFGG; MBP ; validación, IVR; MFGG; MBP; redacción del borrador original, IVR; redacción de la revisión y edición, IVR; MFGG; MBP. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

1. INTRODUCCIÓN

La incorporación del capital natural en los sistemas económicos constituye uno de los desafíos estructurales más relevantes de la economía contemporánea. A pesar de los avances conceptuales impulsados por el System of Environmental-Economic Accounting – Ecosystem Accounting (SEEA-EA), su implementación efectiva sigue siendo limitada, principalmente debido a la dificultad de medir de forma precisa, consistente y escalable el estado de los ecosistemas y su contribución al bienestar económico (United Nations, 2021). Esta limitación ha generado una desconexión persistente entre la dinámica ecológica y los modelos económicos tradicionales, en los que el medio ambiente continúa tratándose como un factor exógeno o residual (Solow, 1993; Nordhaus, 1994).

Desde una perspectiva macroeconómica, la ausencia de una cuantificación robusta del capital natural implica una subestimación sistemática de los costes asociados a la degradación ambiental y, en consecuencia, una sobrevaloración del crecimiento económico observado (Stiglitz et al., 2009; Dasgupta, 2021). Los indicadores convencionales, como el producto interior bruto (PIB), no reflejan la depreciación de los activos naturales ni la pérdida de servicios ecosistémicos, lo que distorsiona la toma de decisiones públicas y privadas (Arrow et al., 2012). En este contexto, la necesidad de integrar el capital natural en la contabilidad económica ha sido ampliamente reconocida, aunque su operacionalización sigue siendo incompleta (Obst, 2015; Hein et al., 2020).

A nivel microeconómico, la falta de información objetiva y verificable sobre el estado de los ecosistemas genera importantes fallos de mercado, especialmente en forma de externalidades negativas y asimetrías de información (Boyd y Banzhaf, 2007; Barbier, 2011). Los agentes económicos toman decisiones sin internalizar plenamente el impacto ambiental de sus actividades, lo que conduce a una asignación ineficiente de los recursos y a la sobreexplotación del capital natural (Costanza et al., 1997; Pearce y Turner, 1990). Aunque instrumentos como los mercados de carbono o los sistemas de certificación ambiental han intentado corregir estos fallos, su efectividad depende en gran medida de la disponibilidad de métricas fiables y comparables (Brander et al., 2021).

En paralelo, el desarrollo de la contabilidad ecosistémica bajo el marco SEEA-EA ha supuesto un avance significativo al establecer una estructura estandarizada para medir la extensión, condición y servicios de los ecosistemas (United Nations, 2021). Sin embargo, su aplicación práctica se enfrenta a tres limitaciones clave: (i) la dependencia de modelos biofísicos específicos y no transferibles, (ii) la baja frecuencia temporal de actualización de los datos, y (iii) la dificultad de integrar información espacial de alta resolución en modelos

económicos (Vardon et al., 2016; Keith et al., 2017). El caso del Murray-Darling Basin, desarrollado por CSIRO, representa uno de los ejemplos más avanzados de implementación, pero también evidencia la complejidad y el elevado coste de estos enfoques, así como su limitada escalabilidad (Friedlingstein et al., 2020).

El desarrollo reciente de tecnologías de observación de la Tierra e inteligencia artificial ofrece una oportunidad sin precedentes para superar estas limitaciones. Las imágenes satelitales permiten capturar de forma continua variables clave del estado de los ecosistemas, como la cobertura vegetal, la biomasa o la humedad del suelo, mientras que los algoritmos de aprendizaje automático facilitan el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la generación de indicadores dinámicos (Reichstein et al., 2019; Gorelick et al., 2017). En particular, índices como el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) han demostrado ser herramientas robustas para medir la condición ecosistémica y su evolución en el tiempo (Myneni et al., 1997; Pettorelli et al., 2005).

A pesar de los avances en contabilidad ecosistémica y modelización de servicios ecosistémicos, persiste una limitación estructural en la literatura: la falta de un marco integrado que conecte de forma operativa la medición biofísica, la valoración económica y su traducción en términos contables. En la práctica, estos tres niveles han evolucionado de manera independiente. Por un lado, la observación de la Tierra permite medir con alta precisión el estado de los ecosistemas; por otro, la economía ambiental ha desarrollado metodologías para valorar los servicios ecosistémicos; y, finalmente, el SEEA-EA ha establecido un marco contable conceptual. Sin embargo, estos tres niveles permanecen escasamente integrados en un marco operativo único que permita su aplicación directa en la toma de decisiones económicas.

En este contexto, el presente artículo introduce SEEA-AI, un modelo económico integrado que combina inteligencia artificial, datos de observación de la Tierra y contabilidad ecosistémica para cuantificar el capital natural de forma dinámica, verificable y escalable. El modelo se estructura en tres componentes: un marco económico stock-flujo-valor que define el capital natural como activo dinámico; un sistema de inferencia basado en inteligencia artificial que estima la condición ecosistémica mediante un índice continuo; y un mecanismo de calibración empírica sobre un benchmark real que permite evaluar la consistencia y la transferibilidad metodológica del modelo entre regiones de características ecológicas contrastadas. La principal aportación es la formalización del capital natural como variable económica cuantificable e integrable en sistemas de contabilidad nacional.

El estudio se organiza en torno a tres hipótesis de trabajo: (H1) la condición ecosistémica derivada de observación de la Tierra explica de forma significativa la variación del capital natural; (H2) la actualización de alta frecuencia mediante observación de la Tierra reduce la latencia y la incertidumbre temporal respecto a las cuentas SEEA convencionales; y (H3) la metodología mantiene coherencia de orden de magnitud al transferirse entre regiones de características ecológicas contrastadas (semiárida y tropical).

Finalmente, el artículo se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 presenta el marco conceptual del modelo. La Sección 3 desarrolla la metodología y la formulación matemática. La Sección 4 describe el proceso de calibración y validación empírica. La Sección 5 expone los resultados obtenidos. La Sección 6 discute las implicaciones económicas y las limitaciones del modelo. Por último, la Sección 7 concluye con las principales aportaciones y líneas futuras de investigación.

Este enfoque permite reducir la brecha existente entre la medición ambiental y la toma de decisiones económicas, proporcionando una base cuantitativa para integrar el capital natural en políticas públicas, mercados y sistemas financieros.

2. ARQUITECTURA METODOLÓGICA DEL MODELO SEEA-AI

2.1. Enfoque general

El modelo SEEA-AI se concibe como un sistema híbrido de observación, modelización y contabilidad que traduce información ecológica de alta resolución en indicadores económicos compatibles con las cuentas nacionales.

Esta estructura permite vincular el análisis ambiental con la contabilidad económica, manteniendo coherencia semántica y trazabilidad metodológica.

- Nivel físico (observación de la Tierra): adquisición y preprocesamiento de datos satelitales multiespectrales y de sensores in situ.
- Nivel analítico (modelización inteligente): estimación de variables biofísicas mediante algoritmos de inteligencia artificial.
- Nivel contable (integración SEEA): correspondencia entre las variables estimadas y las cuentas físicas y monetarias del SEEA EA.

Esta estructura permite vincular el análisis ambiental con la contabilidad económica, manteniendo coherencia semántica y trazabilidad metodológica. (United Nations et al., 2021; Obst et al., 2015; Hein et al., 2020)

2.2. Formalización matemática del modelo SEEA-AI

La integración entre observación de la Tierra, inteligencia artificial y contabilidad ambiental requiere una formalización matemática explícita que garantice coherencia interna, reproducibilidad y trazabilidad del sistema. En este contexto, el modelo SEEA-AI se define como una transformación estructurada de datos geoespaciales en indicadores biofísicos, flujos de servicios ecosistémicos y magnitudes económicas compatibles con el marco del System of Environmental-Economic Accounting – Ecosystem Accounting (SEEA-EA).

2.2.1. Estructura funcional del modelo

El modelo se articula como una composición de funciones que conecta el dominio biofísico con el económico:

$$Z_{i,t} = f_{\theta}(X_{i,t})$$

$$S_{k,i,t} = g_k(Z_{i,t}, C_{i,t})$$

$$V_{k,i,t} = p_{k,t} \cdot S_{k,i,t}$$

donde $X_{i,t}$ representa el conjunto de variables de entrada geoespaciales (imágenes satelitales multiespectrales, variables climáticas y topográficas) para la unidad espacial i en el tiempo t ; $Z_{i,t}$ denota las variables biofísicas estimadas mediante modelos de inteligencia artificial parametrizados por θ ; $S_{k,i,t}$ corresponde al flujo físico del servicio ecosistémico k ; $C_{i,t}$ recoge variables de contexto biofísico y socioeconómico; $p_{k,t}$ es el valor unitario económico del servicio; y $V_{k,i,t}$ es el valor monetario asociado.

Esta estructura permite formalizar de manera explícita la transición desde datos observacionales hasta indicadores económicos, garantizando trazabilidad entre niveles analíticos.

2.2.2. Agregación económica

El valor económico total de los servicios ecosistémicos en el sistema se define como:

$$Y_t = \sum_i \sum_k V_{k,i,t} = \sum_i \sum_k p_{k,t} \cdot S_{k,i,t}$$

donde Y_t representa el flujo agregado de servicios ecosistémicos en términos monetarios en el tiempo t . Esta magnitud es directamente interpretable como una extensión del ingreso económico que incorpora la contribución de los ecosistemas.

2.2.3. Definición del capital natural

El modelo distingue explícitamente entre el stock biofísico de capital natural y su valoración monetaria, en coherencia con la teoría económica del capital y el marco SEEA-EA.

El stock biofísico se define como:

$$K_t^{bio} = \sum_i A_{i,t} \cdot \phi(Z_{i,t})$$

donde $A_{i,t}$ representa la extensión del ecosistema y $\phi(Z_{i,t})$ es una función que traduce la condición ecosistémica en capacidad productiva ecológica. La forma multiplicativa $K = A \cdot g(C)$ sigue la lógica de la contabilidad ecosistémica del SEEA-EA (extensión $\times$ condición; United Nations et al., 2021) y de los enfoques stock-flujo de capital natural (Jones et al., 2016): la extensión A fija la magnitud física del activo y la función de condición $g(C) \in [0,1]$ la escala según su integridad ecológica, de modo que una misma área en mejor condición sostiene mayor capacidad productiva. Especificaciones más ricas (p. ej., $K = A \cdot C \cdot \text{biomasa}$ o formas tipo CES) son extensiones directas de esta cuando se dispone de datos de stock adicionales.

El valor monetario del capital natural se expresa como:

$$K_t^{mon} = \sum_i \sum_k p_{k,t} \cdot g_k(f_{\theta}(X_{i,t}), C_{i,t})$$

Esta formulación permite interpretar el capital natural como un activo económico cuyo valor depende tanto de su dimensión física como de su estado funcional y su capacidad de generar servicios.

2.2.4. Relación stock-flujo

Los flujos de servicios ecosistémicos se derivan funcionalmente del estado del sistema ecológico:

$$S_{k,i,t} = g_k(Z_{i,t}, C_{i,t})$$

A nivel agregado:

$$Y_t = \sum_i \sum_k p_{k,t} \cdot g_k(Z_{i,t}, C_{i,t})$$

Esta relación establece una conexión directa entre observaciones geoespaciales, estado ecológico y producción de servicios ecosistémicos, permitiendo integrar escalas locales y agregadas en un marco coherente.

La formulación del capital natural como una relación stock–flujo–valor se basa en la teoría económica del capital natural y en el marco SEEA–EA, que conceptualizan los ecosistemas como activos capaces de generar flujos de servicios en el tiempo (Mäler et al., 2008; Arrow et al., 2012; Jones et al., 2016; United Nations et al., 2021).

2.2.5. Productividad ecológica

La productividad del capital natural se define como la relación entre el flujo de servicios ecosistémicos y el stock biofísico:

$$r_t = Y_t / K_t^{bio}$$

A diferencia de la teoría económica convencional, donde la productividad del capital se trata como un parámetro exógeno, en el modelo SEEA–AI esta magnitud emerge endógenamente a partir de la condición ecosistémica estimada mediante datos observables.

2.2.6. Dinámica del capital natural

La evolución temporal del capital natural monetario se define como:

$$K_t^{mon} = K_t^{mon} - K_{t-1}^{mon}$$

Para mejorar la interpretabilidad económica, esta variación puede descomponerse en efectos de precio y cantidad:

$$\Delta K_t = \sum_i \sum_k (P_{k,i,t} - P_{k,i,t-1}) \cdot S_{k,i,t} - p_{k,i,t-1} \cdot (S_{k,i,t} - S_{k,i,t-1})$$

Esta descomposición permite distinguir entre cambios atribuibles a variaciones en los valores económicos y cambios derivados de la dinámica ecológica, facilitando su integración en sistemas de contabilidad económica.

Desde una perspectiva económica, la dinámica del capital natural admite tres interpretaciones fundamentales:

acumulación de capital natural, asociada a mejoras en la condición ecológica;

$$\Delta K_t > 0$$

depreciación del capital natural, reflejando procesos de degradación ambiental;

$$\Delta K_t < 0:$$

estado estacionario del capital natural, en el que no se observan variaciones netas en su valor.

$$\Delta K_t = 0$$

Esta formulación permite conectar directamente la dinámica ecológica con la contabilidad económica, posibilitando la interpretación de procesos como deforestación, degradación o incendios como pérdidas de capital natural cuantificables y registrables en términos económicos.

En este contexto, la evolución del capital natural es conceptualmente análoga a la depreciación del capital en la contabilidad nacional, donde la degradación ambiental puede interpretarse como una forma de consumo de capital natural.

2.2.7. Incertidumbre y propagación del error

Dado que tanto las variables biofísicas como los parámetros económicos están sujetos a incertidumbre, el modelo incorpora una aproximación de propagación del error en la valoración:

$$Var(Y_t) \approx \sum_k \sigma_{pk}^2 s_k^2 + p_k^2 \sigma_{sk}^2$$

donde σ_{pk}^2 y σ_{sk}^2 representan las desviaciones estándar asociadas a los precios y a los flujos de servicios, respectivamente.

Este enfoque permite cuantificar la robustez de las estimaciones y proporciona un marco analítico para la evaluación de sensibilidad del modelo.

2.2.8. Correspondencia operativa con las cuentas SEEA-EA

La formulación matemática del modelo SEEA-AI se operacionaliza mediante una correspondencia explícita entre los componentes del sistema y las cuentas del marco SEEA-EA. Esta correspondencia permite traducir de manera sistemática los datos derivados de la observación de la Tierra y los resultados de los modelos de inteligencia artificial en indicadores contables coherentes con los estándares internacionales.

En particular, la cadena funcional definida en la Sección 2.2:

$$X_{i,t} \rightarrow Z_{i,t} \rightarrow S_{k,i,t} \rightarrow V_{k,i,t}$$

se corresponde directamente con las distintas cuentas ecosistémicas:

- Los datos de entrada $X_{i,t}$ derivados de imágenes satelitales y variables geoespaciales, se vinculan con la **cuenta de extensión**, permitiendo delimitar el stock físico del ecosistema mediante indicadores de cobertura del suelo.
- Las variables biofísicas estimadas $Z_{i,t}$, tales como índices de vegetación, biomasa o humedad del suelo, se asocian a la **cuenta de condición ecosistémica**, proporcionando una medida continua del estado ecológico.
- Los flujos físicos de servicios ecosistémicos $S_{k,i,t}$ se integran en la **cuenta de flujos físicos**, cuantificando la provisión de servicios como regulación hídrica, captura de carbono o retención de sedimentos.
- Finalmente, la valoración económica $V_{k,i,t}$ se incorpora en la **cuenta de flujos monetarios**, permitiendo expresar los servicios ecosistémicos en términos económicos.

La agregación de estos valores da lugar al stock de capital natural monetario:

$$K_t^{mon} = \sum_i \sum_k p_{k,t} \cdot S_{k,i,t}$$

que se registra en la **cuenta de activos ecosistémicos**, en coherencia con la estructura del SEEA-EA. (Jones et al. (2016); United Nations et al. (2021))

La Tabla 1 sintetiza esta correspondencia, estableciendo un mapeo operativo entre indicadores derivados de observación de la Tierra, variables biofísicas estimadas mediante inteligencia artificial, cuentas SEEA-EA y métricas económicas asociadas. Este mapeo garantiza la trazabilidad completa del sistema, desde los datos de entrada hasta la valoración monetaria del capital natural, y constituye el elemento clave que permite integrar el modelo SEEA-AI en sistemas de contabilidad económica y toma de decisiones.

Indicador IA / EO	Variable biofísica estimada	Cuenta SEEA-EA asociada	Índice contable propuesto	Unidad	Uso económico
Clasificación de cobertura del suelo	Extensión del ecosistema	Cuenta de extensión	Índice de extensión ecosistémica $A_{i,t}$	ha o km ²	Delimita el stock físico del activo natural
NDVI / GNDVI / EVI	Condición de vegetación	Cuenta de condición ecosistémica	Índice de condición ecosistémica $Z_{i,t}$	0–1	Mide mejora o deterioro ecológico
Biomasa aérea estimada	Carbono almacenado / biomasa	Cuenta de flujos físicos	Índice de carbono ecosistémico $C_{k,i,t}$	tC/ha o tCO ₂ e/ha	Cuantifica regulación climática
Humedad del suelo / evapotranspiración	Regulación hídrica	Cuenta de flujos físicos	Índice hídrico ecosistémico $H_{k,i,t}$	mm, %, o m ³ /ha	Estima servicios de regulación hídrica
Retención de sedimentos	Control de erosión / sedimentos retenidos	Cuenta de flujos físicos	Índice de retención de sedimentos $R_{k,i,t}$	t/ha/año o t/km ² /año	Valora costes evitados y protección de infraestructura

Detección de deforestación	Pérdida de cobertura forestal	Cuenta de cambios en extensión / condición	Índice de pérdida ecosistémica $L_{i,t}$	ha/año	Identifica depreciación física del activo
Área quemada / severidad de incendio	Perturbación ecosistémica	Cuenta de condición	Índice de perturbación $D_{i,t}$	ha o 0–1	Atribuye pérdidas por eventos extremos
Servicios ecosistémicos modelados	Flujo físico de servicios	Cuenta de flujos físicos	Flujo ecosistémico agregado $S_{k,i,t}$	unidad física del servicio	Base para valoración monetaria
Precio unitario / coste evitado	Valor económico unitario	Cuenta de flujos monetarios	Precio SEEA-compatible $p_{k,t}$	USD/unidad	Convierte flujos físicos en valor monetario
Valor monetario del servicio	Valor económico del flujo	Cuenta de flujos monetarios	Valor del servicio ecosistémico $VNC_{k,i,t}$	USD/año	Mide contribución económica anual
Valor presente de servicios futuros	Valor del activo ecosistémico	Cuenta de activos ecosistémicos	Capital natural monetario K_t	USD	Registra el activo natural en términos económicos

Variación del capital natural	Cambio del valor del activo	Cuenta de ecosistémicos / activos contable / ajuste	Depreciación o acumulación natural ΔK_t	USD/año	Registra pérdida o ganancia de capital natural
-------------------------------	-----------------------------	---	---	---------	--

Tabla 1. Correspondencia operativa entre observación de la Tierra, variables biofísicas, servicios ecosistémicos y cuentas SEEA-EA en el modelo SEEA-AI.

2.2.9 Módulo de inteligencia artificial

El modelo SEEA-AI incorpora un módulo de inteligencia artificial basado en aprendizaje automático supervisado para estimar la condición ecosistémica a partir de datos de observación de la Tierra.

Formalmente, este módulo implementa la función:

$$Z_{i,t} = f_{\theta}(X_{i,t})$$

donde $X_{i,t}$ representa el conjunto de variables geoespaciales de entrada (imágenes satelitales multiespectrales, variables climáticas y topográficas), $Z_{i,t}$ es el índice de condición ecosistémica estimado, y f_{θ} es una función paramétrica no lineal definida por el modelo de aprendizaje automático.

En particular, se emplea un algoritmo de tipo Random Forest (Breiman, 2001; Foody, 2002; Belgiu y Drăguț, 2016), adecuado para capturar relaciones no lineales y robusto frente a multicolinealidad y ruido en los datos.

Las variables de entrada incluyen indicadores derivados de teledetección, tales como NDVI, cobertura del suelo, índices de humedad, así como variables topográficas. La variable objetivo es un índice continuo de condición ecosistémica, que actúa como variable intermedia en la estimación de los flujos de servicios ecosistémicos.

El modelo se entrena utilizando datos históricos y se valida mediante partición entrenamiento-validación, evaluando su desempeño mediante métricas estándar. Este enfoque permite estimar la condición ecosistémica de forma continua, espacialmente explícita y escalable, mejorando la precisión respecto a métodos agregados tradicionales.

La inteligencia artificial no sustituye la estructura económica del modelo, sino que mejora la estimación de sus variables clave, permitiendo una actualización dinámica del capital natural basada en datos observables.

2.2.10 Benchmark metodológico: CSIRO Murray-Darling Basin

El modelo utiliza como referencia metodológica los experimental ecosystem accounts desarrollados por CSIRO para el Murray-Darling Basin, uno de los casos más avanzados de implementación del marco SEEA-EA.

Este benchmark proporciona una estructura para la estimación de servicios ecosistémicos, incluyendo carbono, provisión hídrica, retención de sedimentos y biomasa, así como su integración en cuentas económicas.

En este estudio, el benchmark se utiliza como referencia estructural para definir funciones de servicios ecosistémicos $g_k(\cdot)$, criterios de validación y organización contable. No se realiza una transferencia directa de valores monetarios, sino una adaptación mediante parámetros biofísicos y económicos específicos del contexto de estudio (CSIRO, 2024; Smith et al., 2025).

2.2.11 Validación y benchmark comparativo

La validación del modelo SEEA-AI se aborda mediante un enfoque comparativo frente a metodologías convencionales del marco SEEA-EA, evaluando tanto la precisión de las estimaciones como la eficiencia operativa del sistema.

El desempeño del modelo se analiza a partir de indicadores de precisión, frecuencia de actualización, resolución espacial, coste operativo y trazabilidad. La Tabla 2 presenta una comparación estructurada entre el enfoque tradicional y el modelo propuesto.

La Tabla 2 presenta una comparación estructurada entre el enfoque SEEA convencional y el modelo SEEA-AI en términos de resolución, precisión y eficiencia operativa.

Criterio	SEEA tradicional	SEEA-AI	Métrica
Frecuencia	3–5 años	mensual / alta frecuencia (potencial)	reducción temporal
Resolución espacial	agregada (regional/nacional)	píxel/cuenca	reducción espacial (m ,km²)
Error biofísico	inventarios y modelos estáticos	Modelos IA validados	RMSE , MAE
Reproducibilidad	media	alta	trazabilidad metodológica
Coste operativo	alto	decreciente	coste por unidad de superficie
Tiempo de actualización	años	días-semanas	coste de procesamiento

Tabla 2: Comparación estructurada entre el enfoque SEEA convencional y el modelo SEEA-AI

Este análisis pone de manifiesto mejoras significativas en términos de resolución espacial, frecuencia temporal y reproducibilidad, derivadas del uso de datos de observación de la Tierra e inteligencia artificial.

La cadencia de 3–5 años atribuida al enfoque convencional refleja la periodicidad habitual de compilación de cuentas ecosistémicas nacionales bajo el SEEA-EA (United Nations et al., 2021; Hein et al., 2020); la frecuencia mensual/alta del enfoque SEEA-AI es un potencial derivado de la revisita satelital, sujeto a cobertura sin nubes, y no implica que todas las variables económicas se actualicen a esa cadencia.

La precisión del modelo se evalúa mediante métricas estándar ampliamente utilizadas en teledetección y aprendizaje automático:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$$NRMSE = \frac{RMSE}{\bar{y}}$$

donde y_i representa los valores observados, $\hat{y}_i$ los valores estimados por el modelo y $\bar{y}_i$ la media de los valores observados.

Estas métricas permiten evaluar la precisión predictiva y la capacidad explicativa del modelo, garantizando su consistencia estadística.

2.2.12. Análisis de sensibilidad económica

La valoración monetaria de los servicios ecosistémicos constituye uno de los componentes más sensibles del modelo, dado que depende de parámetros económicos exógenos como precios, costes evitados y tasas de descuento.

Para evaluar la robustez de los resultados, se incorpora un análisis de sensibilidad basado en escenarios alternativos de valoración. La Tabla 3 define los escenarios utilizados en el análisis de sensibilidad económica del modelo

Escenario	Precio unitario	Tasa de descuento	Interpretación
Conservador	-20%	6%	Estimación inferior del valor del capital natural
Base	valor observado	3%	Escenario de referencia
Alto	+20%	1.5%	Estimación superior bajo condiciones favorables

Tabla 3: escenarios utilizados en el análisis de sensibilidad económica del modelo

- **Escenario conservador:** reducción del 20% en los precios unitarios y tasa de descuento del 6%
- **Escenario base:** valores observados y tasa de descuento del 3%
- **Escenario alto:** incremento del 20% en los precios unitarios y tasa de descuento del 1.5%

El valor del capital natural bajo cada escenario se define como:

$$V_t^{(s)} = \sum_i \sum_k P_{k,t}^{(s)} S_{k,i,t}$$

donde se denota el escenario considerado.

Para el cálculo del valor presente:

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{V_t}{(1+r)^t}$$

Este enfoque permite identificar rangos plausibles de valor del capital natural, evaluar la sensibilidad del modelo a supuestos económicos y mejorar la transparencia en la interpretación de resultados. (SEEA valuation principles; ONS (2024))

En conjunto, el análisis de sensibilidad refuerza la robustez del modelo y facilita su aplicación en contextos de toma de decisiones bajo incertidumbre.

2.3 Validación metodológica mediante benchmark CSIRO

El modelo SEEA-AI se valida mediante comparación estructural con los *experimental ecosystem accounts* desarrollados por CSIRO para el Murray–Darling Basin, uno de los casos más avanzados de implementación del marco SEEA–EA a escala regional.

Dado que el objetivo del modelo es proporcionar una arquitectura generalizable para la cuantificación del capital natural, la validación no se plantea como una comparación directa con datos observados en el mismo territorio, sino como una validación metodológica basada en benchmark. Este enfoque permite evaluar la coherencia estructural, la consistencia contable y la plausibilidad económica del modelo frente a una referencia empírica consolidada.

El benchmark CSIRO proporciona una base para validar tres dimensiones fundamentales del modelo. En primer lugar, la coherencia funcional de la relación entre datos de observación de la Tierra, condición ecosistémica y flujos de servicios, representada por las funciones f_{θ} y g_k . En segundo lugar, la consistencia contable del modelo, al reproducir la estructura de cuentas de extensión, condición, flujos físicos y flujos monetarios definida por el SEEA–EA. En tercer lugar, la plausibilidad económica de los resultados, al generar magnitudes comparables en orden de magnitud y comportamiento dinámico a las observadas en el caso del Murray–Darling Basin.

La Tabla 4 muestra que la validación del modelo SEEA–AI frente al benchmark CSIRO se basa en la correspondencia estructural entre componentes contables, unidades espaciales, funciones de servicios ecosistémicos y mecanismos de valoración. La comparación no implica una transferencia directa de parámetros, sino una evaluación de coherencia metodológica frente a una aplicación empírica consolidada del marco SEEA–EA. En consecuencia, el benchmark permite verificar que el modelo reproduce una arquitectura contable y funcional compatible con experiencias internacionales avanzadas, manteniendo la calibración local de variables biofísicas y económicas.

Dimensión de validación	Benchmark CSIRO Murray–Darling Basin	Modelo SEEA–AI	Criterio de validación
Marco contable	Cuentas compatibles con SEEA–EA	Cuentas de extensión, condición, flujos físicos, flujos monetarios y activos	Coherencia contable
Unidad espacial	Datos espaciales regionales y cuenca	Píxel, unidad ecosistémica o cuenca	Compatibilidad espacial
Variable de condición	Indicadores biofísicos y ecosistémicos	$Z_{i,t} = f_{\theta}(X_{i,t})$	Coherencia biofísica
Servicios ecosistémicos	Carbono, agua, sedimentos, biomasa y servicios recreativos	$S_{k,i,t} = g_k(Z_{i,t}, C_{i,t})$	Coherencia funcional

Valoración económica	Integración en cuentas monetarias y tablas extendidas de oferta y uso	$V_{k,i,t} = p_{k,t} \cdot S_{k,i,t}$	Coherencia económica
Transferibilidad	Aplicación regional en Murray–Darling Basin	Adaptación a otros territorios con parámetros locales	Transferibilidad estructural
Validación	Datos <i>account-ready</i> y consistencia SEEA–EA	Comparación estructural, funcional y de orden de magnitud	Plausibilidad empírica

Tabla 4: la validación del modelo SEEA–AI frente al benchmark CSIRO se basa en la correspondencia estructural entre componentes contables, unidades espaciales, funciones de servicios ecosistémicos y mecanismos de valoración.

En este contexto, el benchmark no se utiliza para transferir directamente valores monetarios o parámetros biofísicos, sino como referencia estructural para evaluar la robustez del modelo. Los parámetros específicos se calibran utilizando datos del contexto de aplicación, garantizando así la adaptabilidad del modelo a diferentes regiones.

Este enfoque de validación refuerza la credibilidad del modelo SEEA–AI, sugiriendo su capacidad para replicar estructuras contables y relaciones funcionales observadas en aplicaciones reales, manteniendo la adaptación a las condiciones locales.

3. RESULTADOS PRELIMINARES

3.1. Estimación de servicios ecosistémicos

Se aplicó el marco metodológico SEEA–AI para evaluar la condición ecosistémica y los cambios ambientales en la cuenca del río Sinú entre 2020 y 2024 mediante observación de la Tierra.

Los resultados muestran un enverdecimiento neto de la matriz vegetal de la cuenca durante 2020–2024. El NDVI medio derivado de Sentinel-2 aumentó de 0,563 a 0,622 ($\Delta\text{NDVI} = +0,058$) y el índice de condición ecosistémica C pasó de 0,642 a 0,714. La verificación cruzada con Landsat 8 arrojó un NDVI medio de 0,655 en 2024, con una diferencia inter-sensor de solo $-0,033$, dentro del sesgo sistemático conocido entre ambos sensores.

Esta mejora agregada de los indicadores ópticos es coherente entre sensores y refleja la dinámica de la matriz agrícola y de pastos, que domina la superficie de la cuenca. No obstante, la media regional no es por sí sola un indicador suficiente de la condición del capital natural: puede enmascarar pérdidas localizadas asociadas a cambios de uso del suelo, que se analizan en la Sección 4.

El análisis espacialmente explícito identificó, en efecto, perturbaciones localizadas: Hansen Global Forest Change registró 14.580 hectáreas de pérdida de bosque entre 2020 y 2024, las alertas de radar RADD/GFW confirmaron 5.605 hectáreas y MODIS Burned Area detectó 3.246 hectáreas afectadas por fuego. Estos focos coexisten con el enverdecimiento agregado y constituyen la base de la cuenta de pérdidas (Sección 4).

3.2. Dinámica del capital natural

La dinámica temporal del capital natural se evaluó comparando indicadores de condición ecosistémica derivados de observación de la Tierra para 2020 y 2024.

El NDVI medio derivado de Sentinel-2 aumentó de 0,563 a 0,622 entre 2020 y 2024, mientras que Landsat 8 registró 0,655 en 2024 (diferencia inter-sensor $-0,033$). El índice de condición C aumentó de 0,642 a 0,714, confirmando una mejora agregada de la condición de la vegetación a escala de cuenca.

No obstante, la evolución positiva observada a escala regional coexistió con procesos localizados de perturbación. El análisis de Hansen Global Forest Change identificó 14.580 ha de pérdida de bosque, las alertas RADD/GFW 5.605 ha y MODIS Burned Area 3.246 ha, concentradas en el alto Sinú y en frentes agrícolas.

Desde la perspectiva del SEEA-EA, estos resultados indican que la condición media del capital natural de la cuenca mejoró en términos de biomasa y verdor, pero que existen pérdidas localizadas de activos forestales que la media regional oculta. La aportación operativa de SEEA-AI es precisamente registrar de forma explícita esas pérdidas localizadas (Sección 4.8), incluso cuando los indicadores agregados muestran una tendencia positiva.

3.3. Validación cruzada mediante observación de la Tierra

Con el fin de evaluar la robustez de los resultados obtenidos, se realizó una validación cruzada utilizando observaciones independientes procedentes de Sentinel-2 y Landsat 8. Adicionalmente, los cambios detectados fueron contrastados mediante los conjuntos de datos Hansen Global Forest Change y MODIS Burned Area.

La comparación entre Sentinel-2 y Landsat 8 mostró tendencias consistentes en los indicadores de condición. El NDVI medio de Sentinel-2 en 2024 (0,622) frente al de Landsat 8 (0,655) presentó una diferencia de $-0,033$, dentro del sesgo sistemático inter-sensor documentado, lo que confirma la robustez de la señal óptica.

La validación temática mediante Hansen Global Forest Change identificó 14.580 hectáreas de pérdida de bosque (2020–2024) y MODIS Burned Area 3.246 hectáreas quemadas; de forma independiente, las alertas de radar RADD/GFW confirmaron 5.605 hectáreas de deforestación. La convergencia entre un sensor óptico (Hansen), uno de radar (RADD) y un producto de fuego (MODIS) refuerza la fiabilidad de la detección de perturbaciones.

La convergencia observada entre sensores ópticos de distinta resolución espacial y entre productos temáticos independientes proporciona evidencia adicional sobre la robustez de los resultados obtenidos y reduce la probabilidad de que los cambios detectados sean consecuencia de artefactos instrumentales o metodológicos.

Indicador	2020	2024	Fuente
NDVI	0,563	0,622	Sentinel-2
Condición C	0,642	0,714	Sentinel-2
NDVI (verificación)	—	0,655	Landsat 8

Pérdida de bosque (ha)	—	14.580	Hansen GFC
Alertas de deforestación (ha)	—	5.605	RADD/GFW
Área quemada (ha)	—	3.246	MODIS

3.4. Comparación metodológica con el benchmark de CSIRO (Murray–Darling Basin)

Los resultados obtenidos fueron comparados con el enfoque metodológico desarrollado por CSIRO para la evaluación de la condición ecosistémica en la cuenca Murray–Darling (Australia), ampliamente reconocido como uno de los casos de referencia para la implementación del marco SEEA–EA mediante observación de la Tierra.

La comparación se realizó considerando cuatro dimensiones: (i) integración de múltiples fuentes satelitales, (ii) uso de indicadores biofísicos de condición ecosistémica, (iii) validación mediante conjuntos de datos independientes y (iv) capacidad para generar métricas reproducibles y espacialmente explícitas.

Al igual que el enfoque de CSIRO, el modelo SEEA–AI integró múltiples fuentes de información satelital. En este estudio se utilizaron Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized, Landsat 8 Collection 2, Hansen Global Forest Change y MODIS Burned Area. La combinación de estas fuentes permitió evaluar simultáneamente cambios en la vegetación, pérdida forestal e impactos asociados a incendios.

Los resultados mostraron una elevada coherencia entre Sentinel-2 y Landsat 8, con tendencias consistentes en NDVI entre 2020 y 2024 (diferencia inter-sensor $-0,033$). La verificación con productos temáticos independientes (Hansen, RADD y MODIS) confirmó la localización de las perturbaciones, reproduciendo procedimientos compatibles con el marco SEEA–EA.

La similitud conceptual entre ambos enfoques confirma que la metodología propuesta puede generar indicadores compatibles con el marco SEEA–EA y reproducir procedimientos de evaluación comparables a los desarrollados por CSIRO, manteniendo al mismo tiempo la adaptación a las condiciones biofísicas específicas de la cuenca del río Sinú.

3.5. Validación empírica en la cuenca del río Sinú (Colombia)

La cuenca del río Sinú fue seleccionada como caso de estudio para validar empíricamente la metodología propuesta debido a su importancia estratégica para la regulación hídrica, la producción agropecuaria, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos en el Caribe colombiano.

La evaluación se realizó comparando indicadores de condición derivados de observación de la Tierra para 2020 y 2024. Los resultados muestran un enverdecimiento neto de la matriz vegetal (NDVI $0,563 \rightarrow 0,622$; condición $0,642 \rightarrow 0,714$) acompañado de focos de pérdida forestal localizada.

La validación temática identificó 14.580 hectáreas de pérdida de bosque mediante Hansen Global Forest Change, 5.605 hectáreas mediante alertas de radar RADD/GFW y 3.246 hectáreas afectadas por incendios según MODIS Burned Area.

La convergencia observada entre múltiples sensores y productos temáticos independientes proporciona una base sólida para la siguiente fase metodológica del estudio, consistente en la clasificación de estados de condición ecosistémica mediante algoritmos Random Forest. Esta aproximación permitirá generar mapas espaciales de condición ecosistémica comparables con los desarrollados en aplicaciones SEEA-EA basadas en observación de la Tierra, incluyendo los trabajos realizados por CSIRO en la cuenca Murray-Darling.

Este ejercicio ilustra la coherencia del enfoque SEEA-AI y sugiere que la integración IA-contabilidad tiene potencial para actualizar los resultados con mayor frecuencia que los inventarios convencionales, una capacidad que requiere validación operativa adicional.

3.6 Medición de la condición ecosistémica

El modelo utiliza NDVI como indicador base:

$$NDVI(x, t) = \frac{B8 - B4}{B8 + B4}$$

(Tucker, 1979; Myneni et al., 1997)

Se agrega a nivel territorial:

$$K_t = \frac{1}{|A|} \sum_{x \in A} NDVI(x, t)$$

Este índice representa la condición del ecosistema. Su uso está ampliamente validado en literatura ecológica (Pettorelli et al., 2005; Zhu et al., 2016).

3.7 Módulo de carbono

$$C_{flux}(i, t) = \alpha_b \cdot K_t(i, t) + \beta_b$$

$$C_{stock}(i, t) = \gamma_b \cdot K_t(i, t) \cdot A_i + \delta_b$$

Estas ecuaciones se basan en relaciones empíricas entre vegetación y carbono (Friedlingstein et al., 2020; Bonan, 2008).

Valor económico:

$$V_{carbon}(i, t) = C_{flux}(i, t) \cdot P_{CO2}$$

Permite conectar directamente con mercados de carbono (World Bank, 2024).

3.8 Valor del activo ecosistémico

$$NCA(i, t) = \sum_{\tau=0}^T \frac{SE(i, t + \tau) \cdot P}{(1 + r)^\tau}$$

Esta ecuación proviene de finanzas (Weitzman, 2001; Nordhaus, 2018). Representa el valor presente de los servicios futuros.

Variación:

$$\Delta NCA = NCA(t_2) - NCA(t_1)$$

Relación clave:

Nota de notación y consistencia de fórmulas. Se distinguen explícitamente: el flujo monetario anual $Y_t = \sum_k p_k \cdot S_{\{k,t\}}$ (USD/año); el activo de capital natural $K_t = \sum_n Y_{\{t+n\}} / (1+r)^n$ (USD); y su variación $\Delta K_t = K_t - K_{\{t-1\}}$ (USD). La descomposición precio-cantidad se expresa, en forma Laspeyres, como $\Delta Y_t = \sum_k (p_{\{k,t\}} - p_{\{k,t-1\}}) \cdot S_{\{k,t-1\}} + \sum_k p_{\{k,t\}} \cdot (S_{\{k,t\}} - S_{\{k,t-1\}})$, de modo que un aumento de servicios no aparece como pérdida. C denota el índice de condición $\in [0,1]$; φ y g , las funciones que traducen la condición en capacidad productiva y en flujo de servicios; S , el flujo físico; V , su valoración monetaria; y K , el activo de capital natural. Las ecuaciones gráficas del documento siguen esta notación.

$$\Delta NCA = f(\Delta K)$$

RESULTADOS

Esta sección presenta los resultados de SEEA-AI con tres objetivos: (i) validar el modelo frente a un benchmark reconocido (CSIRO - Murray-Darling Basin), (ii) demostrar su aplicabilidad en un caso real (cuenca del río Sinú, Colombia) y (iii) operacionalizar los resultados en términos económicos y contables, incluyendo el registro explícito de pérdidas por deforestación, degradación e incendios. La exposición sigue la lógica del modelo: condición → servicios → valor → activo → asiento contable.

4.1 Diseño de la validación y fuentes de datos

Se emplean dos configuraciones:

1. Calibración sobre el sistema de referencia CSIRO (Murray-Darling), que proporciona cuentas SEEA-EA consolidadas (extensión, condición, flujos y valor).
2. Transferencia al caso del río Sinú (2020–2024), con menor densidad de datos locales.

Datos de entrada (Sinú): Sentinel-2 (NDVI), MODIS (series temporales), Global Forest Change (Hansen et al., 2013) para pérdida de bosque y MODIS Burned Area para incendios. Resolución operativa: 10–30 m (EO) agregada a unidad de análisis.

Transferencia al caso del río Sinú mediante composites de estación seca 2019–2020 y 2023–2024 (ventana dic–mar), con menor densidad de datos locales. En el texto, «2020» y «2024» se refieren a estos composites estacionales, no a años calendario completos.

4.2 Validación frente a CSIRO (consistencia externa)

La validación compara la capacidad del modelo para reproducir (i) dinámica de condición, (ii) flujos (especialmente carbono) y (iii) valor económico agregado.

Métricas de ajuste (calibración):

$$NRMSE = 0.14, \quad \rho = 0.78$$

Métricas de transferencia (Sinú):

$$NRMSE = 0.18, \quad \rho = 0.71$$

Estos resultados indican un ajuste moderado-bueno y robustez en la transferencia. En el sistema de referencia (Murray–Darling, 2018–19) el módulo de IA alcanzó un R^2 de 0,77 sobre datos reservados (RMSE = 13,2 tC/ha; biomasa media $\approx$ 13 tC/ha con elevada varianza espacial, sd $\approx$ 27 tC/ha) en la estimación de biomasa aérea frente a las etiquetas independientes de NASA/ORNL, y reprodujo el secuestro de carbono por unidad publicado por Smith et al. (2025) dentro del 27 % (12,6 frente a 9,9 tCO₂/ha·año).

Estos resultados indican un ajuste moderado-bueno en el sistema de referencia. En el Murray–Darling (2018–19) el módulo de IA alcanzó un R^2 de 0,77 sobre datos reservados (RMSE = 13,2 tC/ha $\approx$ 48,4 tCO₂/ha; del orden de la media de biomasa, por la elevada varianza espacial), y reprodujo el potencial de captura primaria neta (MODIS NPP) dentro del 27 % del valor de secuestro publicado por Smith et al. (2025) (12,6 frente a 9,9 tCO₂/ha·año). Esta concordancia es de orden de magnitud; la NPP no equivale a remoción neta verificable de carbono.

Variable	CSIRO	SEEA-AI
Tendencia condición	↓	↓
Variación relativa	~-6%	-7.8%
Flujo medio CO ₂ (t/ha·año)	~3.1	~3.0

Error relativo valor	—	< 5%
----------------------	---	------

El modelo mantiene coherencia de orden de magnitud con las cuentas SEEA–EA del Murray–Darling (Smith et al., 2025) y reduce complejidad (menos dependencia de inventarios locales), aunque con incertidumbre significativa en la biomasa absoluta. El caso Murray–Darling se utiliza como benchmark de coherencia metodológica, no como validación empírica directa de la transferencia tropical al Sinú.

4.3 Evolución de la condición ecosistémica (Sinú)

A partir de NDVI agregado:

$$K_{2016} = 0.64, \quad K_{2025} = 0.59, \quad \Delta K = -0.05 \text{ } (-7.8\%)$$

El comportamiento agregado del NDVI refleja un enverdecimiento neto de la matriz vegetal. Sin embargo, este promedio coexiste con focos de degradación localizada que el indicador medio no captura; su identificación requiere un análisis espacialmente explícito, base de la cuenta de pérdidas.

4.4 Identificación de eventos y atribución

El descenso en K_t se explica por tres procesos:

- Deforestación (Hansen Global Forest Change): 14.580 ha
- Alertas de deforestación por radar (RADD/GFW): 5.605 ha
- Incendios (MODIS Burned Area): 3.246 ha

Formalmente:

$$Def(i, t) = Area_{forest}(t_1) - Area_{forest}(t_2) > 0, \quad \Delta K < 0, \quad Fire(i, t) = A_{burned}(i, t)$$

La combinación de estos eventos reduce la provisión de servicios SEjSE_jSEj, base de la valoración económica.

4.5 Flujos de carbono y traducción monetaria

La pérdida de carbono se estima a partir de la superficie deforestada y de la densidad de carbono de la biomasa aérea estimada por el módulo de Random Forest:

$$C_{flux}(i, t) = \alpha_b K_t + \beta_b$$

Resultado (pérdida de carbono en focos de deforestación): 14.580 ha × ≈130 tCO₂/ha ≈ 1,90 MtCO₂.

$$C_{flux,2016} = 3.2 \text{ tCO}_2/\text{ha} \cdot \text{año}, \quad C_{flux,2025} = 2.9 \text{ tCO}_2/\text{ha} \cdot \text{año}, \quad \Delta C_{flux} = -0.3$$

Con un precio de referencia del carbono de 25 USD/tCO₂ (World Bank, 2024; rango 20–30 USD/tCO₂):

$$P_{CO_2} = 25 \text{ USD/t}$$

se obtiene una pérdida económica localizada de ≈ 47 millones USD (rango 38–57 millones USD según el escenario de precio).

$$\Delta V_{carbon} = -7.5 \text{ USD/ha} \cdot \text{año}$$

Este resultado es económicamente interpretable y contrastable con mercados de carbono.

4.6 Pérdida de capital natural (flujo anual)

Aplicando la función de valoración:

$$\Delta NC(i, t) = \sum_j [\Delta S_j(i, t) \cdot P_j(t) \cdot Q_j(i, t)]$$

se obtiene la pérdida de capital natural localizada registrada en el periodo, del orden de 47 millones USD, atribuible a la conversión de bosque, pese al enverdecimiento neto de la matriz agrícola a escala de cuenca.

$$\Delta NC \approx -7.5 \text{ M USD/año}$$

Este valor integra carbono y otros servicios (regulación hídrica, productividad), y representa **menor capacidad de generación de beneficios**.

4.7 Valor del activo (NCA) y pérdida de riqueza

El capital natural como activo se calcula por valor presente:

$$NCA(i, t) = \sum_{\tau=0}^T \frac{SE(i, t + \tau) \cdot P}{(1 + r)^\tau}$$

Resultado: la pérdida localizada de activo natural (NCA) asociada a la deforestación asciende a ≈ 47 millones USD en el periodo 2020–2024.

$$NCA_{2016} = 312 \text{ M USD}, \quad NCA_{2025} = 275 \text{ M USD}, \quad \Delta NCA = -37 \text{ M USD}$$

Esta magnitud representa la pérdida localizada de riqueza natural que el sistema de cuentas espacialmente explícito aísla y registra, aun cuando los indicadores agregados de condición muestran una tendencia positiva. En términos financieros equivale a una depreciación parcial del activo en las zonas afectadas.

4.8 Registro contable explícito (innovación operativa)

SEEA-AI introduce el **asiento contable** de la pérdida, ausente en muchas implementaciones SEEA-EA:

Asiento consolidado:

- Debe (gasto/pérdida): Pérdida por degradación ambiental localizada = 47 M USD
- Haber (activo): Capital natural (NCA) = 47 M USD

Esta cifra corresponde a una pérdida puntual del stock de carbono almacenado liberado por la conversión de bosque ($\approx 1,90 \text{ MtCO}_2 \times 25 \text{ USD/tCO}_2$), no a un flujo anual recurrente; por tanto no se capitaliza a valor presente. Su desglose mínimo (Opción A) atribuye los $\approx 47 \text{ M USD}$ a la pérdida de carbono por deforestación; la valoración monetaria de la degradación sin cambio de uso y de los incendios queda pendiente de estimación específica. En términos del SEEA-EA, la pérdida se registra como reducción del activo ecosistémico (depreciación del capital natural) en una cuenta satélite ambiental, no como un asiento financiero de la contabilidad empresarial convencional.

Desglose por evento:

Evento	Pérdida (USD)
Deforestación	18 M
Degradación	12 M
Incendios	7 M
Total	37 M

Este registro hace auditable la pérdida y la integra en balance y resultados.

4.9 Integración macroeconómica

La corrección del crecimiento incorpora la variación del capital natural:

$$PIB^* = PIB + \Delta NC$$

Si $PIB = 5,000 \text{ M USD}$:

$$PIB^* = 4,963 \text{ M USD}$$

Se evita así sobreestimar el crecimiento en presencia de degradación.

4.10 Síntesis causal de resultados

La evidencia empírica confirma la cadena del modelo:

$$\Delta K \rightarrow \Delta SE \rightarrow \Delta NC \rightarrow \Delta NCA$$

- Deterioro ecológico → menor provisión de servicios
- Menor provisión → menor valor económico
- Menor valor → depreciación del activo y pérdida de riqueza

4.11 Repositorio reproducible

Se habilita un repositorio para replicabilidad completa del caso:

Nombre: ivilaruic_SEEA-AI — Repositorio: https://github.com/ivilaruic/SEEA_AI

4.11.1. Estructura del repositorio

4.11.2. Cálculos para determinar el resultado

4.11.3 Módulo IA

4.12 Comparación con la literatura reciente de Ecosystem Services

Los resultados obtenidos deben interpretarse en el contexto de la literatura reciente publicada en *Ecosystem Services*, donde se han desarrollado múltiples enfoques para la cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos (La Notte et al., 2019; Vallecillo et al., 2019; Hein et al., 2020). Estos trabajos han demostrado la viabilidad del marco SEEA-EA y su utilidad para la construcción de cuentas ambientales, aunque su implementación suele requerir procesos intensivos en datos y calibración local.

Asimismo, modelos ampliamente utilizados como InVEST (Nelson et al., 2009; Sharp et al., 2020) permiten estimar servicios ecosistémicos a partir de variables espaciales, pero no están diseñados para integrarse directamente en sistemas de contabilidad económica ni para generar activos comparables en términos financieros.

En comparación, SEEA-AI introduce tres avances relevantes. En primer lugar, automatiza la estimación de la condición ecosistémica mediante datos satelitales de alta frecuencia. En segundo lugar, traduce dicha condición en valor económico de forma directa, sin necesidad de modelos intermedios complejos. En tercer lugar, permite registrar explícitamente las variaciones del capital natural en términos contables, incluyendo pérdidas derivadas de procesos como la deforestación, la degradación o los incendios.

Estos resultados sugieren que el modelo no solo reproduce las capacidades de medición existentes, sino que amplía su alcance hacia una integración económica y contable completa. No solo validan el modelo desde un punto de vista técnico, sino que demuestran su capacidad para transformar datos ambientales en información económica directamente utilizable, reduciendo la distancia entre la medición ecológica y la toma de decisiones.

Los resultados obtenidos evidencian que la degradación ecológica observada no solo tiene implicaciones ambientales, sino que se traduce en una pérdida económica cuantificable y en una reducción del valor del capital natural como activo. Este resultado confirma la validez del modelo para transformar dinámicas ecológicas en variables económicas comparables con otros factores productivos.

4.13 Modelo IA

El módulo de aprendizaje automático (Random Forest, 200 árboles) muestra una capacidad predictiva moderada-buena en la estimación de la biomasa aérea de carbono. Entrenado sobre el sistema de referencia del Murray–Darling con etiquetas independientes de NASA/ORNL y 12 predictores (bandas Sentinel-2 B2–B12, NDVI, NDWI, NBR, elevación, pendiente y precipitación), con partición 70/30 ($n = 5.035$ entrenamiento; $n = 829$ test), alcanzó un R^2 de 0,77 y un RMSE de 13,2 tC/ha ($\approx 48,4$ tCO₂/ha) en validación sobre datos reservados, reproduciendo la media de referencia (14,6 frente a 13,1 tC/ha; equivalentes a 53,5 frente a 48,0 tCO₂/ha). El modelo se transfirió posteriormente a la cuenca del río Sinú.

El módulo de aprendizaje automático (Random Forest, 200 árboles) estima una aproximación relativa de la biomasa aérea de carbono, calibrada con la línea base global de NASA/ORNL (año 2010, 300 m); se utiliza, por tanto, para inferir diferencias espaciales y cambios relativos, no como inventario absoluto de carbono anual. Entrenado sobre el sistema de referencia del Murray–Darling con 12 predictores (bandas Sentinel-2 B2–B12, NDVI, NDWI, NBR, elevación, pendiente y precipitación) y partición 70/30 ($n = 5.035$ entrenamiento; $n = 829$ test), alcanzó un R^2 de 0,77 y un RMSE de 13,2 tC/ha (equivalente a 48,4 tCO₂/ha). El modelo es útil para clasificación relativa y contraste espacial, pero su error absoluto limita su uso como inventario financiero exacto. Como alternativa con cobertura temporal anual se recomienda ESA CCI Biomass (2007, 2010, 2015–2022).

Estos resultados confirman que el uso de inteligencia artificial permite capturar relaciones complejas entre variables satelitales y biofísicas, con métricas validadas frente a datos independientes. Las variables de mayor importancia fueron los índices de vegetación (NDVI, NBR) y las bandas del infrarrojo de onda corta (B11, B12). La partición se realizó por píxel aleatorio; se reconoce que ello no controla plenamente la autocorrelación espacial (posible fuga espacial), por lo que las métricas deben interpretarse como un límite superior optimista, y se plantea una validación con bloques espaciales como trabajo futuro. La transferencia entre biomas (semiárido → tropical) se efectuó re-localizando la referencia de condición (NDVI alto tropical) y añadiendo muestras tropicales al entrenamiento para evitar la extrapolación fuera del rango de biomasa observado en Australia.

Las variables de mayor importancia fueron los índices de vegetación (NDVI, NBR) y las bandas del infrarrojo de onda corta (B11, B12). Un Random Forest no extrapola fuera del rango de sus etiquetas: un modelo entrenado solo en el Murray–Darling subestima la biomasa tropical del Sinú, por lo que se añadieron muestras tropicales al entrenamiento y se re-localizó la referencia de condición. En consecuencia, el resultado del Sinú debe interpretarse como una calibración tropical contextual, no como una transferencia directa ni como prueba de transferibilidad global. La partición por píxel no controla plenamente la autocorrelación espacial (posible fuga espacial), por lo que las métricas representan un límite superior optimista; se plantea una validación con bloques espaciales como trabajo futuro.

Parámetro	Valor
Algoritmo	Random Forest (regresión;

	ee.Classifier.smileRandomForest)
Nº de árboles	200
Profundidad máxima	sin límite (por defecto)
Predictores (12)	B2–B12; NDVI, NDWI, NBR; elevación; pendiente; precipitación
Etiqueta	NASA/ORNL biomasa aérea (tC/ha; baseline global 2010, 300 m)
Muestras	n = 5.035 entrenamiento / 829 test
Partición	70/30, aleatoria por píxel (sin bloques espaciales — limitación)
Importancia (top)	NDVI, NBR, B11, B12 (SWIR)
R ² (test, MDB)	0,77
RMSE	13,2 tC/ha ($\approx$ 48,4 tCO ₂ /ha)
Región de entrenamiento	Murray–Darling (+ muestras tropicales del Sinú)

Tabla 9. Especificación del módulo de inteligencia artificial (Random Forest). El modelo predice una aproximación relativa de biomasa aérea; su error absoluto (RMSE $\approx$ 48,4 tCO₂/ha) lo hace apto para contraste espacial, no como inventario financiero exacto.

Servicio / variable	SEEA–AI (teledetección)	Smith et al. 2025	Concordancia / nota
Área de la cuenca	1.059.394 km ²	$\approx$ 1,06 M km ²	✓ Contorno oficial idéntico (Water Act 2007)
Productividad primaria neta (NPP)	12,6 tCO ₂ /ha·año (NPP MODIS)	9,9 tCO ₂ /ha·año	Mismo orden; EO +27 %; la NPP no equivale a secuestro/remoción neta (sin descontar respiración, perturbaciones, cosecha ni permanencia)
Stock de carbono	48,0 tCO ₂ /ha (biomasa aérea)	346 tCO ₂ /ha (incl. suelo)	Componente comparable: el stock de Smith está dominado por carbono de suelo
Retención / erosión de sedimentos	0,63 t/ha·año (proxy RUSLE)	0,47 t/ha·año (retención)	Mismo orden; conceptos distintos (pérdida bruta $\neq$ retención)
Suministro de agua	— (fuera de alcance EO)	8,9 GL	No derivable de NDVI; fuera de alcance
Pesca recreativa	— (fuera de alcance EO)	servicio no-SNA	No derivable de NDVI; fuera de alcance

Tabla 5. Validación por unidad SEEA–AI $\leftrightarrow$ Smith et al. (2025), Murray–Darling 2018–19.

La señal primaria de Sentinel-2 se corrobora con tres fuentes independientes:

Fuente	Tipo	Variable	Resultado	Lectura
Landsat 8	Óptico, sensor independiente	NDVI medio (ventana homogénea)	$\Delta(S2\text{--}Landsat) = -0,048$	Consistencia inter-sensor dentro del sesgo conocido
Hansen GFC v1.12	Óptico, pérdida anual	Pérdida de bosque 2018-19	524.266 ha	Confirma la perturbación de forma independiente
MODIS MCD64A1	Quemado, sensor independiente	Área quemada 2018-19	193.105 ha	Confirma el fuego como motor de perturbación

Tabla 6. Verificación cruzada de la señal Sentinel-2 (Murray–Darling).

4.15. Cuentas paralelas de las dos cuencas (referencia y aplicación)

Indicador	Murray–Darling (ref., 2018-19)	Río Sinú (aplic., 2020-2024)
Área	1.059.394 km ²	14.065 km ²
NDVI medio	0,229	0,563 $\rightarrow$ 0,622
Condición C	0,274 (ref. 0,70 semiárida)	0,642 $\rightarrow$ 0,714 (ref. 0,85 tropical)
Δ NDVI	—	+0,058 (enverdecimiento)

Captura primaria neta NPP (tCO₂/ha·año)	12,6	21–23
Carbono biomasa AGB, RF (tCO₂/ha)	53,5 (≈NASA/ORNL 48)	132 → 140 (Δ +8,9)
Sedimentos, proxy RUSLE (t/ha·año)	0,63	0,45
Verificación Landsat Δ(S2–Landsat)	–0,048	–0,033
Pérdida de bosque Hansen (ha)	524.266	14.580
Alertas RADD/GFW (ha)	— (sin cobertura)	5.605
Área quemada MODIS (ha)	193.105	3.246
Módulo IA Random Forest	R ² =0,77; RMSE=13,2 tC/ha	transferido (parámetros re-localizados)

Tabla 7. Cuentas SEEA–AI paralelas de la cuenca de referencia (Murray–Darling) y la cuenca de aplicación (río Sinú). El contraste semiárido ↔ tropical es coherente físicamente (mayor NDVI y NPP en el trópico) y la señal de cada cuenca se verifica con Landsat, Hansen, RADD y MODIS.

4.16. Cartografía de resultados




Figura 9. Murray–Darling 2018–19: composición Sentinel-2 (izq.) e índice de condición ecosistémica C (der.), con el gradiente semiárido oeste–este característico.




Figura 10. Módulo Random Forest: biomasa aérea de carbono estimada en el río Sinú (izq.) y su variación 2020–2024 Δ AGB (der.; rojo = pérdida en focos de deforestación, verde = ganancia de la matriz agrícola).




Figura 11. Río Sinú: composición Sentinel-2 (izq.) e índice NDVI / condición (der.) para 2024.




Figura 12. Río Sinú, perturbaciones 2020–2024: pérdida de bosque Hansen (izq., en rojo) y alertas de deforestación por radar RADD/GFW (der., en magenta), concentradas en el alto Sinú.

4.17. Incertidumbre y análisis de sensibilidad de la pérdida localizada

La pérdida localizada de carbono por deforestación (14.580 ha) se propaga a través de la densidad de carbono y del precio del carbono. Por tratarse de una pérdida puntual de stock (no de un flujo anual), la tasa de descuento no se aplica. La incertidumbre dominante procede de la densidad de carbono del bosque convertido y del precio del carbono.

Escenario	Densidad C (tCO ₂ /ha)	Precio (USD/tCO ₂)	Pérdida (M USD)
Conservador	110	20	32,1

Base	130	25	47,4
Alto	150	30	65,6

Tabla 8. Sensibilidad de la pérdida localizada de carbono (rango $\approx 32\text{--}66$ M USD; valor base ≈ 47 M USD). La biomasa absoluta del módulo de IA conserva una incertidumbre significativa ($RMSE \approx 48,4$ tCO₂/ha), por lo que estas cifras se interpretan como órdenes de magnitud, no como inventario financiero exacto.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten situar SEEA-AI en el estado del arte de la economía ambiental y, al mismo tiempo, identificar con claridad sus aportaciones, límites y alcance operativo. La discusión se organiza en torno a cuatro ejes: consistencia con la literatura, aportación metodológica, implicaciones económicas y limitaciones.

5.1 Coherencia con el marco SEEA-EA y la literatura existente

El modelo es consistente con la estructura conceptual del SEEA-EA (United Nations, 2021), al reproducir sus cinco cuentas (extensión, condición, flujos físicos, flujos monetarios y activos). En este sentido, no introduce una ruptura metodológica, sino una operacionalización de dicho marco mediante datos de observación de la Tierra y modelización económica.

En comparación con implementaciones avanzadas como el Murray–Darling Basin (CSIRO; Smith et al., 2025), los resultados muestran coherencia de orden de magnitud en la cuenta de referencia, lo que aporta validez externa de coherencia metodológica —no una validación empírica directa de la aplicación tropical al Sinú.

Asimismo, el modelo se alinea con la literatura sobre valoración de servicios ecosistémicos (Costanza et al., 1997; de Groot et al., 2012), al mantener la estructura de suma de servicios ponderados por precios. Sin embargo, avanza al integrar explícitamente estos valores en una dinámica temporal y contable.

5.2 Aportación metodológica principal

La contribución central del modelo es la introducción de una relación explícita entre condición ecosistémica y valor económico:

$$\Delta K \rightarrow \Delta NC \rightarrow \Delta NCA$$

Esta relación, aunque intuitiva, no suele formalizarse de manera operativa en la literatura. En muchos estudios, la condición ecológica y la valoración económica se tratan como procesos separados (Fisher et al., 2009; Polasky et al., 2015). SEEA-AI los integra en una única estructura funcional.

Adicionalmente, el modelo introduce un elemento clave ausente en la mayoría de enfoques: el registro contable explícito de pérdidas. Mientras que el SEEA-EA permite identificar cambios en activos, no establece necesariamente su traducción directa en asientos económicos. SEEA-AI cubre este vacío, convirtiendo la degradación ambiental en una variable contable auditable.

5.3 Implicaciones económicas

Los resultados tienen implicaciones relevantes tanto a nivel micro como macroeconómico.

A nivel microeconómico, el modelo reduce la incertidumbre en la valoración ambiental, facilitando la internalización de externalidades (Boyd y Banzhaf, 2007). Esto es especialmente relevante en mercados de carbono, certificaciones y decisiones de inversión.

A nivel macroeconómico, la incorporación del capital natural en el cálculo del crecimiento económico:

$$PIB^* = PIB + \Delta NC$$

la fórmula responde directamente a las críticas sobre la insuficiencia del PIB como indicador de bienestar (Stiglitz et al., 2009; Dasgupta, 2021). El modelo permite cuantificar de forma sistemática la contribución —positiva o negativa— del medio ambiente a la economía.

Además, el tratamiento del capital natural como activo permite integrarlo en marcos de análisis financiero, abriendo la puerta a su consideración en balances, riesgo sistémico y planificación económica.

5.4 Comparación con modelos alternativos

En comparación con herramientas como InVEST (Nelson et al., 2009) o modelos biofísicos complejos, SEEA-AI presenta tres diferencias principales:

1. Menor complejidad operativa, al basarse en relaciones funcionales agregadas
2. Mayor escalabilidad, al depender de datos satelitales globales
3. Integración económica directa, sin necesidad de modelos intermedios

Sin embargo, esta simplificación implica una menor capacidad para capturar procesos ecológicos específicos a escala local.

5.5 Limitaciones del modelo

A pesar de sus ventajas, el modelo presenta limitaciones que deben considerarse:

En primer lugar, el uso del NDVI como proxy de condición puede generar sesgos en ecosistemas densos o heterogéneos, donde el índice presenta saturación (Pettorelli et al., 2005). La incorporación de indicadores adicionales podría mejorar la precisión.

En segundo lugar, la valoración económica depende de precios que, en muchos casos, no están observados directamente y deben estimarse. Esto introduce incertidumbre, especialmente en servicios no de mercado (Brander et al., 2021).

En tercer lugar, la relación lineal entre condición y servicios puede simplificar excesivamente dinámicas ecológicas complejas. Aunque funcionalmente útil, esta aproximación puede requerir ajustes en contextos específicos.

Por último, la validación se basa en un número limitado de casos. Aunque los resultados son robustos, la generalización completa del modelo requiere aplicaciones adicionales en distintas regiones.

Adicionalmente, deben considerarse limitaciones operativas: (i) la condición se estima sobre superficie terrestre no inundada, ya que la máscara de agua (MNDWI) puede excluir humedales estacionales y cuerpos turbios; (ii) los indicadores corresponden a composites de estación seca (dic-mar), no a años calendario completos; (iii) el carbono de biomasa se calibra con una línea base global de 2010 (NASA/ORNL), por lo que representa una aproximación relativa y no un inventario absoluto del periodo; y (iv) el carbono de suelo no es recuperable con Sentinel y requiere productos edáficos externos (SoilGrids/SLGA).

5.6 Alcance y aplicabilidad

A pesar de estas limitaciones, el modelo presenta un alto potencial de aplicación:

- Política pública: medición de impacto ambiental y diseño de regulaciones
- Mercados de carbono: cuantificación y verificación de créditos
- Finanzas sostenibles: valoración de activos naturales
- Planificación territorial: evaluación de escenarios

La combinación de datos abiertos, modelización económica y registro contable lo convierte en una herramienta operativa más allá del ámbito académico.

Por tanto, SEEA-AI se sitúa como una evolución natural del SEEA-EA: mantiene su coherencia conceptual, pero amplía su alcance al integrar inteligencia artificial, escalabilidad global y contabilidad económica explícita. Su principal aportación no es solo medir el capital natural, sino convertirlo en una variable económica operativa, capaz de integrarse en decisiones reales.

El modelo confirma que la sostenibilidad no es únicamente una cuestión ambiental, sino un componente central de la economía, medible, cuantificable y registrable.

El uso de inteligencia artificial introduce una mejora metodológica relevante, al permitir capturar relaciones no lineales entre variables ecológicas y económicas, aspecto que no está presente en enfoques tradicionales de contabilidad ambiental.

5.7 Diferenciación frente a la literatura existente

La literatura sobre contabilidad ecosistémica y servicios ecosistémicos ha avanzado significativamente en la medición biofísica, la valoración económica y la integración contable del capital natural. Sin embargo, estos tres niveles suelen desarrollarse de forma separada o parcialmente conectada.

El marco SEEA-EA proporciona una arquitectura contable robusta para organizar cuentas de extensión, condición, flujos y activos ecosistémicos, pero no prescribe un mecanismo operativo único para transformar datos satelitales en valores económicos actualizables. Por su parte, herramientas como InVEST permiten modelar servicios ecosistémicos espacialmente explícitos, aunque su objetivo principal no es generar registros contables de activos naturales comparables con otros activos económicos. Asimismo, experiencias avanzadas como Murray-Darling Basin muestran la viabilidad de la contabilidad ecosistémica aplicada, pero suelen requerir altos niveles de información local, calibración institucional y esfuerzo técnico.

En este contexto, SEEA-AI se diferencia por integrar en una misma estructura operativa tres componentes: observación de la Tierra, valoración económica y registro contable del capital natural. Su contribución no consiste únicamente en estimar servicios ecosistémicos, sino en vincular la condición ecológica observada con variaciones monetarias del activo natural, permitiendo interpretar la mejora del ecosistema como acumulación de capital y su deterioro como depreciación económica.

Esta integración permite que los cambios ambientales sean expresados como variaciones contables auditables, lo que facilita su uso en política pública, planificación territorial, mercados de carbono y evaluación de inversiones sostenibles. Así, SEEA-AI amplía la aplicación práctica del SEEA-EA al ofrecer un procedimiento dinámico, espacialmente explícito y potencialmente escalable para convertir información biofísica en información económica comparable. La tabla a continuación muestra diferentes enfoques y sus diferencias.

Enfoque	Medición biofísica	Valoración económica	Integración contable	Actualización dinámica	Registro explícito de pérdidas
SEEA-EA	Sí	Sí	Sí	Parcial	Parcial

InVEST	Sí	Sí	No es su foco principal	Parcial	No
Murray-Darling/CSIRO	Sí	Sí	Sí	Parcial	Limitado
SEEA-AI	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

5.8 Implicaciones para policy y mercados

La integración del capital natural en sistemas económicos operativos tiene implicaciones directas para el diseño de políticas públicas y mercados ambientales. En particular, la capacidad de registrar pérdidas de capital natural como eventos contables permite mejorar la transparencia en la gestión de recursos naturales y facilitar la internalización de externalidades.

En el ámbito de los mercados de carbono, el modelo proporciona una base cuantitativa para la generación y verificación de créditos, reduciendo la incertidumbre asociada a la medición. En el ámbito de la política pública, permite evaluar el impacto económico de decisiones territoriales y ambientales de forma más precisa. Finalmente, en el contexto de las finanzas sostenibles, abre la posibilidad de integrar el capital natural en análisis de riesgo y valoración de activos.

CONCLUSIONES

La investigación muestra que es posible convertir el estado de los ecosistemas en una variable económica operativa. El modelo SEEA-AI permite medir la condición ambiental con datos satelitales y traducirla a indicadores económicos compatibles con las cuentas nacionales.

Los resultados confirman que el modelo es sólido desde el punto de vista técnico y consistente con referencias avanzadas como el caso del Murray-Darling Basin desarrollado por CSIRO. Al mismo tiempo, muestra una ventaja clara: reduce la complejidad operativa y permite aplicar la metodología en distintos territorios sin depender de inventarios locales intensivos, lo que facilita su escalabilidad.

La aportación principal no es únicamente metodológica, sino económica y contable. SEEA-AI permite registrar explícitamente las pérdidas de capital natural derivadas de procesos como la deforestación, la degradación o los incendios. Esto supone un avance relevante, ya que convierte la degradación ambiental en una pérdida económica medible y registrable, integrable en balances y cuentas de resultados.

Desde una perspectiva macroeconómica, el modelo permite corregir la medición del crecimiento económico al incorporar la variación del capital natural. Esto responde a una limitación ampliamente reconocida en la literatura: los indicadores tradicionales no reflejan adecuadamente el deterioro ambiental, lo que puede llevar a una sobreestimación del bienestar económico.

En términos prácticos, el modelo abre nuevas aplicaciones en política pública, mercados de carbono, finanzas sostenibles y planificación territorial. Su capacidad para generar resultados reproducibles y auditables lo convierte en una herramienta útil más allá del ámbito académico.

Existen, no obstante, limitaciones. La dependencia de indicadores satelitales puede introducir sesgos en ciertos ecosistemas, la valoración económica de algunos servicios sigue siendo incierta y será necesario ampliar la validación en distintos contextos geográficos. Estas cuestiones definen una agenda clara de investigación futura.

La principal aportación de este trabajo es mostrar que el capital natural puede integrarse en el sistema económico no solo como objeto de medición, sino como un activo cuyas variaciones —incluidas las pérdidas localizadas— pueden registrarse de forma explícita.

El modelo propuesto integra técnicas de inteligencia artificial dentro de un marco económico, permitiendo una estimación más precisa y dinámica del capital natural y facilitando su incorporación en sistemas de decisión.

REFERENCIAS

United Nations, 2021. System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting (SEEA-EA). United Nations, New York.

United Nations, European Commission, FAO, IMF, OECD, World Bank, 2014. System of Environmental-Economic Accounting 2012—Central Framework. United Nations, New York.

Obst, C., 2015. Reflections on natural capital accounting at the national level. *Ecological Economics* 112, 16–23.

Vardon, M., Burnett, P., Dovers, S., 2016. The accounting push and the policy pull: Balancing environment and economy. *Ecological Economics* 124, 145–152.

Keith, H., Vardon, M., Stein, J., Lindenmayer, D., 2017. Ecosystem accounts define explicit and spatial trade-offs for managing natural resources. *Ecological Economics* 132, 164–171.

Edens, B., Hein, L., 2013. Towards a consistent approach for ecosystem accounting. *Ecological Economics* 90, 41–52.

European Commission, 2013. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES). Publications Office of the European Union.

OECD, 2017. Natural Capital Accounting. OECD Publishing, Paris.

World Bank, 2018. WAVES Annual Report. World Bank, Washington, DC.

UNSD, 2021. SEEA Ecosystem Accounting Technical Recommendations. United Nations, New York.

United Nations, 2022. SEEA Ecosystem Accounting Implementation Strategy. United Nations, New York.

Hein, L., Bagstad, K., Obst, C., Edens, B., Schenau, S., Castillo, G., 2020. Progress in natural capital accounting for ecosystems. *Ecosystem Services* 44, 101085.

Remme, R.P., Edens, B., Schröter, M., Hein, L., 2015. Monetary accounting of ecosystem services: A test case for Limburg province. *Ecological Economics* 112, 116–128.

La Notte, A., Marques, A., Crosato, A., Vallecillo, S., Maes, J., 2019. Ecosystem services classification: A systems ecology perspective. *Ecosystem Services* 36, 100911.

- Banerjee, O., Vardon, M., Keith, H., Burnett, P., 2020. Integrating natural capital accounting into economic policy. *Ecosystem Services* 44, 101092.
- Barton, D., Obst, C., Thackway, R., 2019. Accounting for ecosystem services. *Ecosystem Services* 37, 100937.
- Vallecillo, S., La Notte, A., Ferrini, S., Maes, J., 2019. Ecosystem services accounts: Valuation of ecosystem condition. *Ecosystem Services* 39, 100996.
- Maes, J., Teller, A., Erhard, M., Liqueste, C., Braat, L., Berry, P., Egoh, B., Puydarrieux, P., Fiorina, C., Santos, F., 2018. Mapping and assessment of ecosystems and their services. *Ecosystem Services* 29, 1–9.
- Schröter, M., Remme, R., Sumarga, E., Barton, D., Hein, L., 2014. Ecosystem service supply and demand. *Ecological Economics* 100, 158–167.
- Boyd, J., Banzhaf, S., 2007. What are ecosystem services? *Ecological Economics* 63, 616–626.
- Daily, G.C., 1997. *Nature's Services*. Island Press, Washington, DC.
- Millennium Ecosystem Assessment, 2005. *Ecosystems and Human Well-being*. Island Press.
- TEEB, 2010. *The Economics of Ecosystems and Biodiversity*. Earthscan.
- World Bank, 2021. *The Changing Wealth of Nations 2021*. World Bank.
- Dasgupta, P., 2021. *The Economics of Biodiversity*. Cambridge University Press.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R., Paruelo, J., Raskin, R., Sutton, P., van den Belt, M., 1997. The value of ecosystem services. *Nature* 387, 253–260.
- Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S., Kubiszewski, I., Farber, S., Turner, R., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Change* 26, 152–158.
- Arrow, K., Dasgupta, P., Goulder, L., Mumford, K., Oleson, K., 2012. Sustainability and wealth. *Environment and Development Economics* 17, 317–353.
- Hamilton, K., Clemens, M., 1999. Genuine savings rates. *World Bank Economic Review* 13, 333–356.
- Solow, R., 1993. Sustainability: An economist's perspective. In: Dorfman, R., Dorfman, N. (Eds.), *Economics of the Environment*. Norton.
- Nordhaus, W., 1994. *Managing the Global Commons*. MIT Press.
- Stern, N., 2007. *The Economics of Climate Change*. Cambridge University Press.
- Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J., 2009. Report on the Measurement of Economic Performance. Commission on Economic Performance.
- Pearce, D., Turner, R., 1990. *Economics of Natural Resources*. Johns Hopkins University Press.
- Daly, H., 1996. *Beyond Growth*. Beacon Press.
- Hartwick, J., 1977. Intergenerational equity. *American Economic Review* 67, 972–974.
- Weitzman, M., 2001. Gamma discounting. *American Economic Review* 91, 260–271.

- Pindyck, R., 2013. Climate policy analysis. *Journal of Economic Literature* 51, 860–872.
- Tol, R., 2009. Social cost of carbon. *Journal of Economic Perspectives* 23, 29–51.
- Nordhaus, W., 2017. Revisiting SCC. *PNAS* 114, 1518–1523.
- Dietz, S., Stern, N., 2015. Endogenous growth. *Economic Journal* 125, 574–620.
- Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L., Hemous, D., 2012. Directed technical change. *American Economic Review* 102, 131–166.
- Aghion, P., Dechezleprêtre, A., Hémous, D., Martin, R., Van Reenen, J., 2016. Growth and environment. *Journal of Political Economy* 124, 1–51.
- Barbier, E., 2011. *Natural capital and wealth*. Cambridge University Press.
- Hallegatte, S., 2012. *Green growth*. World Bank.
- Heal, G., 2000. *Nature and the Marketplace*. Island Press.
- Perman, R., Ma, Y., McGilvray, J., Common, M., 2011. *Natural Resource and Environmental Economics*. Pearson.
- Mäler, K.G., Aniyar, S., Jansson, Å., 2008. Accounting for ecosystem services. *Environmental and Resource Economics* 39, 1–15.
- Arrow, K., Dasgupta, P., Goulder, L., Mumford, K., Oleson, K., 2003. Comprehensive wealth. *Environment and Development Economics* 8, 181–205.
- UNEP, 2012. *Inclusive Wealth Report*. UNEP.
- de Groot, R., Brander, L., van der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L., Christie, M., Crossman, N., Ghermandi, A., Hein, L., Hussain, S., Kumar, P., McVittie, A., Portela, R., Rodriguez, L., ten Brink, P., van Beukering, P., 2012. Global estimates of ecosystem services. *Ecosystem Services* 1, 50–61.
- Brander, L., Eppink, F., Wagtendonk, A., 2021. Meta-analysis valuation. *Ecosystem Services* 50, 101318.
- Bateman, I., Harwood, A., Mace, G., Watson, R., Abson, D., Andrews, B., Binner, A., Crowe, A., Day, B., Dugdale, S., Fezzi, C., Foden, J., Hadley, D., Haines-Young, R., Hulme, M., Kontoleon, A., Lovett, A., Munday, P., Pascual, U., Paterson, J., Perino, G., Sen, A., Siriwardena, G., van Soest, D., Termansen, M., 2013. Bringing ecosystem services into decision making. *Science* 341, 45–50.
- Freeman, A., 2003. *The Measurement of Environmental and Resource Values*. Resources for the Future.
- Hanley, N., Barbier, E., 2009. *Pricing Nature*. Edward Elgar.
- Carson, R., 2012. Contingent valuation. *Journal of Economic Perspectives* 26, 21–46.
- Loomis, J., 2000. Environmental valuation techniques. *Journal of Environmental Management* 59, 45–60.
- Johnston, R., Boyle, K., Adamowicz, W., Bennett, J., Brouwer, R., Cameron, T., Hanemann, W., Hanley, N., Ryan, M., Scarpa, R., Tourangeau, R., Vossler, C., 2017. Contemporary guidance for stated preference studies. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists* 4, 319–405.
- Tietenberg, T., Lewis, L., 2006. *Environmental and Natural Resource Economics*. Pearson.

- Farber, S., Costanza, R., Wilson, M., 2006. Economic valuation of ecosystem services. *Ecological Economics* 41, 375–392.
- Turner, R., Fisher, B., Morse-Jones, S., 2010. Ecosystem services and economics. *Ecological Economics* 69, 1–9.
- Polasky, S., Bryant, B., Hawthorne, P., Johnson, J., Keeler, B., Pennington, D., 2015. Inclusive wealth accounting. *Ecosystem Services* 12, 15–26.
- Tucker, C., 1979. Red and photographic infrared linear combinations. *Remote Sensing of Environment* 8, 127–150.
- Myneni, R., Hall, F., Sellers, P., Marshak, A., 1997. NDVI and productivity. *Remote Sensing of Environment* 49, 200–211.
- Pettorelli, N., Vik, J., Mysterud, A., Gaillard, J., Tucker, C., Stenseth, N., 2005. Using NDVI in ecology. *Trends in Ecology & Evolution* 20, 503–510.
- Zhu, Z., Piao, S., Myneni, R., Huang, M., Zeng, Z., Canadell, J., Ciais, P., Sitch, S., Friedlingstein, P., Arneeth, A., Cao, C., Cheng, L., Kato, E., Koven, C., Li, Y., Lian, X., Liu, Y., Liu, R., Mao, J., Pan, Y., Peng, S., Penuelas, J., Poulter, B., Pugh, T., Stocker, B., Viovy, N., Wang, X., Wang, Y., Xiao, Z., Yang, H., Zaehle, S., Zeng, N., 2016. Greening Earth. *Nature Climate Change* 6, 791–795.
- Running, S., Nemani, R., Heinsch, F., Zhao, M., Reeves, M., Hashimoto, H., 2004. MODIS productivity. *BioScience* 54, 547–560.
- Hansen, M., Potapov, P., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S., Goetz, S., Loveland, T., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C., Townshend, J., 2013. Global forest change. *Science* 342, 850–853.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R., 2017. Google Earth Engine. *Remote Sensing of Environment* 202, 18–27.
- Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., Hoersch, B., Isola, C., Laberinti, P., Martimort, P., Meygret, A., Spoto, F., Sy, O., Marchese, F., Bargellini, P., 2012. Sentinel-2 mission. *Remote Sensing of Environment* 120, 25–36.
- Li, W., MacBean, N., Ciais, P., Defourny, P., 2014. Remote sensing ecosystems. *Remote Sensing of Environment* 155, 239–255.
- Belgiu, M., Drăguț, L., 2016. Random forest in remote sensing. *ISPRS Journal* 114, 24–31.
- Foody, G., 2002. Classification accuracy. *Remote Sensing of Environment* 80, 185–201.
- Wulder, M., Masek, J., Cohen, W., Loveland, T., Woodcock, C., 2018. Landsat applications. *Remote Sensing of Environment* 185, 271–283.
- Asner, G., 2009. LiDAR ecosystems. *Remote Sensing of Environment* 113, S16–S24.
- Kuenzer, C., Dech, S., 2015. Remote sensing of ecosystems. Springer.
- Turner, W., Spector, S., Gardiner, N., Fladeland, M., Sterling, E., Steininger, M., 2003. Biodiversity monitoring. *Trends in Ecology & Evolution* 18, 306–314.
- Friedl, M., Sulla-Menashe, D., Tan, B., Schneider, A., Ramankutty, N., Sibley, A., Huang, X., 2010. MODIS land cover. *Remote Sensing of Environment* 114, 168–182.

- Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., 2016. Deep Learning. MIT Press.
- LeCun, Y., Bengio, Y., Hinton, G., 2015. Deep learning. *Nature* 521, 436–444.
- Reichstein, M., Camps-Valls, G., Stevens, B., Jung, M., Denzler, J., Carvalhais, N., 2019. Deep learning and Earth system science. *Nature* 566, 195–204.
- Rolnick, D., Donti, P., Kaack, L., Kochanski, K., Lacoste, A., Sankaran, K., Ross, A., Milojevic-Dupont, N., Jaques, N., Waldman-Brown, A., Luccioni, A., Maharaj, T., Sherwin, E., Muckavilli, S., Kording, K., Gomes, C., Ng, A., Hassabis, D., Platt, J., Creutzig, F., Chayes, J., Bengio, Y., 2019. AI for climate change. *arXiv*.
- Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G., 2012. ImageNet classification. *NIPS*.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A., Kaiser, L., Polosukhin, I., 2017. Attention is all you need. *NIPS*.
- Chen, T., Guestrin, C., 2016. XGBoost. *KDD*.
- Breiman, L., 2001. Random forests. *Machine Learning* 45, 5–32.
- IPCC, 2021. Climate Change 2021. Cambridge University Press.
- World Bank, 2024. Carbon Pricing Dashboard. World Bank.
- Ouyang, Z., et al., 2016. Improvements in ecosystem services. *Science* 352, 1455–1459.
- Chaplin-Kramer, R., et al., 2019. Nature’s contributions to people. *Science* 366, 255–258.
- Sharp, R., et al., 2020. InVEST User Guide. Natural Capital Project.
- Gueyry, A., et al., 2015. Natural capital in decisions. *PNAS* 112, 7348–7355.
- Daily, G., et al., 2020. Mainstreaming natural capital. *Science* 367, 1279–1281.
- Breiman, L., 2001. Random forests. *Machine Learning* 45, 5–32.
- Reichstein, M., Camps-Valls, G., Stevens, B., et al., 2019. Deep learning and Earth system science. *Nature* 566, 195–204.
- Jones, L., Norton, L., Austin, Z., et al. (2016). Stocks and flows of natural and human-derived capital in ecosystem services. *Land Use Policy*, 52, 151–162.
- United Nations et al. (2021). System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting (SEEA EA). United Nations.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
- Belgiu, M., & Drăguț, L. (2016). Random forest in remote sensing: A review of applications and future directions. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 114, 24–31.
- CSIRO. (2024). Experimental ecosystem accounts for the Murray–Darling Basin. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.
- Greg S. Smith, et al., (2024) CSIRO. Accounting for ecosystem services using extended supply and use tables: A case study of the Murray–Darling Basin, Australia.

Smith, G. S., Stewart, S. B., Scheufele, G., Evans, D., Liu, N., Pascoe, S., Roxburgh, S. H., Schmidt, R. K., & Vardon, M. (2025). Accounting for ecosystem services using extended supply and use tables: A case study of the Murray–Darling Basin, Australia. *Ecosystem Services*, 74, 101741.

Castaldi, F., Chabrillat, S., Don, A., van Wesemael, B., 2019. Evaluating the capability of the Sentinel 2 data for soil organic carbon prediction in croplands. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 147, 267–282.

Vaudour, E., Gomez, C., Fouad, Y., Lagacherie, P., 2019. Sentinel-2 image capacities to predict common topsoil properties of temperate and Mediterranean agroecosystems. *Remote Sensing of Environment* 223, 21–33.

Vaudour, E., Gomez, C., Lagacherie, P., et al., 2022. Temporal mosaicking approaches of Sentinel-2 images for soil organic carbon prediction robustness. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 183, 96–113.

Spawn, S.A., Sullivan, C.C., Lark, T.J., Gibbs, H.K., 2020. Harmonized global maps of above and belowground biomass carbon density (NASA/ORNL). *Scientific Data* 7, 112.

ONS. (2024). UK natural capital accounts methodology guide: 2024. Office for National Statistics.