

Семинар 04

Ивайло Андреев

13 март 2025

1 Уравнения, нерешени относно производната

1.1 Общ случай

$$y(x) = f(x, y'(x))$$

Полагаме $z(x) = y'(x)$

Получаваме $y(x) = f(x, z(x))$

Диференцираме по x .

Трябва да се получи нещо хубаво.

ВАЖНО! В крайния отговор трябва да има точно 1 константа, тъй като това е ОДУ от първи ред!

1.2 2024г., контролно 1, вариант С, задача 2

$$y = x^2(y')^2 + x \ln xy' + 1$$

Полагаме $z(x) = y'(x)$

$$y = x^2 z^2 + x \ln xz + 1 \quad (*)$$

Диференцираме у-нието (*) по x

$$y' = 2xz^2 + 2x^2zz' + (x \ln x)'z + x \ln xz'$$

$$z = 2xz^2 + 2x^2zz' + (\ln x + 1)z + x \ln xz'$$

$$\cancel{z} = 2xz^2 + 2x^2zz' + \ln xz + \cancel{z} + x \ln xz'$$

$$0 = 2xz^2 + 2x^2zz' + \ln xz + x \ln xz'$$

$$0 = 2xz(z + xz') + \ln x(z + xz')$$

$$0 = (z + xz')(2xz + \ln x)$$

Първи случай: $z + xz' = 0$

$$z'x = -z$$

Проверяваме дали $z \equiv 0$ е решение, като заместим в (*). $y = 1$ е решение.
Делим на $z \neq 0$

$$\frac{z'}{z} = -\frac{1}{x}$$

Интегрираме по x

$$\int \frac{1}{z} dz = - \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln |z| = \ln |x| + C$$

$$e^{\ln |z|} = e^{\ln |\frac{1}{x}| + C}$$

$$|z| = e^C \left| \frac{1}{x} \right|$$

$$z = \pm C_1 \frac{1}{x}$$

$$z = C_2 \frac{1}{x}$$

Заместваме в (*) с z

$$y = C_2^2 + C_2 \ln x + 1$$

Втори случай: $2xz + \ln x = 0$

$$z = -\frac{\ln x}{2x}$$

Заместваме в (*) с z

$$y = x^2 \frac{\ln^2 x}{4x^2} - x \ln x \frac{\ln x}{2x} + 1$$

$$y = \frac{\ln^2 x}{4} - \frac{\ln^2 x}{2} + 1$$

$$y = -\frac{\ln^2 x}{4} + 1$$

2 Автономни нелинейни уравнения

2.1 Общ случай

$$f(y, y', y'') = 0$$

x не участва явно.

Възможно е x да не участва явно, но уравнението да не се решава с долупописания алгоритъм.

Полагаме $y'(x) = P(y(x))$

$$y''(x) = P'P$$

Заместваме в уравнението и трябва да се получи нещо хубаво.

Интегрира се по y . (Това е единственият тип задача, където се интегрира по y)

2.2 2024г., контролно 1, вариант F, задача 2

$$y'' = 2e^y y'(y' - 3)^2$$

Полагаме $y'(x) = P(y) = P$

Тогава $y''(x) = (P(y))' = P'(y)y'(x) = P'P$

$$P'P = 2e^y P(P - 3)^2$$

$$P'P - 2e^y P(P - 3)^2 = 0$$

$$P(P' - 2e^y(P - 3)^2) = 0$$

Ако $P \equiv 0$, то $y' \equiv 0 \implies y = C_1^*$ е решение. Иначе делим на $P \neq 0$

$$P' - 2e^y(P - 3)^2 = 0$$

$$P' = 2e^y(P - 3)^2$$

Получаваме уравнение с разделящи се променлива за y и $P(y)$

Ако $(P - 3)^2 \equiv 0$, то $P = 3$ и $y' \equiv 3 \implies y = 3x + C_2^*$ е решение. Иначе делим на $(P - 3)^2 \neq 0$

$$\frac{P'}{(P - 3)^2} = 2e^y$$

Интегрираме по y

$$\int \frac{P'}{(P - 3)^2} dy = \int 2e^y dy$$

$$\int \frac{1}{(P-3)^2} d(P-3) = 2 \int e^y dy$$

$$-\frac{1}{P-3} = 2e^y - C_1$$

$$\frac{1}{P-3} = -2e^y + C_1$$

$$\frac{1}{C_1 - 2e^y} = P - 3$$

$$P = 3 + \frac{1}{C_1 - 2e^y}$$

$$y' = 3 + \frac{1}{C_1 - 2e^y}$$

Получаваме уравнение с разделящи се променлива за x и $y(x)$

$$y' = \frac{3C_1 - 6e^y + 1}{C_1 - 2e^y}$$

$$\text{Нека } C_2 = 3C_1 + 1 \implies C_1 = \frac{C_2 - 1}{3}$$

$$y' = \frac{3C_2 - 18e^y}{C_2 - 1 - 6e^y}$$

$$y' \frac{C_2 - 1 - 6e^y}{3C_2 - 18e^y} = 1$$

$$y' \frac{3C_2 - 18e^y - 3}{3C_2 - 18e^y} = 3$$

$$y' \left(1 - 3 \frac{1}{3C_2 - 18e^y} \right) = 3$$

$$y' \left(1 - \frac{1}{C_2 - 6e^y} \right) = 3$$

$$y' \left(1 + \frac{1}{6e^y - C_2} \right) = 3$$

Интегрираме по x

$$\int y' \left(1 + \frac{1}{6e^y - C_2} \right) dx = \int 3 dx$$

$$\int \left(1 + \frac{1}{6e^y - C_2} \right) dy = 3 \int dx$$

$$\int dx + \frac{1}{6} \int \frac{1}{e^y - \frac{C_2}{6}} dy = 3 \int dx$$

Решаваме интеграла

$$I = \int \frac{1}{e^y - \frac{C_2}{6}} dy dx$$

Полага се $u = e^y$, откъдето $du = e^y dy = u dy$, следователно

$$I = \int \frac{du}{u(u - \frac{C_2}{6})}$$

Разлагаме на елементарни дроби

$$\frac{1}{u(u - \frac{C_2}{6})} = \frac{A}{u} + \frac{B}{u - \frac{C_2}{6}} = \frac{A(u - \frac{C_2}{6}) + Bu}{u(u - \frac{C_2}{6})}$$

$$1 = A(u - \frac{C_2}{6}) + Bu$$

$$A = -\frac{6}{C_2}; \quad B = \frac{6}{C_2}$$

$$I = \int \left(-\frac{6}{C_2} \frac{1}{u} + \frac{6}{C_2} \frac{1}{u - \frac{C_2}{6}} \right) du$$

$$I = -\frac{6}{C_2} \ln|u| + \frac{6}{C_2} \ln \left| u - \frac{C_2}{6} \right| + C$$

$$I = \frac{6}{C_2} \ln \left| \frac{e^y - \frac{C_2}{6}}{e^y} \right| + C$$

$$y + \frac{\ln \left| 1 - \frac{C_2}{6e^y} \right|}{C_2} = 3x + C_3$$

3 Уравнения, където липсват първите младши производни

3.1 Общ случай

$$f(x, y', y'') = 0$$

В случая липсват първите 1 най-младши производни, а именно y .
Тогава полагаме $p(x) = y'(x)$

3.2 Задача 2.2.3 от учебника на проф. Огнян Христов

$$y'' + (y')^2 = y' \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

Полагаме $p(x) = y'(x)$

$$p' + p^2 = p \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

$$p' = p \left(x + \frac{1}{x} \right) - p^2$$

Получихме уравнение на Бернули

$$z = p^{-1} \implies z' = -p^{-2}p' \implies p' = -z'p^{-2}$$

$$z' = z \left(-x - \frac{1}{x} \right) + 1$$

$$I = - \int \left(-x - \frac{1}{x} \right) dx$$

$$I = -\frac{x^2}{2} - \ln|x| + C_1$$

$$z = e^{-\frac{x^2}{2} - \ln|x| + C_1} \left(C + \int e^{+\frac{x^2}{2} + \ln|x| - C_1} dx \right)$$

$$z = e^{C_1} \left| \frac{1}{x} \right| e^{-\frac{x^2}{2}} \left(C + \int e^{C_1|x|} e^{\frac{x^2}{2}} dx \right)$$

$$z = \pm e^{C_1} \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(C + \int \frac{1}{\pm e^{C_1}} x e^{\frac{x^2}{2}} dx \right)$$

$$z = C_2 \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(C + \frac{1}{C_2} \int x e^{\frac{x^2}{2}} dx \right)$$

$$z = \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(C_2 C + \frac{C_2}{C_2} \int x e^{\frac{x^2}{2}} dx \right)$$

$$z = \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(C_3 + \int e^{\frac{x^2}{2}} d\frac{x^2}{2} \right)$$

$$z = \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(C_3 + e^{\frac{x^2}{2}} \right)$$

$$\frac{1}{p} = \frac{C_3}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{y'} = \frac{1 + C_3}{x} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$y' = \frac{x}{1 + C_3 e^{-\frac{x^2}{2}}}$$

Получаваме уравнение с разделени променливи

$$\int y' dx = \int \frac{x}{1 + C_3 e^{-\frac{x^2}{2}}} dx$$

Решаваме интеграла

$$J = \int \frac{x}{1 + C_3 e^{-\frac{x^2}{2}}} dx$$

$$J = - \int \frac{1}{1 + C_3 e^{-\frac{x^2}{2}}} d\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

$$J = - \int \frac{1}{1 + C_3 e^u} du$$

$$J = - \int \frac{1}{v(1 + C_3 v)} dv$$

$$J = -\frac{1}{C_3} \int \frac{1}{v(1 + \frac{v}{C_3})} dv$$

$$\frac{1}{v(1 + \frac{v}{C_3})} = \frac{A}{v} + \frac{B}{1 + \frac{v}{C_3}} = \frac{Av + \frac{A}{C_3} + Bv}{v(1 + \frac{v}{C_3})}$$

$$A = C_3; \quad B = -C_3$$

$$J = -\frac{1}{C_3} \int \left(\frac{C_3}{v} - \frac{C_3}{1 + \frac{v}{C_3}} \right) dx$$

$$J = - \int \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{1 + \frac{v}{C_3}} \right) dx$$

$$J = -\ln|v| + \ln\left|1 + \frac{v}{C_3}\right| + C_4$$

$$J = -\ln|e^{-\frac{x^2}{2}}| + \ln\left|1 + \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{C_3}\right| + C_4$$

$$J = \frac{x^2}{2} + \ln\left|1 + \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{C_3}\right| + C_4$$

Така решението е

$$y = \frac{x^2}{2} + \ln \left| 1 + \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{C_3} \right| + C_4$$

4 Хомогенни уравнения от по-висок ред

4.1 2024г., контролно 1, вариант А, задача 2

$$[3x \sin(3x) - \cos(3x)]yy' = x \cos(3x)[(y')^2 - yy'']$$

Полагаме $z = \frac{y'}{y}$

$$y' = yz$$

$$y'' = y'z + yz' = yz^2 + yz' = y(z^2 + z')$$

Заместваме в уравнението

$$[3x \sin(3x) - \cos(3x)]y^2z = x \cos(3x)[y^2z^2 - y^2(z^2 + z')]$$

$$[3x \sin(3x) - \cos(3x)]y^2z = x \cos(3x)[y^2z^2 - y^2z^2 - y^2z']$$

$$[3x \sin(3x) - \cos(3x)]y^2z = -x \cos(3x)y^2z'$$

Получихме уравнение с разделени променливи.

$y \equiv 0$ е решение на уравнението. Делим на $y^2 \neq 0$

$$[3x \sin(3x) - \cos(3x)]z = -x \cos(3x)z'$$

$$z' = -\frac{3x \sin(3x) - \cos(3x)}{x \cos(3x)}z$$

$z \equiv 0$ е решение и тогава $y' = 0$ е решение и съответно $y = C$ е решение. Делим на $z \neq 0$

$$\frac{z'}{z} = \frac{\cos(3x) - 3x \sin(3x)}{x \cos(3x)}$$

$$\frac{z'}{z} = \frac{1}{x} - 3 \tan(3x)$$

$$\int \frac{z'}{z} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int 3 \tan(3x) dx$$

$$\int \frac{1}{z} dz = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{\sin(3x)}{\cos(3x)} d(3x)$$

$$\int \frac{1}{z} dz = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{\cos(3x)} d \cos(3x)$$

$$\ln |z| = \ln |x| + \ln |\cos(3x)| + C_1$$

$$\ln |z| = \ln |x| + \ln |\cos(3x)| + \ln C_2$$

$$\ln |z| = \ln |x \cos(3x) C_2|$$

$$z = \pm C_2 x \cos(3x)$$

$$z = C_3 x \cos(3x)$$

$$\frac{y'}{y} = C_3 x \cos(3x)$$

Получим уравнение с разделенными переменными.

$$\int \frac{y'}{y} dx = \int C_3 x \cos(3x) dx$$

$$\int \frac{1}{y} dy = C_3 \int x \cos(3x) dx$$

$$I = \int x \cos(3x) dx$$

$$I = \frac{1}{9} \int 3x \cos(3x) d(3x)$$

$$I = \frac{1}{9} \int u \cos u du$$

$$I = \frac{1}{9} \int u \sin u$$

$$I = \frac{1}{9} \left(u \sin u - \int \sin u du \right)$$

$$I = \frac{1}{9} (u \sin u + \cos u) + C_4$$

$$I = \frac{x \sin(3x)}{3} + \frac{\cos(3x)}{9} + C_4$$

$$\ln|y| = \frac{C_3 x \sin(3x)}{3} + \frac{C_3 \cos(3x)}{9} + C_3 C_4$$

$$y = \pm e^{\frac{C_3 x \sin(3x)}{3} + \frac{C_3 \cos(3x)}{9} + C_3 C_4}$$

4.2 2022г., контролно 1, вариант 2, задача 2

$$4xyy'' - x^2y^2 = 4x(y')^2 + 8yy', \quad x > 0$$

Полагаме $z = \frac{y'}{y}$

$$y' = yz$$

$$y'' = y'z + yz' = yz^2 + yz' = y(z^2 + z')$$

Заместваме в уравнението

$$4xy^2(z' + z^2) - x^2y^2 = 4xy^2z^2 + 8y^2z$$

$y \equiv 0$ е решение на уравнението. Делим на $y^2 \neq 0$

$$4x(z' + z^2) - x^2 = 4xz^2 + 8z$$

$$4xz' + 4xz^2 - x^2 = 4xz^2 + 8z$$

$$4xz' - x^2 = 8z$$

$$4xz' = x^2 + 8z$$

$$z' = \frac{x}{4} + z\frac{2}{x}$$

$$z' = z\frac{2}{x} + \frac{x}{4}$$

Получихме линейно уравнение

$$I = \int \frac{2}{x} dx$$

$$I = 2 \int \frac{1}{x} dx$$

$$I = 2 \ln |x|$$

$$I = \ln x^2$$

$$-I = -\ln x^2 = \ln x^{-2}$$

$$z = e^{\ln x^2} \left(C + \frac{1}{4} \int x e^{\ln x^{-2}} dx \right)$$

$$z = x^2 \left(C + \frac{1}{4} \int \frac{1}{x} dx \right)$$

$$z = x^2 \left(C + \frac{1}{4} \ln |x| \right)$$

$$z = Cx^2 + \frac{x^2 \ln |x|}{4}$$

По условие имаме, че $x > 0$ и съответно можем да разкрием модула

$$z = Cx^2 + \frac{x^2 \ln x}{4}$$

$$\frac{y'}{y} = Cx^2 + \frac{x^2 \ln x}{4}$$

Получаваме уравнение с разделени променливи

$$\int \frac{y'}{y} dx = \int \left(Cx^2 + \frac{x^2 \ln x}{4} \right) dx$$

$$\int \frac{1}{y} dy = C \int x^2 dx + \frac{1}{4} \int x^2 \ln x dx$$

Решаваме интеграла

$$J = \int x^2 \ln x dx$$

$$J = \frac{1}{3} \int \ln x dx^3$$

$$J = \frac{1}{3} \left(x^3 \ln x - \int x^3 d \ln x \right)$$

$$J = \frac{1}{3} \left(x^3 \ln x - \int \frac{1}{x} x^3 dx \right)$$

$$J = \frac{1}{3} \left(x^3 \ln x - \int x^2 dx \right)$$

$$J = \frac{1}{3} \left(x^3 \ln x - \frac{x^3}{3} \right)$$

$$J = \frac{x^3 \ln x}{3} - \frac{x^3}{9}$$

Така получаваме

$$\ln |y| = \frac{Cx^3}{3} + \frac{x^3 \ln x}{12} - \frac{x^3}{36} + C_2$$

$$|y| = e^{\frac{Cx^3}{3} + \frac{x^3 \ln x}{12} - \frac{x^3}{36} + C_2}$$

$$|y| = e^{C_2} e^{\frac{Cx^3}{3} + \frac{x^3 \ln x}{12} - \frac{x^3}{36}}$$

$$y = \pm e^{C_2} e^{\frac{Cx^3}{3} + \frac{x^3 \ln x}{12} - \frac{x^3}{36}}$$

$$y = C_3 e^{\frac{Cx^3}{3} + \frac{x^3 \ln x}{12} - \frac{x^3}{36}}$$