

TEORIA KATEGORII

SERIA 4: KATEGORIE KARTEZJAŃSKO-DOMKNIĘTE

Problem 1. Niech \mathbb{C} będzie kategorią CCC. Pokazać, że $\tilde{f} = f^A \circ \eta$, gdzie dla $f : Z \times A \rightarrow B$ strzałka $\tilde{f} : Z \rightarrow B^A$ oznacza transpozycję, $f^A : (Z \times A)^A \rightarrow B^A$ oraz $\eta : Z \rightarrow (Z \times A)^A$ są zdefiniowane jak na wykładzie.

Problem 2. Pokazać, że w dowolnej kategorii, która jest CCC zachodzi:

- $(A \times B)^C \cong A^C \times B^C$,
- $(A^B)^C \cong A^{B \times C}$.

Problem 3. Czy kategoria \mathbf{Mon} jest CCC?

Problem 4. Pokazać, że kategoria $\omega\mathbf{CPO}$ jest CCC, natomiast kategoria $\omega\mathbf{CPO}_\perp$ nie jest CCC.¹

Problem 5. Pokazać, że kategoria wszystkich małych kategorii i funktorów \mathbf{Cat} jest CCC, gdzie $\mathbf{C}^{\mathbf{D}} = \mathbf{Fun}(\mathbf{C}, \mathbf{D})$.

10 grudnia 2020

¹Poset (P, \leq) nazywamy $\omega\mathbf{CPO}$ jeśli każdy przeliczalny łańcuch $x_1 \leq x_2 \leq \dots$ ma supremum. Przekształcenie $f : P \rightarrow Q$, które zachowuje porządek między dwoma posetami (P, \leq) i (Q, \leq) , które dodatkowo są $\omega\mathbf{CPO}$ nazywamy *ciągłym*, jeśli zachowuje suprema przeliczalnych łańcuchów, tj. $f(\bigvee_{i \in \mathbb{N}} x_i) = \bigvee_i f(x_i)$ dla każdego $x_1 \leq x_2 \leq \dots$. Posety, które spełniają własność $\omega\mathbf{CPO}$ wraz z ciągłymi przekształceniami jako morfizmami tworzą kategorię oznaczaną przez $\omega\mathbf{CPO}$.

Poset (P, \leq) , który jest $\omega\mathbf{CPO}$ nazywamy *punktowym*, jeśli istnieje w nim element najmniejszy $\perp \in P$. Punktowe $\omega\mathbf{CPO}$ tworzą kategorię w której strzałkami są wszystkie ciągłe przekształcenia dodatkowo zachowujące element najmniejszy, tj. $h(\perp) = \perp$. Tę kategorię oznaczamy przez $\omega\mathbf{CPO}_\perp$.