




持久延时训练手册

三位一体自我训练法

悟人之意 编著





10.1 兴奋控制力训练 35

10.2 丁丁耐受力训练 36

10.3 本训练阶段的注意事项 39

10.4 本训练阶段达标的标准 42

11 通过仿真模拟训练改变习惯性早泄 44

11.1 仿真模拟训练 5 个阶段 45

11.2 本训练阶段的注意事项 48

11.3 本训练阶段达标的标准 50

12 怎样通过双人训练实现持久实战 51

12.1 双人性快感集中训练法 51

12.2 实战操作延时攻略 53

13 持久延时训练计划安排表 57

13.1 第一阶段训练计划 57


13.2 第二阶段训练计划 58

13.3 第三阶段训练计划 59

13.4 第四阶段训练计划 60

13.5 第五阶段训练计划 61

结 语..... 62



前言

本手册为我们橙人系列推出的持久延时训练最完善的讲解手册，这是我们自成立以来，服务5000多位用户的实用经验总结。

在服务的用户中，通过早先的训练方法，成功者有成功的经验，失败者有失败的原因。

我们经过大量对比研究成功和失败的案例，对原先训练方法中的有效之处进行了保留或优化，对不足之处进行了补充和完善。最终著成了这套更全面、更有效的训练手册，旨在让大家花更少的时间，取得最好的训练效果。

本手册从早泄的分类判断与常见疑问入手，全面分析了早泄的生理原因和心理原因。提出了先适当禁欲，增强身体素质和性相关机能，为训练打好基础；然后消除紧张焦虑，了解持久延时原理，掌握对兴奋度等级的感知和控制。

在熟练对兴奋度的感知和控制后，通过由小到大，逐渐增加性刺激强度，来不断降低对多重性刺激的敏感度，不断提升对多重性刺激的耐受度，从而最终适应耐受实战中的性刺激强度，并能自主控制兴奋度等级，实现持久延时。

只要坚持训练，用心付出，你就能长长久久，获得一生性福！

——橙人团队

1 怎样确定自己是不是早泄

大部分人在自慰或是性生活中，如果遇到射精时间短的情况，就怀疑自己是不是早泄。为了确认结果，于是就查资料或去医院。但无论资料显示还是医生结论，都让自己感觉茫然，因为早泄似乎并没有明确的定义。

1.1 通常的早泄定义标准

一是医生通常认为，丁丁从插入到射精的时间如果少于 2 分钟，则为早泄。如果按照这种说法，那 2 分零 1 秒就不是早泄了吗？其实大家都清楚，如果在性生活中，哪怕你有四、五分钟，而女伴还没满足你就结束了，这是很让双方失望扫兴的。那为什么医生要以 2 分钟来定义早泄呢？

因为医生这样定义，是以人们完成生物繁衍过程的时间为标准。所谓生物繁衍过程，就是只要能完成“插入—射精—受精”这整个过程，那么身体上就是健康的。而完成这个过程，2 分钟完全足够，甚至不用 2 分钟，几十秒都能完成……所以医生这样定义也没错，只是对你来说没有意义。

二是按照国外性学标准，在 6 个月以上，如果超过 50% 的性生活次数都没能使女伴高潮，即为早泄。如果按照这种说法，那全国 80% 的男人都是早泄了，这也太夸张了！所以国外的早泄标准要求太高，不切实际。

那么我们要怎样来合理定义早泄呢？

1.2 男人多是天生的快枪手

其实男人大多是天生的快枪手。早在人类远古时期，生存环境恶劣，猛兽横行，人类连安全的栖息之地都没有，要完成种族的繁衍，也只能进行“野战”。在“野战”时，因为要面临各种猛兽的突然袭击，所以必须要快速射精！

因为只有射精快的人，才能存活，基因才能一代代延续下去；而射精慢的人，在“野战”中很久都不能完事，早被偷袭的猛兽吃掉了，基因也就中断了。所以活下来的，都是射精快的人，而这种射精快的基

因，也就遗传到了现在。

但是到了现代，人们可以有安全私密的空间来进行性生活，性生活也不只是为了繁衍，更多是为了增进伴侣间的亲密关系，为了双方的愉悦快感。


但是据统计，75%的男性在性生活中只能坚持 2-6 分钟的活塞运动，而女性却要 8-15 分钟的活塞运动才能获得高潮，双方是存在时间差的。所以在性生活中，女方可能刚刚开始有一点快感，男方却早早射精，停止动作了。

女方没能得到满足，男方没能展现自己的雄风，所以双方都希望能持久延时，实现彼此的满足满意，所以我们应该以双方的满意度来定义早泄。如果双方都满意了，那么这次你就不是早泄；如果对方不满意，那么这次你就是早泄。

1.3 男人多长时间合适

当然，要让女方满足，男方活塞运动的持久时间应尽量在 10 分钟以上，即便你现在达不到 10 分钟以上，但通过我们这套科学的训练，你的持久时间是完全能延长的。

毕竟早泄不是病，它只是一种快速射精的生物本能。通过训练延长时间，这是现代男人需要刻意去练习的技能，这项技能和游泳、打球、驾驶技能一样，都是需要通过训练才能熟练掌握的。



需要注意的是，时间不是越长越好。当你做到 20 分钟以上，女伴还没有高潮，那你就得考虑，是你的技术问题？还是她的身体感知问题？

或是她内心在抗拒？

当你做到 30 分钟以上，如果还在继续，她的爱液会减少，疼痛会开始出现；当你做到 40、50 分钟以上，你们双方都会觉得干涩而疼痛，几乎没有快感；当你继续活塞运动都还不能射精，那可能属于射精困难，也是一种性功能障碍……

所以时间不是越长越好，只要能达到双方满意，合适即可。建议大家把最终训练目标定在活塞运动 10-30 分钟，只要在这个时间范围内，双方都能实现满足，也能收获高质量的性生活。

本章总结：

医生常用的早泄定义标准太低，国外性学的早泄定义标准太高，都不符合实际。我们应该以双方的满意度来定义早泄。通常来看，男方活塞运动的持久时间应尽量在 10 分钟以上，才容易让女方获得满足。时间是通过训练延长的，但时间不是越长越好，我们的最终训练目标定在 10-30 分钟是比较合适的。

2 医院为什么解决不了你的早泄问题

很多人去正规公立医院检查，好不容易排到了号，医生简单问几句，就让你做各种检查，好不容易检查完，医生扫一眼结果报告，通常会说：“你身体没问题，应该是心理问题，压力不要太大，回去调节一下。”这时求医者就很懵逼了，自己明明早泄，为什么医生说没问题？

其实这不能错怪医生，一来医生太忙，稍微好一点的公立医院，一个医生一天就要接待上百个病人，能够在你身上花 5 分钟就很不错了，他哪有时间解释；哪怕你要求他解释了，很多时候他也未必能给你满意的分析和建议。

2.1 医院不治疗功能性早泄

因为性功能障碍分为**器质性问题**和**功能性问题**。医院医生只检查和治疗器质性问题，~~对于功能性问题~~（心理问题），不属于医生的诊疗范围，医生是不管的。

换句话说，医生只诊治“疾病”问题，“做爱”的问题他是不管的。

根据我们的咨询工作经验来看，绝大多数性功能障碍，都不是器质性问题，而是长期错误自慰或不良性经历等导致的功能性问题！对于功能性早泄，医生不管，所以才会让你自己回去调节。

毕竟一个优秀的医生医术再精湛，但是在他不熟悉的领域，他也未必有准确的认识，仅仅是术业有专攻而已。

而且我们的很多医生朋友，自己的性生活都一团糟，他又哪来经验和认知去指导你的性生活？所以当医生对你的问题表示无能为力时，这反而是他专业且负责的体现。

2.2 吃药解决不了根本问题

当然有的医生也可能会给你开出如“氯米帕明、氟西汀、达泊西汀”等处方药，虽然有延时作用，但这类药都是针对器质性早泄的，对于功能性早泄则不需要。


而且这类药原本多是治疗抑郁症的，副作用大，只是在使用过程中发现有延时作用。而延时作用也只是暂时的，是药就会有依赖性，当你

下次不吃药时，原先早泄现在仍然早泄，无法根治。

同时这些药物价格普通昂贵，如“必利劲（盐酸达泊西汀）”，是目前唯一获得国家食药局批准的早泄适应症药物，正规专利药价大概在145 元/粒！所以吃药是无法从根本上解决问题的。

2.3 早泄手术做不得

因为广大男士对治疗早泄有迫切需求，渴望通过某种药物或手术，简单快速的一次性解决问题。正是摸准了这种心理，某些民营男科医院就推出了各种费用昂贵的早泄治疗手术，作为他们的敛财手段。但实际上，这些手术是做不得的。



最常见的就是“阴茎背神经阻断术”。该手术通过切断丁丁的部分感觉神经，来降低敏感度，从而实现延时。但在实际手术中，如果切断的背神经分支过多，容易出现严重的并发症，如丁丁麻木、勃起障碍等。其疗效不确切，技术不完善，在医疗界内是几乎被否定的！

中国性医学专业委员会男科学组《2011 年早泄诊断治疗指南》摘录：

“阴茎背神经选择性切断术，目前尚缺乏循证医学证据证实其疗效和安全性。”

国际性医学协会《2014 年早泄诊断及治疗指南》摘录：

“选择性阴茎背神经切除或使用透明质酸扩大龟头或可导致性功能的永久丧失，不推荐用于早泄治疗。”

当然，现在这些民营男科医院变聪明了，为防止有人事后来闹，就不怎么提“阻断术”，而是搞出一些高大上的如“微创手术”、“生物补

片手术”……

比如“微创手术”，打了麻醉后，用手术刀在患者身上划一个小口子，然后告诉患者手术已做，其实什么也没做，当然也没有副作用。而且这类手术动辄好几万元，只不过是另一种敛财手段罢了。所以，早泄手术是做不得的。

本章总结：


早泄分器质性早泄和功能性早泄，医院只治疗器质性早泄，不治疗功能性早泄；而早泄药物不仅价格昂贵，有依赖性，作用也只是暂时的，不能解决根本问题；早泄手术更是做不得的。

3 男人为什么会有早泄的状况

除了因组织器官病变导致的器质性早泄，需要按医生医嘱治疗外，绝大多数男士的早泄都是属于功能性早泄。导致功能性早泄的原因既有心理原因，也有长期错误自慰或操作不当等的原因。总体来说分为5个方面：

3.1 缺乏对兴奋等级的感知和控制

欧美国家的性治疗师将性兴奋度分为 10 个等级，注意“性兴奋度≠勃起硬度”。不同的兴奋度等级有不同的感受，但相邻兴奋度等级之间没有明显的分界，只有细微的感受差别。具体兴奋度等级表现感受如下图所示：



虽然兴奋度等级这样区分，但很多人都从没感知到兴奋度等级的变化，只知道最初是勃起，刚插入很快就射精了，中途过程连自己都觉得一晃就过。感知不到兴奋度等级的变化，就无法在该控制兴奋度时进行控制，等到想控制了，却已经来不及，不得不射精了。最常见的有 3 种情况：

1) 处男的第一次，往往射精过快，就是因为基础性兴奋度等级过高。不早泄的人，在丁丁刚插入 Y 道时，兴奋度等级大概在 5-6 级；但处男因为第一次看到真实的女方身体，第一次和女方肌肤相亲，这种性刺激对于处男来说，是极高的也是极度亢奋的。

所以处男刚把丁丁插入 Y 道时，兴奋度等级就已经达到了 8-9 级，之后没抽动几下，兴奋度等级也就很快达到了 10 级，所以就坚持不住射精了。

2) 久别重逢的伴侣，第一次做时通常射得快，而第二次做的时间往往比第一次更长。那是因为长期不做，对性刺激会更为敏感，所以第一次做时，基础性兴奋度等级较高，大概在 7-8 级，这样抽插不久也就结束了；当第二次做时，基础性兴奋度等级就回到正常状态的 5-6 级，所以时间就延长些了。

3) 已婚男士对妻子的容貌和身材产生了审美疲劳，当和妻子做时，性兴奋度等级不高，所以做的时间正常；但如果这个男士和其他性感女士发生关系时，他的性兴奋度等级就很高，所以出轨时往往有早泄的状况。

3.2 敏感度过高，耐受度过低

首先大家要明白，性刺激，不仅仅指丁丁摩擦的触觉刺激，还有看到对方身体的视觉刺激，听到对方呻吟的听觉刺激，闻到对方体香的嗅觉刺激。当稍微接收到这些性刺激后，如果敏感度过高，耐受度过低，就会很快达到射精阈值并射出。

大部分人以为男人的丁丁都是能耐受住 Y 道的摩擦刺激，实际上男人的丁丁是天生敏感的，天生对 Y 道的摩擦刺激缺乏耐受度。区别在于有的人敏感度过高，而耐受度过低，所以插入后，活塞运动不久就射出了。

而有的人不仅对触觉刺激耐受度低，还对视觉刺激、听觉刺激、嗅觉刺激过于敏感，或者对某种体位姿势过于敏感。

比如传教正入式时，女方的 Y 道包裹对丁丁的摩擦触觉刺激较大，容易早射；后入式时，女方的细腰大臀身体曲线对男士的视觉刺激较大，所以容易早射；有的人做时听到女方呻吟或叫床，会兴奋不已，容易早射；有的人做时闻到女方体香会把持不住，也容易早射。

这些都是因为敏感度过高，耐受度过低导致的。而我们可以通过反复训练来降低敏感度，增加耐受度。正如四川人并不是一生下来就能吃辣的，而是在他们之后的日常饮食习惯中，不断的吃辣，才慢慢练就

了对辣食的耐受度。所以我们也是要通过训练，才能降低对各种性刺激的敏感度，增加耐受度。

3.3 自慰方式错误导致习惯性早泄

关于自慰，有的资料说自慰无害，不会导致早泄；有的说自慰有害，是万恶之首。其实这两种说法都太极端，自慰是为了排解性欲，而性欲和我们食欲一样，人不吃东西会饿，但吃得太多，也会吃坏肚子。

不吃或多吃，都不好，唯有适量，才算最好；自慰也是同理，低频度正确的自慰当然无害，但高频度错误的自慰则有害。而很多男士，正是因为长期过度自慰，并且自慰方式错误，才导致了习惯性早泄。具体体现在 3 个方面：

1) 自慰时边看边撸，因为影片中的视觉刺激和听觉刺激都很强，让大脑皮层处于高度兴奋状态，再加上自慰的大力触觉刺激，于是基础兴奋度等级就高，一触即发，可能压迫几下丁丁，就马上射出了。

2) 自慰时只为了满足自己，于是就使用快手速，追求快速射出，手速越快才越刺激。长期如此后，大脑就会形成快速射精的条件反射，也就是当大脑稍稍接收到性刺激，就会马上发出射精的指令，于是就泄了。

3) 自慰频度高，撸龄长达几年或十几年，一天一撸甚至一天几撸。这样相当于用几年时间把自己反复训练成了“快枪手”。从最初 3 分钟，到 1 分钟，到 30 秒，再到最后甚至还没有完全勃起，就已经发射了。

长期错误自慰形成的习惯性早泄，到了实战时自然也是“快枪手”。当然自慰和实战还是有很大区别的：自慰时只靠手撸的触觉刺激，而实战时不仅有 Y 道包裹的触觉刺激，还有视觉、听觉、嗅觉刺激。实战的综合刺激强度更大，所以有的人在自慰时能撸很久，但到了实战仍然是“快枪手”。


即使你戒撸后，这种习惯性早泄也不会改变。因为这是一种快速射精的条件反射，条件反射是长期错误自慰训练而成的习惯性反应，要想改变习惯性早泄，也只能通过训练才能扭转快速射精的条件反射。

3.4 心理紧张压力焦虑所致

很多曾经有过早射经历的人，在实战时通常处于紧张压力状态，通常会想这次一定不能早射，一定要好好表现，结果越是这样想，就越是焦虑。

当焦虑时，注意力就会不集中，无法感受到自己性兴奋度等级的变化，等意识到应该控制时，兴奋度等级已经达到了 9 级以上，想控制已经来不及了，于是继续早早的泄了……

另外从神经系统来看，人的神经系统包含**运动神经**和**植物神经**。运动神经是我们自己可以控制的，比如张嘴、举手、抬腿等；植物神经是我们自己不可控制的，比如心跳、消化食物、血管收缩等。而射精正是由植物神经所控制的，植物神经又分为**交感神经**和**副交感神经**，二者此消彼长，彼此对立。



当人在放松、舒适的状态做爱时，**副交感神经**会处于活跃，此时心跳平缓，兴奋度等级上升缓慢，大脑会分配更多精力来感受愉悦的过程，所以时间会更持久。

但当人处于紧张、压力、焦虑状态时，**交感神经**会处于活跃，此时心跳加快，血流加快，全身紧绷，兴奋度等级迅速上升，大脑会减少做爱的精力，通过让你快速射精，从而减少做爱时间，减少精力消耗。

所以有的人在极度紧张或焦虑时，可能丁丁还是软的就已经射了。当你越担心早泄，越紧张焦虑时，反而就越容易早泄。

3.5 实战操作不当导致早泄

有的男士在实战时，不注意节奏和技巧，一开始就大力猛怼到底，速度也是如打桩机一样快，丁丁短时间内难以适应过大的刺激，所以兴奋度等级很快飙升，没抽动多久，就达到射精阈值而射出结束了。

这就属于操作不当导致的早泄，正确的做法应该是由浅入深，由慢到快，由轻到重，循序渐进的增加刺激程度，让丁丁逐渐适应Y道的摩擦刺激，使兴奋度等级缓慢上升，从而延长时间。

本章总结：


导致早泄的原因有缺乏对兴奋度等级的感知和控制，我们就要通过训练学会控制兴奋等级；敏感度过高，耐受度过低，我们就要通过训练降低敏感度，增加耐受度；错误的自慰方式导致习惯性早泄，我们就要通过训练改变快速射精的条件反射；心理紧张压力焦虑所致，我们就要通过训练消除心理焦虑；实战操作不当导致早泄，我们就要改善操作方法与技巧。

4 壮阳补肾和壮阳食物可以延时吗

4.1 壮阳补肾可以延时吗

因为各种壮阳补肾保健品广告的误导，很多男士一遇到性障碍问题，再联想到自己床上运动后的腰部酸痛，就觉得自己也是肾虚了，就开始补肾。然而，肾虚只补肾，根本没有用。

为什么没有用？因为中医里“肾虚”的“肾”，并不是指西医解剖学里的“肾脏”器官！中医的“肾”和西医的“肾”是两个完全不同的概念。



中医的“肾”是指系统，是中医脏象学说中的概念。医书经典《黄帝内经》和《景岳全书》中都提到：“肾，主封藏、主精、主水、主骨、主纳气。”意思是中医的“肾”起到调控精气收纳贮存，调控体液平衡，调控运动系统等很多功能。

所以中医的“肾”不仅包含了肾脏器官，还包含了人的神经系统、运动系统、内分泌系统、生殖系统等各种系统。而西医里的“肾”，仅仅指“肾脏”器官，只是泌尿系统的一部分。

所以，中医的“肾虚”，是指包含肾脏器官在内的神经系统、运动系统、内分泌系统、生殖系统等都出现了问题，才导致的性功能障碍。如果你只是单纯的去补“肾脏”器官，当然没用！

而床上运动后的腰部酸痛，原因是很多人平时都不运动，腰腹力量不强，但床上运动又特别费腰。所以性爱后，腰部肌肉劳损过度，感觉

酸痛也很正常，这和肾没有半点关系。

正是抓住了大家对中西医里“肾”概念的误解，一些保健品厂商就生产出各种壮阳补肾保健品，宣称能补肾，宣称原料来自于“玛卡、牡蛎、袋鼠精、蚕、鹿”等这几类，当然还有什么“XX 肾宝、XX 药酒”。

要知道，这些原料也是分等级的，能达到保健作用的原料成本非常高，但保健品的利润起码都是 10 倍以上，一盒售价几百元的东西，成本最多几十元，他会给你用好的原料吗？为了有效果，必然在里面添加药物成分。

有的非法添加“伟哥”或类似“达泊西汀”有延时作用的处方药，这些药都有副作用或依赖性；有的非法添加动物催情药，药效猛烈，虽然没有延时作用，但可以让连续几次，次数多了，你也感觉能力强了，甚至最后都射血了，很伤身体；当然还有的就是添加淀粉，不添加药物，虽然没有任何作用，就是让你多个心理安慰而已……

所以补肾保健品是不靠谱的，单纯的补“肾脏”也是没用的。真正的补肾，是要增强神经系统、运动系统、内分泌系统、生殖系统等多个系统的功能，才能延长时间，这和我们后面的训练目的是一致的。

4.2 壮阳食物可以延时吗

大家常听说的壮阳食物，如“玛卡、牛鞭、羊腰”等。首先，“玛卡”原产于南美洲的秘鲁，就是当地的一种蔬菜而已，属于萝卜科植物，成分和萝卜类似。当地人除了把它当蔬菜吃掉，多余的还会作为牛羊的饲料。

而宣扬说玛卡是“天然伟哥、南美人参”具有助性功效的，是一些商家为了牟利，故意做出的虚假宣传。这和宣扬钻石代表“永恒的爱情”一样，都是商家为了卖出高价而进行的营销手段，所以吃玛卡并不能延时。

对于“牛鞭”，里面的确含有少量雄性激素，但雄性激素只是促进勃起，对延时没有作用。而且它经过烹饪和我们胃的消化分解后，已经所剩无几了；吃“羊腰”也和吃肉一样，经过胃的消化分解，产生的蛋白质和能量被人体吸收，对性能力和延时都没有促进作用。

5 持久延时训练前要做哪些准备工作

在进行正式的持久延时训练前，还需要增强身体素质，禁欲适当的时间，了解训练原理。这些过程和训练息息相关，只有身体素质好了，才能保证训练的顺利进行；只有适当的禁欲，才能促使精力的恢复；只有了解了训练原理，才能提高对各个训练阶段的重视程度。

5.1 增强身体素质

根据我们的咨询经验来看，很多早泄男士在身体素质方面是不过关的。如果身体素质不行，就强行训练，不仅早泄难以解决，还可能导致勃起障碍，或者导致炎症问题，这是得不偿失的。

为什么一定要先增强身体素质？因为身体素质好，精力就充沛。而大脑对精力是有分配原则的，大脑会优先把精力分配给维持生命的活动，比如心跳、呼吸；而性爱属于繁衍和娱乐行为，相对是次要的。

所以当身体素质弱，精力不足时，大脑会出于自我保护，减少对性精力的分配，让你性欲降低，或者让你快速射精，尽快结束性爱，从而减少精力的消耗，把精力用在维持生命的活动上。

这就好比当你饿了时，但你包里只有三十块钱，你肯定是去买吃的填饱肚子，而不是去买电影票看电影娱乐。所以只有精力充沛时，大脑才会把更多的精力分配给性爱，让性爱时间更长。

所以一定要先增强身体素质，使精力充沛，才是延时的前提条件。增强身体素质主要通过两个方面：

- 1) 首要保证充足的睡眠时间。现代人因为生活节奏快，常常熬夜加班或者看剧玩游戏，大脑得不到充分休息，精力被长期透支，身体处于亚健康状态，是很难持久作战的。所以要保证充足的睡眠，对于平时有熬夜习惯的，建议先进行 1-2 周的作息时间调整，养成早睡的习惯，以恢复精力。

- 2) 在睡眠充足的前提下，再进行适度有氧运动。如果休息不充分，会越运动越不行。而运动并不是去健身房撸铁，撸铁是不能延时的。

健身房的运动分为**无氧运动**和**有氧运动**，无氧运动主要是通过撸铁等

器械训练，来增强爆发力，增加肌肉，但无氧运动容易让身体疲劳，精力不足。有氧运动如慢跑、游泳、动感单车等，运动过程会消耗大量氧气，可以提升耐力，增强心肺功能，促进血液循环，增加精力。所以有氧运动更适合增强身体素质。

但是有氧运动不建议大家骑动感单车。因为骑车时仍为坐姿，PC 肌会松弛，前列腺会充血，不利于增强性能力。

并且有氧运动不一定非要去健身房，大家可以在小区或是周边的公园里进行慢跑运动。慢跑要循序渐进，不要突然增加强度，如果体力不支，可以先快速步行，等一段时间体力增强后，再进行慢跑。慢跑每次 30 分钟，每周 4 次为好。

5.2 禁欲适当时间

在进行训练前，禁欲适当时间是很有必要的。一是因为大多数早泄人士都有长期纵欲过度或者自慰过度的经历，身体精力被严重透支，禁欲适当的时间可有助于恢复精力。

二是因为有的人一旦经历过早泄，就担心下次也早泄，于是就害怕做爱，把做爱当成一种心理负担，但又不得不去做时，心理焦虑就会加重，反而让情况更糟。所以这时就需要通过禁欲，来暂时远离焦虑源，调节恢复身心。


禁欲多久才算适当？这个因人而异，年轻人可能禁欲 2-3 周就行，年龄大点的禁欲 1-2 个月也有可能。

禁欲结束的标准是：在没有任何外界性刺激，比如没看片，没看性感图片，没有自慰的情况下，当感觉到有明显的生理需求时，禁欲就可以结束了；或者是在没有任何外界性刺激的情况下，某天晚上遗精了，禁欲也可以结束了。遗精是精满自溢的正常表现，说明精力充沛，训练时机成熟了。

5.3 了解训练原理

在经过身体素质增强，和禁欲适当时间后，就可以正式训练了。持久延时训练共分为 6 个阶段：

第 1 阶段，通过训练消除心理紧张，消除压力焦虑；




第2阶段，通过日常训练增强性机能，为后面的兴奋度控制打下基础；
第3阶段，通过单人性快感集中训练，实现对兴奋度等级的感知与控制；

第4阶段，通过性兴奋控制力训练，从心理上降低敏感度；然后逐渐增加性刺激强度，通过丁丁耐受力训练，从生理上降低敏感度，提高耐受度；

第5阶段，通过使用两种训练器进行仿真模拟训练，进一步延长时间，扭转快速射精的条件反射，改变习惯性早泄；

第6阶段，通过双人性快感集中训练和实战操作练习，完全实现在真实性爱中的持久延时。

为什么通过这些训练就能实现持久延时？我们首先要知道，男士的性兴奋周期分为4个时期：**兴奋期**、**平台期**、**高潮期**、**消退期**，如下图所示：



男士遇到性刺激后，兴奋度逐渐上升，此时处于**兴奋期**，当兴奋度上升到4级左右时，丁丁勃起。当丁丁进入Y道后，随着动作继续，兴奋度持续上升，此时处于**平台期**。

当兴奋度上升到9级时，就达到了**临界点**，在临界点时，射精紧迫感明显。一旦过了临界点，就进入了**高潮期**，很快便达到10级兴奋度的**射精点**，射精结束后，进入**消退期**。


在**高潮期**内，兴奋度等级超过9级，此时无论如何都无法控制或阻止射精。因为射精是由植物神经所控制的，而人类的主观意识却无法控制植物神经。所以在高潮期内，射精时不是自己说“加油、撑住”就

能撑得住的。

射精时虽然不可控，但在高潮期之前的平台期却是可控的。即我们可以通过延长平台期的时间，来实现持久延时。怎样才能延长平台期时间？关键在于 3 点：

一是要通过训练降低敏感度，增加耐受度，提升对性刺激的耐受时间；二是要通过训练改变习惯性早泄，避免一接触到性刺激，就想射了；三是要通过训练实现对兴奋度的感知和控制，把兴奋度等级控制在 9 级以下，避免进入高潮期，出现射精感不可控的情况。

如果能做到这 3 点，性反应过程随时间的变化就如下图所示。其中，虚线为训练前的反应过程，实线为训练后的反应过程：



要想实现这 3 点，必须先通过训练消除紧张焦虑，避免交感神经活跃而导致射精过快；然后通过日常训练增强性机能，为之后的兴奋度控制打下基础。

然后从第 3 阶段的训练开始，性刺激强度由低到高、逐渐增加，使训练者对性刺激的耐受度也由低到高、逐渐增强。并在过程中采用正确的兴奋度控制方法，把兴奋度等级始终控制在 9 级以下，避免进入高潮期而射精，从而延长时间，改变习惯性早泄。最后再通过实战操作练习，完全实现在真实性爱中的持久延时！

其实延时训练就像马拉松长跑一样，一个没有长跑经验的人，一开始是不可能跑完 42 公里的马拉松。必须要经过一段时间的长跑训练，

并且训练要从 3 公里开始，到 5 公里、10 公里……当身体能力增强了、适应了某段里程后，才能增加里程数，进行下阶段的训练。只有这样循序渐进，不断增强能力，才能最终一次性跑完全程马拉松。

本章总结：

在进行正式的持久延时训练前，还需要增强身体素质，禁欲适当的时间，了解训练原理。只有身体素质好了，才能保证训练的顺利进行；只有适当的禁欲，才能促使精力的恢复；只有了解了训练原理，才能提高对各个训练阶段的重视。只要按照训练阶段的顺序来做，就一定能实现持久延时。

6 怎样训练消除事前的紧张焦虑感

我们前面已经说过，当紧张焦虑时，注意力就会不集中，无法感受到自己性兴奋度等级的变化，等意识到应该控制时，兴奋度等级已经达到了9级以上，想控制已经来不及了，于是就早早的泄了。

还有当人处于紧张、压力、焦虑的状态时，交感神经也会处于活跃状态，此时心跳加快，血流加快，全身紧绷，兴奋度等级迅速上升，大脑会减少做爱的精力，通过让你快速射精，从而减少做爱时间，减少精力消耗。

而紧张焦虑却又十分常见。如果某人因为身体疲惫，偶然早泄，但一旦早泄后，通常就会担心下一次也早泄。于是就迫不及待的想要验证，当身体还没完全休息好时，又开始了下一次。并且开始前反复告诫自己，一定要好好表现，一定不能早泄。但越是这样压力大，就越是紧张焦虑，反而更容易早泄……



有人说，既然是紧张焦虑，那我事前暗示自己不要紧张焦虑就行吧？这是很难做到的。比如让你不要去想“大象”，你大脑中首先想到的是什么？正是“大象”。所以要消除事前的紧张焦虑，必须进行科学的身心放松训练。

紧张焦虑按照影响程度可以分为轻度、中度、重度，不同的焦虑程度应采取不同的身心放松训练方法，训练时最好跟着配套音频的指示进行训练：

6.1 轻度焦虑放松训练

轻度焦虑的表现是注意力不集中，时不时就在想自己到底能做多久，是不是下次丁丁一插入就要射精了，总担心自己是不是真的早泄了。

轻度焦虑放松训练的核心是，通过呼吸和冥想，把注意力集中到手上，慢慢抛开其他的身体感觉，进入一种空无的状态，从而使潜意识抛开焦虑。训练时间为 3-5 分钟，结合音频训练。具体方法如下：

- 在一个安静的房间，关上门窗，关闭光源。以舒服的姿势坐在椅子上，后背挺直，双手十指相扣，掌心向上，轻放于大腿上。
- 闭上眼睛，深呼吸，慢慢吸气，慢慢呼气，调整全身，感觉平稳。继续深呼吸，把注意力放在手上，感觉手的存在，手中有一团火，正慢慢燃烧，慢慢燃烧。
- 这时你看不见任何东西，听不见任何声音，只感觉手中越来越热，越来越热；慢慢深呼吸，双手成了你身体的全部，所有杂念也在慢慢远去。
- 慢慢深呼吸，杂念也在慢慢远去，你进入了一种空无的状态，非常放松，非常放松……

6.2 中度焦虑放松训练

中度焦虑的表现是经常眉头紧促压力大，觉得自己怎么就早泄了，所以时常有胸闷发紧或者呼吸困难的感觉，十分焦虑。

中度焦虑放松训练的核心是，呼吸调整使自己放松后，想象从黑暗到光明，从寒冷到温暖的变化，再通过潜意识里的能量来对抗焦虑，达到一个放松愉悦的内心世界。训练时间为 3-5 分钟，结合音频训练。具体方法如下：

- 在一个安静的房间，关上门窗，关闭光源。以舒服的姿势坐在椅子上，后背挺直，双手分别平放在双腿上，闭上眼睛，慢慢深呼吸。
- 吸气时，双手掌心向上，随着吸气缓缓从腹部抬起，让身体吸收新鲜的空气；呼气时，双手掌心向下，顺着呼气缓缓从胸部下压，让身体排出污浊的气体。
- 慢慢吸气，慢慢呼气，重复 10 次后，身体已经调整到平稳状态，双手停下动作，分别平放在双腿上，继续慢慢深呼吸。
- 想象你正处于黑暗之中，什么都看不见，周围一片漆黑，感觉寒冷，



深呼吸，慢慢感受这漆黑与寒冷，深呼吸。

- 这时前方出现了一丝光明，你化作一个身影，开始慢慢跑向光明。跑着跑着，身体开始温暖，光明越来越近，越来越近。

- 这时太阳正在你的不远处升起，刹那间，光芒万丈，天地明亮。阳光照在你的脸上，你感觉很温暖，很舒适。

- 继续深呼吸，慢慢深呼吸，温暖的能量随着呼吸慢慢进入了你的体内，能量越来越多，化作了更多的光明，在你面前打开了又一个新的世界。

- 这个世界美好而光亮，空气清新，鸟语花香，到处绿树成荫。阳光照着你全身，你感觉非常温暖，能量越来越多，内心越来越强大，你足以战胜一切困难……

6.3 重度焦虑放松训练

重度焦虑的表现全身紧绷僵硬，心跳无故加快，感觉伴侣因为自己早泄而不能满足，所以要出轨了，或者要和自己分手/离婚了，非常焦虑。

因为重度焦虑已经由意识影响到行为，常用的呼吸、冥想、想象等方法已经无法抑制焦虑，所以就需要进行“渐进性肌肉放松训练”。该训练是由美国生理学家 Edmund Jacobsen 于 20 世纪 30 年代创立，后来逐步完善，广泛应用，是解决重度焦虑的有效放松方法。

渐进性肌肉放松训练的核心是，通过有意识的控制身体肌群，使自己在内心自觉体验肌肉的松紧程度，以间接调节植物神经系统的兴奋性，从而缓解紧张焦虑。训练时间为 10-15 分钟，结合音频训练。具体方法如下：

- 在一个安静的房间，关上门窗，关闭光源。松开所有紧身衣物，如领带、皮带等，摘下有碍放松的首饰、眼镜等物品，脱掉鞋帽，以便减少不必要的刺激。

- 以舒服的姿势坐在软椅或沙发上，肌肉不能用力，头和上身轻轻靠住椅背或沙发后背，双臂和手放在扶手上，双腿自然前伸，闭上眼睛。

- 首先慢慢深呼吸，感觉身体稳定后，紧皱眉头 10 秒钟，就像生气时一样皱紧，然后慢慢的，慢慢的松开眉头，感觉眉头微微发热，麻

木酸软。

- 向左转动眼球，转动到最大程度，感觉眼睛酸胀，保持这个动作，10 秒钟后还原放松；再向右转动眼球，转动到最大程度，感觉眼球酸胀，10 秒钟后还原放松；然后两只眼球按顺时针方向，慢慢的转动一周，然后放松；再使两只眼球按逆时针方向，慢慢的转动一周，然后放松。

- 咬紧牙关，用力皱紧鼻子，像在愤怒时用力一样，保持 10 秒后放松；紧闭双唇，使唇部肌肉紧张，保持 10 秒后放松；鼓起两腮，使脸颊肌肉紧张，绷紧，保持 10 秒后放松；用舌头顶住上腭，使舌头前部酸胀紧张，10 秒钟后放松；然后像吞咽食物一样，做吞咽动作，只吞咽一半，不完全吞下，使舌头根部和喉部肌肉紧张，10 秒钟后放松，体验放松时的轻松感觉。

- 低头，将头用力向下低，使下巴抵住胸部，保持 10 秒钟，然后慢慢放松，感觉颈部肌肉的放松，恢复自然状态。

- 双手伸直，平放在沙发的扶手上，握紧拳头，用力一点，使劲握，使双手和小臂肌肉紧绷，10 秒后慢慢放松；然后再握紧拳头，收拢小臂，小臂用力向大臂弯曲靠拢，10 秒后慢慢放松，体验放松时的感觉。

- 将双臂放在沙发两侧扶手上方，尽力耸肩，使双肩靠近耳朵，10 秒钟后慢慢放松，体验双肩发热和沉重的放松感觉。

- 向后用力弯曲背部，使胸部和腹部向前挺起突出，坚持 10 秒钟，然后放松；然后双肩向后背伸展，使肩胛骨尽量靠拢，让背部肌肉群紧绷，保持 10 秒钟，慢慢放松，体验放松时的感觉。

- 双肩向前向下沉，绷紧胸部肌肉，保持 10 秒钟，慢慢放松；高抬大腿，同时胸部压低，使大腿靠拢胸部，绷紧腹部肌肉，保持 10 秒钟，慢慢放松，体验放松时的感觉。

- 将双腿伸直平放于地，小腿和脚后跟用力下压，使臀部肌肉绷紧，保持 10 秒钟，慢慢放松；然后将左臀和右臀用力夹紧，保持 10 秒钟，慢慢放松，体验放松时的感觉。

- 脚后跟离开地面，绷直双腿，夹紧双膝，如同两只膝盖紧紧夹住一枚硬币那样，使大腿肌肉绷紧，保持 10 秒钟，慢慢放松；脚后跟再离开地面，绷直双腿，脚尖朝膝盖处用力弯曲，使小腿肌肉绷紧，保持 10 秒钟，慢慢放松。

- 双脚平放于地面，脚趾慢慢向上用力弯曲，脚踝和腿都不要移动，保持 10 秒钟，慢慢放松；然后再将脚趾慢慢向下用力弯曲，就像抓地一般，保持 10 秒钟，慢慢放松，体验放松时的感觉。
- 所有动作做完后，慢慢吸气，慢慢呼气，现在感觉非常放松，全身每一块肌肉都很轻松，慢慢深呼吸，内心充满平和与宁静……

本章总结：

因为紧张焦虑等负面心态会导致做时的快速射精，所以我们就要根据焦虑程度的不同，进行相应的身心放松训练。轻度焦虑为呼吸加冥想训练；中度焦虑为呼吸加想象训练；重度焦虑为从头到脚的渐进性肌肉放松训练。

7 怎样通过日常训练增强性相关机能

日常训练主要是 PC 肌训练和丁丁按摩训练。在之后进行的兴奋度等级控制中，我们需要用到 PC 肌功能，同时 PC 肌对控制射精力有重要作用；丁丁按摩训练是为了疏通阴部经络，加强丁丁血液循环，增强性相关机能。

7.1 凯格尔运动（PC 肌训练）

凯格尔运动大家应该都听说过，但网上的讲解较为复杂，难以理解。我只用知道凯格尔运动的目的就是为了锻炼 PC 肌，所以我们可以直接进行 PC 肌训练。

PC 肌也叫盆底肌，是位于阴囊和肛门之间的会阴内部的一组肌肉，当你尿尿时，突然把尿夹断，使用的就是 PC 肌。PC 肌对勃起硬度和兴奋度控制能力有着重要作用。在之后进行的兴奋度等级控制中，我们就需要用到 PC 肌功能。

同时如果 PC 肌收缩功能越强，在射精时就会越有力。但长期久坐的人通常 PC 肌松弛，收缩无力。我们可以通过**深蹲运动**和**收肛运动**来进行 PC 肌训练。


深蹲运动：

- 1) 小腿与上身平行，大腿与地面平行或更低；
- 2) 双脚与肩同宽，脚尖与膝盖朝向一致；
- 3) 头部、肩部上下垂直移动，保持背部挺直；
- 4) 重心在脚后跟，身体不可前倾，整个过程脚掌应完全接触地面。

训练时一蹲一起算 1 个，每 30 个为一组，每天至少 3 组。动作一定要做正确，否则会损伤膝盖。深蹲运动不仅能训练 PC 肌，还能锻炼腰部力量，促进雄性激素分泌，对提升性能力很有帮助。

收肛运动：

如下图，类似大家拉便便时用肛门夹断便便的动作，就是收肛；如果用力向外拉便便，就是推肛。收肛运动以收肛 3 秒，推肛 1 秒，休息 2 秒为动作周期，有空时都可以做，多做为好。



7.2 丁丁按摩训练

丁丁按摩训练，是通过推拿阴部相关穴位，促进经络畅通；通过按摩丁丁相关部位，促进血液循环；通过按摩时的自我语言反复暗示，提升心理上的延时信心。按摩训练共分为 4 个步骤，要在安静私密的房间进行，训练过程中要配合使用我们提供的按摩精油。

7.2.1 推肾俞

肾俞穴，在中医上具有增强精力，调理性生殖功能的作用。肾俞穴位于人体腰部，在第二腰椎棘突下，左右二指宽处。大家可能难以精准取穴，但通过推按肾俞穴及周围部位，也是有增强作用的，建议大家跟着视频演示一起做。

首先在手掌上涂抹几滴精油，互相搓热后，手掌并排，两手向下，按在腰后部。然后从腰部到尾椎部，上下来回推按，速度不要太快，同时配合着推按频率，有节奏的快速收紧肛门和放松。

过程中要自言自语的反复说出声来：“我的精力正在增强，我的性能力正在恢复……”该步骤持续 2 分钟。

7.2.2 按会阴

会阴穴，在中医上具有疏通体内脉结，促进阴阳气的交接与循环，对调节生理和生殖功能有独特的作用。会阴穴位于阴囊根部与肛门连线的中点，按准后有轻微凹陷感。

双手的手指肚涂上精油，先单手轻轻托住睾丸，中指和无名指同时按住会阴穴，并转圈揉动，速度不要太快，用力不可过大，不要按出酸胀感。2 分钟后，另一只手加入，从会阴穴沿着腹股沟向上推按摩擦，双手交替进行。



过程中要自言自语的反复说出声来：“我丁丁的经脉正在打通，我丁丁的血液循环正在增强……”该步骤共持续 4 分钟。

7.2.3 甩丁头

做该步骤时，若包皮过长，要翻开包皮，露出龟头。先 3 根手指轻轻托住睾丸，食指和大拇指轻捏着丁丁根部，上下甩动，速度不要太快。向上甩捶打到小腹，向下甩到下方。

2 分钟后，5 根手指都轻轻托住睾丸，托住就行，不要捏。用大拇指肚顶着丁丁根部，让其上下甩动。注意向上甩捶打小腹时，不可太用力，否则龟头不舒服。

过程中要配合着甩动频率，有节奏的快速收紧肛门和放松。并且要自言自语的反复说出声来：“我的丁丁在撞击中越来越强，我的丁丁最威武雄壮……”该步骤共持续 4 分钟。

7.2.4 搓丁柱

做该步骤时，若包皮过长，要翻开包皮，露出龟头。先在整个手掌上涂抹精油，手掌伸直，夹着丁丁搓动，速度不要太快，力度不可过大，不能搓出痛感。当丁丁没有勃起时，就用几根手指搓，不要让手指碰到龟头；当丁丁勃起后，改为用手掌搓，此时碰到龟头也没关系，但要避免引起射精感。

过程中要自言自语反复说出声来：“我的丁丁不怕摩擦，我的丁丁耐操持久……”该步骤共持续 2 分钟。

丁丁按摩训练的某些步骤，可能会产生兴奋快感，但注意一定不能为了快感而加快速度或增加力度，更不能手淫。当感觉兴奋度过高时，就要停下，等丁丁疲软一些后再继续，训练时间严格按照要求执行。

本章总结：

丁丁按摩训练分为推肾俞、按会阴、甩丁头、搓丁柱共 4 个步骤，在按摩训练的过程中同时要配合动作节奏，进行快速收缩肛门和放松。并且通过反复的自我语言暗示，从潜意识里增强延时信心。

8 射精紧迫感前的三大兴奋度控制方法

我们在之前的训练原理中讲过，性反应周期图中，在临界点时，射精紧迫感明显出现，此时性兴奋度等级约为 9 级。一旦过了临界点，就会进入高潮期，高潮期内，兴奋度等级超过 9 级，此时无论如何都无法控制或阻止射精。如果一定要在这时强行憋精，不仅会失败，长期这样还会导致前列腺炎、精囊炎等疾病！

所以真正的控精，并不是指想射就射，想停就停；也不是指在高潮期内控精，那样是根本控制不住的。**真正的控精，是指在临界点前，也就是出现射精紧迫感之前进行兴奋度控制，把兴奋度等级降低稳定在 7-8 级甚至更低，避免兴奋度过高而出现射精失控的情况。**

射精紧迫感的表现因人而异，但通常表现为：龟头胀大，肛门收紧，蛋蛋上提靠近身体，大腿内侧肌肉紧绷，意识模糊……这种射精紧迫感持续一小会儿，就会射精。**射精紧迫感之前**，就是指“龟头开始胀大，肛门开始收紧，蛋蛋开始上提，大腿内侧开始紧绷，意识开始模糊”这些感觉刚开始时，就要进行兴奋度控制。

而**临界点前**，具体又是指哪个时候？因为临界点的兴奋度等级为 9 级，在临界点前兴奋度控制，是指当兴奋度等级上升到 8-9 级之间时，就进行控制。“兴奋度 8-9 级之间”就是“射精紧迫感之前”。

所以，什么时候开始兴奋度控制？抽象来说，就是临界点前，当兴奋度等级上升到 8-9 级之间时，就进行控制；具体来说，就是射精紧迫感之前，当“龟头开始胀大，肛门开始收紧，蛋蛋开始上提，大腿内侧开始紧绷，意识开始模糊”这些感觉刚开始时，就要进行控制。

通过正确的兴奋度控制方法，可以把兴奋度等级始终控制在 9 级以下，**稳定在 7-8 级最好**，这样既能保证有较强的兴奋快感，又能避免越过临界点。只要兴奋度等级不超过 9 级，就不会进入高潮期，也就不会射精，从而使时间延长，持久延时。

正确的兴奋度控制方法分别为：呼吸控制法、PC 肌控制法、行为控制法。这些控制方法在之后的训练或是爱爱中，需要降低性兴奋度等级时都会用到，建议大家优先采用呼吸控制法和 PC 肌控制法。

8.1 呼吸控制法

性兴奋是由人体植物神经所控制的，兴奋感的强弱则是由植物神经中的交感神经和副交感神经共同调控的。人的主观意识虽然不能直接控制植物神经，但可以通过呼吸方法间接调控兴奋感的强弱，实现对兴奋度等级的控制。

练习呼吸控制法时，以舒适的姿势坐下，保持上身挺直，气息才能通畅。然后完全放松，进行深呼吸。注意呼吸节奏为：用 2 秒钟左右快速吸一口气，用 5 秒钟左右慢速呼气，反复循环呼吸。

在呼吸的同时，想象性能量聚积于丁丁，当每一次吸气，性能量都逐渐提升至胸腔；每一次呼气，性能量就随着呼气缓缓扩散至四肢，扩散到每一个毛孔。每一次吸气，性能量就少了一些，提升到了胸腔；每一次呼气，性能量又少了一些，扩散到了四周……继续呼吸，身体越来越放松，性能量越来越少，兴奋冲动也越来越低……

至于“性能量”是否真的存在，这个并不重要。用“性能量”只是为了在潜意识里把兴奋冲动感具体化，通过这种呼吸方法，缓解即将到来的射精紧迫感，把兴奋度等级控制在 7-8 级。

呼吸控制法要反复练习，只有多练，才能在射精紧迫感即将到来之前，形成条件反射似的控制习惯，自然顺利的使时间延长。

8.2 PC 肌控制法

大家在自慰或爱爱时会发现，当有射精紧迫感时，肛门是夹紧的，PC 肌也是收缩的，这是正常生理反应。肛门夹紧，是为了促使 PC 肌收缩，而 PC 肌收缩，是为了压迫丁丁海绵体，让丁丁更硬更大，充血更充分，触觉更敏感，从而完成射精前的最后一步。

但这种肛门夹紧、PC 肌收缩的状态对我们延时是很不利的，这会让兴奋度等级过高，让射精紧迫感提前到来。所以我们可以通过 PC 肌控制法，来放松肛门，放松 PC 肌，降低兴奋度等级。

当感觉肛门夹紧时，我们可以通过类似拉便便时的推肛动作，让肛门外推扩张几次，使 PC 肌松弛，降低丁丁充血程度，从而降低兴奋度等级。但注意推肛不要过于用力，推肛次数和持续时间也不要过度（通常推肛 1-2 次，每次 3-5 秒），否则过度可能让丁丁疲软。

因为每个人的身体机能都不一样，要达到放松 PC 肌，降低兴奋度的效果，推肛具体用多大的力，推多少次，每次持续时间多长，这都是因人而定的。所以就需要你在之后的训练中反复实践，找到适合自己的推肛力度、次数、时间。

8.3 行为控制法

行为控制法就是通过一系列的动作行为，从外部来缓解射精紧迫感，降低性兴奋度等级。这些外部的动作行为，主要是 3 个动作：按龟头、扯阴囊、揉会阴。

- 1) 按龟头，就是当出现射精紧迫感时，用拇指按住龟头上方，使充血暂时减弱，兴奋度暂时降低；
- 2) 扯阴囊，就是当出现射精紧迫感时，单手轻握阴囊向下拉扯，避免蛋蛋上提靠近身体，缓解紧迫感；
- 3) 揉会阴，就是当出现射精紧迫感时，3 根手指并排，用画圈的动作揉按会阴，用力不可过大，不能揉出酸胀感。通过揉按会阴，间接使 PC 肌放松。

本章总结：

真正的控精，是指在临界点前，也就是出现射精紧迫感之前进行兴奋度控制。正确的兴奋度控制方法分别为：呼吸控制法、PC 肌控制法、行为控制法。这些控制方法在之后的训练或是爱爱中，需要降低性兴奋度等级时都会用到，建议大家优先采用呼吸控制法和 PC 肌控制法。

9 单人性快感集中训练感知兴奋等级

从前文可知，在持久延时训练或爱爱中，最重要的是对性兴奋度等级的感知和控制。只有明显感知到兴奋度等级的变化，才能在 8-9 级兴奋度时，及时采取呼吸控制法或 PC 肌控制法（第 8 章内容），来控制降低兴奋度等级，避免兴奋度超过 9 级而出现射精失控的情况。


要达到对兴奋度等级的明显感知和控制，可以通过“单人性快感集中训练”来实现。“性快感集中训练”是由美国性治疗师玛斯特斯和约翰逊于 20 世纪 70 年代创立，是现代性治疗领域的重大突破。

原训练方法要求伴侣双方配合进行，但考虑到大部分早泄人士对异性的性刺激都过于敏感，若一开始就进行双人训练，常常会出现兴奋度上升失控，导致训练失败的情况，所以我们这里先采用单人训练方法。

待敏感度降低，耐受度提高，兴奋度控制能力熟练，习惯性早泄改善后，最后再进行双人训练方法。

9.1 性兴奋等级的划分及表现

欧美国家的性治疗师将性兴奋度分为 10 个等级，注意“性兴奋度≠勃起硬度”。不同的兴奋度等级有不同的感受，但相邻兴奋度等级间没有明显的分界，只有细微的感受差别。具体兴奋度等级划分表现如下图所示：



- 1 级：大脑里没有任何性想法；
- 2-3 级：大脑产生性想法，丁丁根部开始充血，有轻微快感；
- 4 级：大脑感觉舒服，丁丁勃起，出现低程度的性兴奋；
- 5-6 级：有明显性快感，想继续增加刺激。这是丁丁刚进入 Y 道时应有的兴奋度等级；
- 7-8 级：快感强烈，呼吸急促，心跳加快，感觉兴奋刺激。兴奋度控制时，稳定在这个兴奋等级最好；
- 8-9 级：龟头开始胀大，肛门开始收紧，蛋蛋开始上提，大腿内侧开始紧绷，意识开始模糊，此时应马上进行兴奋度控制，降低兴奋度；
- 9 级：快感很强烈，处于临界点，即将进入高潮期，出现射精紧迫感；
- 9-10 级：大脑空白，任何做法都不能阻止射精；10 级，射精。

9.2 单人性快感集中训练方法

在一个安静私密的房间，不要被其他人打扰，可先做 3-5 分钟的身心放松训练（第 6 章内容）以排除杂念，然后闹钟定时 20 分钟开始。

保持全身赤裸，先躺在床上，双手手掌涂抹我们训练配套的按摩精油，慢慢深呼吸，保持身心放松状态，慢慢爱抚自己的身体敏感带。可参考配套视频演示，重点爱抚这些部位：

- 从脖颈开始，双手慢慢爱抚移动到自己的胸部，不要一开始就触碰乳头，先爱抚胸肌周围，待适应后，再以缓缓画圈的动作滑向乳头，爱抚时指腹指背都可以滑动摩擦。
- 指尖慢慢滑动，从胸部移向腹部爱抚，然后转入大腿外侧、大腿内侧，手掌贴合皮肤，反复爱抚摩擦。期间双手也可再次回到胸部爱抚，动作顺序不限，完全随性而为。
- 然后手指顺着腹股沟，来回循环摩擦；再沿着阴囊的边缘轮廓，滑动爱抚；之后滑过阴囊，只用指尖轻轻抚触丁丁。这些部位要反复循环爱抚，不要只停留在一个位置。
- 正面爱抚后，再翻过身，背面朝上。双手从大腿外侧到大腿内侧爱抚，然后翘起臀部，从大腿内侧滑向会阴，此时可以三指并排，轻轻揉按会阴。
- 最后从会阴转向肛门（前提是肛门要洗干净），手指划过肛门，滑向尾椎，然后又回到肛门，手指按压肛门，循环往复……

9.3 本训练阶段的注意事项

以上过程中爱抚的部位都是男士的身体敏感带，爱抚过程中会有兴奋

快感，随着爱抚的进行，性兴奋度会逐渐上升。大家在训练中一定要注意这几点：

- 1) 过程动作一定要慢，用力要轻，把注意力完全集中在自己的身心变化上，慢慢享受过程，静静感受兴奋快感的缓慢增加，静静体验身体的每一个细微变化，从而感知兴奋度等级的变化，找到兴奋度 8-9 级，射精紧迫感之前时的感觉。
- 2) 当感觉兴奋度 8-9 级，射精紧迫感之前时，就停止爱抚，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法（第 8 章内容）进行兴奋度控制，把兴奋度降低到 7-8 级后，再继续爱抚。
- 3) 大脑一定要放松，因为不用射精，不用满足谁，所以不要有任何心理上的压力。一旦有压力，注意力就不集中，就无法感知到兴奋度等级的变化。
- 4) 训练过程中不要手淫，抚触丁丁时，只是用指尖轻轻滑过触摸丁丁，不是用手撸。训练过程中勃起与否无所谓，只用感受手指滑动触摸的过程。
- 5) 本训练阶段不是为了射精，但如果不慎射了，也没关系，只是下次一定要注意兴奋等级的控制，避免进入高潮期而出现射精不可控的情况。

9.4 本训练阶段达标的标准

本训练阶段持续 2 周时间，训练目标达到的标准为：训练过程中注意力很集中，能明显感知到兴奋度等级的上升，以及各个兴奋度等级所对应的身体感觉。并能在兴奋度等级上升到 8-9 级时，熟练的进行控制，把兴奋度等级降低稳定在 7-8 级。

本章总结：

单人性快感集中训练，通过缓慢爱抚自己的敏感带，慢慢体验兴奋快感增长的感觉，从而准确感知各个兴奋度等级所对应的身体感觉。清楚自己所处的兴奋等级，才能在恰当的时候进行控制，把兴奋度等级降低稳定在 7-8 级，避免兴奋度超过 9 级而出现射精失控的情况。

10 怎样训练降低敏感度，提升耐受度

有的人敏感度过高，耐受度过低，当稍微性刺激时，反应就过于强烈，兴奋度等级急速上升，几分钟甚至几秒钟就能达到 10 级兴奋度而射精。这里的性刺激，不仅仅指丁丁摩擦的触觉刺激，还有看到对方身体的视觉刺激，听到对方呻吟的听觉刺激，闻到对方体香的嗅觉刺激。

既然对这些性刺激的敏感度过高，那么我们就先从较小的性刺激开始，反复训练对性兴奋的控制力，然后逐渐增加性刺激强度，慢慢提升对性刺激的耐受力，最终降低敏感度，提升耐受度。使兴奋度等级不至于上升过快，使射精紧迫感更长时间后才会到来。

10.1 兴奋控制力训练

兴奋控制力训练是为了降低对视觉刺激和听觉刺激的敏感度。首先你要自己准备几部喜欢的 AV 片或情色片，但因为大部分 AV 都过于夸张，所以选择的片要尽量贴近真实，建议首选日本 SILK 系列的片。

10.1.1 视觉降敏


片选好后，先关闭声音，只看画面，不要快进，抱着学习的心态从头开始看。把自己想象成男主角，学习片中男主角是怎样调情的，怎样前戏的，采用了哪些动作步骤，他们的频率和节奏是怎样的……

慢慢看，慢慢感受自己身体的变化，感受兴奋度等级的变化。当丁丁完全勃起，有很想自慰的冲动时，暂停画面，马上采用呼吸控制法或 PC 肌控制法（第 8 章内容）来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，再继续观看，如此反复控制，观看时间为 15 分钟。

10.1.2 听觉降敏

如果对听觉刺激敏感，也就是当听到伴侣的呻吟，就把持不住的，在看片训练 15 分钟后，就把片重新定格在正戏开始的时候，不看画面，只听声音。把自己代入到片中场景，慢慢听，慢慢感受自己身体的变化，感受兴奋度等级的变化。

当丁丁完全勃起，有很想自慰的冲动时，暂停声音，马上采用呼吸控制法或 PC 肌控制法（第 8 章内容）来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，再继续听声音，如此反复控制，



听声音时间为 15 分钟。


10.1.3 视听综合降敏

训练一周后，再把画面和声音同时打开，按照上面相同的方法，当丁丁完全勃起，有很想自慰的冲动时，就暂停影片，进行兴奋度控制，当兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，再继续开启，如此反复控制，整个时间为 20 分钟。

通过这种训练方法可降低对视觉刺激和听觉刺激的敏感度，提高心理上对性刺激的耐受度。随着训练的进行，自慰的冲动会越来越少，产生自慰冲动的时间间隔会越来越长，甚至不会有自慰的冲动。

10.2 丁丁耐受力训练

丁丁耐受力训练是为了降低龟头敏感度，增加龟头对触觉摩擦刺激的耐受度。龟头的敏感部位主要有 4 个：冠状沟、龟头上表面、包皮系带、马眼。



因为马眼就是尿道口，为防止病菌感染，不能直接对其进行训练刺激，所以我们只训练刺激冠状沟、龟头上表面、包皮系带，最后再整体提升耐受力。

训练前要先进行 5 分钟的单人性快感集中训练（第 9 章内容），让兴奋度等级慢慢上升后促使勃起，才开始训练。训练中要使用我们配套的按摩精油，不要使用润滑液，润滑液刺激度太大。

丁丁耐受力训练主要通过**旋转摩擦法**和**整体套动法**。其中**旋转摩擦法**分为“指扣旋转”和“伞状摩擦”两个步骤；**整体套动法**分为“大小幅套动”、“套动+视觉刺激”、“套动+听觉刺激”、“套动+试听刺激”

共四个阶段。

训练中通过逐渐增加性刺激强度，不断训练自身对各种性刺激的耐受度，训练可参考配套视频演示进行。

10.2.1 旋转摩擦法

步骤 1：指扣旋转

翻开包皮，完全露出龟头。单手的食指和拇指均匀涂抹按摩精油，然后相扣成 OK 环形状，套在龟头的冠状沟处，通过旋转摩擦的手法刺激冠状沟和包皮系带，这个步骤的训练时间为 10 分钟。

训练中，食指拇指不要扣得太紧，环住冠状沟后，有稍微压迫力即可；旋转时速度要慢。训练过程最好闭上眼睛，专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法（第 8 章内容）来降低兴奋度等级。

当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制，训练时不能看片。

步骤 2：伞状摩擦

指扣旋转结束后，再进行伞状摩擦。继续保持龟头露出，在单手的手掌均匀涂抹按摩精油，手掌自然伸直张开，掌心轻按在龟头上表面，以顺时针或逆时针方向，依次旋转摩擦龟头上表面，龟头侧面，龟头背面的包皮系带。手的运动轨迹就像撑开的伞面，这个步骤的训练时间为 10 分钟。

训练中，速度要慢，按压力度不可太大。最好闭上眼睛，专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法（第 8 章内容）来降低兴奋度等级。

当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制，训练时不能看片。

10.2.2 整体套动法

当训练一周后，龟头敏感度会降低，耐受度会增加，这时再增加刺激程度，采用整体套动法进行训练。训练前要先进行 5 分钟的单人性快

感集中训练（第 9 章内容），让兴奋度等级慢慢上升后促使勃起，再开始训练。避免一开始刺激度过大，丁丁还没适应，射精紧迫感就提前到来了。

阶段 1：大小幅套动

开始训练时，一只手在丁丁根部拉住包皮，保持龟头一直露出。另一只手的整个手掌和龟头上都涂抹按摩精油，涂抹均匀后，手握住龟头，呈包裹状。几秒钟后，当龟头适应了手的温度和感觉，再进行套动。

开始套动时，要轻轻握住龟头，保持对龟头仅有轻微压力即可，如果握力太大，刺激度会过大，不利于训练的循序渐进；在套动过程中，开始不要一撸到底，否则刺激度也会过大，要先小幅度套动龟头及周围。

套动时，保持轻微的握力不变，有意对冠状沟、包皮系带、龟头上表面，整体进行触觉摩擦刺激。套动速度要慢，一下一上为 1 次，频率为 1-2 次/秒，如果套动速度过快，刺激度也是过大，会很快进入高潮期迅速射精，丧失训练信心。

小幅度套动 10 分钟后，再进行从龟头到丁丁根部的套动。注意只是套动幅度加大，但握力和速度频率仍维持不变，大幅度套动也是训练 10 分钟。

训练过程最好闭上眼睛，专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法（第 8 章内容）来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制。

阶段 2：套动+视觉刺激

当“大小幅套动”训练一段时期后，龟头对触觉摩擦刺激的耐受度会增加，此时再加入视觉刺激。即打开自己喜欢的影片，只看画面，关闭声音，同时进行大小幅套动训练，小幅度和大幅度套动各 10 分钟，握力、速度频率都维持不变。

训练过程中要专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到

7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制，训练时间共 20 分钟。

阶段 3：套动+听觉刺激

当“阶段 2”训练一段时期后，龟头对“触觉摩擦刺激+视觉刺激”的耐受度会增加，此时去掉视觉刺激，加入听觉刺激。即打开自己喜欢的影片，关闭画面，只听声音，同时进行大小幅套动训练，小幅度 and 大幅度套动各 10 分钟，握力、速度频率都维持不变。

训练过程中要专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制，训练时间共 20 分钟。

阶段 4：套动+视听刺激

当“阶段 3”训练一段时期后，龟头对“触觉摩擦刺激+听觉刺激”的耐受度会增加，此时再同时加入视觉刺激和听觉刺激。即打开自己喜欢的影片，边看画面，边听声音，同时进行大小幅套动训练，小幅度 and 大幅度套动各 10 分钟，握力、速度频率都维持不变。

训练过程中要专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制，训练时间共 20 分钟。

在这种“触觉摩擦刺激+视觉刺激+听觉刺激”多重的性刺激环境下，可以全面降低敏感度，不断增强自身对视觉刺激、听觉刺激、触觉摩擦刺激的耐受度，提高对性兴奋度等级的感知和控制，为下一阶段的仿真模拟训练打下基础。

10.3 本训练阶段的注意事项

1) 训练环境的私密安全十分重要。尤其是丁丁耐受力训练，因为要露出丁丁，如果环境不私密，训练者怕其他人看见，就会处于紧张压力的状态，紧张压力会导致射精过快，影响训练效果。

2) 一定要不困不累时才能训练，困倦和疲惫都会严重影响发挥，大脑会出于自我保护让你提前射精，所以一定要保证睡眠和休息。

3) 丁丁耐受力训练前要先进行 5 分钟的单人性快感集中训练（第 9 章内容），让兴奋度等级慢慢上升后促使勃起，才开始训练。避免一开始刺激度过大，丁丁还没适应，射精紧迫感就提前到来了。

4) 丁丁耐受力训练不是简单的自慰，它是先对龟头局部性刺激，然后整体性刺激，再增加视觉听觉刺激。性刺激强度由小到大，逐渐增加。丁丁只有先适应耐受了小强度的性刺激，才能继续训练，适应耐受更大强度的性刺激。所以要按照顺序训练，循序渐进。

尤其注意的是，整体套动法无论哪个阶段，握力一定要轻，保持对龟头仅有轻微压力即可；套动速度要慢，一下一上为 1 次，频率为 1-2 次/秒。

5) 不要带着“一定要坚持多久”这样的目的性压力，有压力就会影响发挥。

6) 训练过程中，注意力一定要集中，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就要马上停止动作并进行控制。

千万不要为了多练几下而不停，一旦不停，错过了最佳控制时间，兴奋等级就会超过 9 级，进入高潮期，出现射精失控的情况，所以一定要尽早控制。

7) 进行呼吸控制或 PC 肌控制后，继续训练，却很快又有了射精紧迫感。这是因为训练者动作速度过快，或者握力过大，没有感知到兴奋等级的变化，第一次控制时，时间已经太晚，兴奋度已经达到了临界点 9 级，虽然勉强控制住了，但继续训练时，第二次射精紧迫感就会很快到来。

所以速度要慢，用力要轻，注意力要集中，感知兴奋度等级的变化。当兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就要马上停止动作并控制。

射精紧迫感之前，通常是“龟头开始胀大，肛门开始收紧，蛋蛋开始上提，大腿内侧开始紧绷，意识开始模糊……”这些感觉。

8) 中途控制时，停止动作后就软了。这种情况要么是存在轻微勃起障碍，要么是停得太久了。所以一定要先进行勃起训练，再进行持久延时训练；另外中途停止时间不要太久，应以 7-10 秒为宜；即使疲软了也没关系，再通过训练刺激勃起就行了。

9) 中途控制时，停止动作多少次无所谓，只要是兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就应停止控制。随着训练次数的增加，停止控制的次数会越来越少，射精紧迫感之间的时间间隔会越来越长。

10) 兴奋控制力训练和丁丁耐受力训练要隔天交替进行，隔天一次，不要当天两项都做，更不要一天多次。二者的训练时间都是控制在 20 分钟，不可增加训练时间，毕竟性机能也需要休息恢复。

若兴奋控制力训练时间太长，可能导致兴奋阈值升高，性兴奋冲动不足，出现勃起问题；若丁丁耐受力训练时间太长，会让性系统长时间充血，不利于性系统健康，所以只有适度训练，才能增强机能。

11) 在本训练阶段内，每训练 2-3 天后，就应在训练结束时射精一次。因为每次训练，都会累积性能量，当性能量累积到一定程度之后，就需要排解释放，这样才能维持训练状态的稳定，维持性系统的健康。

大家不要觉得射精不好，伤肾气啥的，这种认识是片面的。如果每天都射精，过度射精，的确会伤身；但如果累积了几天的性能量，却强行憋着不释放，也会伤身，所以长期禁欲的人也是前列腺炎的高发人群之一。

而且累积大量性能量后，憋着不释放，当下次训练时，性兴奋度会急速飙升，很快就会出现射精紧迫感，让人感觉难以控制，影响训练状态的稳定，容易让人丧失训练信心。

所以每训练 2-3 天后，在训练结束时射精一次是很有必要的。但注意如果前两天晚上有自然遗精，就不要主动射精，更不要和伴侣做爱射精。本训练阶段是不能做爱的，否则累积了性能量去做爱，时间会更短。

12) 在不射精的训练日，训练结束后，因为性系统还处于充血状态，

为了保持性系统健康，必须要加快血液循环，缓解充血。所以训练结束后，一定要进行**深蹲运动**和**原地高抬腿运动**，以缓解性系统的充血。

具体要求是先做一组（30 个）深蹲运动，一组（3 分钟）原地高抬腿运动，再做一组深蹲运动，一组原地高抬腿运动。两项运动各做两组，交替进行。

深蹲运动在 PC 肌训练（第 7 章内容）中已经讲过，原地高抬腿运动细节如下：

- 上身挺直，重心不前顷、也不后倒，尽量向上拔高；
- 双腿交替抬起，原地跑动，节奏尽量快，摆臂与抬腿要协调；
- 一条腿抬起时，大腿腿根与上身之间呈 90 度直角；
- 一条腿抬起时，支撑地的那条腿尽量绷直，前脚掌着地，脚跟离地；
- 原地高抬腿运动一组持续 3 分钟。

13) 睡前 1 小时不要进行训练，以免影响睡眠。

10.4 本训练阶段达标的标准

兴奋控制力训练，训练目标达到的标准：

“视听综合降敏训练”20 分钟后，丁丁不是极度勃起，只是兴奋度等级 4-5 级的勃起，并且丁丁没有流出大量的透明粘液，训练目标即达到。

训练过程中流出少量透明粘液是正常生理现象。透明粘液为尿道球腺液，呈弱碱性，又名“预射精液”，是为射精前而预备的，可以中和尿道的残余酸性，以确保射精时，能让更多精子存活。当尿道球腺液大量流出时，这说明射精工作已准备完成，若继续增加性刺激，就会很快射精。

丁丁耐受力训练，训练目标达到的标准：

“整体套动法·阶段 4”训练时，中途不停止动作，不进行兴奋度控制，也能坚持 10 分钟以上。并且坚持 10 分钟后，若停止动作，进行兴奋度控制 2 次后，这样总体时间若能达到 15-20 分钟，训练目标即达到。

因为训练必须要保证注意力集中，所以过程中不要频繁的去看时间，避免分心。建议当出现第 1 次射精紧迫感之前的感觉时，看一下时间

是否达到 10 分钟，然后停止动作，进行兴奋度控制，然后继续。当出现第 3 次射精紧迫感之前的感觉时，再看一下时间是否达到 15-20 分钟。

本章总结：

通过兴奋控制力训练降低自身对视觉刺激和听觉刺激的敏感度，通过丁丁耐受力训练提升丁丁对视觉刺激、听觉刺激、触觉摩擦刺激的综合耐受度。训练过程逐渐增加性刺激强度，使自身对性刺激的敏感度不断降低，耐受度不断提升，避免稍微性刺激就出现射精紧迫感，为下一阶段的仿真模拟训练打下基础。

11 通过仿真模拟训练改变习惯性早泄

通过前面阶段的训练后，对各种性刺激的敏感度大大降低，耐受度大幅提升，不再一稍微接触性刺激就出现射精紧迫感。当这些基础打好后，才可以进行仿真模拟训练，从根本上改变习惯性早泄。

有的男士自慰时可以持久，但当真正实战时，丁丁一进入 Y 道，刚抽动几下就想射了……为什么自慰和做爱会有差别？原因有两点：

一是因为做爱时，不仅有触觉刺激，还有更真实的视觉刺激、听觉刺激、嗅觉刺激，比自慰时的综合性刺激度更强；二是因为自慰时，丁丁没有被手完全包裹，而做爱时，丁丁是被 Y 道完全包裹的，丁丁的每一个敏感点都会被 Y 道摩擦刺激到，所以性刺激度更高。


因为做爱时性刺激度更高，所以在插入前基础兴奋度等级就高，达到了 8-9 级，插入后没抽动几下，兴奋度等级就迅速上升超过了 9 级，进入了高潮期，马上就出现射精失控的情况。

所以我们的仿真模拟训练，就是要模拟 Y 道的全面包裹摩擦刺激，在适应单方面的包裹刺激后，再逐渐增加性刺激强度，分阶段的加入视觉刺激、听觉刺激、视听刺激，使丁丁逐渐适应耐受不同性刺激下的包裹摩擦，从而最终适应耐受 Y 道环境，延长活塞运动时间。

训练中，我们需要用到配套的**龟头训练器**，以及专用的**水溶性人体润滑液**。龟头训练器是经过特殊设计的飞机杯，分为“2 环训练器”和“1 环训练器”。水溶性人体润滑液是在训练中模拟爱液，起润滑作用的。

市面上常见的飞机杯，内部通道结构过于复杂，挤压过于紧致，这种设计会让刺激度极大，远远高于真实 Y 道的刺激强度。所以很多人使用飞机杯的时间，远低于实战活塞运动的时间，所以常见的飞机杯是不适合用于仿真模拟训练的。

而龟头训练器是经过特殊设计的。“2 环训练器”内部通道结构简单，内部空腔体积较大，整体刺激强度低于真实 Y 道的刺激强度；“1 环训练器”内部通道结构和空腔体积，完全模拟真实 Y 道大小，其整体刺激强度与真实 Y 道的刺激强度类似。



所以先使用“2环训练器”进行训练，待丁丁适应耐受强度较低的包裹刺激后，再使用“1环训练器”，使丁丁逐步适应耐受与真实 Y 道类似的刺激强度。

龟头训练器为 TPE 材料制成，与婴儿奶嘴属同一材料，安全无毒。训练器打开时看起来有点脏，那不是灰尘，那是出厂时涂的保护粉，为保护胶体材质的。训练时一定要使用配套的人体润滑液，不要使用按摩精油，因为精油可能损坏 TPE 材料，使其老化破裂。

11.1 仿真模拟训练 5 个阶段

仿真模拟训练分为 5 个阶段，分别为：2 环训练器套动、2 环训练器+视觉刺激、2 环训练器+听觉刺激、2 环训练器+视听刺激、1 环训练器+视听刺激。要按照这个训练顺序循序渐进的练习。

阶段 1：2 环训练器套动

训练前，先进行 5 分钟的单人性快感集中训练（第 9 章内容），让兴奋度等级慢慢上升后促使勃起。然后在丁丁上涂抹人体润滑液，进行丁丁耐受力训练（第 10 章内容）中的“整体套动法·阶段 1”练习。小幅套动和大幅套动各 1-2 分钟后，再向 2 环训练器洞口挤入适量润滑液，然后丁丁慢慢插入训练器。

插入后，先不要急着套动，而是通过旋转训练器或轻微套动等手法，把训练器通道内的润滑液搅拌均匀，旋转或轻微套动的过程，也是让丁丁适应包裹刺激的过程。当丁丁适应后，才开始套动训练，可参考配套视频的演示进行。

开始套动时，同样不要一撸到底，而是应该先只套动一半的长度，当感觉丁丁适应后，再完全套动。套动过程中，手只是轻握住训练器，不要加压力；套动速度要慢，一下一上为 1 次，频率为 1-2 次/秒。

套动过程中体位姿势随意，如果坐着或躺着训练，就是模拟的女上位，为被动抽插姿势；如果站着训练，就是模拟的正入式或后入式，为主动抽插姿势。模拟动作请看配套视频演示。

训练过程最好闭上眼睛，专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法（第 8 章内容）来降低兴奋度等级。

当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制。“阶段 1”每次训练时间为 20 分钟，训练周期为 5 天，隔天训练 1 次，训练 2-3 次后，要在训练结束时射精一次。不射精当天训练后，要进行深蹲运动和原地高抬腿运动各 2 组，以缓解性系统的充血。

阶段 2：2 环训练器+视觉刺激

“阶段 1”训练结束，丁丁已经适应耐受了“2 环训练器”的包裹摩擦刺激。休息 1 天后，再加入视觉刺激，进行“阶段 2”训练。即打开自己喜欢的影片，只看画面，关闭声音，同时进行“2 环训练器”的套动练习。

开始套动时，同样不要一撸到底，而是应该先只套动一半的长度，当感觉丁丁适应后，再完全套动。套动过程中，手只是轻握住训练器，不要加压力；套动速度要慢，一下一上为 1 次，频率为 1-2 次/秒，训练时体位姿势随意。

训练过程中要专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制。

“阶段 2”每次训练时间为 20 分钟，训练周期为 5 天，隔天训练 1 次，训练 2-3 次后，要在训练结束时射精一次。不射精当天训练结束后，要进行深蹲运动和原地高抬腿运动各 2 组，以缓解性系统的充血。

阶段 3：2 环训练器+听觉刺激

“阶段 2”训练结束，丁丁已经适应耐受了“2 环训练器+视觉”的综合性刺激。休息 1 天后，去掉视觉刺激，加入听觉刺激，进行“阶段 3”训练。即打开自己喜欢的影片，关闭画面，只听声音，同时进行“2 环训练器”的套动练习。

开始套动时，同样不要一撸到底，而是应该先只套动一半的长度，当感觉丁丁适应后，再完全套动。套动过程中，手只是轻握住训练器，不要加压力；套动速度要慢，一下一上为 1 次，频率为 1-2 次/秒，训练时体位姿势随意。

训练过程最好闭眼，专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制。

“阶段 3”每次训练时间为 20 分钟，训练周期为 5 天，隔天训练 1 次，训练 2-3 次后，要在训练结束时射精一次。不射精当天训练结束后，要进行深蹲运动和原地高抬腿运动各 2 组，以缓解性系统的充血。

阶段 4：2 环训练器+视听刺激

“阶段 3”训练结束，丁丁已经适应耐受了“2 环训练器+听觉”的综合性刺激。休息 1 天后，同时加入视觉刺激和听觉刺激，进行“阶段 4”训练。即打开自己喜欢的影片，边看画面，边听声音，同时进行“2 环训练器”的套动练习。

开始套动时，同样不要一撸到底，而是应该先只套动一半的长度，当感觉丁丁适应后，再完全套动。套动过程中，手只是轻握住训练器，不要加压力；套动速度要慢，一下一上为 1 次，频率为 1-2 次/秒，训练时体位姿势随意。

训练过程中要专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就马上停止，采用呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再继续训练，如此反复控制。

“阶段 4”每次训练时间为 20 分钟，训练周期为 5 天，隔天训练 1 次，训练 2-3 次后，要在训练结束时射精一次。不射精当天训练结束后，要进行深蹲运动和原地高抬腿运动各 2 组，以缓解性系统的充血。

阶段 5：1 环训练器+视听刺激

“阶段 4”训练结束，丁丁已经适应耐受了“2 环训练器+视觉听觉”的综合性刺激。休息 1 天后，增加包裹摩擦的刺激程度，把“2 环训练器”换为“1 环训练器”，同时加入视觉刺激和听觉刺激，进行“阶段 5”训练。训练相关要求和“阶段 4”训练一样。

通过这种逐渐增加的性刺激强度，不断训练自身对多重性刺激的适应耐受能力；通过对性兴奋度等级进行熟练的感知和控制，始终把兴奋度稳定在可控水平，逐渐使时间延长，逐渐改变快速射精的条件反射，从而改变习惯性早泄，最终适应类似实战的多重性刺激。

11.2 本训练阶段的注意事项

- 1) 训练环境的私密安全十分重要。因为要露出丁丁，使用训练器，如果环境不私密，训练者怕其他人看见，就会处于紧张压力的状态，紧张压力会导致射精过快，影响训练效果。
- 2) 训练时一定要使用配套的人体润滑液，不要使用按摩精油。
- 3) 一定要在不困不累时才能训练，困倦和疲惫都会严重影响发挥，大脑会出于自我保护让你提前射精，所以一定要保证睡眠和休息。
- 4) 仿真模拟训练前要先进行 5 分钟的单人性快感集中训练（第 9 章内容），让兴奋度等级慢慢上升后促使勃起，才开始训练。避免一开始刺激度过大，丁丁还没适应，射精紧迫感就提前到来了。
- 5) 不要带着“一定要坚持多久”这样的目的性压力，有压力就会影响发挥。
- 6) 训练过程中，注意力一定要集中，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就要马上停止动作并进行控制。

千万不要为了多练几下而不停，一旦不停，错过了最佳控制时间，兴

奋等级就会超过 9 级，进入高潮期，出现射精失控的情况，所以一定要尽早控制。

7) 进行呼吸控制或 PC 肌控制后，继续训练，却很快又有了射精紧迫感。这是因为训练者动作速度过快，或者注意力不集中，没有感知到兴奋等级的变化，第一次控制时，时间已经太晚，兴奋度已经达到了临界点 9 级，虽然勉强控制住了，但继续训练时，第二次射精紧迫感就会很快到来。

所以速度要慢，1-2 次/秒，注意力要集中，感知兴奋度等级的变化。当兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就要马上停止动作并控制。

射精紧迫感之前，通常是“龟头开始胀大，肛门开始收紧，蛋蛋开始上提，大腿内侧开始紧绷，意识开始模糊……”这些感觉。

8) 中途控制时，停止动作后就软了。这种情况要么是存在轻微勃起障碍，要么是停得太久了。所以一定要先进行勃起训练，再进行持久延时训练；另外中途停止时间不要太久，应以 7-10 秒为宜；即使疲软了也没关系，再通过训练刺激勃起就行了。

9) 中途控制时，停止动作多少次无所谓，只要是兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就应停止控制。随着训练次数的增加，停止控制的次数会越来越少，射精紧迫感之间的时间间隔会越来越长。

10) 每个阶段的训练时间都应控制在 20 分钟，要隔天训练一次，不可增加训练时间，毕竟性机能也需要休息恢复。若训练时间太长，可能导致兴奋阈值升高，性兴奋冲动不足，出现勃起问题；也可能让性系统长时间充血，不利于性系统健康，所以只有适度训练，才能增强机能。

11) 每训练 2-3 次后，就应在训练结束时射精一次。因为每次训练，都会累积性能量，当性能量累积到一定程度之后，就需要排解释放，这样才能维持训练状态的稳定，维持性系统的健康。

大家不要觉得射精不好，伤肾气啥的，这种认识是片面的。如果每天都射精，过度射精，的确会伤身；但如果累积了几天的性能量，却强

行憋着不释放，也会伤身，所以长期禁欲的人也是前列腺炎的高发人群之一。

而且累积大量性能量后，憋着不释放，当下次训练时，性兴奋度会急速飙升，很快就会出现射精紧迫感，让人感觉难以控制，影响训练状态的稳定，容易让人丧失训练信心。

所以每训练 2-3 天后，在训练结束时射精一次是有必要的。但注意如果前两天晚上有自然遗精，就不要主动射精，更不要和伴侣做爱射精。本训练阶段是不能做爱的，否则累积了性能量去做爱，时间会更短。

12) 在不射精的训练日，训练结束后，因为性系统还处于充血状态，为了保持性系统健康，必须要加快血液循环，缓解充血。所以训练结束后，一定要进行深蹲运动和原地高抬腿运动各两组，以缓解性系统的充血。

具体要求是先做 ^{更多精品联系微信} 二组（30 个）深蹲运动，一组（3 分钟）原地高抬腿运动，再做一组深蹲运动，一组原地高抬腿运动。两项运动各做两组，交替进行。注意睡前 1 小时内不要进行训练，以免影响睡眠。

11.3 本训练阶段达标的标准

当“阶段 5：1 环训练器+视听刺激”训练时，中途不停止动作，不进行兴奋度控制，也能坚持 10 分钟以上。并且坚持 10 分钟后，若停止动作，进行兴奋度控制 2 次后，这样总体时间若能达到 15-20 分钟，训练目标即达到。

因为训练必须保证注意力集中，所以过程中不要频繁的去看时间，避免分心。建议当出现第 1 次射精紧迫感之前的感觉时，看一下时间是否达到 10 分钟，然后停止动作，进行兴奋度控制，再继续。当出现第 3 次射精紧迫感之前的感觉时，再看一下时间是否达到 15-20 分钟。

本章总结：

仿真模拟训练通过使用“2 环训练器”和“1 环训练器”，使丁丁逐渐适应耐受与真实 Y 道类似的包裹摩擦刺激；通过在训练中逐渐增加多重性刺激，提升自身在类似实战的多重性刺激下的耐受力，从而延长时间，改变快速射精的条件反射，从根本上改变习惯性早泄。

12 怎样通过双人训练实现持久实战

单身人士在上阶段的训练达标后，训练就到此结束了。有伴侣的人士还需要进行双人训练，因为虽然敏感度已经降低，耐受度得到提升，兴奋度可熟练控制，习惯性早泄得以改变，但毕竟都是模拟实战，和真正实战还是有些许差别。

所以就需要进行双人训练，真实的感受来自异性伴侣的多重性刺激。通过“双人性快感集中训练法”，使自身适应耐受来自伴侣的视觉刺激、听觉刺激、嗅觉刺激、触觉摩擦刺激；通过“实战操作延时攻略”来实现在实战中的最终延时。

该训练阶段，需要伴侣配合参与，但仍然是以自身的性兴奋度控制为主，不要有为了泄欲而射精的心态。也不要总想着怎样去取悦对方或满足对方，全程应该是无压力的，身心放松的。

所以训练前就需要你与伴侣充分沟通，让她了解训练原理，理解并支持你的训练行为，毕竟是为了共同的性福，和她约定在训练中她需要配合你的地方。该训练周期为 2 周，2 周后才进行实战插入式射精。

12.1 双人性快感集中训练法

“性快感集中训练”是由美国性治疗师玛斯特斯和约翰逊于 20 世纪 70 年代创立，是现代性治疗领域的重大突破。本章方法正是在此训练的基础上优化并改进。

训练时要求伴侣双方保持裸体，男方不要把女方的裸体看成性爱开始的信号，而是要把这当成性爱开始前的热身，要把兴奋度控制下来。

第 1 周：身体探索

本阶段每次训练 40 分钟，前 20 分钟女方躺在床上保持不动，由男方主动爱抚女方身体，先爱抚正面，然后女方翻身趴在床上或者翘起臀部，男方再爱抚背面；后 20 分钟男方躺下保持不动，由女方主动爱抚男方身体，先爱抚正面，然后男方翻身趴在床上或者翘起臀部，女方再爱抚背面。

爱抚对方时，可以用指尖、指腹、指背、手掌肚交替变换，轻轻抚触摩擦对方，也可以用嘴进行唇舌漫游，从脖子、肩部、手臂、胸部、

腰部、腹部、腹股沟、大腿内外侧、私处/丁丁、小腿，到背部、脊椎、腰两侧、臀部……

这些都是身体敏感带，可以依次进行，也可以打乱顺序，随性的爱抚某个部位，只是不要在某个部位停留得太久，要游走起来。尤其是在爱抚私处/丁丁时，不要刻意去刺激，而是应把它当成其他身体部位一样，正常爱抚即可。

当男方主动爱抚女方时，不用去取悦或满足女方，所以不要有任何心理压力，要完全放松，注意力集中在爱抚的部位。如果女方感觉有快感，要发出喘息声，男方静静的感受来自女方的视觉刺激、听觉刺激、嗅觉刺激。如果感觉过于兴奋，要通过呼吸控制法来降低兴奋度等级。

当男方被女方爱抚时，要闭上眼睛，注意力集中在被爱抚的部位，静静的感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就轻拍女方，示意她停一下，然后自己通过呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，再让女方继续，如此反复控制。

本阶段训练隔天进行一次，毕竟性系统也需要休息恢复。每训练 2-3 次要通过“仿真模拟训练·阶段 5”（第 11 章内容）的方式主动射精一次，如果训练期间有夜间遗精，就不用主动射精了。定期射精是为了合理释放累积的基础性能量，以维持训练状态的稳定，维持性系统的健康。

注意本阶段暂时不能通过做爱射精，因为训练阶段还没完成，自身还没有完全适应真实伴侣的触觉摩擦刺激，若此时就插入式做爱，可能会因为兴奋度上升过快而出现射精失控的情况。

在不射精的训练日，训练结束后，因为性系统还处于充血状态，为了保持性系统健康，必须要加快血液循环，缓解充血。所以训练结束后，一定要进行深蹲运动和原地高抬腿运动各两组，以缓解性系统的充血。

第 2 周：伴侣套动

“探索身体”阶段完成后，自身对来自女方的多重性刺激已经有了良好的适应耐受能力。第 2 周的训练，在“身体探索”爱抚的基础上，再加入“伴侣套动”的触觉摩擦刺激。

本阶段训练也是每次 40 分钟，前 20 分钟女方躺在床上保持不动，由男方主动爱抚女方身体，先爱抚正面，然后女方翻身趴在床上或者翘起臀部，男方再爱抚背面。当男方爱抚女方时，爱抚方法和相关要求与“身体探索”阶段相同。

后 20 分钟男方躺下保持不动，由女方主动爱抚男方身体，几分钟后，女方再采用丁丁耐受力训练（第 10 章内容）“整体套动法·阶段 1”的方式，对丁丁进行大小幅套动。

套动时，保持轻微的握力不变，有意对冠状沟、包皮系带、龟头上表面，整体进行触觉摩擦刺激。套动速度要慢，一下一上为 1 次，频率为 1-2 次/秒。小幅度套动 10 分钟后，再进行从龟头到丁丁根部的套动。注意只是套动幅度加大，但握力和速度频率仍维持不变，大幅度套动也是训练 10 分钟。

训练过程男方要闭上眼睛，专注的慢慢感受快感的增加，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级，或者有射精紧迫感之前的感觉时，就轻拍女方，示意她停一下，然后自己通过呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。

当感觉兴奋度等级被降低到 7-8 级或者更低时，并且丁丁也没有疲软时，再让女方继续，如此反复控制，套动只训练 20 分钟。

本阶段训练隔天进行一次，每训练 2-3 次要在训练结束时射精一次，如果前两天有夜间遗精，就不用主动射精了。定期射精是为了合理释放累积的基础性能量，以维持训练状态的稳定，维持性系统的健康。

注意本阶段暂时不能通过做爱射精，因为训练阶段还没完成，自身还没有完全适应真实伴侣的触觉摩擦刺激，若此时就插入式做爱，可能会因为兴奋度上升过快而出现射精失控的情况。

在不射精的训练日，训练结束后，因为性系统还处于充血状态，为了保持性系统健康，必须要加快血液循环，缓解充血。所以训练结束后，一定要进行深蹲运动和原地高抬腿运动各两组，以缓解性系统的充血。

12.2 实战操作延时攻略

“双人性快感集中训练法”结束后，男方已经基本适应了来自女伴的

视觉刺激、听觉刺激、嗅觉刺激、触觉摩擦刺激，也能熟练的在这种多重性刺激下进行兴奋度控制，延长操作时间。这时休息 1-2 天后，即可进行实战操作。

但很多人在实战操作时往往不懂策略，不懂技巧，把活塞运动看做性爱的全部，把大力猛怼看做高手的表现，这都是很肤浅的。

如果只会一味的活塞运动，一味的大力猛怼，不仅女方的感觉体验不好，而且男方也会因为这种错误的操作方法而导致兴奋度迅速上升，最终快速射精。所以，掌握在实战中的延时攻略，是很有必要的。

1) 做足前戏

我们最先就讲到，是否早泄的标准是看伴侣双方的满意度。如果女方高潮了，满意了，她对你时间上的要求会大大降低。怎样才能让女方更快高潮，更加满意？那就要做足前戏。

因为只有前戏做足了，女方的身体才会被唤起，性兴奋也才增长得更快，才更容易高潮。我们曾经访谈过一位性工作者，她说这些年最有快感的经历，是一个 60 多岁的老男人给她的。那个老男人很会前戏，在真正进入她身体的瞬间，她几乎就高潮了……

所以前戏尤为重要，合适的前戏时间为 20-30 分钟。亲密的交流是前戏，一起做喜欢做的事是前戏，当她最需要你的时候你能及时出现，温柔的爱抚，深情的拥吻，每一个一丝不苟的动作，这些都是前戏。

前戏也不只是温柔的爱抚，还包括唇舌漫游，指法按摩，口爱指交……各种花式玩法，因为规定限制，不方便在这里展开讲解。总之一点，大家要做足前戏。

2) 辅助用品

正戏开始前，可以使用植物提取类延时喷剂（化学麻醉类延时喷剂副作用大），可以佩戴震动环同时给女方带来 Y 蒂刺激，可以戴上物理加厚延时套，这些都能为延时和增加满意度提供辅助作用。但大家不要同时戴两个套，因为避孕套胶体间的互相摩擦，容易导致套套脱落或破裂。

3) 预热适应

当丁丁刚进入 Y 道后，不要急于抽动，而是应该先稳住不动，让丁丁

适应 Y 道的预热感和包裹快感，调整呼吸，放松身体，避免身体紧绷而激动易射。

虽然丁丁不抽动，但前戏的爱抚亲吻等动作要继续，这样女方接收到的性刺激也不会减少，随着丁丁的进入，她的兴奋度也会逐渐上升。这同时也让 Y 道逐渐适应丁丁的感觉，为后面兴奋度更快的上升做好准备。

4) 节奏控制

当感觉丁丁适应后，开始抽动时要注意节奏控制。力度大小、速度快慢、幅度深浅，都有讲究。因为如果一开始就大力快速深入，不仅自身的兴奋度等级迅速上升，容易导致失控射精，还会让女方的感觉体验糟糕。

因为你的兴奋度虽然上升得快，但女方的兴奋度上升缓慢，爱液分泌不充分，会因摩擦刺激而疼痛。所以你开始抽动的速度一定要慢，力度要轻，幅度要浅，这样你才能感受到兴奋度等级的慢慢增加，才能在合适的时候进行兴奋度控制。

当慢速抽动一会儿后，双方都适应了这种兴奋快感，此时再增加速度、力度、幅度。在这个过程中，速度、力度、幅度也并非保持不变，速度要时快时慢，力度要时大时小，幅度要时深时浅。不可捉摸，才能让对方感觉情趣，也才更利于兴奋度控制和时间的延长。

5) 姿势选择

体位姿势选择时，尽量不要采用或者少用刺激度过大的姿势，比如传教式、后入式。建议采用刺激度较小的拱桥式、女上位（女上位前后扭动的方式，刺激度更小）。体位姿势的变换在 2-3 个即可，因为女方的快感是慢慢积累的，如果姿势变化过于频繁，快感积累被打断，女方是很不爽的。

6) 兴奋度控制

在抽动中，节奏是变化的，注意力一定要集中在兴奋度的变化上。当快节奏时，兴奋度等级上升较快，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级时，就降低节奏，并采用呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。

此时虽然速度、力度、幅度都降低了，但手上动作不要停，要加上对伴侣的爱抚或亲吻，避免对方的兴奋快感降低。当感觉自己的兴奋度

适应 Y 道的预热感和包裹快感，调整呼吸，放松身体，避免身体紧绷而激动易射。

虽然丁丁不抽动，但前戏的爱抚亲吻等动作要继续，这样女方接收到的性刺激也不会减少，随着丁丁的进入，她的兴奋度也会逐渐上升。这同时也让 Y 道逐渐适应丁丁的感觉，为后面兴奋度更快的上升做好准备。

4) 节奏控制

当感觉丁丁适应后，开始抽动时要注意节奏控制。力度大小、速度快慢、幅度深浅，都有讲究。因为如果一开始就大力快速深入，不仅自身的兴奋度等级迅速上升，容易导致失控射精，还会让女方的感觉体验糟糕。

因为你的兴奋度虽然上升得快，但女方的兴奋度上升缓慢，爱液分泌不充分，会因摩擦干涩而疼痛。所以你开始抽动的速度一定要慢，力度要轻，幅度要浅，这样你才能感受到兴奋度等级的慢慢增加，才能在合适的时候进行兴奋度控制。

当慢速抽动一会儿后，双方都适应了这种兴奋快感，此时再增加速度、力度、幅度。在这个过程中，速度、力度、幅度也并非保持不变，速度要时快时慢，力度要时大时小，幅度要时深时浅。不可捉摸，才能让对方感觉情趣，也才更利于兴奋度控制和时间的延长。

5) 姿势选择

体位姿势选择时，尽量不要采用或者少用刺激度过大的姿势，比如传教式、后入式。建议采用刺激度较小的拱桥式、女上位（女上位前后扭动的方式，刺激度更小）。体位姿势的变换在 2-3 个即可，因为女方的快感是慢慢积累的，如果姿势变化过于频繁，快感积累被打断，女方是很不爽的。

6) 兴奋度控制

在抽动中，节奏是变化的，注意力一定要集中在兴奋度的变化上。当快节奏时，兴奋度等级上升较快，当感觉兴奋度等级达到 8-9 级时，就降低节奏，并采用呼吸控制法或 PC 肌控制法来降低兴奋度等级。

此时虽然速度、力度、幅度都降低了，但手上动作不要停，要加上对伴侣的爱抚或亲吻，避免对方的兴奋快感降低。当感觉自己的兴奋度

13 持久延时训练计划安排表

考虑到训练内容的先后性及多样性，我们把训练计划分为五个阶段。其中，单身人士可以只做前四个阶段，如果在常规训练时间内能达标，则整体训练时间约为两个半月；有伴侣的人士五个阶段都要完成，整体训练时间约为三个月。如果在常规训练时间内不能达标，则要相应增加训练时间。

注意：本章训练计划是以大多数人的工作日时间为基准安排的，仅供参考。周末或节假日训练安排请自主调整。若晚上时间不够的，可以把训练安排在其他时间；若要在早晨慢跑，前提是不能缩短睡眠时间，当天不能感觉困倦。

13.1 第一阶段训练计划

第一阶段训练以禁欲，增强身体素质，身心放松训练为主，目的是为后期训练打基础。持续时间约为 2 周，本阶段内不能看片、不能手淫、不能做爱，杜绝一切性刺激的因素。

第一阶段训练计划（持续约 2 周）		
时间安排	训练内容安排	备注
早晨	早晨醒来，躺床上收肛运动 30 次。 下床后，做深蹲运动 30 个。	每天进行
白天	不要久坐，每坐 1 小时就站起来做收肛运动 30 次。 临近午饭前，临近晚饭前，各做深蹲运动 30 个。	每天进行
晚上	晚饭 1 小时后，慢跑 30 分钟；若体力不支跑不动，就快速步行 30 分钟，待后期体力增强了再慢跑。	每周至少 4 次
	睡前做身心放松训练（第 6 章内容，配合音频训练）。	每天进行
注意事项： 1. 本阶段内不能看片、不能手淫、不能做爱； 2. 每天保证 8 小时充足睡眠，睡眠不足会影响延时； 3. 少抽烟少喝酒，尽量戒掉； 4. 合理饮食，每天至少吃 12 种以上食物。		

13.2 第二阶段训练计划

第二阶段训练以单人性快感集中训练和丁丁按摩训练为主。目的是通过最低程度的性刺激，来训练对兴奋度等级的准确感知和控制；通过丁丁按摩来疏通阴部经络，改善血液循环。

持续时间约为 2 周，快感集中训练和丁丁按摩训练隔天交替进行，比如：今天做快感集中训练，明天就做丁丁按摩训练，后天又做快感集中训练，如此交替……

本阶段内适当禁欲，不能看片，不能手淫，不能做爱。每训练 2-3 天后，若有强烈冲动，可以在当天训练结束时射精一次；如果前两天有夜间遗精，或者没有强烈冲动，就不要主动射精。

第二阶段训练计划（持续约 2 周）		
时间安排	训练内容安排	备注
早晨	早晨醒来，躺床上收肛运动 30 次。 下床后，做深蹲运动 30 个。	每天进行
白天	不要久坐，每坐 1 小时就站起来做收肛运动 30 次。 临近午饭前，临近晚饭前，各做深蹲运动 30 个。	每天进行
晚上	晚饭 1 小时后，慢跑 30 分钟；若体力不支跑不动，就快速步行 30 分钟，待后期体力增强了再慢跑。	每周 3-4 次
	身心放松训练（第 8 章内容，配合音频训练）。	每天进行
	单人性快感集中训练（第 9 章内容，有视频演示）。	交替隔天 1 次
	丁丁按摩训练（第 7 章内容，有视频演示）。	交替隔天 1 次
注意事项： 1. 本阶段内适当禁欲，不能看片，不能手淫，不能做爱。每训练 2-3 天后，若有强烈冲动，可在当天训练结束时射精一次；若前两天有夜间遗精，或者没有强烈冲动，就不要射精； 2. 每天保证 8 小时充足睡眠，睡眠不足会影响延时； 3. 少抽烟少喝酒，尽量戒掉； 4. 合理饮食，每天至少吃 12 种以上食物； 5. 更多注意事项详见 7.2 节和 9.3 节。		

13.3 第三阶段训练计划

第三阶段训练以降低心理和生理敏感度，提升耐受度为主。目的是通过逐渐增加性刺激强度的兴奋控制力训练来降低心理敏感度，提升心理耐受度；通过逐渐增加性刺激强度的丁丁耐受力训练来降低丁丁敏感度，提升丁丁耐受度。

持续时间约为 4 周，兴奋控制力训练和丁丁耐受力训练隔天交替进行，比如：今天做兴奋控制力训练，明天就做丁丁耐受力训练，后天又做兴奋控制力训练，如此交替……通常兴奋控制力训练 2 周就能达标，达标后即可停止，然后只做隔天一次的丁丁耐受力训练。

本阶段内不能做爱，每训练 2-3 天后，若有强烈冲动，可以在当天训练结束时射精一次；如果前两天有夜间遗精，或者没有强烈冲动，就不要主动射精。

第三阶段训练计划（持续约 4 周）		
时间安排	训练内容安排	备注
早晨	早晨醒来，躺床上收肛运动 30 次。 下床后，做深蹲运动 30 个。	每天进行
白天	不要久坐，每坐 1 小时就站起来做收肛运动 30 次。 临近午饭前，临近晚饭前，各做深蹲运动 30 个。	每天进行
晚上	晚饭 1 小时后，慢跑 30 分钟；若体力不支跑不动，就快速步行 30 分钟，待后期体力增强了再慢跑。	每周 3-4 次
	兴奋控制力训练（第 10.1 节内容，先做视觉降敏和听觉降敏，一周后再做视听综合降敏）。	交替隔天 1 次
	丁丁耐受力训练（第 10.2 节内容，先做旋转摩擦法，一周后再做整体套动法）。	交替隔天 1 次
注意事项： 1. 本阶段内不能做爱，每训练 2-3 天后，若有强烈冲动，可在当天训练结束时射精一次；如果前两天有夜间遗精，或者没有强烈冲动，就不要射精； 2. 每天保证 8 小时充足睡眠，睡眠不足会影响延时； 3. 少抽烟少喝酒，尽量戒掉； 4. 合理饮食，每天至少吃 12 种以上食物； 5. 更多注意事项详见 10.3 节。		

13.4 第四阶段训练计划

第四阶段以仿真模拟训练为主，目的是通过使用训练器，逐渐增加性刺激强度，进一步降低敏感度，使丁丁适应耐受类似实战时的视觉刺激、听觉刺激、Y道包裹摩擦刺激，在这种多重刺激下进行兴奋度感知和控制，从而实现延时。

持续时间约为4周，隔天训练一次，每5天为一个阶段，共有5个阶段。本阶段内不能做爱，每训练2-3次后，若有强烈冲动，可以在当天训练结束时射精一次；如果前两天有夜间遗精，或者没有强烈冲动，就不要主动射精。

第四阶段训练计划（持续约4周）		
时间安排	训练内容安排	备注
早晨	早晨醒来，躺床上收肛运动30次。 下床后，做深蹲运动30个。	每天进行
白天	不要久坐，每坐1小时就站起来做收肛运动30次。 临近午饭前，临近晚饭前，各做深蹲运动30个。	每天进行
晚上	晚饭1小时后，慢跑30分钟；若体力不支跑不动，就快速步行30分钟，待后期体力增强了再慢跑。	每周3-4次
	仿真模拟训练（第11章内容，每5天为一个阶段，共5个阶段）。	隔天训练1次
注意事项： 1. 本阶段内不能做爱，每训练2-3天后，若有强烈冲动，可在当天训练结束时射精一次；如果前两天有夜间遗精，或者没有强烈冲动，就不要射精； 2. 每天保证8小时充足睡眠，睡眠不足会影响延时； 3. 少抽烟少喝酒，尽量戒掉； 4. 合理饮食，每天至少吃12种以上食物； 5. 更多注意事项详见11.2节。		

13.5 第五阶段训练计划

第五阶段以双人训练为主，有伴侣的人士需要完成。目的是通过“双人性快感集中训练法”，使自身适应耐受来自伴侣的视觉刺激、听觉刺激、嗅觉刺激、触觉摩擦刺激；通过“实战操作延时攻略”来实现在实战中的最终延时。

持续时间约为2周，隔天训练一次，前2周都不能做爱，训练最终完成后，休息1-2天，才可进行实战。

第五阶段训练计划（持续约2周）		
时间安排	训练内容安排	备注
早晨	早晨醒来，躺床上收肛运动30次。 下床后，做深蹲运动30个。	每天进行
白天	不要久坐，每坐1小时就站起来做收肛运动30次。 临近午饭前，临近晚饭前，各做深蹲运动30个。	每天进行
晚上	晚饭1小时后，慢跑30分钟；若体力不支跑不动，就快速步行30分钟，待后期体力增强了再慢跑。	每周3-4次
	身心放松训练（第8章内容，配合音频训练）。	每天进行
	双人性快感集中训练（第12章内容）。	隔天训练1次
注意事项： 1. 前2周都不能做爱，训练最终完成后，休息1-2天，才可进行实战； 2. 每天保证8小时充足睡眠，睡眠不足会影响延时； 3. 少抽烟少喝酒，尽量戒掉； 4. 合理饮食，每天至少吃12种以上食物； 5. 更多注意事项详见12.1节。		

结 语


以上就是《持久延时训练手册》的所有内容。训练注定是要花费心力的事，对个人自控力有着更高的要求。

要始终坚定目标，要时常忍受诱惑，要做短期之内没什么快乐，但长期以后有巨大回报的事。这是一个男人成熟的表现，也是人类个体在进化过程中的优秀行为能力。

如果只是为了一时之快，而不能学会等待与付出，那么你期待的美好，就永远不会到来；如果愿意为了目标而坚持与忍耐，你终会成为自己想要的样子。

愿大家早日实现训练目标，和所爱之人完成完美的性福体验！

阿阳微信:tushu959 微信:kc58567 微信:CF69567



扫一扫 查看全网最新课程动态

长按识别二维码 进入小程序课程网址，左上角有搜索关键词、导师或课程名字，快速查找您需要的课程，收藏网址关注课程最新动态。(课程都有、最新最全)加入VIP会员/全部免费