

NOTAS DE ANÁLISIS NUMÉRICO

ISRAEL GARCÍA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

1. PRELIMINARES

1.1. Distintos tipos de bases. Considera el número $x = 123456$. Aunque es claro que significa x , formalmente debemos entender que

$$x = 1 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 6,$$

pues de esta forma, los resultados previos de matemáticas como sucesiones y series se pueden utilizar para analizar las propiedades de los números. Sin embargo, en análisis numérico no es conveniente utilizar potencias de 10 para representar los números, pues la computadora utiliza cables y electricidad para funcionar, de modo que es fácil representar 0 y 1 como la presencia/ausencia de electricidad.

Teorema 1. *Para todo número x existe una sucesión*

$$a_0, a_1, a_n \dots$$

tal que

$$x = \sum_{i=-\infty}^n a_i \cdot b^i,$$

donde

$$b > 1$$

es un número natural, llamado la base.

La sucesión

$$a_0, a_1, \dots$$

del teorema anterior suele expresarse así:

$$x = (a_n, \dots, a_1, a_0, \dots)_b$$

En particular si $b = 2$, la base se llama binaria. y si la base es decimal, entonces por definición

$$123456 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)_{10}$$

Ejercicio 1. *Investiga o demuestra que si en algún momento la sucesión*

$$\{a_k\}$$

se convierte en una sucesión periódica, el número x es racional. El recíproco también es cierto, pero es más difícil de probar.

1.2. Numeros binarios. En general, la computadora guarda todos los datos en *binario*, de modo que existen varios estandares para representar los diferentes tipos de datos: *caracteres, enteros, flotantes, etc.*, cada uno tiene un tamaño predefinido. Por otro lado, representar números binarios, o pensar en el valor de un número en potencias de dos puede resultar laborioso, pues por ejemplo, el número 95578, tiene la representación binaria 10111010101011010, mucho más larga que en decimal, de modo que es más conveniente utilizar alguna otra base para expresar el número de manera humanamente entendible. Por razones históricas, se acostumbra representar los datos de la computadora en *formato hexadecimal*.

Definición 1. La notación $0b\,a_1 \dots a_n$ representa un número en formato binario, y la notación $0x\,a_1 \dots a_k$ lo representa en hexadecimal, donde para el caso binario los dígitos $a_i \in \{0, 1\}$, pero para evitar confusión, en el caso hexadecimal los dígitos $a_i \in \{0, \dots, 9, a, b, c, d, e, f\}$.

Así, en nuestro ejemplo

$$95578 = 0b\,10111010101011010 = 0x\,1755a,$$

o en *python*:

```
1  >> x = 95578
2  >> bin(x)
3  10111010101011010
4  >> hex(x)
5  1755a
```

1.3. Numeros de punto flotante.

Definición 2. Un número x se expresa en notación científica si puede escribirse de la forma

$$x = \pm r \times 10^n,$$

donde $1/10 \leq r < 1$. El número r se llama la mantissa normalizada

Esta definición se extiende de manera natural a cualquier otra base para representar al número, en particular, en binario

$$x = \pm r \times 2^n,$$

donde $1/2 \leq r < 1$. Como la computadora tiene una capacidad de almacenamiento finito, en realidad, solo una pequeña parte de los números reales puede representarse dentro de la computadora con números de punto flotante.

Ejercicio 2. ■ Cuántos números de punto flotante pueden expresarse con una mantissa de tres bits y un exponente de tres bits:

$$x = \pm(0.b_1b_2b_3) \times 2^{\pm k},$$

($k, b_i \in \{0, 1\}$).

■ Con hipótesis similares, cuántos números pueden escribirse en base tres?. Este ejercicio podría ser más fácil de resolver con un programa.