

**ToneBalance**

# Методичка упражнений

Полный сборник логопедических и голосовых упражнений

76 упражнений · 10 разделов · Парезы · Дисфагия · Дыхание · SOVT · Узелки

**76**

упражнений

**10**

разделов

**~6**

мин/упр.

*Разработано на основе приложения ToneBalance*

# Содержание

## Введение

3 упражнений

- Добро пожаловать в ToneBalance 5 мин
- Техника безопасности 5 мин
- Как построить занятие 5 мин

## Дыхательная гимнастика

10 упражнений

- Дутьё в губную гармошку 5 мин
- Диафрагмальное дыхание (базовое) 8 мин
- Комплекс дыхательных упражнений (8 вариантов) 10 мин
- Дыхание с разведением рук 5 мин
- Наклоны туловища с дыханием 5 мин
- Произнесение звуков [ш] и [с] на выдохе 6 мин
- Рёберно-брюшное дыхание с аутотренингом 7 мин
- Упражнение «Свеча» 5 мин
- Счёт на выдохе 6 мин
- Дыхание «Велосипед» 5 мин

## Постановка голоса и речи

14 упражнений

- Гимнастика для губ 5 мин
- Гимнастика для языка 7 мин
- Раскрепощение челюсти 5 мин
- Диафрагмальное дыхание 10 мин
- Опора дыхания 8 мин
- Грудной резонатор 7 мин
- Головной резонатор 7 мин
- Чёткие гласные 8 мин
- Чёткие согласные 10 мин
- Скороговорки 10 мин
- Основы интонации 10 мин
- Эмоциональная речь 8 мин
- Выразительное чтение 15 мин
- Публичная речь 12 мин

## Парезы гортани

15 упражнений

- Отклонение головы назад с сопротивлением 5 мин
- Наклоны головы вперёд с сопротивлением 5 мин
- Наклоны головы в стороны с сопротивлением 5 мин

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| • Движения нижней челюстью                       | 4 мин |
| • Надувание щёк                                  | 4 мин |
| • Доставание кончиком языка мягкого нёба         | 5 мин |
| • Поднимание мягкого нёба при зевке              | 4 мин |
| • Произнесение слогов с вибрантом [p]            | 6 мин |
| • Произнесение фонемы [м] (мычание)              | 7 мин |
| • Сочетания [м] + гласные                        | 6 мин |
| • Звонкие согласные с гласными                   | 6 мин |
| • Пары слогов на одном выдохе                    | 6 мин |
| • Длительное произнесение гласных и их сочетаний | 8 мин |
| • Семь слогов с перемещающимися ударениями       | 6 мин |
| • Тренировка сочетаний гласных с [й]             | 6 мин |

## Дисфагия

6 упражнений

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| • Упражнение Шейкера                             | 10 мин |
| • Манёвр Мендельсона                             | 8 мин  |
| • Упражнения для языка                           | 8 мин  |
| • Форсированная фонация (упражнение на смыкание) | 6 мин  |
| • Глотание с поворотом головы                    | 5 мин  |
| • Надгортанное глотание                          | 5 мин  |

## Мутации голоса

3 упражнения

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| • Понимание мутации голоса | 5 мин |
| • Поиск грудного регистра  | 7 мин |
| • Покашливание с голосом   | 5 мин |

## Профессионалы голоса

4 упражнения

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| • Правило 20-20-20 для голоса | 3 мин |
| • Разминка перед работой      | 8 мин |
| • Заминка после работы        | 8 мин |
| • Резонансная техника речи    | 8 мин |

## Гипотонусные дисфонии

5 упражнений

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| • Твёрдая атака звука                         | 6 мин |
| • Push-pull упражнения (с физическим усилием) | 6 мин |
| • Звонкие взрывные согласные                  | 5 мин |
| • Глоттальные атаки                           | 4 мин |
| • Крещендо на гласных                         | 6 мин |

## Гипертонусные дисфонии

10 упражнений

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| • Lip trills (вибрация губ) | 6 мин |
|-----------------------------|-------|

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| • Tongue trills (вибрация языка)           | 6 мин |
| • Straw phonation (фонация через трубочку) | 8 мин |
| • Мычание с закрытым ртом (Humming)        | 7 мин |
| • Жевательные упражнения с фонацией        | 6 мин |
| • Зевок с фонацией                         | 5 мин |
| • Мягкая атака на придыхательных звуках    | 6 мин |
| • Упражнение «Стон»                        | 5 мин |
| • Резонансная терапия                      | 7 мин |
| • Самомассаж гортани                       | 5 мин |

### Узелки голосовых складок

6 упражнений

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| • Straw phonation (основное упражнение!)      | 8 мин |
| • Голосовая гигиена (обязательный компонент!) | 5 мин |
| • Резонансная терапия (мычание в маску)       | 8 мин |
| • Снижение громкости речи                     | 5 мин |
| • Мягкая атака (придыхательное начало)        | 6 мин |
| • Оптимальная высота голоса                   | 5 мин |

# Введение

3 упражнений

## Упражнения раздела:

- Добро пожаловать в ToneBalance
- Техника безопасности
- Как построить занятие

## 1

## Добро пожаловать в ToneBalance

5 мин

## цель

Знакомство с приложением и основными принципами голосовой реабилитации.

## исходное положение

Найдите удобное место, где вас не будут отвлекать.

## выполнение

- 1 ToneBalance — это приложение для восстановления и укрепления голоса
- 2 Все упражнения основаны на методиках современной фонопедии
- 3 Регулярность важнее длительности: лучше 5 минут 6 раз в день, чем 30 минут один раз
- 4 Начните с дыхательной гимнастики — это фундамент для всех нозологий
- 5 Слушайте своё тело: при дискомфорте прекратите упражнение

## ДОЗИРОВКА

Ознакомительное занятие.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Дыхательная гимнастика — обязательный первый этап
- SOVT-упражнения (фонация через трубочку) — универсальный безопасный метод
- При гипотонусе — активация и твёрдая атака
- При гипертонусе — расслабление и мягкая атака
- При узелках — НИКАКОГО форсирования!

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Пропуск дыхательной гимнастики
- Форсирование звука
- Нерегулярные занятия
- Игнорирование дискомфорта

## 2

## Техника безопасности

5 мин

## цель

Изучение правил безопасного выполнения упражнений.

## исходное положение

Внимательно прочитайте и запомните.

## выполнение

- 1 При боли в горле или дискомфорте — немедленно прекратите упражнение

- 2 При головокружении — сократите время дыхательных упражнений
- 3 Не выполняйте упражнения при ОРВИ, ларингите, фарингите
- 4 После операций на гортани — начинайте только с разрешения врача
- 5 Пейте воду до и после занятий — гидратация важна для голосовых складок

#### ДОЗИРОВКА

**Запомните и соблюдайте всегда.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Охриплость более 2 недель
- Боль при глотании
- Ощущение комка в горле
- Затруднённое дыхание
- Кровь в мокроте

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Занятия через боль
- Упражнения при острых заболеваниях
- Самолечение без консультации врача
- Игнорирование противопоказаний

*Острые воспалительные заболевания гортани и глотки.*

3

## Как построить занятие

5 мин

#### ЦЕЛЬ

*Научиться правильно организовывать занятия.*

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Подготовьте место для занятий.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Начните с 2-3 минут дыхательных упражнений — это разминка
- 2 Переходите к основным упражнениям по вашей нозологии
- 3 Заканчивайте SOVT-упражнением (фонация через трубочку) — это безопасное завершение
- 4 Общая длительность одного занятия: 10-15 минут
- 5 Выполняйте 2-4 занятия в день с перерывами

#### ДОЗИРОВКА

**Следуйте этой структуре в каждом занятии.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Разминка: дыхание (2-3 мин)
- Основная часть: упражнения по нозологии (5-10 мин)
- Завершение: SOVT или резонанс (2-3 мин)
- Лучшее время: утром и вечером
- Вода под рукой — обязательно

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Пропуск разминки
- Слишком длинные занятия (лучше чаще, но короче)
- Занятия только раз в день
- Отсутствие воды

# Дыхательная гимнастика

10 упражнений

#### Упражнения раздела:

- Дутьё в губную гармошку
- Диафрагмальное дыхание (базовое)
- Комплекс дыхательных упражнений (8 вариантов)
- Дыхание с разведением рук
- Наклоны туловища с дыханием
- Произнесение звуков [ш] и [с] на выдохе
- Рёберно-брюшное дыхание с аутотренингом
- Упражнение «Свеча»
- Счёт на выдохе
- Дыхание «Велосипед»



## 1

## Дутьё в губную гармошку

5 мин

## цель

Удлинение выдоха, стимуляция всех мышц гортани (внутренних и наружных) под действием воздушной струи, увеличение подвижности здоровой половины гортани и активация парализованной стороны.

## исходное положение

Сесть на стул, прислониться к спинке, корпус выпрямить, ноги согнуть, ступни прижать к полу. Плечи опущены и расслаблены.

## выполнение

- 1 Возьмите губную гармошку, поднесите к губам
- 2 Начните дуть медленно и протяжно, вдувая воздух в гармошку
- 3 Затем так же медленно выдувайте воздух, извлекая звук
- 4 Старайтесь держать одну ноту (одно отверстие гармошки) — не перемещайтесь по инструменту
- 5 Дышите ровно: вдох через гармошку — пауза — выдох через гармошку
- 6 Продолжайте дышать через гармошку в течение 30 секунд

## ДОЗИРОВКА

1-я неделя: по 30 секунд, 8-10 раз в день (можно доводить до 15 раз). 2-я н...

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- При головокружении сократите время до комфортного
- Плечи должны оставаться опущенными и расслабленными
- Дыхание должно быть диафрагмальным — живот расширяется на вдохе
- Упражнение можно выполнять в любое время дня, в любом месте
- Если нет гармошки — можно использовать детскую дудочку или свисток

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Поднимание плеч при вдохе
- Слишком быстрое, резкое дутьё
- Напряжение мышц шеи и лица
- Перемещение по отверстиям гармошки вместо удержания одной ноты

При сильном головокружении — сократить время или временно прекратить.

## 2

## Диафрагмальное дыхание (базовое)

8 мин

#### цель

Формирование правильного диафрагмально-рёберного типа дыхания, который является основой фонации. Отключение верхнего (ключичного) типа дыхания.

#### исходное положение

Лечь на спину или сесть удобно. Одна рука лежит на животе, другая — на грудной клетке (рука на груди контролирует неподвижность грудной клетки, то есть работает только живот).

#### выполнение

- 1 Сделайте быстрый, неглубокий, короткий вдох через нос
- 2 Почувствуйте, как живот под рукой поднимается (надувается)
- 3 Грудная клетка при этом остаётся неподвижной!
- 4 Сделайте продолжительный выдох через рот, сложив губы «трубочкой» (как будто дуете сквозь узкую соломинку)
- 5 Живот при выдохе постепенно втягивается (сдувается)
- 6 Продолжайте дышать диафрагмально в течение 2 минут

#### дозировка

**2-3 минуты 3 раза в день. По возможности — больше.**

#### методические указания

- Выдох должен быть в 2-3 раза длиннее вдоха
- Плечи и грудь не должны подниматься!
- Живот должен подниматься на вдохе — это главный критерий правильности
- Начинайте в положении лёжа — так легче почувствовать диафрагму
- Постепенно переходите к выполнению сидя и стоя

#### типичные ошибки

- Поднимание груди и плеч на вдохе (верхнее дыхание)
- Втягивание живота на вдохе (обратное дыхание)
- Слишком глубокий, форсированный вдох
- Короткий, резкий выдох

*Нет абсолютных противопоказаний. При головокружении — сократить количество повторений.*

### 3

## Комплекс дыхательных упражнений (8 вариантов)

10 мин

#### цель

Развитие гибкости дыхательной системы, тренировка различных паттернов дыхания, подготовка к фонации.

#### исходное положение

Сидя на стуле прямо или стоя. Спина прямая, плечи опущены.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Вариант 1: Вдох и выдох через нос. Спокойно, ровно, без напряжения
- 2 Вариант 2: Вдох через нос, выдох через рот. Выдох мягкий, как на «хаааа»
- 3 Вариант 3: Вдох через рот, выдох через нос. Вдох бесшумный, через слегка приоткрытые губы
- 4 Вариант 4: Вдох и выдох через левую половину носа, затем через правую (попеременно). Закрывать одну ноздрю пальцем
- 5 Вариант 5: Вдох через одну половину носа, выдох через рот (попеременно левая и правая ноздря)
- 6 Вариант 6: Вдох через нос, удлинённый выдох через нос с усилением в конце. В конце выдоха — лёгкое «дожатие»
- 7 Вариант 7: Вдох через нос, выдох через сжатые губы. Губы в позиции «трубочка»
- 8 Вариант 8: Вдох через нос, выдох через нос «точками» — с кратковременными задержками дыхания

#### ДОЗИРОВКА

Каждый вариант выполнять по 4-5 раз. Весь комплекс — 1-2 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Выполнять через неделю после освоения базового диафрагмального дыхания
- Темп — медленный
- Выдох всегда длиннее вдоха
- Не напрягать мышцы шеи и лица
- Между вариантами можно делать паузу для обычного дыхания

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком быстрый темп
- Напряжение в плечах и шее
- Шумное, резкое дыхание
- Пропуск вариантов — важно выполнять все 8

*При заложенности носа — пропустить варианты с носовым дыханием до выздоровления.*

## 4 Дыхание с разведением рук

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Координация дыхания и движения, расширение грудной клетки, удлинение выдоха.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя на стуле, руки на коленях. Спина прямая.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Исходное положение: руки лежат на коленях ладонями вниз

- 2 На вдохе медленно разведите руки в стороны на уровне плеч
- 3 Задержите положение на 1-2 секунды
- 4 На выдохе медленно верните руки на колени
- 5 Выдох делайте через рот, удлинённый, мягкий
- 6 Движение рук синхронно с дыханием: руки в стороны = вдох, руки вниз = выдох

#### ДОЗИРОВКА

4-5 раз, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Темп — медленный
- Выдох через рот должен быть длиннее вдоха
- Руки разводить плавно, без рывков
- Можно добавить лёгкий наклон головы назад на вдохе

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком быстрые, резкие движения руками
- Короткий выдох
- Задержка дыхания между вдохом и выдохом
- Подъём плеч к ушам

*При болях в плечевых суставах — выполнять с меньшей амплитудой.*

5

## Наклоны туловища с дыханием

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Активация диафрагмы в движении, удлинение выдоха, растяжка мышц спины.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя на стуле, ноги на ширине плеч, стопы прижаты к полу.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Поднимите руки вверх — сделайте вдох через нос
- 2 Наклоните туловище вниз, стараясь достать пальцами рук пола
- 3 Во время наклона делайте удлинённый выдох
- 4 Задержитесь в нижней точке на 1-2 секунды
- 5 Выпрямитесь в исходное положение — вдох
- 6 Повторите цикл

#### ДОЗИРОВКА

3-4 раза, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Выдох — удлинённый, на всём протяжении наклона
- Не обязательно доставать до пола — наклоняйтесь насколько комфортно
- Движение плавное, без рывков
- Голова свободно свисает вниз при наклоне

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Задержка дыхания в нижней точке
- Резкий подъём (может вызвать головокружение)
- Короткий выдох

*При повышенном внутричерепном давлении, глаукоме — выполнять с осторожностью или исключить...*

## 6

### Произнесение звуков [ш] и [с] на выдохе

6 мин

#### цель

Удлинение выдоха, формирование ровной воздушной струи, подготовка к фонации.

#### исходное положение

Сидя на стуле. Спина прямая, плечи опущены.

#### выполнение

- 1 Сделайте быстрый вдох через нос
- 2 На выдохе произнесите длительно звук [ш] — как шипение змеи
- 3 Звук должен быть ровным, без колебаний громкости
- 4 Тяните звук как можно дольше, но без напряжения
- 5 Повторите 5-6 раз со звуком [ш]
- 6 Затем выполните то же самое со звуком [с] — как свист воздуха

#### дозировка

**По 5-6 раз каждый звук, 2-3 подхода в день.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Не напрягать мышцы шеи!
- Звук должен быть ровным — следите за этим
- Выдох — плавный, без толчков
- Можно засекают время: стремитесь к 15-20 секундам на одном выдохе
- Упражнение готовит к звонким звукам

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Напряжение мышц шеи и гортани
- Неровный, «дрожащий» звук
- Слишком короткий выдох
- Форсирование звука — попытка сделать его громче

## 7

## Рёберно-брюшное дыхание с аутотренингом

7 мин

## цель

Закрепление диафрагмального дыхания, расслабление, формирование осознанного контроля над дыханием.

## исходное положение

Сидя, облокотившись на спинку стула, ноги выпрямить, расслабиться. Одна рука на груди, другая на животе.

## выполнение

- 1 Примите удобное, расслабленное положение
- 2 Закройте глаза (по желанию)
- 3 Начните дышать животом: вдох — живот поднимается, выдох — живот опускается
- 4 На вдохе мысленно произносите: «Я на вдохе»
- 5 На выдохе мысленно произносите: «На выдохе ровно и плавно дышу»
- 6 Повторяйте эту фразу в такт дыханию в течение 1-2 минут
- 7 Выдох — длинный, через рот

## ДОЗИРОВКА

1-2 минуты, 2-3 раза в день. Идеально — перед сном и после пробуждения...

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Длинный выдох через рот
- Полное расслабление всего тела
- Можно использовать другие аутогенные фразы: «Я спокоен», «Моё дыхание свободно» и т.д.
- Упражнение помогает снять стресс и подготовить голосовой аппарат

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Напряжение в теле
- Слишком быстрое, поверхностное дыхание
- Отвлечение мыслей — возвращайте внимание к фразе и дыханию

## 8

## Упражнение «Свеча»

5 мин

## цель

Тренировка ровного, длительного выдоха, контроль воздушной струи.

## исходное положение

Сидя или стоя. Можно использовать реальную свечу или воображаемую.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Представьте (или поставьте перед собой) зажжённую свечу на расстоянии 20-30 см
- 2 Сделайте вдох через нос
- 3 На выдохе дуйте на пламя так, чтобы оно колебалось, но не гасло
- 4 Выдох должен быть ровным, без толчков — пламя лишь слегка отклоняется
- 5 Тяните выдох как можно дольше
- 6 Если пламя погасло — значит, выдох был слишком сильным. Начните сначала

#### ДОЗИРОВКА

**5-6 раз, 2-3 подхода в день.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Выдох максимально длинный и ровный
- Можно засекают время выдоха и стремиться к увеличению
- Если нет свечи — держите перед ртом тонкую полоску бумаги: она должна отклоняться, но не сильно трепетать
- Упражнение отлично развивает контроль над воздушной струёй

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Резкий, сильный выдох (свеча гаснет)
- Неровный выдох (пламя «скачет»)
- Слишком короткий выдох

*При использовании реальной свечи — соблюдать пожарную безопасность.*

9

## Счёт на выдохе

6 мин

#### ЦЕЛЬ

Удлинение фонационного выдоха, координация дыхания и речи, подготовка к фразовой речи.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя. Спина прямая, плечи расслаблены.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Сделайте вдох через нос (диафрагмальный, живот расширяется)
- 2 На выдохе начните считать вслух: один, два, три, четыре...
- 3 Считайте спокойно, не торопясь, с равномерными интервалами
- 4 Старайтесь досчитать до максимально возможного числа на одном выдохе
- 5 Записывайте свой результат — стремитесь к его увеличению

6

Начальная цель: 15. Хороший результат: 20-25. Отличный: 30+

#### ДОЗИРОВКА

3-5 раз, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Не форсировать! Не считать быстро, чтобы «добраться до большего числа»
- Постепенно увеличивать счёт день за днём
- Голос должен оставаться ровным до конца счёта
- Если голос слабеет к концу — не дотягивать, остановиться раньше

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком быстрый счёт
- Напряжение в голосе к концу выдоха
- Глубокий форсированный вдох перед счётом
- Попытка «выжать» последние числа на остатках воздуха

10

## Дыхание «Велосипед»

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Активация дыхания в движении, координация выдоха с физической нагрузкой.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя на стуле, оперевшись на спинку, ноги выпрямить вперёд, руками держаться за сиденье.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Примите исходное положение: сидя, ноги вытянуты
- 2 Сделайте вдох
- 3 На выдохе выполняйте движение ногами «велосипед» — как будто крутите педали
- 4 Выдох — длинный, через рот
- 5 Продолжайте «крутить педали» на протяжении всего выдоха
- 6 На вдохе — остановите движение ног, вернитесь в исходное положение
- 7 Повторите цикл

#### ДОЗИРОВКА

4-5 раз, 2 подхода в день.



#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Длинный выдох через рот
- Движение ног — плавное, не слишком быстрое
- Упражнение укрепляет мышцы пресса, что полезно для дыхания
- Можно выполнять лёжа на спине — так легче

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Задержка дыхания во время движения
- Слишком быстрые движения ног
- Короткий выдох

*При болях в пояснице — выполнять лёжа с согнутыми коленями или исключить.*

## Постановка голоса и речи

14 упражнений

#### Упражнения раздела:

- Гимнастика для губ
- Гимнастика для языка
- Раскрепощение челюсти
- Диафрагмальное дыхание
- Опора дыхания
- Грудной резонатор
- Головной резонатор
- Чёткие гласные
- Чёткие согласные
- Скороговорки
- Основы интонации
- Эмоциональная речь
- Выразительное чтение
- Публичная речь

## 1

## Гимнастика для губ

5 мин

## цель

Развитие подвижности и силы губных мышц для чёткого произношения гласных О, У и согласных Б, П, М, В, Ф

## исходное положение

Сядьте перед зеркалом. Спина прямая, плечи расслаблены. Лицо расслаблено, челюсть свободна.

## выполнение

- 1 Улыбка — Трубочка: широко улыбнитесь, затем вытяните губы трубочкой. Чередуйте 10 раз
- 2 Поцелуйчик: вытяните губы и сделайте воздушный поцелуй. 15 повторений
- 3 Надувание щёк: надуйте щёки и перекачивайте воздух из одной щеки в другую. 8 раз
- 4 Вибрация губ: расслабьте губы и выдохните со звуком «бррр». 5 повторений
- 5 Покусывание губ: осторожно покусывайте нижнюю губу верхними зубами, затем наоборот

## дозировка

Выполнять 2-3 раза в день по 5 минут. Особенно полезно утром для бодро...

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Работайте перед зеркалом для контроля
- Движения должны быть максимально амплитудными
- Челюсть остаётся расслабленной — работают только губы
- При усталости сделайте паузу и лёгкий массаж губ

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Недостаточная амплитуда — губы едва двигаются
- Напряжение челюсти — она должна быть свободной
- Слишком быстрый темп — делайте медленно и осознанно

## 2

## Гимнастика для языка

7 мин

## цель

Развитие гибкости и точности движений языка для чёткого произношения звуков Р, Л, Ш, Ж, Т, Д, Н

## исходное положение

Сядьте перед зеркалом. Рот приоткрыт, челюсть расслаблена и неподвижна.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Иголочка — Лопатка: сделайте язык узким, затем широким. По 5 секунд каждое положение, 6 раз
- 2 Часики: двигайте языком от одного уголка рта к другому. Челюсть неподвижна! 10 раз
- 3 Чистка зубов: проведите языком по внешней и внутренней стороне зубов. 4 круга
- 4 Лошадка: присосите язык к нёбу и резко оторвите — цок! Челюсть НЕ двигается. 15 раз
- 5 Грибок: присосите язык к нёбу и удерживайте. Рот открыт. Держите 10 секунд, 3 раза
- 6 Качели: поднимайте язык к верхним зубам, затем опускайте к нижним. 10 раз

#### ДОЗИРОВКА

Выполнять 2-3 раза в день по 7 минут. Не торопитесь — важна точность, а...

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Челюсть должна быть абсолютно неподвижной
- Если челюсть двигается — зафиксируйте её рукой
- Язык должен быть напряжённым, движения чёткими
- При болезненности уменьшите нагрузку

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Движение челюсти вместо языка — главная ошибка!
- Вялый, расслабленный язык — он должен быть активным
- Недостаточное открытие рта в упражнении «Лошадка»

### 3

## Раскрепощение челюсти

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Снятие зажимов и развитие свободы нижней челюсти для объёмного, красивого звучания голоса

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сядьте или встаньте прямо. Плечи опущены. Зубы разомкнуты, губы слегка сомкнуты.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Зевок: имитируйте глубокий зев, максимально опуская челюсть. 5 раз
- 2 Ленивая челюсть: положите руку под подбородок. Опускайте челюсть, преодолевая лёгкое сопротивление. 8 раз
- 3 Массаж жевательных мышц: круговыми движениями массируйте область между скулой и углом челюсти
- 4 Гласные на свободной челюсти: произносите А-О-У, широко открывая рот. 5 циклов

#### ДОЗИРОВКА

Выполнять 2 раза в день, особенно перед важными разговорами или выс...

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Челюсть должна опускаться расслабленно, под собственным весом
- Не форсируйте раскрытие рта — это создаст новое напряжение
- Проверяйте напряжение челюсти в течение дня
- Расслабляйте челюсть при стрессе — мы часто сжимаем её бессознательно

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Принудительное, резкое раскрытие рта
- Напряжение в шее и плечах при упражнениях
- Слишком быстрый темп выполнения

*При дисфункции ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) выполнять с осторожностью.*

4

## Диафрагмальное дыхание

10 мин

#### ЦЕЛЬ

Освоение правильного типа дыхания для речи — основы сильного и устойчивого голоса

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Лягте на спину или сядьте прямо. Одна рука на груди, другая на животе.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Осознание: дышите естественно и наблюдайте — какая рука двигается больше? Должна двигаться рука на животе
- 2 Вдох через нос — живот поднимается, грудь неподвижна. Выдох — живот опускается. 10 циклов
- 3 Положите руки на нижние рёбра. На вдохе рёбра расширяются в стороны. 10 циклов
- 4 Стоя: вдох — живот и рёбра расширяются, плечи НЕ поднимаются. 10 циклов
- 5 Выдох на счёт: вдохните и считайте вслух 1, 2, 3... Стремитесь к 15-20 на одном выдохе

#### ДОЗИРОВКА

10-15 минут ежедневно. Лучше несколько коротких сессий, чем одна дли...

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Плечи никогда не должны подниматься на вдохе!
- Выдох в 2-3 раза длиннее вдоха
- Дыхание спокойное, без напряжения
- Практикуйте в разных положениях: лёжа, сидя, стоя

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Подъём плеч на вдохе — верхнее дыхание
- Втягивание живота на вдохе (должно быть наоборот!)
- Задержка дыхания и напряжение

5

## Опора дыхания

8 мин

#### ЦЕЛЬ

Формирование устойчивой опоры для сильного, уверенного голоса

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки свободно вдоль тела.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Ощущение опоры: вдохните и задержите дыхание на 3-5 секунд. Почувствуйте напряжение в животе — это опора
- 2 Выдох на «с-с-с»: тяните ровный звук, контролируя напряжение в животе. 5 раз
- 3 Чередование: с-с-с — ш-ш-ш — ф-ф-ф на одном выдохе. Каждый звук по 5 секунд
- 4 Голос на опоре: тяните «м-м-м» на комфортной ноте. Ощущайте вибрацию. 5 раз
- 5 Фразы на опоре: «Добрый день», «Как дела?» — голос уверенный, наполненный. 10 фраз

#### ДОЗИРОВКА

8-10 минут 2 раза в день. Опора должна стать привычкой при каждом гов...

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Опора — это НЕ жёсткое напряжение, а активная поддержка
- Представьте, что выдыхаете через узкую соломинку
- Опора сохраняется до конца фразы
- Голос на опоре звучит уверенно и не устаёт

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Потеря опоры в конце фразы — голос «сдувается»
- Слишком сильное напряжение — зажим
- Задержка дыхания вместо опоры

6

## Грудной резонатор

7 мин

## ЦЕЛЬ

Развитие глубины и бархатистости голоса через активацию грудного резонатора

## ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Встаньте или сядьте прямо. Положите ладонь на грудь.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Поиск вибрации: произносите низкий «м-м-м» и ищите вибрацию под рукой. 5 раз
- 2 Усиление: тяните «м-м-м», «н-н-н», «в-в-в» на низкой ноте. Стремитесь усилить вибрацию
- 3 Слоги: МО-МО-МО, НО-НО-НО, ВО-ВО-ВО на низкой ноте. Резонанс в груди!
- 4 Фразы: «Мой голос звучит глубоко», «Я говорю уверенно» — с грудным резонансом

### ДОЗИРОВКА

7 минут 2 раза в день.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Не опускайте голос слишком низко
- Грудной звук НЕ означает тихий
- Вибрация в груди, не в горле

### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком низкий тон — напряжение
- Глухой звук вместо резонансного

## 7

## Головной резонатор

7 мин

## ЦЕЛЬ

Развитие звонкости и полётности голоса

## ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Встаньте или сядьте прямо. Слегка улыбайтесь.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Носовая вибрация: тяните «н-н-н» — вибрация в носу и переносице
- 2 Звук «и» на улыбке: тяните «и-и-и». Вибрация в области лба
- 3 Гудение в маску: «м-м-м» направляйте в область лба, носа, скул
- 4 Скольжение: «м-м-м» с низкой ноты плавно к высокой. 5 раз

### ДОЗИРОВКА

7 минут 2 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Представляйте звук через макушку
- Головной резонатор — высокий голос

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Гнусавость вместо резонанса
- Слишком высокий тон

## 8

### Чёткие гласные

8 мин

#### ЦЕЛЬ

Отработка гласных для мелодичной речи

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сядьте перед зеркалом. Челюсть свободна.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 По отдельности: А, О, У, И — 3 раза каждую с чёткой артикуляцией
- 2 Ряды: А-О-У-И на одном выдохе. 5 раз
- 3 Контрастные пары: А-И, О-И — максимально контрастно. 10 пар
- 4 Гласные в словах с утрированием каждой гласной

#### ДОЗИРОВКА

8 минут 2 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Работайте с зеркалом
- Утрируйте на тренировках
- Следите за конечными гласными

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Редукция гласных
- Недостаточное открытие рта

## 9

### Чёткие согласные

10 мин

#### ЦЕЛЬ

Отработка согласных для разборчивой речи

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сядьте перед зеркалом. Аппарат разогрет.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Взрывные: П-Б, Т-Д, К-Г — резко. 10 пар
- 2 Щелевые: С-З, Ш-Ж, Ф-В — тяните по 5 секунд

- 3 Слоги: ПА-ТА-КА, БА-ДА-ГА. 5 раз
- 4 Стечения согласных: СТР, ЗДР, ВСТР — каждый звук слышен!
- 5 Конечные согласные: не «глотайте» звуки в конце слов

#### ДОЗИРОВКА

**10 минут 2 раза в день.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Внимание конечным согласным
- Не глотайте стечения
- Записывайте себя

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Пропуск конечных согласных
- Смазывание стечений

10

## Скороговорки

10 мин

#### ЦЕЛЬ

*Развитие скорости и точности артикуляции*

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Артикуляционный аппарат разогрет.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Медленно: «Карл у Клары украл кораллы» — каждый звук чётко. 3 раза
- 2 Средний темп: та же скороговорка. 3 раза
- 3 Быстро: максимальная скорость с чёткостью. 3 раза
- 4 Разные скороговорки по той же схеме
- 5 С эмоцией: радостно, грустно, удивлённо

#### ДОЗИРОВКА

**10 минут ежедневно.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- От медленного к быстрому
- Лучше медленно и чётко
- Записывайте себя

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Ускорение с потерей чёткости
- Пропуск медленного этапа



## цель

Освоение базовых интонационных конструкций

## исходное положение

Голос разогрет.

## выполнение

- 1 Повествование: тон понижается к концу. 5 фраз
- 2 Вопрос: тон повышается. 5 фраз
- 3 Восклицание: энергичный подъём. 5 фраз
- 4 Перечисление: подъём на каждом, падение в конце
- 5 Смена интонации: одна фраза с разными эмоциями

## дозировка

10 минут 2 раза в день.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Слушайте хороших ораторов
- Избегайте монотонности

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Монотонная речь
- Отсутствие пауз

## цель

Выражение эмоций голосом

## исходное положение

Расслабьтесь. Настройтесь на игру голосом.

## выполнение

- 1 Радость: улыбка, голос выше, темп быстрее. 5 фраз
- 2 Грусть: голос ниже, темп медленнее. 5 фраз
- 3 Удивление: голос взлетает. 5 фраз
- 4 Уверенность: грудной голос, ровный темп
- 5 Мини-история с разными эмоциями

#### ДОЗИРОВКА

8 минут 2 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Эмоции должны быть искренними
- Не бойтесь быть выразительными

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Наигранность
- Страх показаться смешным

13

## Выразительное чтение

15 мин

#### ЦЕЛЬ

Практика всех навыков на текстах

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Подготовьте текст. Аппарат разогрет.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Разминка: вибрация губ, гудение, скороговорка
- 2 Первое чтение — техника: артикуляция, дыхание, опора
- 3 Второе чтение — смысл: ключевые слова, паузы, эмоции
- 4 Третье чтение — образ: вы рассказчик, визуализируйте
- 5 Запись и анализ: что хорошо? над чем работать?

#### ДОЗИРОВКА

15 минут ежедневно.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Читайте вслух минимум 15 минут в день
- Выбирайте разнообразные тексты
- Записывайте себя

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Чтение без понимания смысла
- Монотонность
- Слишком быстрый темп

14

## Публичная речь

12 мин

#### ЦЕЛЬ

Подготовка и произнесение выступления

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Выберите тему. Встаньте перед зеркалом.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Выбор темы: хобби, профессия. Подготовьте 3 мысли
- 2 Структура: вступление, 3 пункта, заключение
- 3 Репетиция вслух: не читайте — говорите!
- 4 Тело: прямая осанка, жесты, взгляд в зал
- 5 Финальное выступление: запишите видео

#### ДОЗИРОВКА

**Практикуйте 2-3 раза в неделю.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Репетируйте вслух
- Записывайте видео
- Начинайте с коротких выступлений

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Зжатость
- Слишком быстрый темп
- Чтение с листа

# Парезы гортани

15 упражнений

#### Упражнения раздела:

- Отклонение головы назад с сопротивлением
- Наклоны головы вперёд с сопротивлением
- Наклоны головы в стороны с сопротивлением
- Движения нижней челюстью
- Надувание щёк
- Доставка кончиком языка мягкого нёба
- Поднимание мягкого нёба при зевке
- Произнесение слогов с вибрантом [p]
- Произнесение фонемы [m] (мычание)
- Сочетания [m] + гласные
- Звонкие согласные с гласными
- Пары слогов на одном выдохе
- Длительное произнесение гласных и их сочетаний
- Семь слогов с перемещающимися ударениями

- Тренировка сочетаний гласных с [й]

## 1

## Отклонение головы назад с сопротивлением

5 мин

## цель

Активация задней группы мышц шеи и наружных мышц гортани.

## исходное положение

Сидя на стуле. Руки сложены в замок на затылке.

## выполнение

- 1 Сложите руки в замок и положите их на затылок
- 2 Попробуйте отклонить голову назад, одновременно создавая сопротивление руками
- 3 Голова давит назад, руки не пускают — возникает изометрическое напряжение
- 4 Удерживайте напряжение 5-7 секунд
- 5 Расслабьтесь на 3-5 секунд
- 6 Повторите

## дозировка

4-5 раз, 2-3 подхода в день.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Усилие умеренное — без боли!
- Дышать свободно во время напряжения, не задерживать дыхание
- После упражнения — мягко поворачивать головой для расслабления

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком сильное давление (боль в шее)
- Задержка дыхания
- Напряжение мышц лица

При болях в шейном отделе позвоночника — проконсультироваться с врачом.

## 2

## Наклоны головы вперед с сопротивлением

5 мин

## цель

Активация передней группы мышц шеи, важных для фонации.

## исходное положение

Сидя на стуле. Сжатые в кулак кисти подпирают подбородок.

## выполнение

- 1 Сожмите руки в кулаки и подоприте ими подбородок снизу

- 2 Попытайтесь наклонить голову вперёд (подбородок к груди)
- 3 Руки создают сопротивление — не дают голове опуститься
- 4 Удерживайте напряжение 5-7 секунд
- 5 Расслабьтесь
- 6 Повторите

#### ДОЗИРОВКА

4-5 раз, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Умеренное усилие
- Дыхание свободное
- Упражнение активирует мышцы, участвующие в глотании и фонации

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Чрезмерное усилие
- Задержка дыхания
- Напряжение в челюсти

*При проблемах с шейным отделом — с осторожностью.*

### 3

## Наклоны головы в стороны с сопротивлением

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Активация боковых мышц шеи.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя на стуле. Ладони прижаты к ушам (голова между ладонями).

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Прижмите ладони к ушам — голова как бы зажата между руками
- 2 Попытайтесь наклонить голову влево, правая рука создаёт сопротивление
- 3 Удерживайте напряжение 5-7 секунд
- 4 Расслабьтесь
- 5 Повторите в другую сторону — наклон вправо, левая рука сопротивляется
- 6 Чередуйте стороны

#### ДОЗИРОВКА

4-5 раз в каждую сторону, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Поочерёдно влево-вправо
- Усилие умеренное
- После упражнения — мягкие наклоны головы без сопротивления для расслабления

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком сильное давление
- Поднимание плеч
- Задержка дыхания

*При болях в шее — проконсультироваться с врачом.*

## 4

### Движения нижней челюстью

4 мин

#### ЦЕЛЬ

*Расслабление челюстных мышц, снятие зажимов, подготовка артикуляционного аппарата.*

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя на стуле. Рот слегка приоткрыт.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Расслабьте нижнюю челюсть — рот слегка приоткрыт
- 2 Медленно опустите нижнюю челюсть вниз (как при зевке, но без напряжения)
- 3 Вернитесь в исходное положение
- 4 Выдвиньте нижнюю челюсть вперёд
- 5 Вернитесь
- 6 Сместите челюсть влево, затем вправо
- 7 Сделайте круговые движения челюстью
- 8 Мягко сожмите зубы на 2-3 секунды, затем расслабьте

#### ДОЗИРОВКА

**4-5 раз каждое движение, 2-3 подхода в день.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Без напряжения в шее!
- Движения плавные, без рывков
- Если есть щёлканье в суставе — выполнять с меньшей амплитудой
- Упражнение снимает зажимы, которые мешают свободной фонации

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Резкие движения
- Чрезмерное открывание рта
- Напряжение мышц шеи

5

## Надувание щёк

4 мин

### цель

Укрепление мышц щёк и губ, развитие контроля над воздушной струёй.

### исходное положение

Сидя. Губы плотно сомкнуты.

### выполнение

- 1 Плотно сомкните губы
- 2 Надуйте обе щёки воздухом
- 3 Удержите воздух 5-10 секунд
- 4 Медленно выпустите воздух через сомкнутые губы
- 5 Надуйте только левую щёку (правая расслаблена)
- 6 Удержите 5 секунд
- 7 Надуйте только правую щёку
- 8 «Перекачивайте» воздух из левой щеки в правую и обратно

### дозировка

10-15 раз (полный цикл), 2-3 подхода в день.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Губы должны быть плотно сомкнуты — воздух не должен выходить
- Упражнение укрепляет круговую мышцу рта
- При дисфагии — особенно полезно для контроля над болюсом

### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Воздух выходит через губы или нос
- Напряжение в шее

6

## Доставание кончиком языка мягкого нёба

5 мин

### цель

Укрепление мышц языка, особенно задней его части; важно при дисфагии и парезах.



#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя. Рот широко открыт.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Откройте рот максимально широко
- 2 Кончик языка поднимите вверх и постарайтесь дотянуться до мягкого нёба (задняя часть нёба, ближе к глотке)
- 3 Удержите язык в этом положении 3-5 секунд
- 4 Расслабьте язык
- 5 Повторите
- 6 Если не удаётся достать до мягкого нёба — тянитесь к твёрдому нёбу как можно дальше назад

#### ДОЗИРОВКА

4-5 раз, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Не напрягать корень языка чрезмерно — напряжение должно быть ощутимым, но не болезненным
- Упражнение укрепляет мышцы, важные для глотания
- Постепенно увеличивайте время удержания

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Закрывание рта во время упражнения
- Напряжение шеи вместо языка
- Слишком сильное напряжение — боль в корне языка

*При сильном рвотном рефлекс — выполнять с осторожностью.*

7

## Поднимание мягкого нёба при зевке

4 мин

#### ЦЕЛЬ

Активация мышц мягкого нёба и глотки, расширение резонансного пространства.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Имитируйте начало зевка — почувствуйте, как расширяется задняя часть рта и глотки
- 2 Ощутите, как мягкое нёбо поднимается, а язык слегка опускается
- 3 Удержите это ощущение «открытого горла» на 3-5 секунд
- 4 Расслабьтесь

- 5 Повторите, стараясь каждый раз почувствовать расширение глотки более явно
- 6 Можно добавить звук [а] на зевке — он должен быть низким и объёмным

#### ДОЗИРОВКА

4-5 раз, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Ощутите расширение глотки — это ключевой момент
- Упражнение «открывает» пространство для резонанса
- Используется в вокальной практике для расширения диапазона
- Помогает при гипертонусе — расслабляет гортань

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Напряжение в шее
- Закрывание горла после зевка слишком быстро

## 8

### Произнесение слогов с вибрантом [p]

6 мин

#### ЦЕЛЬ

Стимуляция голосовых складок вибрацией, активация фонации. Вибрант [p] создаёт естественный «массаж» голосового аппарата.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя. Спина прямая, плечи расслаблены.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Сделайте вдох
- 2 Произнесите на выдохе: КРА — КРО — КРУ — КРЭ — КРЫ
- 3 Вибрант [p] произносите длительно: кррррра, крррро и т.д.
- 4 Гласные — очень коротко, как бы обрывая звучание
- 5 Затем произнесите ряды: ГРА-ГРО-ГРУ-ГРЭ-ГРЫ
- 6 ТРА-ТРО-ТРУ-ТРЭ-ТРЫ
- 7 ДРА-ДРО-ДРУ-ДРЭ-ДРЫ
- 8 ЗРА-ЗРО-ЗРУ-ЗРЭ-ЗРЫ
- 9 РА-РО-РУ-РЭ-РЫ
- 10 РАРА-РАРО-РАРУ-РАРЭ-РАРЫ

**ДОЗИРОВКА****По 5-6 раз каждый ряд, 2 подхода в день.**

## 9

**Произнесение фонемы [м] (мычание)**

7 мин

**цель***Нахождение оптимального звучания голоса, формирование резонанса, мягкая активация голосовых складок.***ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

Сидя. Губы мягко сомкнуты, зубы разомкнуты, челюсть расслаблена.

**ВЫПОЛНЕНИЕ**

- 1 Сомкните губы, но зубы должны быть слегка разомкнуты (как при лёгкой улыбке)
- 2 Сделайте вдох
- 3 Начните мычать на комфортной для вас высоте: ммммм...
- 4 Методом проб и ошибок подберите высоту, на которой голос звучит лучше всего
- 5 Ищите ощущение вибрации в области носа и губ (маска лица)
- 6 Постепенно увеличивайте продолжительность мычания
- 7 Начните с коротких звуков [м], затем переходите к длительным

**ДОЗИРОВКА****1-2 минуты, несколько раз в день.****МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

- Искать комфортную высоту — не слишком высокую, не слишком низкую
- Ощущение вибрации в «маске» — показатель правильного резонанса
- Звук должен быть мягким, без напряжения
- Это базовое упражнение для восстановления голоса при парезах

**ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ**

- Мычание в горле (звук «застревает» внизу)
- Напряжение в челюсти
- Слишком высокая или слишком низкая нота

*При полной афонии — выполнять беззвучно, затем переходить к шёпотному мычанию.*

## цель

Переход от сонорного [м] к гласным, формирование голосоподачи.

## исходное положение

Сидя. Челюсть расслаблена.

## выполнение

- 1 Начните с длительного мычания: ммммм...
- 2 Продолжая мычать, резко опустите нижнюю челюсть — получится МА
- 3 Гласный [а] — короткий, как бы «выбрасывается» изо рта
- 4 Повторите: мммМА
- 5 Затем: мммМО, мммМУ, мммМЭ, мммМы
- 6 Согласный [м] — длительный, гласные — краткие

## ДОЗИРОВКА

По 4-5 раз каждый слог, 2-3 подхода в день.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Резкое опускание челюсти на гласном — важно!

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Длинные гласные (должны быть короткими!)
- Потеря резонанса при переходе к гласному
- Напряжённая, «зажатая» челюсть

## цель

Закрепление голосовых навыков, расширение репертуара звуков.

## исходное положение

Сидя.

## выполнение

- 1 Произнесите ряд слогов с согласным [н]: НА-НО-НУ-НЭ-НЫ
- 2 Согласный — длительный (ннна), гласный — короткий
- 3 Затем со слогами: ЛА-ЛО-ЛУ-ЛЭ-ЛЫ (лллла...)

- 4 ВА-ВО-ВУ-ВЭ-ВЫ
- 5 ЗА-ЗО-ЗУ-ЗЭ-ЗЫ
- 6 ЖА-ЖО-ЖУ-ЖЕ-ЖИ

#### ДОЗИРОВКА

По 4-5 раз каждый ряд, 2 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Все эти согласные — звонкие, требуют работы голосовых складок
- Согласный длительный, гласный — короткий
- Искать резонанс на согласном, сохранять на гласном

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Оглушение согласных (ннь, зс и т.д.)
- Длинные гласные
- Напряжение в горле

## 12 Пары слогов на одном выдохе

6 мин

#### ЦЕЛЬ

Развитие фонационного выдоха, тренировка ударения.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Произнесите на одном выдохе пару слогов с ударением на втором: маМА
- 2 Первый слог — безударный, второй — ударный (более громкий, чуть выше)
- 3 Ряд: маМА — маМО — маМУ — маМЭ — маМЫ
- 4 Затем: наНА — наНО — наНУ — наНЭ — наНЫ
- 5 лаЛА — лаЛО — лаЛУ — лаЛЭ — лаЛЫ
- 6 ваВА — ваВО — ваВУ — ваВЭ — ваВЫ
- 7 заЗА — заЗО — заЗУ — заЗЭ — заЗЫ
- 8 жаЖА — жаЖО — жаЖУ — жаЖЕ — жаЖИ
- 9 Согласный произносится длительно, ударный слог — чётко выделяется

#### ДОЗИРОВКА

По 3-4 раза каждый ряд, 2 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Ударение на втором слоге — обязательно!
- Один выдох — одна пара слогов
- Согласный длительный

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Ударение на первом слоге
- Равномерное произнесение без ударения
- Вдох между слогами пары

13

## Длительное произнесение гласных и их сочетаний

8 мин

#### ЦЕЛЬ

Тренировка координации дыхания и голосообразования, развитие певучести голоса.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Произнесите длительно гласный [а]: аааааа...
- 2 Затем сочетание [ао]: ааааооооо... (плавный переход)
- 3 Далее: [ау], [аэ], [аи]
- 4 Более сложные сочетания: [аоу], [аоэ], [аои]
- 5 Ещё сложнее: [аоуэ], [аоуи], [аоуэи]
- 6 Все гласные — на одном выдохе, с плавным переходом друг в друга

#### ДОЗИРОВКА

2-3 минуты, 2 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Плавный переход между гласными — без прерывов
- Дыхание диафрагмальное
- Голос ровный, без колебаний громкости
- Упражнение развивает певучесть и «полётность» голоса

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Прерывание звука между гласными
- Затухание голоса к концу
- Напряжение в горле

14

## Семь слогов с перемещающимися ударениями

6 мин

#### ЦЕЛЬ

Развитие интонационной гибкости, тренировка модуляции голоса.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Произнесите 7 одинаковых слогов: ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма
- 2 Первый раз — ударение на 1-м слоге: МА-ма-ма-ма-ма-ма-ма
- 3 Второй раз — ударение на 2-м слоге: ма-МА-ма-ма-ма-ма-ма
- 4 Третий раз — на 3-м слоге: ма-ма-МА-ма-ма-ма-ма
- 5 И так далее до 7-го слога
- 6 Повторите с другими слогами: на, ла, ва, за
- 7 Ударный слог — громче и чуть выше по тону

#### ДОЗИРОВКА

По 2-3 раза каждый ряд, 2 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Все слоги на одном выдохе
- Ударный слог выделяется громкостью и высотой
- Упражнение развивает интонационную выразительность
- Важно для восстановления просодики речи

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Дыхание между слогами
- Одинаковое произнесение всех слогов
- Напряжение в горле

15

## Тренировка сочетаний гласных с [й]

6 мин

#### ЦЕЛЬ

Тренировка плавного голосообразования, работа над йотированными гласными.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Произнесите длительно: ааааай (а переходит в й)
- 2 Затем: оооооой, ууууууй, эээээй
- 3 Обратный порядок: йааааа, йоооооо, йууууу, йэээээ
- 4 Сочетания: ай-ой-уй-эй (на одном выдохе)
- 5 Обратные сочетания: йа-йо-йу-йэ

6

Переход плавный, без разрыва звука

**ДОЗИРОВКА**

**2-3 минуты, 2 подхода в день.**

**ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ**

- Резкий переход между звуками

# Дисфагия

6 упражнений

## Упражнения раздела:

- Упражнение Шейкера
- Манёвр Мендельсона
- Упражнения для языка
- Форсированная фонация (упражнение на смыкание)
- Глотание с поворотом головы
- Надгортанное глотание



## 1

## Упражнение Шейкера

10 мин

## цель

Укрепление передней группы мышц шеи, улучшение открытия верхнего пищеводного сфинктера.

## исходное положение

Лёжа на спине, без подушки. Поверхность твёрдая (пол с ковриком).

## выполнение

- 1 Лягте на спину без подушки
- 2 Плечи прижаты к полу и не поднимаются!
- 3 Поднимите только голову, подбородок к груди
- 4 Смотрите на пальцы ног
- 5 Вариант 1 (изометрический): удержите голову в этом положении 1 минуту. Опустите. Отдых 1 минута. Повторите 3 раза
- 6 Вариант 2 (динамический): поднимайте и опускайте голову 30 раз подряд
- 7 Выполняйте 3 раза в день в течение 6 недель

## дозировка

3 подхода по 1 минуте (изометрический) ИЛИ 30 подъёмов (динамическ...

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Не поднимать плечи! Работает только шея
- Упражнение разработано доктором Шейкером — доказанная эффективность при дисфагии
- Укрепляет мышцы, открывающие верхний пищеводный сфинктер
- Требуется регулярность — эффект накопительный

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Подъём плеч вместе с головой
- Слишком быстрое выполнение
- Задержка дыхания

При болях в шейном отделе — проконсультироваться с врачом. При грыжах шейного отдела — возмо...

## 2

## Манёвр Мендельсона

8 мин

## цель

*Увеличение продолжительности и амплитуды подъёма гортани при глотании.*

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Положите пальцы на гортань (кадык) для контроля
- 2 Начните глотательное движение (можно с небольшим количеством воды)
- 3 В момент, когда гортань поднимается вверх — задержите её в этом положении
- 4 Удержите гортань наверху 2-3 секунды, напрягая мышцы горла
- 5 Затем расслабьтесь и позвольте гортани опуститься
- 6 Повторите

#### ДОЗИРОВКА

**5-10 раз, 3 подхода в день.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Сложное упражнение — требует практики
- Удержание гортани наверху — ключевой момент
- Улучшает координацию глотания
- Можно практиковать сначала без еды/воды, потом с водой

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Не удаётся удержать гортань наверху — нужна практика
- Напряжение в плечах вместо горла
- Слишком быстрое выполнение

*При аспирации — выполнять только под наблюдением специалиста.*

## 3

### Упражнения для языка

8 мин

#### ЦЕЛЬ

*Укрепление мышц языка, важных для оральной фазы глотания.*

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя. Рот открыт.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Упражнение 1: Высуньте язык максимально вперёд и вниз. Удержите 5 секунд. Расслабьтесь
- 2 Упражнение 2: Высуньте язык и двигайте им влево-вправо, касаясь уголков губ
- 3 Упражнение 3: Поднимите язык к нёбу и «присосите» его. Удержите 5 секунд

- 4 Упражнение 4: «Лошадка» — цокайте языком (отрывайте «присосанный» язык от нёба с громким щелчком)
- 5 Упражнение 5: Упирайтесь языком в щёку изнутри, создавая сопротивление пальцем снаружи

**ДОЗИРОВКА**

**По 10 раз каждое упражнение, 3 подхода в день.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

- Язык должен быть напряжён во время упражнений
- Работает вся мускулатура языка, включая корень
- Эти упражнения улучшают перемещение пищевого комка во рту

**ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ**

- Слабое, вялое выполнение
- Напряжение шеи вместо языка

4

**Форсированная фонация (упражнение на смыкание)**

6 мин

**ЦЕЛЬ**

Укрепление мышц надгортанника и голосовых складок, улучшение защиты дыхательных путей при глотании.

**ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

Сидя. Голова слегка наклонена вперёд.

**ВЫПОЛНЕНИЕ**

- 1 Слегка наклоните голову вперёд (подбородок к груди)
- 2 Сделайте глубокий вдох
- 3 Произнесите звуки [а], [э] с максимальным усилием, как при натуживании или кряхтении
- 4 Звук должен быть коротким, резким, «толкающим»
- 5 Ощутите смыкание в горле
- 6 Повторите 5-10 раз

**ДОЗИРОВКА**

**5-10 раз, 3 подхода в день.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Форсированная фонация — голос с усилием
- Укрепляет мышцы надгортанника
- Не злоупотреблять — это интенсивное упражнение
- Голова наклонена вперёд — это важно для правильного положения надгортанника

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Длительные звуки вместо коротких
- Голова запрокинута назад
- Боль в горле — значит слишком сильное усилие

*При воспалительных заболеваниях гортани — временно исключить.*

5

## Глотание с поворотом головы

5 мин

#### цель

*Направление пищевого комка по здоровой стороне глотки при одностороннем поражении.*

#### исходное положение

Сидя.

#### выполнение

- 1 Определите, какая сторона глотки поражена (по данным обследования)
- 2 При глотании поворачивайте голову в сторону поражённой стороны
- 3 Поворот головы «закрывает» поражённую сторону и направляет пищу/жидкость по здоровой стороне
- 4 Применяйте при каждом глотке еды и воды

#### дозировка

**При каждом приёме пищи и питья.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Этот приём — не упражнение, а компенсаторная стратегия
- Голова поворачивается В СТОРОНУ поражения (не от него!)
- Очень эффективно при односторонних парезах глотки
- Рекомендуются специалистом по дисфагии

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Поворот головы в противоположную сторону
- Забывание использовать приём

*Нет, но применять по рекомендации специалиста.*

**цель**

Защита дыхательных путей при глотании путём произвольного закрытия голосовых складок.

**ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

Сидя.

**ВЫПОЛНЕНИЕ**

- 1 Сделайте глубокий вдох
- 2 Задержите дыхание
- 3 Проглотите (еду, жидкость или слюну)
- 4 Сразу после глотания — кашляните
- 5 Это удаляет остатки пищи, которые могли попасть в дыхательные пути

**ДОЗИРОВКА**

При каждом глотке во время еды — по рекомендации специалиста.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

- Задержка дыхания = закрытие голосовых складок = защита дыхательных путей
- Кашель после глотания — обязательный этап
- Применяется при риске аспирации
- Требуется концентрации во время еды

**ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ**

- Забывание задержать дыхание
- Забывание кашлянуть после глотания
- Слишком большие порции еды

*Применять по рекомендации специалиста по дисфагии.*

# Мутации голоса

3 упражнений

**Упражнения раздела:**

- Понимание мутации голоса
- Поиск грудного регистра

- Покашливание с голосом

## 1

## Понимание мутации голоса

5 мин

## цель

Изучение процесса мутации голоса и его особенностей.

## исходное положение

Информационное занятие.

## выполнение

- 1 Мутация голоса — естественный процесс изменения голоса в период полового созревания
- 2 У мальчиков гортань увеличивается на 70%, голос понижается на октаву
- 3 У девочек изменения менее выражены — голос понижается на 3-4 полутона
- 4 Нормальная мутация длится 3-6 месяцев
- 5 При затянувшейся или неправильной мутации нужны специальные упражнения

## дозировка

Информационное занятие.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Фальцетная мутация — когда подросток продолжает говорить детским голосом
- Это часто психологическая, а не физическая проблема
- Упражнения помогают найти «новый» голос
- Важна работа с фониатром/логопедом

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Насмешки над голосом подростка
- Требования «говорить нормально»
- Игнорирование проблемы

## 2

## Поиск грудного регистра

7 мин

## цель

Нахождение и закрепление грудного (низкого) звучания голоса.

## исходное положение

Сидя, расслабленно. Рука на груди.

## выполнение

- 1 Положите руку на грудь
- 2 Начните мычать на низкой комфортной ноте: ммммм...

- 3 Ищите ощущение вибрации под рукой — в груди
- 4 Если вибрация ощущается в голове/носу — голос слишком высокий, понизьте
- 5 Закрепите ощущение грудной вибрации
- 6 Постепенно переходите от мычания к гласным: мммма, ммммо

#### ДОЗИРОВКА

5-7 минут, 3-4 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Грудной регистр = низкие частоты = вибрация в груди
- Это «взрослый» мужской голос
- Не форсировать — искать естественное звучание
- Постепенно переносить в речь

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком низкий голос (напряжение)
- Возврат к высокому голосу в речи
- Форсирование звука

3

## Покашливание с голосом

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Активация низкого регистра через естественный рефлекс.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Сделайте лёгкое покашливание с голосом: кхе-кхе
- 2 Обратите внимание на низкий звук, который получается при покашливании
- 3 Это и есть ваш грудной регистр
- 4 Попробуйте «задержать» этот звук и перевести его в гласный: кхе э
- 5 Повторите несколько раз, закрепляя низкое звучание

#### ДОЗИРОВКА

3-5 минут, 2-3 раза в день.



#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Покашливание рефлекторно включает грудной регистр
- Это способ «обмануть» привычку говорить высоко
- Важно не кашлять сильно — лёгкое покашливание
- Метод Таптаповой

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком сильное покашливание
- Потеря низкого звука при переходе к гласному
- Напряжение в горле

*Не злоупотреблять — частое покашливание раздражает связки.*

## Профессионалы голоса

4 упражнений

#### Упражнения раздела:

- Правило 20-20-20 для голоса
- Разминка перед работой
- Заминка после работы
- Резонансная техника речи

## 1

## Правило 20-20-20 для голоса

3 мин

### цель

Профилактика голосового утомления у профессионалов.

### исходное положение

В течение рабочего дня.

### выполнение

- 1 Каждые 20 минут активной голосовой работы
- 2 Делайте паузу 20 секунд
- 3 Выпейте глоток воды
- 4 Это предотвращает накопление голосовой усталости
- 5 Установите напоминание на телефоне

### дозировка

Каждые 20 минут голосовой работы.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Голосовые складки — мышцы, они устают
- Регулярные микропаузы предотвращают перенапряжение
- Вода увлажняет связки изнутри
- Профилактика эффективнее лечения

### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Пропуск пауз («некогда»)
- Замена воды кофе или газировкой
- «Доработаю и отдохну» — накопление усталости

## 2

## Разминка перед работой

8 мин

### цель

Подготовка голосового аппарата к нагрузке.

### исходное положение

За 10-15 минут до начала голосовой работы.

### выполнение

- 1 Lip trills: вибрация губ 1-2 минуты, с голосом и без
- 2 Мычание: ммммм на разных высотах 1-2 минуты
- 3 Слоги с сонорными: ма-мо-му, на-но-ну, ла-ло-лу

- 4 Глиссандо: плавное скольжение голоса вверх-вниз
- 5 Артикуляционная гимнастика: движения губами, языком, челюстью

#### ДОЗИРОВКА

**5-10 минут перед каждым «голосовым днём».**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Как разминка перед спортом — обязательна
- Разогретый голос меньше устаёт
- Снижает риск травм голосовых складок
- Улучшает качество звучания

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Пропуск разминки («и так справлюсь»)
- Слишком короткая разминка
- Форсирование во время разминки

3

## Заминка после работы

8 мин

#### ЦЕЛЬ

*Восстановление голосового аппарата после нагрузки.*

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сразу после окончания голосовой работы.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Straw phonation: 3-5 минут фонации через трубочку в воду
- 2 Мягкое мычание на комфортной высоте 1-2 минуты
- 3 Глубокое диафрагмальное дыхание 1-2 минуты
- 4 Выпейте стакан воды комнатной температуры
- 5 По возможности — 10-15 минут голосового молчания

#### ДОЗИРОВКА

**5-10 минут после каждого интенсивного голосового дня.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Заминка восстанавливает голосовые складки
- Straw phonation — лучший метод для восстановления
- Голосовое молчание даёт отдых
- Вода комнатной температуры — не холодная!

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Пропуск заминки
- Продолжение разговоров после работы
- Холодные напитки

## цель

Освоение экономичного способа голосоподачи.

## исходное положение

Сидя или стоя. Челюсть расслаблена.

## выполнение

- 1 Начните с мычания: ищите вибрацию в «маске» (нос, губы, скулы)
- 2 Положите пальцы на переносицу — чувствуете вибрацию?
- 3 Откройте рот, сохраняя вибрацию в маске: ммма, мммо
- 4 Произнесите фразы, сохраняя ощущение резонанса в маске
- 5 Голос должен «выходить через маску», а не из горла

## дозировка

5-7 минут, 2 раза в день. Перенести в повседневную речь.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Резонансная техника = минимальное усилие, максимальный звук
- Снижает нагрузку на голосовые складки на 50-70%
- Голос звучит громче без форсирования
- Метод Verdolini — золотой стандарт

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Ощущение звука в горле вместо маски
- Потеря резонанса в речи
- Форсирование звука

# Гипотонусные дисфонии

5 упражнений

## Упражнения раздела:

- Твёрдая атака звука
- Push-pull упражнения (с физическим усилием)
- Звонкие взрывные согласные
- Глоттальные атаки

- Крещендо на гласных

## 1

## Твёрдая атака звука

6 мин

## цель

Активация смыкания голосовых складок, повышение их тонуса.

## исходное положение

Сидя.

## выполнение

- 1 Сделайте вдох
- 2 Произнесите гласный [а] с резким, чётким началом
- 3 Звук должен начинаться сразу, без придыхания, без «хаканья»
- 4 Как будто звук «выстреливает» изо рта
- 5 Повторите с гласными [о], [у], [э], [и]
- 6 Каждый звук — короткий и чёткий

## дозировка

По 10 раз каждый гласный, 2-3 подхода в день.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Избегать придыхания (ха, хо) — звук должен начинаться сразу
- Твёрдая атака = плотное смыкание складок перед началом звука
- Не путать с криком — громкость умеренная
- Упражнение повышает тонус складок

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Придыхание перед гласным (ха вместо а)
- Слишком длинные звуки (должны быть короткими)
- Напряжение в шее

При гипертонусе — НЕ выполнять (усилит напряжение).

## 2

## Push-pull упражнения (с физическим усилием)

6 мин

## цель

Усиление смыкания голосовых складок за счёт рефлекторного напряжения.

## исходное положение

Сидя на стуле с подлокотниками или за столом.

## выполнение

- 1 Вариант 1 (Push): Положите руки на стол или подлокотники. На выдохе давите руками вниз и одновременно произносите [а] или [э]
- 2 Вариант 2 (Pull): Возьмитесь руками за сиденье стула снизу. На выдохе тяните сиденье вверх и произносите [а]
- 3 Вариант 3: Сложите руки перед грудью и давите ладонями друг на друга, произнося звук
- 4 Физическое усилие рефлекторно вызывает более плотное смыкание складок

#### ДОЗИРОВКА

5-10 раз каждый вариант, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Метод Фролова — физическое усилие помогает смыканию
- Усилие умеренное — не чрезмерное
- Голос должен звучать сильнее, чем без усилия
- Очень эффективно при парезах гортани

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком слабое физическое усилие (эффекта не будет)
- Слишком сильное усилие (натуживание, красное лицо)
- Задержка дыхания

*При гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях — с осторожностью, без чрезмерного напряжен...*

## 3

### Звонкие взрывные согласные

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Активация голосовых складок через произнесение звонких взрывных звуков.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Произнесите слоги со звонкими взрывными согласными:
- 2 БА-БА-БА — громко, чётко, активно
- 3 ДА-ДА-ДА
- 4 ГА-ГА-ГА
- 5 Акцент на согласном — он должен быть сильным, «взрывным»
- 6 Каждый слог — отдельно, с паузой

#### ДОЗИРОВКА

По 10 раз каждый ряд, 2-3 подхода в день.

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слабые, «смазанные» согласные
- Оглушение (бапа, дата, гака)
- Напряжение в шее

*При гипертонусе — НЕ выполнять.*

## 4

### Глоттальные атаки

4 мин

#### цель

Максимальная активация смыкания голосовых складок.

#### исходное положение

Сидя.

#### выполнение

- 1 Произнесите короткие резкие звуки [а]-[а]-[а]
- 2 Каждый [а] начинается с твёрдой атаки — как лёгкое покашливание с голосом
- 3 Это глоттальная (гортанная) атака — складки резко смыкаются перед началом звука
- 4 Звуки короткие, резкие, отрывистые
- 5 Не путать с покашливанием без голоса!

#### дозировка

**10-15 раз, 2-3 подхода в день. НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ!**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Осторожно! Это интенсивное упражнение
- Не использовать как основное — только как дополнение
- При дискомфорте — прекратить
- Эффективно при выраженном гипотонусе, но может травмировать при злоупотреблении

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком частое выполнение
- Длительные звуки вместо коротких
- Боль в горле — СТОП!

*При узелках, полипах, отёке складок — НЕ выполнять! При гипертонусе — НЕ выполнять!*

## 5

### Крещендо на гласных

6 мин



## ЦЕЛЬ

Развитие динамического диапазона, укрепление голосовых складок.

## ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

## ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Начните произносить гласный [a] очень тихо (пиано)
- 2 Постепенно увеличивайте громкость
- 3 К концу выдоха достигните максимальной громкости (форте)
- 4 Переход должен быть плавным, без «скачков»
- 5 Затем выполните обратное: от громкого к тихому (диминуэндо)
- 6 Повторите с другими гласными

### ДОЗИРОВКА

3-5 раз на каждый гласный, 2 подхода в день.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Плавное крещендо — главный критерий
- Не кричать на форте! Громко, но не надрывно
- Контроль за ровностью тона — высота не должна меняться
- Упражнение развивает выносливость и силу голоса

### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Резкие скачки громкости
- Изменение высоты тона
- Крик на форте
- Затухание голоса раньше времени

*При гипертонусе — с осторожностью, без форсирования.*

# Гипертонусные дисфонии

10 упражнений

### Упражнения раздела:

- Lip trills (вибрация губ)
- Tongue trills (вибрация языка)
- Straw phonation (фонация через трубочку)
- Мычание с закрытым ртом (Humming)

- Жевательные упражнения с фонацией
- Зевок с фонацией
- Мягкая атака на придыхательных звуках
- Упражнение «Стон»
- Резонансная терапия
- Самомассаж гортани

## 1

## Lip trills (вибрация губ)

6 мин

## цель

Расслабление голосового аппарата, балансировка давления воздуха, разогрев голоса.

## исходное положение

Сидя или стоя. Губы расслаблены.

## выполнение

- 1 Расслабьте губы полностью
- 2 Сделайте вдох
- 3 На выдохе заставьте губы вибрировать — как фырканье лошади или звук мотора «брррр»
- 4 Сначала выполняйте без голоса — только воздух
- 5 Затем добавьте голос — губы вибрируют, и одновременно звучит голос
- 6 Меняйте высоту: выше, ниже, глиссандо вверх и вниз
- 7 Продолжайте 2-3 минуты

## ДОЗИРОВКА

2-3 минуты, 3-4 раза в день. Обязательно перед голосовой нагрузкой.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Губы полностью расслаблены — напряжённые губы не будут вибрировать
- Если не получается — слегка придержите щёки пальцами
- Ровный поток воздуха
- Отличное упражнение для разогрева перед пением или выступлением

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Напряжение губ (вибрация не получается)
- Неровный поток воздуха (вибрация прерывается)
- Форсирование звука

Нет. Одно из самых безопасных упражнений.

## 2

## Tongue trills (вибрация языка)

6 мин

## цель

Расслабление языка и гортани, разогрев голоса.

## исходное положение

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Расслабьте язык
- 2 Поднимите кончик языка к альвеолам (бугорки за верхними зубами)
- 3 На выдохе заставьте язык вибрировать — как звук «дрrrrrr» или «трrrrrr»
- 4 Это похоже на раскатистый [p], но более расслабленный
- 5 Сначала без голоса, затем с голосом
- 6 Меняйте высоту
- 7 Если не получается — замените на lip trills

#### ДОЗИРОВКА

2-3 минуты, 2-3 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Язык расслаблен — только кончик слегка напряжён
- Если не получается вибрация языка — это нормально, не у всех получается. Используйте lip trills
- Упражнение расслабляет корень языка, что важно при гипертонусе

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Напряжение корня языка
- Напряжение челюсти
- Если вообще не получается — не мучайтесь, используйте альтернативы

3

## Straw phonation (фонация через трубочку)

8 мин

#### ЦЕЛЬ

Балансировка подвязочного давления, снятие напряжения с голосовых складок, лечение узелков и гипертонуса. Самое эффективное SOVT-упражнение!

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя. Вам понадобится: коктейльная трубочка и стакан воды.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Налейте воду в стакан (3-5 см воды)
- 2 Опустите трубочку в воду
- 3 Обхватите трубочку губами
- 4 Сделайте вдох через нос

- 5 На выдохе издавайте звук (гудите) через трубочку — воздух будет выходить в воду, образуя пузырьки
- 6 Пузырьки должны быть равномерными, без «взрывов» и пауз
- 7 Продолжайте 3-5 минут, меняя высоту звука
- 8 Глубина воды регулирует сопротивление: больше воды = больше сопротивление

#### ДОЗИРОВКА

**3-5 минут, 2-3 раза в день. При узелках — до 5-6 раз в день.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Лучший SOVT! Рекомендован ведущими фониатрами мира
- Пузырьки должны быть равномерными — это главный критерий правильности
- Начните с меньшей глубины воды (2-3 см), постепенно увеличивайте
- Можно выполнять и без воды — просто гудеть в трубочку, но с водой эффективнее
- После упражнения голос звучит свободнее

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Неравномерные пузырьки («взрывы» или паузы)
- Слишком сильное давление (брызги)
- Слишком слабое давление (редкие пузырьки)
- Напряжение в шее

*Нет. Безопасно при любых голосовых нарушениях.*

4

## Мычание с закрытым ртом (Humming)

7 мин

#### ЦЕЛЬ

*Развитие резонанса, расслабление гортани, фокусировка звука в «маске».*

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя. Губы мягко сомкнуты, зубы разомкнуты.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Сомкните губы мягко (без напряжения)
- 2 Зубы слегка разомкнуты (как при лёгкой улыбке изнутри)
- 3 Сделайте вдох
- 4 Начните мычать: ммммм...
- 5 Ищите ощущение вибрации в области носа, губ, лба («маска лица»)
- 6 Меняйте высоту: выше, ниже, глиссандо

## 7 Постепенно увеличивайте продолжительность

### ДОЗИРОВКА

3-5 минут, несколько раз в день.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Вибрация в «маске» — показатель правильного резонанса
- Если вибрация ощущается в горле — голос слишком «зажат». Расслабьте челюсть и ищите звук выше
- Отличная подготовка к речи и пению

### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Напряжённые губы и челюсть
- Вибрация в горле вместо «маски»
- Форсирование звука

*При заложенности носа — затруднено. Дождитесь выздоровления.*

## 5

## Жевательные упражнения с фонацией

6 мин

### ЦЕЛЬ

Расслабление челюстных мышц и гортани, освобождение голоса.

### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя. Челюсть расслаблена.

### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Расслабьте челюсть — рот слегка приоткрыт
- 2 Начните делать жевательные движения, как будто жуёте что-то вкусное
- 3 Одновременно начните мычать: ммммм...
- 4 Получится звук, похожий на «ням-ням-ням» с мычанием
- 5 Челюсть свободно двигается, звук мягкий, расслабленный
- 6 Продолжайте 2-3 минуты

### ДОЗИРОВКА

2-3 минуты, 3-4 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Челюсть должна быть свободной — это главное!
- Звук появляется как бы сам собой, без усилия
- Упражнение снимает зажимы артикуляционного аппарата
- Метод Фребелиуса — классика голосовой терапии

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Напряжённая челюсть (противоречит цели упражнения)
- Форсирование звука
- Слишком широкое открывание рта

6

## Зевок с фонацией

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Расширение глотки, понижение гортани, освобождение голоса.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Начните имитировать зевок — почувствуйте, как расширяется задняя часть рта
- 2 Ощутите, как мягкое нёбо поднимается, а гортань слегка опускается
- 3 На вершине «зевка» добавьте мягкий звук [а]
- 4 Звук должен быть низким, объёмным, расслабленным
- 5 Ощутите «открытое горло»
- 6 Повторите

#### ДОЗИРОВКА

5-6 раз, 3-4 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Зевок расширяет глотку и опускает гортань — это снимает напряжение

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Форсирование звука
- Напряжение в шее
- Слишком высокий звук (должен быть низким)

7

## Мягкая атака на придыхательных звуках

6 мин

#### ЦЕЛЬ

Формирование мягкого начала фонации, противоположного твёрдой атаке.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Произнесите слоги с придыхательным [х]: ха, хо, ху, хэ, хы
- 2 Начало звука — мягкое, воздушное, с лёгким придыханием
- 3 Затем постепенно уменьшайте придыхание, переходя к чистым гласным
- 4 Цель: научиться начинать звук мягко, без «удара» голосовых складок
- 5 ха а (мягко), хо о (мягко) и т.д.

#### ДОЗИРОВКА

По 5 раз каждый слог, 2-3 подхода в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Мягкое начало звука — противоположность твёрдой атаке
- Это снижает нагрузку на голосовые складки
- Особенно важно при узелках, отёке складок
- После освоения — перенести мягкую атаку в речь

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Твёрдая атака вместо мягкой
- Слишком громкий звук
- Потеря придыхания слишком рано

8

## Упражнение «Стон»

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Нахождение естественного, расслабленного звучания голоса.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или лёжа, расслабленно.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Примите удобное, расслабленное положение
- 2 Представьте, что вы очень устали
- 3 На выдохе издайте тихий стон — как при усталости или лёгком дискомфорте
- 4 Звук естественный, низкий, расслабленный
- 5 Не контролируйте звук — пусть он будет таким, какой получается
- 6 Постепенно удлиняйте стон до 10-15 секунд



#### ДОЗИРОВКА

5-6 раз, 3-4 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Полное расслабление — ключевой момент
- Звук не должен быть контролируемым — он естественный
- Это базовый звук вашего голоса без напряжения
- Упражнение помогает найти «свой» голос

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Контроль над звуком (попытка сделать его красивым)
- Напряжение в теле
- Слишком короткий стон

## 9

### Резонансная терапия

7 мин

#### ЦЕЛЬ

Перенос опоры звука с гортани на резонаторы (маску лица), освобождение гортани.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Начните мычать с закрытым ртом: ммммм...
- 2 Сфокусируйтесь на ощущении вибрации в области носа и губ
- 3 Положите пальцы на переносицу — вы должны чувствовать вибрацию
- 4 Постепенно откройте рот, переходя к звуку [а], но сохраняя ощущение вибрации в «маске»
- 5 Звук как бы «выходит через нос», хотя рот открыт
- 6 Если вибрация теряется — вернитесь к мычанию и начните сначала

#### ДОЗИРОВКА

5-7 минут, 2-3 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Перенос опоры с гортани на резонаторы — главная цель при гипертонусе
- Вибрация в «маске» — показатель успеха
- Если вибрация ощущается в горле — голос слишком «зажат»
- Метод Verdolini — резонансная голосовая терапия

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Потеря вибрации в «маске» при переходе к гласным
- Форсирование звука
- Напряжение в шее и горле

При заложенности носа — затруднено. Дождитесь выздоровления.

## 10 Самомассаж гортани

5 мин

### цель

Снятие мышечного напряжения в области гортани.

### исходное положение

Сидя, голова прямо.

### выполнение

- 1 Найдите гортань (кадык) на шее
- 2 Положите указательный и средний пальцы по бокам от гортани
- 3 Делайте лёгкие круговые движения, массируя мышцы по бокам от гортани
- 4 Движения — снизу вверх
- 5 Затем слегка смещайте гортань влево-вправо (очень мягко!)
- 6 Продолжайте 2-3 минуты

### дозировка

2-3 минуты, 2-3 раза в день.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Очень мягко! Без давления
- Можно делать самостоятельно
- Если есть боль — прекратить
- Снимает мышечное напряжение

### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком сильное давление
- Болезненные ощущения (означают, что давление слишком сильное)

При заболеваниях щитовидной железы — проконсультироваться с врачом.

# Узелки голосовых складок

6 упражнений

**Упражнения раздела:**

- Straw phonation (основное упражнение!)
- Голосовая гигиена (обязательный компонент!)
- Резонансная терапия (мычание в маску)
- Снижение громкости речи
- Мягкая атака (придыхательное начало)
- Оптимальная высота голоса

## 1

**Straw phonation (основное упражнение!)**

8 мин

**цель**

Балансировка давления, снятие нагрузки с узелков, создание условий для их регресса.

**исходное положение**

Сидя. Трубочка + стакан с водой.

**выполнение**

- 1 Налейте воду в стакан (3-5 см)
- 2 Опустите трубочку в воду
- 3 Обхватите трубочку губами
- 4 На выдохе издавайте звук через трубочку — пузырьки в воде
- 5 Пузырьки должны быть равномерными
- 6 Выполняйте 3-5 минут, меняя высоту звука
- 7 Выполняйте 4-6 раз в день — это главное упражнение при узелках!

**ДОЗИРОВКА**

**3-5 минут, 4-6 раз в день. ЭТО ГЛАВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ ПРИ УЗЕЛКАХ!**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

- Лучший метод при узелках — доказано исследованиями
- Снимает нагрузку с места образования узелков
- Пузырьки равномерные — критерий правильности
- Выполнять регулярно, много раз в день
- Можно чередовать разные диаметры трубочек

**ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ**

- Неравномерные пузырьки
- Слишком редкое выполнение
- Форсирование звука

*Нет. Самое безопасное упражнение.*

## 2

**Голосовая гигиена (обязательный компонент!)**

5 мин

**цель**

Исключение травматичного голосового поведения — без этого упражнения бесполезны!

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В течение всего дня.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 **ИСКЛЮЧИТЬ:** крик, шёпот (да, шёпот тоже травмирует!), кашель, откашливание, громкую речь
- 2 **ВВЕСТИ:** обильное питьё (8-10 стаканов воды в день)
- 3 Достаточный сон (7-8 часов)
- 4 Увлажнение воздуха (40-60%)
- 5 Не говорить на фоне шума (это заставляет повышать голос)
- 6 При першении — не откашливаться, а сделать глоток воды или сглотнуть

#### ДОЗИРОВКА

**ПОСТОЯННО. Это не упражнение, а образ жизни.**

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Без соблюдения голосовой гигиены все упражнения бесполезны!
- Шёпот травмирует связки не меньше крика — это важно знать
- Откашливание — главный враг голосовых складок
- Записать правила и повесить на видное место

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- «Забываю соблюдать» — поставьте напоминания
- «Один раз крикнул — ничего страшного» — каждый раз травмирует
- «Шёпот же тихий» — нет, шёпот травмирует!

3

### Резонансная терапия (мычание в маску)

8 мин

#### ЦЕЛЬ

*Перенос опоры звука с места узелков на резонаторы.*

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сидя или стоя.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Начните мычать: ммммм...
- 2 Сфокусируйтесь на вибрации в области носа и губ (маска лица)
- 3 Постепенно откройте рот, переходя к гласным, сохраняя вибрацию
- 4 Голос «выходит через маску», а не из горла
- 5 Если вибрация теряется — вернитесь к мычанию

6

Ключевое: голос не должен ощущаться в горле!

#### ДОЗИРОВКА

5-10 минут, 2-3 раза в день.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Перенос опоры с гортани (места узелков) на резонаторы
- Снижает нагрузку на голосовые складки
- Вибрация в маске — критерий успеха
- Если ощущение в горле — это неправильно

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Ощущение звука в горле
- Форсирование
- Потеря резонанса при переходе к гласным

4

## Снижение громкости речи

5 мин

#### ЦЕЛЬ

Уменьшение травматизации узелков за счёт снижения громкости.

#### ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В течение дня, при всей речевой деятельности.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ

- 1 Сознательно снижайте громкость речи во всех ситуациях
- 2 Говорите тихо, но НЕ ШЁПОТОМ (шёпот травмирует!)
- 3 Представьте, что вы разговариваете в библиотеке
- 4 При необходимости говорить громче — используйте микрофон
- 5 Если собеседник не слышит — подойдите ближе, не повышайте голос

#### ДОЗИРОВКА

ПОСТОЯННО.

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Громкая речь = удары голосовых складок друг о друга = травматизация узелков
- Тихая речь (не шёпот!) снижает нагрузку
- Учитесь доносить информацию без повышения голоса
- При работе, требующей громкого голоса — использовать усиление

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Переход на шёпот
- «Забываю и начинаю говорить громко»
- Попытка «перекричать» шум

## 5

## Мягкая атака (придыхательное начало)

6 мин

## цель

Исключение твёрдой атаки, которая травмирует узелки.

## исходное положение

Сидя.

## выполнение

- 1 Произносите слоги ха, хо, ху, хэ, хы
- 2 Начало — мягкое, воздушное
- 3 Постепенно уменьшайте придыхание, переходя к чистым гласным
- 4 Гласные должны начинаться мягко, без «удара»
- 5 Перенесите этот навык в речь: все слова начинаются мягко

## дозировка

По 10 раз каждый слог, 2-3 подхода в день. Затем перенос в речь.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Твёрдая атака = удар складок друг о друга = травма узелков
- Мягкая атака — противоположность, снижает травматизацию
- Особенно важно для слов, начинающихся с гласных
- Это должно стать привычкой в речи

## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Возврат к твёрдой атаке в речи
- Слишком долгое придыхание (речь становится неразборчивой)

## 6

## Оптимальная высота голоса

5 мин

## цель

Нахождение высоты голоса с минимальной нагрузкой на узелки.

## исходное положение

Сидя.

## выполнение

- 1 Мычите на разных высотах: низко, средне, высоко
- 2 Найдите высоту, на которой голос звучит наиболее свободно

- 3 Обычно это средний регистр — не слишком высокий, не слишком низкий
- 4 Запомните эту высоту — это ваша «рабочая» высота
- 5 Старайтесь говорить именно на этой высоте
- 6 Избегайте слишком высокого голоса (больше нагрузка) и слишком низкого (напряжение)

#### ДОЗИРОВКА

Определить оптимальную высоту, затем контролировать в речи — посто...

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- Неправильная высота голоса = дополнительная нагрузка на складки
- Оптимальная высота — где голос звучит легко и свободно
- Можно использовать тюнер или приложение для определения высоты
- При сомнениях — проконсультируйтесь с фониатром

#### ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Слишком высокий голос (частая ошибка при попытке «звучать выразительнее»)
- Слишком низкий (попытка «звучать солиднее»)