

**SULIT**



BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

JABATAN MATEMATIK, SAINS DAN KOMPUTER

PEPERIKSAAN AKHIR

SESI JUN 2014

**DBM1013 : ENGINEERING MATHEMATICS 1**

**TARIKH : 27 OKTOBER 2014**

**MASA : 8.30 AM - 10.30 AM (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **SEBELAS (11)** halaman bercetak.

Bahagian A: Struktur (3 soalan)

Bahagian B: Struktur (3 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**



**SECTION A: 75 MARKS**  
**BAHAGIAN A: 75 MARKAH**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **THREE (3)** structured questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

Bahagian ini mengandungi **TIGA (3)** soalan berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.

**QUESTION 1**  
**SOALAN 1**

CLO1  
C2

- (a) Simplify the following algebra expression  
*Permudahkan persamaan algebra berikut*

i.  $\frac{8x^3y^4}{2x^2y}$

[3 marks]

[3 markah]

ii.  $\frac{8a^2}{16ab}$

[2 marks]

[2 markah]

iii.  $\frac{4a^2+2a}{2a+1}$

[2 marks]

[2 markah]

iv.  $x(z-4x)+x(2z+5x)$

[3 marks]

[3 markah]



CLO2  
C3

(b) Find the value of the variable for the following quadratic equations:

*Cari nilai pembolehubah bagi persamaan kuadratik berikut:*

i.  $2x^2 + 13x + 15 = 0$  by using **Factorization**

$2x^2 + 13x + 15 = 0$  menggunakan *Kaedah Pemfaktoran*

[4 marks]

[4 markah]

ii.  $4x^2 + 5 = -9x$  by using **Completing The Square**

$4x^2 + 5 = -9x$  menggunakan *Kaedah Penyempurnaan Kuasa Dua*

[7 marks]

[7 markah]

iii.  $8 = 2x^2 - 5x$  by using **Quadratic Formula**

$8 = 2x^2 - 5x$  menggunakan *Rumus Kuadratik*

[4 marks]

[4 markah]



**QUESTION 2**  
**SOALAN 2**

CLO1  
C1

- (a) i. State the order of a matrix. [1 mark]  
*Apakah peringkat suatu matriks.* [1 markah]
- ii. List 3 types of matrices. [3 marks]  
*Senaraikan tiga jenis matriks.* [3 markah]

CLO2  
C3

- (b) Given that,  $S = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 4 & -5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  and  $T = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ . Determine:

*Diberi bahawa,  $S = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 4 & -5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  dan  $T = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ . Tentukan:*

- i.  $S - T^T$  [3 marks]  
*[3 markah]*
- ii.  $T + S^T$  [3 marks]  
*[3 markah]*



CLO2  
C3

- (c) Solve the simultaneous equation below using Inverse Matrices Method. [15 marks]

*Selesaikan persamaan serentak di bawah menggunakan Kaedah Songsangan Matrik.* [15 markah]

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 1 \\ 2x - 2y - z &= 3 \\ 2x + 2y - z &= -2 \end{aligned}$$

## QUESTION 3

## SOALAN 3

CLO1  
C2

- (a) Diagram below shows the vector  $\overrightarrow{OA} = \underline{a}$ . By using graph paper, draw the following vectors when:

*Rajah di bawah menunjukkan vektor  $\overrightarrow{OA} = \underline{a}$ . Dengan menggunakan kertas graf, lukiskan vektor yang berikut apabila:*



i.  $\overrightarrow{OP} = 2\underline{a}$

[2 marks]

ii.  $\overrightarrow{OQ} = -\frac{1}{2}\underline{a}$

[2 markah]

[2 marks]

[2 markah]

CLO2  
C2

- (b) If  $p = 2i - j + 2k$  and  $q = -3i + 2j - 4k$ , express the following in terms of  $i, j$  and  $k$ :

*Jika  $p = 2i - j + 2k$  dan  $q = -3i + 2j - 4k$ , nyatakan yang berikut dalam sebutan  $i, j$  dan  $k$ :*

i.  $p + q$

[3 marks]

[3 markah]

ii.  $2p - 3q$

[3 marks]

[3 markah]

SULIT

CLO2  
C3

(c) Given that  $A(3, -6, 7)$ ,  $B(3, 2, -3)$  and  $C(-2, 8, -8)$ . Find:  
*Diberi  $A(3, -6, 7)$ ,  $B(3, 2, -3)$  dan  $C(-2, 8, -8)$ . Dapatkan:*

i.  $B \times C$

[3 marks]

[3 markah]

ii.  $C \times A$

[3 marks]

[3 markah]

iii.  $A \times B$

[3 marks]

[3 markah]

iv.  $B \bullet A$

[3 marks]

[3 markah]

v.  $C \bullet B$

[3 marks]

[3 markah]





## SECTION B: 25 MARKS

## BAHAGIAN B: 25 MARKAH

## INSTRUCTION:

This section consists of **THREE (3)** structured questions. Answer **ONE (1)** question only.

## ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi **TIGA (3)** soalan berstruktur. Jawab **SATU (1)** soalan sahaja.

## QUESTION 4

## SOALAN 4

CLO1  
C3

- (a) Find the partial fractions for fractions below:

Dapatkan pecahan separa bagi pecahan dibawah:

i. 
$$\frac{5}{(x-2)(x+3)}$$

[5 marks]

[5 markah]

ii. 
$$\frac{3x}{(1-x)(1+2x)}$$

[5 marks]

[5 markah]



CLO2  
C3

- (b) Solve the following partial fractions decomposition:

Selesaikan pecahan separa bagi setiap yang berikut:

i. 
$$\frac{2-6x-3x^2}{(1+x)(1-2x)^2}$$

[7 mark]

[7 markah]

ii. 
$$\frac{2x^2+1}{x^3+2x^2+x}$$

[8 marks]

[8 markah]

## QUESTION 5

## SOALAN 5

CLO 1  
C3

- a) Based on the Diagram 5(a), find the following values :


*Merujuk kepada Rajah 5(a), cari nilai yang berikut :*

Diagram 5(a)

*Rajah 5(a)*

- i. The length of AB.

*Panjang AB.*

[3 marks]

[3 markah]

- ii.
- $\sec \theta$
- .

*Sek  $\theta$ .*

[3 marks]

[3 markah]

CLO 1  
C3

- b) Find the value of
- $\sin \theta = 0.9675$
- , where
- $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$
- .

*Cari nilai untuk  $\sin \theta = 0.9675$ , dimana  $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ .*

[4 marks]

[4 markah]

CLO 2  
C3

- c) Solve the equation
- $3 \sec^2 x = 5(1 + \tan x)$
- for
- $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$
- .

*Selesaikan persamaan  $3 \sec^2 x = 5(1 + \tan x)$  untuk  $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ .*

[9 marks]

[9 markah]



CLO 2  
C3

d) Referring to Diagram 5(d), calculate:


*Merujuk kepada rajah 5(d), kirakan:*

Diagram 5(d)

Rajah 5(d)

i. Area of triangle ABC.

*Luas segitiga ABC.*

[2 marks]

[2 markah]

ii. Length of AC.

*Panjang AC.*

[4 marks]

[4 markah]

**QUESTION 6**  
**SOALAN 6**

CLO1  
C2

- a) Given  $z = 2 + 3i$  and  $w = 5 - 2i$ , solve each of the following expression and write the answer in  $(a+bi)$  form.

*Diberi  $z = 2 + 3i$  dan  $w = 5 - 2i$ , selesaikan setiap ungkapan yang berikut dan tulis jawapan dalam bentuk  $(a+bi)$ .*

i)  $z + w$

[2 marks]

[2 markah]

ii)  $w^2$

[4 marks]

[4 markah]

iii)  $zw$

[4 marks]

[4 markah]



CLO2  
C3

- b) i. Calculate  $\frac{(8+3i)}{(2<55^\circ)}$ . Hence, write the answer into polar form and exponential form.

[10 marks]

*Kirakan  $\frac{(8+3i)}{(2<55^\circ)}$ . Seterusnya, tuliskan jawapan dalam bentuk polar dan eksponen.*

[10 markah]

- ii. Using conjugate method, calculate:  
*Dengan menggunakan kaedah konjugat, kira:*

$$\frac{4+2i}{1+3i}$$

[5 marks]

[5 markah]

**SOALAN TAMAT**

# **FORMULA SHEET FOR ENGINEERING MATHEMATICS (DBM1013)**

## **QUADRATIC EQUATION**

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c = 0$$

## **FORMULA OF TRIANGLE**

**Sine Rules;**  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

**Cosine Rules;**  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

**Area of Triangle**  $= \frac{1}{2} ab \sin C$

## **MATRIX**

**Co factor**  $C = (-1)^{(i+j)} M_{ij}$

**Adjoin,**  $Adj(A) = C^T$

**Inverse of Matrix,**  $A^{-1} = \frac{1}{|A|} Adj(A)$

## **COMPLEX NUMBER**

**Modulus of**  $z = \sqrt{a^2 + b^2}$

**Argument of**  $z = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a}\right)$


**Cartesian Form;**  $z = a + bi$

**Polar Form;**  $z = r \angle \theta$

**Exponential Form;**  $z = re^{i\theta}$

## **TRIGONOMETRY**

### Pythagoras' Theorem



$$c^2 = a^2 + b^2$$

### Trigonometric Identities

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$$

## **VECTOR & SCALAR**

**Unit Vector,**  $\hat{u} = \frac{u}{|u|}$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

**Area of parallelogram ABC**  $= |\vec{AB} \times \vec{BC}|$



## **COMPOUND-ANGLE**

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

## **DOUBLE-ANGLE**

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$$

$$= 1 - 2\sin^2 A$$

$$= 2\cos^2 A - 1$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$$

100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100  
100 100 100 100 100 100  
100 100 100 100 100 100  
100 100 100 100 100 100  
100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

100