

Mathematik II für Informatik - Zusammenfassung

Jonas Milkovits

Last Edited: 2. August 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Analysis Teil I - Konvergenz und Stetigkeit	1
1.1	Die reellen Zahlen	1
1.2	Wurzeln, Fakultäten und Binomialkoeffizienten	2
1.3	Konvergenz von Folgen	2
1.3.1	Der Konvergenzbegriff und wichtige Beispiele	2
1.3.2	Konvergenzkriterien	4
1.3.3	Teilfolgen und Häufungswerte	5
1.4	Asymptotik	5
1.5	Reihen	6
1.5.1	Absolute Konvergenz	7
1.5.2	Das Cauchy-Produkt	8
1.6	Konvergenz in normierten Räumen	8
1.7	Stetigkeit reeller Funktionen	10
1.7.1	Der Grenzwertbegriff für Funktionen	10
1.7.2	Stetigkeit	12
1.7.3	Eigenschaften stetiger Funktionen	13
1.8	Stetigkeit von Funktionen mehrerer Variablen	13
1.9	Potenzreihen	14
1.10	Wichtige Funktionen	15
1.10.1	Exponentialfunktion und Logarithmus	15
1.10.2	Trigonometrische Funktionen	16
1.10.3	Die Polardarstellung komplexer Zahlen	17
1.10.4	Hyperbolische Funktionen	18
2	Analysis - Teil II: Differential- und Integralrechnung	18
2.1	Differenzierbarkeit von Funktionen in einer Variablen	18
2.1.1	Der Ableitungsbegriff	18

1 Analysis Teil I - Konvergenz und Stetigkeit

1.1 Die reellen Zahlen

Definitionen

5.1.1	Die Menge der reellen Zahlen ist der kleinste angeordnete Körper, der \mathbb{Z} enthält und das Vollständigkeitsaxiom " <i>Jede nichtleere Teilmenge, die eine obere Schranke besitzt, hat ein Supremum.</i> " erfüllt.
5.1.3	Eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ heißt: a) nach oben (unten) beschränkt , wenn sie eine obere (untere) Schranke besitzt. b) beschränkt , wenn sie nach oben und unten beschränkt ist.
5.1.5	Die Funktion $ \cdot : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $ x = \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases}$ heißt Betragsfunktion und $ x $ heißt Betrag von x .
5.1.8	Intervalle: Es seien zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ gegeben. Dann heißen: <ul style="list-style-type: none">• $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ offenes Intervall• $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ abgeschlossenes Intervall• $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ halboffenes Intervall• $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ halboffenes Intervall Halbstrahlen: <ul style="list-style-type: none">• $[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$• $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$• $(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$• $(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$• $(-\infty, \infty) := \mathbb{R}$

Sätze

5.1.4	Jede nach unten beschränkte, nichtleere Teilmenge von \mathbb{R} besitzt ein Infimum. (Umkehrung Vollständigkeitsaxiom)
5.1.6	Rechenregeln Betragsfunktion: Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: <ul style="list-style-type: none">a) $x \geq 0$b) $x = -x$c) $\pm x \leq x$d) $xy = x \cdot y$e) $x = 0$ genau dann, wenn $x = 0$f) $x + y \leq x + y$ (Dreiecksungleichung)

Bemerkungen

	Ein Körper mit Totalordnung \leq heißt angeordneter Körper , falls gilt: <ul style="list-style-type: none">• $\forall a, b, c \in K : a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$• $\forall a, b, c \in K : (a \leq b \text{ und } 0 \leq c) \Rightarrow ac \leq bc$
--	---

1.2 Wurzeln, Fakultäten und Binomialkoeffizienten

Definitionen

Ganzzahlige Potenzen:	
Für jedes $x \in \mathbb{R}$ und jedes $n \in \mathbb{N}^*$ ist	
5.2.1	a) $x^n := x \cdot x \cdot x \dots \cdot x$ (n -mal x) b) $x^{-n} := \frac{1}{x^n}$, falls $x \neq 0$ c) $x^0 := 1$
5.2.3	Es seien $a \in \mathbb{R}_+$ und $n \in \mathbb{N}^*$. Die eindeutige Zahl $x^n \in \mathbb{R}_+$ mit $x^n = a$ heißt n -te Wurzel von a und man schreibt $x = \sqrt[n]{a}$. Für den wichtigsten Fall $n = 2$ gibt es die Konvention $\sqrt{a} := \sqrt[2]{a}$.
Aus der Eindeutigkeit der n -ten Wurzel (5.2.4) folgt:	
5.2.5	Für jedes $x \in \mathbb{R}_+$ und jedes $q = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$ mit $n \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}^*$ ist die rationale Potenz definiert durch: $x^q = x^{\frac{n}{m}} := (\sqrt[m]{x})^n.$
Es sei $n \in \mathbb{N}^*$. Dann wird die Zahl $n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ als n Fakultät bezeichnet.	
5.2.7	Weiterhin definieren wir $0! := 1$. Es seien $n, k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$. Dann heißt $\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$ Binomialkoeffizient " n über k ".

Sätze

5.2.2	Existenz der Wurzel: Für jedes $a \in \mathbb{R}_+$ und alle $n \in \mathbb{N}^*$ gibt es genau ein $w \in \mathbb{R}_+$ mit $x^n = a$.
5.2.4	Es seien $q \in \mathbb{Q}$ und $m, n, r \in \mathbb{Z}$, sowie $n, r \in \mathbb{N}^*$ so, dass $q = \frac{m}{n} = \frac{p}{r}$. Dann gilt für jedes $x \in \mathbb{R}_+$: $(\sqrt[n]{x})^m = (\sqrt[r]{x})^p$.
Es seien $n, k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$ und $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt:	
5.2.9	a) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ und $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ b) $a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{k=0}^n a^{n-k} b^k$ c) $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ (Binomialformel)

Bemerkungen

Rechenregeln für Potenzen (auch rational)	
$\forall x, y \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ und $\forall p, q \in \mathbb{Q}$ gilt:	
5.2.6	<ul style="list-style-type: none">• $x^p x^q = x^{p+q}$• $x^p y^p = (xy)^p$• $(x^p)^q = x^{pq}$• $\frac{x^p}{x^q} = x^{p-q}$• $\frac{x^p}{y^p} = \left(\frac{x}{y}\right)^p$
Fakultät und Binomialkoeffizient	
5.2.8	$n!$ ist die Anzahl der möglichen Reihenfolgen von n unterschiedlichen Dingen. $\binom{n}{k}$ ist die Anzahl der Möglichkeiten aus n unterscheidbaren Dingen genau k auszuwählen.
Zugriff auf Binomialkoeffizienten für binomische Formeln durch Pascal'sches Dreieck	

1.3 Konvergenz von Folgen

1.3.1 Der Konvergenzbegriff und wichtige Beispiele

Definitionen

	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} und $a \in \mathbb{K}$. Die Folge (a_n) heißt konvergent gegen a , falls für jedes $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert mit
5.3.1	$ a_n - a < \epsilon \text{ für alle } n \geq n_0.$ <p>In diesem Fall heißt a der Grenzwert oder Limes von (a_n) und wir schreiben:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ oder } a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty).$ <p>Ist (a_n) eine Folge \mathbb{K}, die gegen kein $a \in \mathbb{K}$ konvergiert, so heißt diese divergent.</p>
5.3.4	<p>Eine Folge (a_n) in \mathbb{K} heißt beschränkt, wenn die Menge $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ beschränkt in \mathbb{K} ist.</p> <p>Ist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, so setzen wir weiter</p> $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n := \sup_{n=0}^{\infty} a_n := \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ $\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n := \inf_{n=0}^{\infty} a_n := \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$
5.3.13	<p>Bestimmte Divergenz:</p> <p>Eine Folge (a_n) in \mathbb{R} divergiert bestimmt nach $\infty(-\infty)$ und wir schreiben $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty(-\infty)$, wenn es für jedes $C \geq 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $a_n \geq C(a_n \leq -C)$ für alle $n \leq n_0$ gilt.</p>

Sätze

5.3.5	<p>Jede konvergente Folge in \mathbb{K} ist beschränkt.</p> <p>Die Umkehrung dieses Satzes ist falsch. Es gibt beschränkte Folgen, die nicht konvergieren.</p>
5.3.7	<p>Grenzwertsätze</p> <p>Es seien $(a_n), (b_n)$ und (c_n) Folgen in \mathbb{K}. Dann gilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ Gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ so gilt: <ol style="list-style-type: none"> $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n) = \alpha a$ für alle $\alpha \in \mathbb{K}$ Ist zusätzlich $b_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $b \neq 0$, so ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ <p>Ist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, so gilt außerdem:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ist $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ sowie $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, so folgt $a \leq b$ Ist $a_n \leq c_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und sind (a_n) und (b_n) konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, so ist auf die Folge (c_n) konvergent und es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$ <p>(Sandwich-Theorem)</p>

Bemerkungen

	<p>Sei X eine Menge. Eine Folge in X ist eine Abbildung $a : \mathbb{N} \rightarrow X$.</p> <p>(Für $X = \mathbb{R}$ reelle Folge, $X = \mathbb{C}$ komplexe Folge)</p> <p>Schreibweise: a_n statt $a(n)$. (n-tes Folgeglied)</p> <p>Ganze Folge: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oder (a_n) oder $(a_n)_{n > 0}$</p>
	Folgen haben maximal einen (eindeutigen) Grenzwert
	Bezeichnung von Folgen, für die der Grenzwert 0 ist: "Nullfolge"
5.3.7	c) ist falsch mit $<$, nur richtig mit \leq
5.3.10	<p>Wichtige konvergente Folgen</p> <ol style="list-style-type: none"> Ist (a_n) eine konvergente Folge in \mathbb{R} mit Grenzwert a und gilt $a \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ so ist für jedes $p \in \mathbb{N}^*$ auch $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[p]{a_n} = \sqrt[p]{a}$. Die Folge $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $q \in \mathbb{R}$ konvergiert genau dann, wenn $q \in (-1, 1]$ ist und es gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 1 & \text{falls } q = 1 \\ 0 & \text{falls } -1 < q < 1 \end{cases}$ <p>Ist $q \in \mathbb{C}$ mit $q < 1$, so gilt ebenfalls $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[p]{c} = 1$ für jedes $c \in \mathbb{R}_+$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n := e$ ($n \geq 1$). <p>Beachte hier: Beide n gleichzeitig wachsen lassen, keine trägen oder eiligere n.</p>

Beispiele

5.3.1	<p>Folge $(a_n) = (\frac{1}{n})_{n \geq 1} = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ Sei $\epsilon > 0$. Dann $\frac{1}{\epsilon} < n_0$ für ein $n_0 \in \mathbb{N}$ (beliebiges n immer größer). Für alle $n \geq n_0$ gilt dann: $a_n - a = a_n - 0 = a_n = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \epsilon$ \Rightarrow Konvergenz gegen 0</p>
5.3.9	<p>Sei $p \in \mathbb{N}^*$ fest gewählt und $a_n = \frac{1}{n^p}$ für $n \in \mathbb{N}^*$. Dann gilt für alle $n \in \mathbb{N}^*$ die Ungleichung $n \leq n^p$ und damit $0 \leq a_n = \frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{n}.$ Da sowohl die Folge, die konstant Null ist, als auch die Folge $\frac{1}{n}$ gegen Null konvergiert, ist damit nach Satz 5.3.7(d) auch die Folge (a_n) konvergent und ebenfalls eine Nullfolge.</p>
5.3.9	<p>Wir untersuchen $a_n = \frac{n^2+2n+3}{n^2+3}, n \in \mathbb{N}.$ Dazu kürzen wir durch Bruch durch die höchste auftretende Potenz: $a_n = \frac{n^2+2n+3}{n^2+3} = \frac{1+\frac{2}{n}+\frac{3}{n^2}}{1+\frac{3}{n^2}} \rightarrow \frac{1+0+0}{1+0} = 1 \quad (n \rightarrow \infty).$ Dieses Verfahren ist bei allen Polynom in n geteilt durch Polynom in n gut anwendbar.</p>
5.3.12	<p>$a_n := \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$, $n \in \mathbb{N}$ (Differenz von zwei divergenten Folgen) Trick: Erweiterung mit der Summe von Wurzeln bei Differenzen von Wurzeln $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{n}}$ Sandwich: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.</p>
5.3.12	<p>Geometrische Summenformel: $a_n := \sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n, n \in \mathbb{N}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{1-q}, q < 1.$</p>

1.3.2 Konvergenzkriterien

Definitionen

5.3.14	<p>Eine reelle Folge (a_n) heißt:</p> <ol style="list-style-type: none"> monoton wachsend, wenn $a_{n+1} \geq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. monoton fallend, wenn $a_{n+1} \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. monoton, wenn sie monoton wachsend oder monoton fallend ist.
5.3.18	<p>Folge (a_n) in \mathbb{K} heißt Cauchy-Folge, wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein Index $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $a_n - a_m < \epsilon, \text{ für alle } n, m \geq n_0$</p>

Sätze

5.3.15	<p>Monotonie Kriterium Ist die reelle Folge (a_n) nach oben (nach unten) beschränkt und monoton wachsend (fallend), so ist (a_n) konvergent und es gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n \quad (\text{bzw. } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n)$</p>
5.3.19	<p>Jede konvergente Folge in \mathbb{K} ist eine Cauchy-Folge.</p>
5.3.20	<p>Cauchy-Kriterium Eine Folge in \mathbb{K} konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.</p>

Bemerkungen

	<p>Monotonieverhalten, deswegen hier nur in \mathbb{R} und nicht in \mathbb{C} (keine Ordnung)</p>
	<p>Beide hier gesehenen Konvergenzkriterien funktionieren ohne vorherige Behauptung über den Grenzwert</p>

Beispiele

	Betrachtung einer rekursiv definierten Folge
	$a_0 := \sqrt[3]{6} \text{ und } a_{n+1} = \sqrt[3]{6 + a_n}, n \in \mathbb{N}$
5.3.16	Damit folgt: $a_1 = \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{6}}, a_2 = \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{6}}}$ Solche Folgen entstehen oft bei iterativen Näherungsverfahren. Behauptung: (a_n) nach oben beschränkt und monoton wachsend \Rightarrow Konvergenz Beweis: Induktion

1.3.3 Teilfolgen und Häufungswerte

Definitionen

5.3.22	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} . Ein $a \in \mathbb{K}$ heißt Häufungswert der Folge, falls für jedes $\epsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N} : a_n - a < \epsilon\}$ unendlich viele Elemente hat.
5.3.23	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} . Ist $\{n_1, n_2, n_3, \dots\} \subseteq \mathbb{N}$ eine unendliche Menge von Indizes mit $n_1 < n_2 < n_3 \dots$, so heißt die Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ eine Teilfolge von (a_n) .

Sätze

	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} . Dann gilt
5.3.24	a) Ein $\alpha \in \mathbb{K}$ ist genau dann ein Häufungswert von (a_n) , wenn eine Teilfolge (a_{n_k}) von (a_n) existiert, die gegen α konvergiert. b) Ist (a_n) konvergenz mit Grenzwert α , so konvergiert auch jede Teilfolge von (a_n) gegen α . c) Ist (a_n) konvergenz, so hat (a_n) genau einen Häufungswert, nämlich den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Bemerkungen

	Jeder Grenzwert ist auch Häufungswert.
	Häufungswert von $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$: 1, -1 (aber keine Grenzwerte)
	Häufungswert von (i^n) : 1, i, -1, -i
	Keine Teilfolgen: $(a_0, a_0, a_2, a_2, \dots)$ (keine doppelten Elemente) (a_2, a_3, a_0, \dots) (nicht umsordieren)

1.4 Asymptotik

Definitionen

	a) Wir bezeichnen mit $F_+ := \{(a_n) \text{ Folge in } \mathbb{R} : a_n > 0 \text{ für alle } n \in \mathbb{N}\}$ b) Es sei $(b_n) \in F_+$. Dann definieren wir die Landau-Symbole durch
5.4.1	<ul style="list-style-type: none">$O(b_n) := \{(a_n) \in F_+ : \frac{a_n}{b_n} \text{ beschränkt}\}$ (b_n größer gleich a_n)$o(b_n) := \{(a_n) \in F_+ : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0\}$ (b_n echt größer als a_n)

Sätze

Es seien $(a_n), (b_n), (c_n), (d_n) \in \mathbb{F}_+$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$. Dann gilt:

- 5.4.5
- a) Sind $a_n, b_n \in O(c_n)$, so ist auch $\alpha a_n + \beta b_n \in O(c_n)$
 - b) Gilt $a_n \in O(b_n)$ und $c_n \in O(d_n)$, so ist $a_n c_n \in O(b_n d_n)$
 - c) Aus $a_n \in O(b_n)$ und $b_n \in O(c_n)$ folgt $a_n \in O(c_n)$
 - d) $a_n \in O(b_n)$ genau dann, wenn $\frac{1}{b_n} \in O(\frac{1}{a_n})$
 - e) Diese Aussagen gelten auch alle mit Klein-O anstatt Groß-O
-

Bemerkungen

- 5.4.2
- a) \asymp -Zeichen wird hier nicht bekannten mathematischen Sinne verwendet
 \Rightarrow Kompromiss Notation $a_n \in O(b_n)$
 - b) Es gilt immer $o(b_n) \subseteq O(b_n)$.
 - c) $(\frac{a_n}{b_n})_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent $\Rightarrow a_n \in O(b_n)$
 - d) $a_n \in O(b_n)$: Folge a_n wächst höchstens so schnell wie ein Vielfaches von b_n
-

Exponentielle Algorithmen sind viel schlechter als polynomiale.

Landau-Symbol	Bezeichnung	Bemerkung
$O(1)$	beschränkt	
$O(\log_a(n))$	logarithmisch	$a > 1$
$O(n)$	linear	
$O(n \log_a(n))$	„n log n“	$a > 1$
$O(n^2)$	quadratisch	
$O(n^3)$	kubisch	
$O(n^k)$	polynomial	$k \in \mathbb{N}^*$
$O(a^n)$	exponentiell	$a > 1$

1.5 Reihen

Definitionen

- Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} . Dann heißt
- $$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$
- die **Reihe** über (a_n) .
- 5.5.1 Für jedes $k \in \mathbb{N}$ heißt dann $s_k = \sum_{n=0}^k a_n$ die k -te Teilsumme oder **Partialsumme** der Reihe. Ist die Folge $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ konvergent, so nennen wir die Reihe **konvergent** mit dem Reihenwert:
- $$\sum_{n=0}^{\infty} a_n := \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k a_n$$
- Ist (s_k) divergent, so nennen wir auch die Reihe divergent.
-

Sätze

5.5.3	Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ zwei konvergente Reihen in \mathbb{K} und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Dann ist auch $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ konvergent und es gilt $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
5.5.4	Es gilt $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$.
5.5.5	Ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine konvergente Reihe in \mathbb{K} , so ist (a_n) eine Nullfolge in \mathbb{K} .
5.5.6	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} und $s_k := \sum_{n=0}^k a_n$, $k \in \mathbb{N}$ Dann gilt:
	a) Monotonie Kriterium Ist $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ nach oben beschränkt, so ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergent.
	b) Cauchy-Kriterium Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist genau dann konvergent, wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert mit $ \sum_{n=l+1}^k a_n < \epsilon \text{ für alle } k, l \in \mathbb{N} \text{ mit } k > l \geq n_0.$
5.5.7	Leibniz-Kriterium Es sei (a_n) eine monoton fallende Folge in \mathbb{R} mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Dann ist die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ konvergent.

Bemerkungen

5.5.5	Gilt nicht umgekehrt. Nullfolge ist eine Voraussetzung für eine konvergente Reihe, aber keine Garantie.
-------	---

Beispiele

Reihen:

- $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, $|q| < 1$ (*Geometrische Reihe*)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \text{divergent}$ (*Harmonische Reihe*)
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1} = \ln(2)$ (*alternierende harmonische Reihe*) (Leibniz-Kriterium)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$: konvergent, wenn $\alpha > 1$, sonst divergent

1.5.1 Absolute Konvergenz

Definitionen

5.5.9	Eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in \mathbb{K} heißt absolut konvergent , wenn die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n $ in \mathbb{K} konvergiert. (Summanden werden schnell genug klein, vorzeichenunabhängig)
-------	---

Sätze

5.5.10	Jede absolut konvergente Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in \mathbb{K} ist auch konvergent in \mathbb{K} und es gilt die verallgemeinerte Dreiecksungleichung
	$ \sum_{n=0}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} a_n $
5.5.12	Es seien (a_n) und (b_n) reelle Folgen und $n_o \in \mathbb{N}$. <ul style="list-style-type: none"> • Majorantenkriterium Ist $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq n_o$ und konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$, so ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. • Minorantenkriterium Ist $a_n \geq b_n \geq 0$ für alle $n \geq n_o$ und divergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$, so divergiert auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.
5.5.16	Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe in \mathbb{K} . <ul style="list-style-type: none"> a) Wurzelkriterium Existiert der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n }$, so ist die Reihe <ul style="list-style-type: none"> • absolut konvergent, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } < 1$ ist • divergent, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } > 1$ ist b) Quotientenkriterium Ist $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und existiert der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, so ist die Reihe <ul style="list-style-type: none"> • absolut konvergent, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ ist • divergent, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ ist

Bemerkungen

5.5.10	Gilt nicht umgekehrt (alternierende harmonische Reihe)
5.5.10	Absolute Konvergenz: Reihenwert ist unabhängig von der Summationsreihenfolge
5.5.12	Die Vergleichsfolge heißt jeweils konvergente Majorante bzw. divergente Minorante.
5.5.16	Liefert Wurzel-/Quotientenkriterium genau Eins, kann man daraus keine Aussage ableiten

1.5.2 Das Cauchy-Produkt

Definitionen

5.5.21	Für alle $z \in \mathbb{C}$ ist $e^z := E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$.
--------	--

Sätze

5.5.19	Es seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ zwei absolut konvergente Folgen in \mathbb{K} . Dann konvergiert auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ absolut und es gilt für die Reihenwerte: $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$ Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ heißt Cauchy-Produkt der beiden Reihen.
5.5.20	Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt $E(z+w) = E(z)E(w)$.

1.6 Konvergenz in normierten Räumen

Definitionen

5.6.1	a) Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in V heißt konvergent gegen ein $a \in V$, wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $\ a_n - a\ _V < \epsilon \text{ für alle } n \geq n_0$ Die Folge heißt divergent , wenn sie nicht konvergent ist.
	b) Eine Folge heißt Cauchy-Folge , wenn es für jedes $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt mit $\ a_n - a_m\ _V < \epsilon \text{ für alle } n, m \geq n_0$
	c) Eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in V heißt konvergent mit Reihenwert $s \in V$, wenn die Folge der Partialsummen $s_k := \sum_{n=0}^k a_n$, $k \in \mathbb{N}$, in V gegen s konvergiert. Konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \ a_n\ _V$ in \mathbb{R} so heißt die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent . Ist die Reihe nicht konvergent, so nennt man sie divergent .
5.6.2	Eine Menge $M \subseteq V$ heißt beschränkt, falls es ein ≥ 0 gibt, so dass $\ x\ _V \leq C$ für alle $x \in M$ gilt.
5.6.8	a) Es seien $x_0 \in V$ und $r \in (0, \infty)$. Dann heißt die Menge $B_r(x_0) := \{x \in V : \ x - x_0\ _V < r\}$ (offene) Kugel um x_0 (Mittelpunkt) mit Radius r .
	b) Eine Menge $M \subseteq V$ heißt offen , falls es für jeden Punkt $x_0 \in M$ einen Radius $r > 0$ gibt, so dass $B_r(x_0) \subseteq M$ gilt.
	c) Eine Menge $M \subseteq V$ heißt abgeschlossen , wenn die Menge $M^c = V \setminus M$ offen ist.
	d) Es sei $M \subseteq V$. Ein Punkt $x_0 \in M$ heißt innerer Punkt von M , falls es ein $r > 0$ gibt, so dass $B_r(x_0) \subseteq M$ ist. Man nennt $M^\circ := \{x \in M : x \text{ innerer Punkt von } M\}$ das Innere von } M .
5.6.13	Ist V ein endlichdimensionaler normierter \mathbb{R} -Vektorraum, so heißt eine Teilmenge $M \subseteq V$ kompakt , wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.
5.6.15	Es sei (a_n) eine Folge in $(V, \ \cdot\ _V)$.
	a) Ein $a \in V$ heißt Häufungswert von (a_n) falls für jedes $\epsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N} : \ a_n - a\ _V < \epsilon\} = \{n \in \mathbb{N} : a_n \in B_\epsilon(a)\}$ unendlich viele Elemente hat.
	b) Ist $\{n_1, n_2, n_3, \dots\}$ eine unendliche Teilmenge von \mathbb{N} mit $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, so heißt $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ eine Teilfolge von (a_n) .
5.6.19	Ein normierter \mathbb{R} -Vektorraum $(V, \ \cdot\ _V)$ heißt vollständig , wenn jede Cauchy-Folge in V konvergiert. Ein vollständiger normierter \mathbb{R} -Vektorraum wird auch Banachraum genannt. Wird die Norm $\ \cdot\ _V$ außerdem durch ein Skalarprodukt auf V induziert, so nennt man V Hilbertraum .

Sätze

	Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((a_{n,1}, a_{n,2}, \dots, a_{n,d})^T)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in \mathbb{R} mit der 2-Norm. Dann ist (a_n) in \mathbb{R} genau dann konvergent , wenn für jedes $j \in \{1, 2, \dots, d\}$ die Koordinatenfolge $(a_{n,j})_{n \in \mathbb{N}}$ in \mathbb{R} konvergent ist. In diesem Fall ist
5.6.5	$\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} a_{n,1} \\ a_{n,2} \\ \dots \\ a_{n,d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,2} \\ \dots \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,d} \end{pmatrix}.$ <p>Falls eine Komponente im Vektor divergiert, divergiert die ganze Folge.</p>
5.6.11	Eine Teilmenge M von V ist genau dann abgeschlossen , wenn für jede Folge in M , die in V konvergiert, der Grenzwert ein Element aus M ist.
5.6.17	<p>Satz von Bolzano-Weierstraß</p> <p>Sei $(V, \ \cdot\ _V)$ ein endlichdimensionaler normierter Raum und $M \subseteq V$ kompakt. Dann besitzt jede Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M.</p>
5.6.22	<p>Banach'scher Fixpunktsatz</p> <p>Es sei $(V, \ \cdot\ _V)$ ein Banachraum $M \subseteq V$ abgeschlossen und $f : M \rightarrow M$ eine Funktion. Weiter existiere ein $q \in (0, 1)$, so dass</p> $\ f(x) - f(y)\ _V \leq q \ x - y\ _V, \text{ für alle } x, y \in M$ <p>gilt. Dann gelten die folgenden Aussagen:</p> <p>a) Es gibt genau ein $v \in M$ mit $f(v) = v$. (d.h. f hat genau einen Fixpunkt in M)</p> <p>b) Für jedes $x_0 \in M$ konvergiert die Folge (x_n) mit $x_{n+1} = f(x_n)$, $n \in \mathbb{N}$, gegen v und es gelten die folgenden Fehlerabschätzungen für jedes $n \in \mathbb{N}^*$:</p> $\ x_n - v\ _V \leq \frac{q^n}{1-q} \ x_1 - x_0\ _V \text{ (A-priori-Abschätzung)}$ $\ x_n - v\ _V \leq \frac{q}{1-q} \ x_n - x_{n-1}\ _V \text{ (A-posterior-Abschätzung)}$
Bemerkungen	
	<p>Normierter Raum: $V =$ normierter Vektorraum mit Norm $\ \cdot\ _V$ (ermöglicht Abstandsmessung)</p> <p>Hier als Vorstellung \mathbb{R}^d mit Standard(2)-Norm (normaler Abstand im Raum)</p>
5.6.1	Genau dasselbe wie vorher, wir ersetzen nur den Betrag durch die jeweilige Norm
5.6.1	Cauchy-Folge: Abstand von je zwei Folgengliedern
	2-Norm: $\ x\ _2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$
5.6.5	<p>Der Satz gilt im endlichen Raum für alle Normen.</p> <p>Wenn eine Folge bezüglich einer Norm konvergiert, dann auch bzgl jeder anderen.</p> <p>Grenzwerte bleiben gleich.</p>
5.6.8	<p>Menge abgeschlossen: Rand gehört zur Menge</p> <p>Menge offen: Rand gehört nicht zur Menge</p> <p>Die meisten Menge sind weder offen noch abgeschlossen, keine Umkehrschlüsse!</p>
5.6.17	Ist $(V, \ \cdot\ _V)$ ein endlichdimensionaler normierter Raum, so besitzt jede beschränkte Folge in V mindestens einen Häufungswert. (Unendliche viele Punkte in einer beschränkten Menge müssen irgendwo klumpen)
5.6.19	<p>Standardvektorraum \mathbb{R} ist für jedes $d \in \mathbb{N}^*$ mit jeder Norm ein Banachraum.</p> <p>Wählt man außerdem die durch das Skalarprodukt induzierte 2-Norm, so ist $(\mathbb{R}, \ \cdot\ _2)$ ein Hilbertraum.</p>

Beispiele

1.7 Stetigkeit reeller Funktionen

1.7.1 Der Grenzwertbegriff für Funktionen

Definitionen

5.6.3	$V = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, 1-Norm: $\ x\ _1 = \sum_{j=1}^3 x_j $, $a_n := (1, \frac{1}{n}, \frac{n-1}{n})^T$, $n \in \mathbb{N}^*$
	Hier gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = (1, 0, 1)^T$. Zeige: Abstand von a_n zu Grenzwert beliebig klein:
	$\ a_n - (1, 0, 1)^T\ _1 = 0 + \frac{1}{n} + \frac{n-1}{n} - 1 = \frac{2}{n}$ (Abstand geht gegen 0)
	Sei $\epsilon > 0$. Dann existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $n_0 > \frac{2}{\epsilon}$. Für alle $n \geq n_0$ gilt: $\ a_n - (1, 0, 1)^T\ _1 = \frac{2}{n} \leq \frac{2}{n_0} \leq \frac{2\epsilon}{2} = \epsilon$

5.7.1

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ eine Menge, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in \mathbb{R}$

a) Wir nennen x_0 einen **Häufungspunkt** von D , falls es eine Folge (a_n) in D mit $a_n \neq x_0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gibt, die gegen x_0 konvergiert.

b) Ist x_0 ein Häufungspunkt von D , so sagen wir, dass f für x gegen x_0 den Grenzwert y hat, wenn für jede Folge (a_n) in D , die gegen x_0 konvergiert und für die $a_n \neq x_0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, die Folge $(f(a_n))$ gegen y konvergiert.
Wir schreiben dafür: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y$.

c) Ist x_0 ein Häufungspunkt von $D_+ := \{x \in D : x > x_0\}$, so hat f für x gegen x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** y , wenn für jede Folge (a_n) in D_+ , die gegen x_0 konvergiert, die Folge $(f(a_n))$ gegen y konvergiert.
Wir schreiben dafür: $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = y$.

d) Ist x_0 ein Häufungspunkt von $D_- := \{x \in D : x < x_0\}$, so hat f für x gegen x_0 den **linksseitigen Grenzwert** y , wenn für jede Folge (a_n) in D_- , die gegen x_0 konvergiert, die Folge $(f(a_n))$ gegen y konvergiert.
Wir schreiben dafür: $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = y$.

5.7.7	Divergenz
	a) Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und x_0 ein Häufungspunkt von D . Wir schreiben $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty(-\infty)$, wenn für jedes Folge (a_n) in D , die gegen x_0 konvergiert und für die $a_n \neq x_0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, die Folge $(f(a_n))$ bestimmt gegen $\infty(-\infty)$ divergiert. b) Es sei $D \subset \mathbb{R}$ nicht nach oben (unten) beschränkt , $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $y \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$. Wir sagen $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = y$ (bzw. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y$), wenn für jede Folge (a_n) in D , die bestimmt gegen $\infty(-\infty)$ divergiert, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = y$ gilt.

Sätze

5.7.4	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in \mathbb{R}$. Existieren $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$ und sind die beiden Werte gleich so existiert auch $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und es gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x).$
-------	---

5.7.6	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und x_0 ein Häufungspunkt von D . Desweiteren seien drei Funktion $f, g, h : D \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben, so dass die Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ existieren. Dann gilt:
	a) Die Grenzwerte für x gegen x_0 von $f + g$, fg und $ f $ existieren und es gilt: • $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ • $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ • $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) $
	b) Gilt $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in D \setminus \{x_0\}$, so ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
	c) Ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ und es gilt $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ für alle $x \in D \setminus \{x_0\}$, so gilt auch $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. (Sandwich-Theorem) d) Ist $y := \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$, so existiert $\delta > 0$, so dass $ g(x) \geq \frac{ y }{2}$ für alle $x \in (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\}$ ist. Wir können also die Funktion $\frac{f}{g} : (D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\frac{f}{g}(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$ definieren. Für diese existiert dann der Limes für x gegen x_0 mit $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$

Bemerkungen

5.7.1	x_0 HP von D bedeutet, dass x_0 aus $D \setminus \{x_0\}$ annäherbar Bsp.: HP von $(0, 1]$: $[0, 1]$
5.7.4	Es gilt nicht $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Beispiele

5.7.8	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} = \infty$ $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{x} = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$
5.7.8	Exponentialfunktion: $E(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ Grenzwerte: $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

1.7.2 Stetigkeit

Definitionen

5.7.9	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt stetig in x_0 , falls für jede Folge (a_n) in D , die gegen x_0 konvergiert, auch die Folge $(f(a_n))$ konvergiert und $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0)$ gilt. Weiter heißt f stetig auf D , wenn f in jedem Punkt $x_0 \in D$ stetig ist. Schließlich setzen wir noch $C(D) := \{f : D \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ stetig auf } D\}$. (Menge aller stetigen Funktionen auf D)
5.7.18	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt a) monoton wachsend , falls für alle $x, y \in D$ gilt $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ b) monoton fallend , falls für alle $x, y \in D$ gilt $x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$ c) streng monoton wachsend , falls für alle $x, y \in D$ gilt $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$ d) streng monoton fallend , falls für alle $x, y \in D$ gilt $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$ e) (streng) monoton , wenn sie (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist
5.7.22	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Lipschitz-stetig , falls es ein $L > 0$ gibt mit $ f(x) - f(y) \leq L x - y $ für alle $x, y \in D$.

Sätze

5.7.12	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Ist $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von D , so ist f in x_0 genau dann stetig , wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ gilt.
5.7.15	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ seien stetig in $x_0 \in D$. Dann sind die Funktionen $f + g$, fg und $ f $ stetig in x_0 . Ist $x_0 \in D^* := \{x \in D : g(x) \neq 0\}$, so ist die Funktion $\frac{f}{g} : D^* \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in x_0 .
5.7.16	Es seien $D, E \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow E$, sowie $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen. Ist f stetig in $x_0 \in D$ und g stetig in $f(x_0)$, so ist $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in x_0 .
5.7.20	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 genau dann stetig , wenn es für jedes $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, so dass $ f(x) - f(y) < \epsilon$ für alle $x \in D$ mit $ x - x_0 < \delta$ gilt.
5.7.23	Ist $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz-stetig so ist f stetig auf D . Die Umkehrung dieser Aussage ist falsch. (Lipschitz-Stetigkeit ist damit ein strengerer Begriff als Stetigkeit)

Bemerkungen

5.7.9	Stetigkeit: Kleines Wackeln an Parametern \rightarrow auch nur kleines Wackeln am Funktionswert
5.7.12	Stetigkeit: Grenzübergang austauschbar mit Funktionsauswertung
5.7.15	Jede Polynomfunktion ist auf ganz \mathbb{R} stetig.
5.7.19	Exponentialfunktion ist streng monoton wachsend.
5.7.23	Lipschitz-Stetigkeit bedeutet anschaulich, dass die Steigung des Graphen beschränkt bleibt.

1.7.3 Eigenschaften stetiger Funktionen

Definitionen


5.7.27	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt beschränkt, falls die Menge $f(D)$ (Bild der Funktion) beschränkt ist, d.h. falls ein $C \geq 0$ existiert, so dass $ f(x) \leq C$ für alle $x \in D$ gilt.
--------	---

Sätze

Zwischenwertsatz

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ gegeben und $f \in C([a, b])$. Ist y_0 eine reelle Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$, so gibt es ein $x_0 \in [a, b]$ mit $f(x_0) = y_0$.

5.7.25



Nullstellensatz von Bolzano

5.7.26	Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ gegeben und $f \in C([a, b])$ erfülle $f(a)f(b) < 0$ (Existenz einer Nullstelle / Einer der beiden Werte 0). Dann gibt es ein $x_0 \in (a, b)$ mit $f(x_0) = 0$.
5.7.28	Es sei $K \subseteq \mathbb{R}$ kompakt und nicht-leer, sowie $f \in C(K)$. Dann gibt es $x_*, x^* \in K$, so dass $f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*)$ für alle $x \in K$ gilt. Insbesondere ist f beschränkt . (Jede stetige Funktion auf kompakter Menge ist beschränkt)

1.8 Stetigkeit von Funktionen mehrerer Variablen

Definitionen

Es seien V und W normierte \mathbb{R} -Vektorräume, $D \subseteq V$ und $f : D \rightarrow W$ eine Funktion.	
5.8.1	a) Wir nennen $x_0 \in D$ Häufungspunkt von D , falls es eine Folge (a_n) in D mit $a_n \neq x_0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gibt, die gegen x_0 konvergiert.
	b) Sei x_0 ein Häufungspunkt von D . Dann ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y$, falls für jede Folge (a_n) in D , die gegen x_0 konvergiert und $a_n \neq x_0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erfüllt, die Folge $(f(a_n))$ gegen y konvergiert.
Es seien V, W zwei normierte \mathbb{R} -Vektorräumen, $D \subseteq V$ und $x_0 \in D$. Eine Funktion $f : D \rightarrow W$ heißt stetig in x_0 , wenn für jede Folge (a_n) in D , die gegen x_0 konvergiert, auch die Folge $(f(a_n))$ konvergiert und $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0)$ gilt.	
5.3.8	Weiter heißt f stetig auf D , wenn f in jedem Punkt $x_0 \in D$ stetig ist. Außerdem setzen wir wieder $C(D; W) := \{f : D \rightarrow W : f \text{ stetig auf } D\}$.

Sätze

5.8.4	Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Dann ist $f : D \rightarrow \mathbb{R}^l$ genau dann in x_0 stetig , wenn alle Koordinatenfunktionen $f_1, f_2, \dots, f_p : D \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 stetig sind.
5.8.5	Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in x_0 , sowie $h : f(D) \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $f(x_0)$. Dann sind auch $f + g$, fg und $h \circ f$ als Funktionen von D nach \mathbb{R} stetig in x_0 . Ist außerdem $x_0 \in D^* := \{x \in D : g(x) \neq 0\}$, so ist auch $\frac{f}{g} : D^* \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in x_0 .
5.8.8	Es sei $K \subseteq \mathbb{R}$ kompakt und nicht-leer, sowie $f \in C(K)$. Dann gibt es $x_*, x^* \in K$, so dass $f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*) \text{ für alle } x \in K$ gilt. Insbesondere ist f beschränkt .
5.8.10	Es sei $\ \cdot\ $ irgendeine Norm auf \mathbb{R} und $\ \cdot\ _2$ die 2-Norm auf \mathbb{R} . Dann gibt es zwei Konstanten c und C mit $0 < c \leq C$, so dass $c\ x\ _2 \leq \ x\ \leq C\ x\ _2$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.
5.8.11	a) Sind $\ \cdot\ $ und $ \cdot $ zwei Normen auf \mathbb{R} , so gibt es Konstanten $0 < c \leq C$, so dass $c\ x\ \leq x \leq C\ x\ $ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt. b) Ist eine Folge (a_n) in \mathbb{R} bezüglich einer Norm konvergent, so konvergiert sie auch bezüglich jeder anderen Norm und der Grenzwert ist derselbe.

Bemerkungen

5.8.2	Hier keine links- und rechtsseitiger Grenzwerte, da es Unmengen an Richtungen gibt
5.8.11	Gilt $c\ x\ \leq x \leq C\ x\ $ so heißen die Normen $\ \cdot\ , \cdot $ äquivalent. Je zwei Normen im \mathbb{R} sind äquivalent.

1.9 Potenzreihen

Definitionen

5.9.1	Es sei (a_n) eine Folge \mathbb{K} . Eine Reihe der Form $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ heißt Potenzreihe .
5.9.4	Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe die die Voraussetzungen von 5.9.3 erfüllt und ρ wie in diesem Satz definiert. Dann heißt die Zahl: $r := \begin{cases} 0 & \text{falls in obigem Satz a) gilt} \\ \infty & \text{falls in obigem Satz b) gilt} \\ \frac{1}{\rho} & \text{falls in obigem Satz c) gilt} \end{cases}$ der Konvergenzradius der Reihe.
5.9.6	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} , $n_0 \in \mathbb{N}$ und $x_0 \in \mathbb{K}$. Dann nennt man eine Reihe der Form $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ Potenzreihe . Der Punkt x_0 wird Entwicklungspunkt der Potenzreihe genannt. (Hier ist das Konvergenzgebiet nun um x_0 statt um 0 (allgemeiner)) (Alle Sätze und Definitionen gelten hier genauso)

Sätze

Satz von Hadamard

Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} , so dass der Grenzwert $\rho := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ existiert oder die Folge $(\sqrt[n]{|a_n|})$ unbeschränkt ist. Dann gelten die folgenden Konvergenzaussagen für die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$:

- 5.9.3
- a) Ist die Folge $\sqrt[n]{|a_n|}$ unbeschränkt, so konvergiert die Potenzreihe nur für $x = 0$.
 - b) Ist $\rho = 0$, so konvergiert die Potenzreihe für alle $x \in \mathbb{K}$ absolut.
 - c) Ist $\rho \in (0, \infty)$, so ist die Potenzreihe für alle $x \in \mathbb{K}$ mit $|x| < \frac{1}{\rho}$ **absolut konvergenz** und für alle $x \in \mathbb{K}$ mit $|x| > \frac{1}{\rho}$ **divergent**.
-

Quotientenkriterium

- 5.9.10
- Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so dass $\sigma := \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ existiert. Dann gilt für den Konvergenzradius r von $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$:

$$r = \begin{cases} \frac{1}{\sigma}, & \text{falls } \sigma \in (0, \infty) \\ \infty, & \text{falls } \sigma = 0. \end{cases}$$

Cauchy-Produkt von Potenzreihen

Es seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ Potenzreihen in \mathbb{K} mit Konvergenzradien $r_1, r_2 > 0$. Dann hat die Potenzreihe

- 5.9.13
- $$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} x^n$$
- mindestens den Konvergenzradius $R := \min\{r_1, r_2\}$ und es gilt für alle $x \in \mathbb{K}$ mit $|x| < r$
- $$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right).$$
-

- 5.9.14
- Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe in \mathbb{K} mit Konvergenzradius $r > 0$. Dann ist die dadurch gegebene Funktion $f : \{x \in \mathbb{K} : |x| < r\} \rightarrow \mathbb{K}$ mit $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ stetig auf $\{x \in \mathbb{K} : |x| < r\}$.
-

Bemerkungen

Offensichtlich konvergieren alle Potenzreihen für $x = 0$.

- 5.9.3
- Keine Aussage bei $|x| = \frac{1}{\rho}$ möglich.

- 5.9.3
- Konvergenzbereich entweder $\{0\}$ oder \mathbb{K} oder Kreis in \mathbb{C} bzw. Intervall in \mathbb{R}

- 5.9.6
- Konvergenzradius nun entweder 0 , ∞ oder $r = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|})^{-1}$.

- 5.9.14
- $E : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $E(x) = e^x$ stetig auf \mathbb{C} .
Daraus folgt: $E(\mathbb{R}) = \{e^x : x \in \mathbb{R}\} = (0, \infty)$
-

Beispiele**1.10 Wichtige Funktionen****1.10.1 Exponentialfunktion und Logarithmus****Definitionen**

- 5.10.2
- Die Umkehrfunktion von $E : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ wird mit $\ln := E^{-1} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ bezeichnet und heißt **natürlicher Logarithmus**.

- 5.10.4
- Für alle $a \in (0, \infty)$ und alle $x \in \mathbb{R}$ definieren wir die **allgemeine Potenz** durch $a^x := e^{x \cdot \ln(a)}$
-

Sätze

5.10.1	Die Exponentialfunktion $E : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ist bijektiv
5.10.3	a) Die Funktion \ln ist auf $(0, \infty)$ stetig und wächst streng monoton. b) Es gilt $\ln(1) = 0$ und $\ln(e) = 1$. c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$ und $\lim_{x \rightarrow 0+} \ln(x) = -\infty$. d) Für alle $x, y \in (0, \infty)$ und $q \in \mathbb{Q}$ gilt: <ul style="list-style-type: none"> • $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$ • $\ln(\frac{x}{y}) = \ln(x) - \ln(y)$ • $\ln(x^q) = q\ln(x)$
5.10.5	Es sei $a \in (0, \infty)$. Dann ist die Funktion $x \rightarrow a^x$ stetig auf \mathbb{R} und es gelten die bekannten Rechenregeln für Potenzen wie beispielsweise $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{-1} = \frac{1}{a}$, $(a^x)^y = a^{xy}$

1.10.2 Trigonometrische Funktionen

Definitionen

5.10.6	$\sin(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, z \in \mathbb{C}$ (Sinus) $\cos(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, z \in \mathbb{C}$ (Cosinus)
5.10.9	Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ oder $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt: <ul style="list-style-type: none"> a) ungerade, falls $f(-x) = -f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ bzw. \mathbb{C} gilt. b) gerade, falls $f(-x) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ bzw. \mathbb{C} gilt. c) periodisch mit Periode $L \in \mathbb{R}$, bzw. \mathbb{C}, wenn $f(x+L) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ bzw. \mathbb{C} gilt.
5.10.14	Die Funktion $\tan : \mathbb{C} \setminus \{\frac{\pi i}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $\tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)}$ heißt Tangens .
5.10.15	$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (Arcussinus) $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ (Arcuscosinus) $\operatorname{arctan} : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (Arcustangens)

Sätze

5.10.8	Trigonometrischer Pythagoras $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$, für alle $x \in \mathbb{R}$
5.10.10	Der Cosinus ist gerade und der Sinus ist ungerade .
5.10.11	Eulersche Formel Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $e^{iz} = \cos(z) + \sin(z)i$. Insbesondere gilt für alle $x \in \mathbb{R}$ damit $\operatorname{Re}(e^{ix}) = \cos(x)$ und $\operatorname{Im}(e^{ix}) = \sin(x)$.
5.10.12	Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt a) $ \sin(x) \leq 1$ und $ \cos(x) \leq 1$ b) Additionstheoreme: $\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x)$ $\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$ c) Rechenregeln für verschobene Funktionen: $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x)$ $\sin(x + \pi) = -\sin(x)$ $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$ $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x)$ $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$ $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ Sinus und Cosinus sind periodisch mit Periode 2π
5.10.13	Es ist $\sin(z) = 0 \Leftrightarrow z = k\pi$ für ein $k \in \mathbb{Z}$ $\cos(z) = 0 \Leftrightarrow z = \frac{\pi}{2} + k\pi$ für ein $k \in \mathbb{Z}$

Bemerkungen

5.10.6

Alle Winkel in der Mathematik werden im Bogenmaß angegeben.

	0°	30°	45°	60°	90°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0

(Sin: $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$)

1.10.3 Die Polardarstellung komplexer Zahlen

Definitionen

5.10.17	Es sei $Z = x + yi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$. Dann heißt $r := \sqrt{x^2 + y^2}$ der Betrag von z und der Winkel ϕ , der zwischen z und der positiven reellen Achse eingeschlossen wird das Argument von z . Beide Werte zusammen (r, ϕ) zusammen sind die Polarkoordinaten von z .
---------	---

Sätze

5.10.19	Es seien $z = re^{i\phi}, w = se^{i\psi} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ mit Polarkoordinaten (r, ϕ) , bzw. (s, ψ) gegeben. Dann hat $z \cdot w$ die Polarkoordinaten $(rs, \phi + \psi)$ und $\frac{z}{w}$ die Polarkoordinaten $(\frac{r}{s}, \phi - \psi)$.
---------	---

Bemerkungen

5.10.17 Argument im Intervall $(-\pi, \pi]$ oder $[0, 2\pi)$ um Eindeutigkeit zu garantieren.

Argument: $(-\pi, \pi) \rightarrow$ Umrechnung von Komplex zu Polarkoordinaten

$$x = r \cos(\phi)$$

$$y = r \sin(\phi)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

5.10.18

$$\phi = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & x > 0 \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & x < 0 \text{ und } y \geq 0 \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & x < 0 \text{ und } y < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0 \text{ und } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0 \text{ und } y < 0 \end{cases}$$

Beispiele

1.10.4 Hyperbolische Funktionen

Definitionen

5.10.22 $\sinh(z) := \frac{e^z - e^{-z}}{2}, z \in \mathbb{C}$ (**Sinus hyperbolicus**)
 $\cosh(z) := \frac{e^z + e^{-z}}{2}, z \in \mathbb{C}$ (**Cosinus hyperbolicus**)
 $\tanh(z) := \frac{\sinh(z)}{\cosh(z)}, z \in \mathbb{C} \setminus \{(k\pi + \frac{\pi}{2}i : k \in \mathbb{Z})\}$ (**Tangens hyperbolicus**)

2 Analysis - Teil II: Differential- und Integralrechnung

2.1 Differenzierbarkeit von Funktionen in einer Variablen

2.1.1 Der Ableitungsbegriff

Definitionen

Für ganzes Kapitel gilt: $I \subseteq \mathbb{R}$ als Intervall.

- 6.1.1 a) Es sei $x_0 \in I$. Eine Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ heißt differenzierbar in x_0 , wenn der Grenzwert
- $$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$
- in \mathbb{R} existiert. In diesem Fall heißt dieser Grenzwert die **Ableitung** von f in x_0 und wird mit $f'(x_0)$ bezeichnet.
- b) Eine Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **differenzierbar** auf I , falls sie in allen Punkten $x_0 \in I$ differenzierbar ist. In diesem Fall wird $x \rightarrow f'(x)$ für $x \in I$ eine Funktion $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ definiert. Diese Funktion heißt die **Ableitung** oder auch **Ableitungsfunktion** von f auf I .
-

Sätze

Bemerkungen

Beispiele

5.9.2	Geometrische Reihe Konvergiert für $ x < 1$ mit $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.
5.9.2	Exponentialfunktion $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ konvergiert für alle $z \in \mathbb{C}$
5.9.5	a) $a_n = 1, \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ Dann gilt: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$, also $r = \frac{1}{\rho} = 1$. Am Rand: Für $x = 1$: $\sum_{n=0}^{\infty} 1^n$ divergent. (-1 auch divergent) Konvergenzbereich: $(-1, 1)$ b) $a_n = \frac{1}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ Konvergenzradius 1, da: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}} = 1$. Am Rand: Für $x = 1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$: divergent (harmonische Reihe) Für $x = -1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$: konvergent (alternierende harmonische Reihe) Konvergenzbereich: $[-1, 1)$
5.9.6	$a_n := \frac{(-4)^n}{n}, x_0 = 1, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n} (x-1)^n$ Es gilt: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left \frac{(-4)^n}{n}\right } = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt[n]{n}} = \frac{4}{1} = 4$ Konvergenzradius: $r = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{4}$ Konvergenz in $(1 - \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{4}) = (\frac{3}{4}, \frac{5}{4})$ Randpunkte: $x = \frac{5}{4} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n} (\frac{5}{4} - 1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n} \cdot \frac{1}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ konvergent (alt. harmonische Reihe) $x = \frac{3}{4} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n} (\frac{3}{4} - 1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n} \cdot \frac{1}{(-4)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergent (harmonische Reihe) Konvergenzgebiet: $(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}]$
5.9.11	a) $a_n = \frac{n^n}{n!}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ Quotientenkriterium: $\sigma := \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} \right = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{(n+1) \cdot (n+1)^n}{(n+1)n^n} \right = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$ Konvergenzradius: $r = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{3n}$ Achtung Falle! Wegen 3^n kein Hadamard und 5.9.10 anwendbar. Substitution $y = x^3$. $\rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} y^n$ Konvergenzradius: 2, da $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left \frac{1}{2^n}\right } = \frac{1}{2}$. Also Konvergenz für $y = x^3 \in (-2, 2)$, Divergenz außerhalb $[-2, 2]$ \rightarrow Konvergenz für $x \in (-\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$, Divergenz außerhalb $[-\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}]$ Konvergenzradius der ursprünglichen Reihe ist $\sqrt[3]{2}$.
5.9.16	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - 1 \right) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$ Konvergenzradius: Unendlich (Quotientenkriterium) \rightarrow Auf \mathbb{R} und in Null stetig Damit gilt: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^n}{(n+1)!} = 1$.
5.10.20	Wir berechnen $(1+i)^{2001}$. $(1+i)^{2001} = (\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}})^{2001} = \sqrt{2}^{2001} e^{i2001 \cdot \frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} \cdot 2^{1005} e^{i(2008+3)\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} 2^{1005} e^{i502\pi} e^{i\frac{3\pi}{4}} = 2^{1005} \cdot \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}} = 2^{1005} (-1+i) \quad (e^{i502\pi} = 1)$