

Mathematik II für Informatik - Zusammenfassung

Jonas Milkovits

Last Edited: 29. Juli 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Analysis Teil I - Konvergenz und Stetigkeit	1
1.1	Die reellen Zahlen	1
1.2	Wurzeln, Fakultäten und Binomialkoeffizienten	2
1.3	Konvergenz von Folgen	2
1.3.1	Der Konvergenzbegriff und wichtige Beispiele	2
1.3.2	Konvergenzkriterien	4
1.3.3	Teilfolgen und Häufungswerte	5
1.4	Asymptotik	5
1.5	Reihen	6
1.5.1	Absolute Konvergenz	7
1.5.2	Das Cauchy-Produkt	8
1.6	Konvergenz in normierten Räumen	8

1 Analysis Teil I - Konvergenz und Stetigkeit

1.1 Die reellen Zahlen

Definitionen

5.1.1	Die Menge der reellen Zahlen ist der kleinste angeordnete Körper, der \mathbb{Z} enthält und das Vollständigkeitsaxiom " <i>Jede nichtleere Teilmenge, die eine obere Schranke besitzt, hat ein Supremum.</i> " erfüllt.
5.1.3	Eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ heißt: a) nach oben (unten) beschränkt , wenn sie eine obere (untere) Schranke besitzt. b) beschränkt , wenn sie nach oben und unten beschränkt ist.
5.1.5	Die Funktion $ \cdot : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $ x = \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases}$ heißt Betragsfunktion und $ x $ heißt Betrag von x .
5.1.8	Intervalle: Es seien zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ gegeben. Dann heißen: <ul style="list-style-type: none">• $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ offenes Intervall• $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ abgeschlossenes Intervall• $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ halboffenes Intervall• $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ halboffenes Intervall Halbstrahlen: <ul style="list-style-type: none">• $[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$• $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$• $(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$• $(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$• $(-\infty, \infty) := \mathbb{R}$

Sätze

5.1.4	Jede nach unten beschränkte, nichtleere Teilmenge von \mathbb{R} besitzt ein Infimum. (Umkehrung Vollständigkeitsaxiom)
5.1.6	Rechenregeln Betragsfunktion: Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: a) $ x \geq 0$ b) $ x = -x $ c) $\pm x \leq x $ d) $ xy = x \cdot y $ e) $ x = 0$ genau dann, wenn $x = 0$ f) $ x + y \leq x + y $ (Dreiecksungleichung)

Bemerkungen

	Ein Körper mit Totalordnung \leq heißt angeordneter Körper , falls gilt: <ul style="list-style-type: none">• $\forall a, b, c \in K : a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$• $\forall a, b, c \in K : (a \leq b \text{ und } 0 \leq c) \Rightarrow ac \leq bc$
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Wurzeln, Fakultäten und Binomialkoeffizienten

Definitionen

Ganzzahlige Potenzen:	
Für jedes $x \in \mathbb{R}$ und jedes $n \in \mathbb{N}^*$ ist	
5.2.1	a) $x^n := x \cdot x \cdot x \dots \cdot x$ (n -mal x) b) $x^{-n} := \frac{1}{x^n}$, falls $x \neq 0$ c) $x^0 := 1$
5.2.3	Es seien $a \in \mathbb{R}_+$ und $n \in \mathbb{N}^*$. Die eindeutige Zahl $x^n \in \mathbb{R}_+$ mit $x^n = a$ heißt n -te Wurzel von a und man schreibt $x = \sqrt[n]{a}$. Für den wichtigsten Fall $n = 2$ gibt es die Konvention $\sqrt{a} := \sqrt[2]{a}$.
Aus der Eindeutigkeit der n -ten Wurzel (5.2.4) folgt:	
5.2.5	Für jedes $x \in \mathbb{R}_+$ und jedes $q = \frac{n}{m} \in \mathbb{Q}$ mit $n \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}^*$ ist die rationale Potenz definiert durch: $x^q = x^{\frac{n}{m}} := (\sqrt[m]{x})^n.$
Es sei $n \in \mathbb{N}^*$. Dann wird die Zahl $n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ als n Fakultät bezeichnet.	
5.2.7	Weiterhin definieren wir $0! := 1$. Es seien $n, k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$. Dann heißt $\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$ Binomialkoeffizient " n über k ".

Sätze

5.2.2	Existenz der Wurzel: Für jedes $a \in \mathbb{R}_+$ und alle $n \in \mathbb{N}^*$ gibt es genau ein $w \in \mathbb{R}_+$ mit $w^n = a$.
5.2.4	Es seien $q \in \mathbb{Q}$ und $m, n, r \in \mathbb{Z}$, sowie $n, r \in \mathbb{N}^*$ so, dass $q = \frac{m}{n} = \frac{p}{r}$. Dann gilt für jedes $x \in \mathbb{R}_+$: $(\sqrt[n]{x})^m = (\sqrt[r]{x})^p$.
Es seien $n, k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$ und $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt:	
5.2.9	a) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ und $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ b) $a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{k=0}^n a^{n-k} b^k$ c) $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ (Binomialformel)

Bemerkungen

Rechenregeln für Potenzen (auch rational)	
$\forall x, y \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ und $\forall p, q \in \mathbb{Q}$ gilt:	
5.2.6	<ul style="list-style-type: none">• $x^p x^q = x^{p+q}$• $x^p y^p = (xy)^p$• $(x^p)^q = x^{pq}$• $\frac{x^p}{x^q} = x^{p-q}$• $\frac{x^p}{y^p} = \left(\frac{x}{y}\right)^p$
Fakultät und Binomialkoeffizient	
5.2.8	$n!$ ist die Anzahl der möglichen Reihenfolgen von n unterschiedlichen Dingen. $\binom{n}{k}$ ist die Anzahl der Möglichkeiten aus n unterscheidbaren Dingen genau k auszuwählen.
Zugriff auf Binomialkoeffizienten für binomische Formeln durch Pascal'sches Dreieck	

1.3 Konvergenz von Folgen

1.3.1 Der Konvergenzbegriff und wichtige Beispiele

Definitionen

	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} und $a \in \mathbb{K}$. Die Folge (a_n) heißt konvergent gegen a , falls für jedes $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert mit
5.3.1	$ a_n - a < \epsilon \text{ für alle } n \geq n_0.$ <p>In diesem Fall heißt a der Grenzwert oder Limes von (a_n) und wir schreiben:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ oder } a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty).$ <p>Ist (a_n) eine Folge \mathbb{K}, die gegen kein $a \in \mathbb{K}$ konvergiert, so heißt diese divergent.</p>
5.3.4	<p>Eine Folge (a_n) in \mathbb{K} heißt beschränkt, wenn die Menge $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ beschränkt in \mathbb{K} ist.</p> <p>Ist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, so setzen wir weiter</p> $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n := \sup_{n=0}^{\infty} a_n := \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ $\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n := \inf_{n=0}^{\infty} a_n := \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$
5.3.13	<p>Bestimmte Divergenz:</p> <p>Eine Folge (a_n) in \mathbb{R} divergiert bestimmt nach $\infty(-\infty)$ und wir schreiben $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty(-\infty)$, wenn es für jedes $C \geq 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $a_n \geq C(a_n \leq -C)$ für alle $n \leq n_0$ gilt.</p>

Sätze

5.3.5	<p>Jede konvergente Folge in \mathbb{K} ist beschränkt.</p> <p>Die Umkehrung dieses Satzes ist falsch. Es gibt beschränkte Folgen, die nicht konvergieren.</p>
5.3.7	<p>Grenzwertsätze</p> <p>Es seien $(a_n), (b_n)$ und (c_n) Folgen in \mathbb{K}. Dann gilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ Gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ so gilt: <ol style="list-style-type: none"> $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n) = \alpha a$ für alle $\alpha \in \mathbb{K}$ Ist zusätzlich $b_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $b \neq 0$, so ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ <p>Ist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, so gilt außerdem:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ist $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ sowie $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, so folgt $a \leq b$ Ist $a_n \leq c_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und sind (a_n) und (b_n) konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, so ist auf die Folge (c_n) konvergent und es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$ <p>(Sandwich-Theorem)</p>

Bemerkungen

	<p>Sei X eine Menge. Eine Folge in X ist eine Abbildung $a : \mathbb{N} \rightarrow X$.</p> <p>(Für $X = \mathbb{R}$ reelle Folge, $X = \mathbb{C}$ komplexe Folge)</p> <p>Schreibweise: a_n statt $a(n)$. (n-tes Folgeglied)</p> <p>Ganze Folge: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oder (a_n) oder $(a_n)_{n > 0}$</p>
	Folgen haben maximal einen (eindeutigen) Grenzwert
	Bezeichnung von Folgen, für die der Grenzwert 0 ist: "Nullfolge"
5.3.7	c) ist falsch mit $<$, nur richtig mit \leq
5.3.10	<p>Wichtige konvergente Folgen</p> <ol style="list-style-type: none"> Ist (a_n) eine konvergente Folge in \mathbb{R} mit Grenzwert a und gilt $a \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ so ist für jedes $p \in \mathbb{N}^*$ auch $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[p]{a_n} = \sqrt[p]{a}$. Die Folge $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $q \in \mathbb{R}$ konvergiert genau dann, wenn $q \in (-1, 1]$ ist und es gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 1 & \text{falls } q = 1 \\ 0 & \text{falls } -1 < q < 1 \end{cases}$ <p>Ist $q \in \mathbb{C}$ mit $q < 1$, so gilt ebenfalls $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[p]{c} = 1$ für jedes $c \in \mathbb{R}_+$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n := e$ ($n \geq 1$). <p>Beachte hier: Beide n gleichzeitig wachsen lassen, keine trägen oder eiligere n.</p>

Beispiele

5.3.1	<p>Folge $(a_n) = (\frac{1}{n})_{n \geq 1} = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ Sei $\epsilon > 0$. Dann $\frac{1}{\epsilon} < n_0$ für ein $n_0 \in \mathbb{N}$ (beliebiges n immer größer). Für alle $n \geq n_0$ gilt dann: $a_n - a = a_n - 0 = a_n = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \epsilon$ \Rightarrow Konvergenz gegen 0</p>
5.3.9	<p>Sei $p \in \mathbb{N}^*$ fest gewählt und $a_n = \frac{1}{n^p}$ für $n \in \mathbb{N}^*$. Dann gilt für alle $n \in \mathbb{N}^*$ die Ungleichung $n \leq n^p$ und damit $0 \leq a_n = \frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{n}.$ Da sowohl die Folge, die konstant Null ist, als auch die Folge $\frac{1}{n}$ gegen Null konvergiert, ist damit nach Satz 5.3.7(d) auch die Folge (a_n) konvergent und ebenfalls eine Nullfolge.</p>
5.3.9	<p>Wir untersuchen $a_n = \frac{n^2+2n+3}{n^2+3}, n \in \mathbb{N}.$ Dazu kürzen wir durch Bruch durch die höchste auftretende Potenz: $a_n = \frac{n^2+2n+3}{n^2+3} = \frac{1+\frac{2}{n}+\frac{3}{n^2}}{1+\frac{3}{n^2}} \rightarrow \frac{1+0+0}{1+0} = 1 \quad (n \rightarrow \infty).$ Dieses Verfahren ist bei allen Polynom in n geteilt durch Polynom in n gut anwendbar.</p>
5.3.12	<p>$a_n := \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$, $n \in \mathbb{N}$ (Differenz von zwei divergenten Folgen) Trick: Erweiterung mit der Summe von Wurzeln bei Differenzen von Wurzeln $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{n}}$ Sandwich: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.</p>
5.3.12	<p>Geometrische Summenformel: $a_n := \sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n, n \in \mathbb{N}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{1-q}, q < 1.$</p>

1.3.2 Konvergenzkriterien

Definitionen

5.3.14	<p>Eine reelle Folge (a_n) heißt:</p> <ol style="list-style-type: none"> monoton wachsend, wenn $a_{n+1} \geq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. monoton fallend, wenn $a_{n+1} \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. monoton, wenn sie monoton wachsend oder monoton fallend ist.
5.3.18	<p>Folge (a_n) in \mathbb{K} heißt Cauchy-Folge, wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein Index $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $a_n - a_m < \epsilon, \text{ für alle } n, m \geq n_0$</p>

Sätze

5.3.15	<p>Monotonie Kriterium Ist die reelle Folge (a_n) nach oben (nach unten) beschränkt und monoton wachsend (fallend), so ist (a_n) konvergent und es gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n \quad (\text{bzw. } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n)$</p>
5.3.19	<p>Jede konvergente Folge in \mathbb{K} ist eine Cauchy-Folge.</p>
5.3.20	<p>Cauchy-Kriterium Eine Folge in \mathbb{K} konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.</p>

Bemerkungen

	<p>Monotonieverhalten, deswegen hier nur in \mathbb{R} und nicht in \mathbb{C} (keine Ordnung)</p>
	<p>Beide hier gesehenen Konvergenzkriterien funktionieren ohne vorherige Behauptung über den Grenzwert</p>

Beispiele

	Betrachtung einer rekursiv definierten Folge
	$a_0 := \sqrt[3]{6} \text{ und } a_{n+1} = \sqrt[3]{6 + a_n}, n \in \mathbb{N}$
5.3.16	Damit folgt: $a_1 = \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{6}}, a_2 = \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{6}}}$ Solche Folgen entstehen oft bei iterativen Näherungsverfahren. Behauptung: (a_n) nach oben beschränkt und monoton wachsend \Rightarrow Konvergenz Beweis: Induktion

1.3.3 Teilfolgen und Häufungswerte

Definitionen

5.3.22	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} . Ein $a \in \mathbb{K}$ heißt Häufungswert der Folge, falls für jedes $\epsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N} : a_n - a < \epsilon\}$ unendlich viele Elemente hat.
5.3.23	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} . Ist $\{n_1, n_2, n_3, \dots\} \subseteq \mathbb{N}$ eine unendliche Menge von Indizes mit $n_1 < n_2 < n_3 \dots$, so heißt die Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ eine Teilfolge von (a_n) .

Sätze

	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} . Dann gilt
5.3.24	a) Ein $\alpha \in \mathbb{K}$ ist genau dann ein Häufungswert von (a_n) , wenn eine Teilfolge (a_{n_k}) von (a_n) existiert, die gegen α konvergiert. b) Ist (a_n) konvergenz mit Grenzwert α , so konvergiert auch jede Teilfolge von (a_n) gegen α . c) Ist (a_n) konvergenz, so hat (a_n) genau einen Häufungswert, nämlich den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Bemerkungen

	Jeder Grenzwert ist auch Häufungswert.
	Häufungswert von $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$: 1, -1 (aber keine Grenzwerte)
	Häufungswert von (i^n) : 1, i, -1, -i
	Keine Teilfolgen: $(a_0, a_0, a_2, a_2, \dots)$ (keine doppelten Elemente) (a_2, a_3, a_0, \dots) (nicht umsortieren)

1.4 Asymptotik

Definitionen

	a) Wir bezeichnen mit $F_+ := \{(a_n) \text{ Folge in } \mathbb{R} : a_n > 0 \text{ für alle } n \in \mathbb{N}\}$ b) Es sei $(b_n) \in F_+$. Dann definieren wir die Landau-Symbole durch
5.4.1	<ul style="list-style-type: none">$O(b_n) := \{(a_n) \in F_+ : \frac{a_n}{b_n} \text{ beschränkt}\}$ (b_n größer gleich a_n)$o(b_n) := \{(a_n) \in F_+ : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0\}$ (b_n echt größer als a_n)

Sätze

Es seien $(a_n), (b_n), (c_n), (d_n) \in \mathbb{F}_+$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$. Dann gilt:

- 5.4.5
- a) Sind $a_n, b_n \in O(c_n)$, so ist auch $\alpha a_n + \beta b_n \in O(c_n)$
 - b) Gilt $a_n \in O(b_n)$ und $c_n \in O(d_n)$, so ist $a_n c_n \in O(b_n d_n)$
 - c) Aus $a_n \in O(b_n)$ und $b_n \in O(c_n)$ folgt $a_n \in O(c_n)$
 - d) $a_n \in O(b_n)$ genau dann, wenn $\frac{1}{b_n} \in O(\frac{1}{a_n})$
 - e) Diese Aussagen gelten auch alle mit Klein-O anstatt Groß-O
-

Bemerkungen

- 5.4.2
- a) \asymp -Zeichen wird hier nicht bekannten mathematischen Sinne verwendet
 \Rightarrow Kompromiss Notation $a_n \in O(b_n)$
 - b) Es gilt immer $o(b_n) \subseteq O(b_n)$.
 - c) $(\frac{a_n}{b_n})_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent $\Rightarrow a_n \in O(b_n)$
 - d) $a_n \in O(b_n)$: Folge a_n wächst höchstens so schnell wie ein Vielfaches von b_n
-

Exponentielle Algorithmen sind viel schlechter als polynomiale.

Landau-Symbol	Bezeichnung	Bemerkung
$O(1)$	beschränkt	
$O(\log_a(n))$	logarithmisch	$a > 1$
$O(n)$	linear	
$O(n \log_a(n))$	„n log n“	$a > 1$
$O(n^2)$	quadratisch	
$O(n^3)$	kubisch	
$O(n^k)$	polynomial	$k \in \mathbb{N}^*$
$O(a^n)$	exponentiell	$a > 1$

1.5 Reihen

Definitionen

- Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} . Dann heißt
- $$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$
- die **Reihe** über (a_n) .
- 5.5.1 Für jedes $k \in \mathbb{N}$ heißt dann $s_k = \sum_{n=0}^k a_n$ die k -te Teilsumme oder **Partialsumme** der Reihe. Ist die Folge $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ konvergent, so nennen wir die Reihe **konvergent** mit dem Reihenwert:
- $$\sum_{n=0}^{\infty} a_n := \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k a_n$$
- Ist (s_k) divergent, so nennen wir auch die Reihe divergent.
-

Sätze

5.5.3	Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ zwei konvergente Reihen in \mathbb{K} und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Dann ist auch $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ konvergent und es gilt $\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
5.5.4	Es gilt $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$.
5.5.5	Ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine konvergente Reihe in \mathbb{K} , so ist (a_n) eine Nullfolge in \mathbb{K} .
5.5.6	Es sei (a_n) eine Folge in \mathbb{K} und $s_k := \sum_{n=0}^k a_n$, $k \in \mathbb{N}$. Dann gilt:
	a) Monotonie Kriterium Ist $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ nach oben beschränkt, so ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergent.
	b) Cauchy-Kriterium Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist genau dann konvergent, wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert mit $ \sum_{n=l+1}^k a_n < \epsilon \text{ für alle } k, l \in \mathbb{N} \text{ mit } k > l \geq n_0.$
5.5.7	Leibniz-Kriterium Es sei (a_n) eine monoton fallende Folge in \mathbb{R} mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Dann ist die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ konvergent.

Bemerkungen

5.5.5	Gilt nicht umgekehrt. Nullfolge ist eine Voraussetzung für eine konvergente Reihe, aber keine Garantie.
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beispiele

Reihen:

- $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, $|q| < 1$ (*Geometrische Reihe*)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \text{divergent}$ (*Harmonische Reihe*)
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1} = \ln(2)$ (*alternierende harmonische Reihe*) (Leibniz-Kriterium)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$: konvergent, wenn $\alpha > 1$, sonst divergent

1.5.1 Absolute Konvergenz

Definitionen

5.5.9	Eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in \mathbb{K} heißt absolut konvergent , wenn die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n $ in \mathbb{K} konvergiert. (Summanden werden schnell genug klein, vorzeichenunabhängig)
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sätze

5.5.10	Jede absolut konvergente Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in \mathbb{K} ist auch konvergent in \mathbb{K} und es gilt die verallgemeinerte Dreiecksungleichung
	$ \sum_{n=0}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} a_n $
5.5.12	Es seien (a_n) und (b_n) reelle Folgen und $n_o \in \mathbb{N}$. <ul style="list-style-type: none"> • Majorantenkriterium Ist $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq n_o$ und konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$, so ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. • Minorantenkriterium Ist $a_n \geq b_n \geq 0$ für alle $n \geq n_o$ und divergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$, so divergiert auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.
5.5.16	Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe in \mathbb{K} . <ul style="list-style-type: none"> a) Wurzelkriterium Existiert der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n }$, so ist die Reihe <ul style="list-style-type: none"> • absolut konvergent, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } < 1$ ist • divergent, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } > 1$ ist b) Quotientenkriterium Ist $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und existiert der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, so ist die Reihe <ul style="list-style-type: none"> • absolut konvergent, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ ist • divergent, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ ist

Bemerkungen

5.5.10	Gilt nicht umgekehrt (alternierende harmonische Reihe)
5.5.10	Absolute Konvergenz: Reihenwert ist unabhängig von der Summationsreihenfolge
5.5.12	Die Vergleichsfolge heißt jeweils konvergente Majorante bzw. divergente Minorante.
5.5.16	Liefert Wurzel-/Quotientenkriterium genau Eins, kann man daraus keine Aussage ableiten

1.5.2 Das Cauchy-Produkt

Definitionen

5.5.21	Für alle $z \in \mathbb{C}$ ist $e^z := E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$.
--------	--------------------------------------------------------------------------------------

Sätze

5.5.19	Es seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ zwei absolut konvergente Folgen in \mathbb{K} . Dann konvergiert auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ absolut und es gilt für die Reihenwerte: $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = (\sum_{n=0}^{\infty} a_n) (\sum_{n=0}^{\infty} b_n)$ Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ heißt Cauchy-Produkt der beiden Reihen.
5.5.20	Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt $E(z+w) = E(z)E(w)$.

1.6 Konvergenz in normierten Räumen

Definitionen

5.6.1	a) Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in V heißt konvergent gegen ein $a \in V$, wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $\ a_n - a\ _V < \epsilon \text{ für alle } n \geq n_0$ Die Folge heißt divergent , wenn sie nicht konvergent ist.
	b) Eine Folge heißt Cauchy-Folge , wenn es für jedes $\epsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt mit $\ a_n - a_m\ _V < \epsilon \text{ für alle } n, m \geq n_0$
	c) Eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ in V heißt konvergent mit Reihenwert $s \in V$, wenn die Folge der Partialsummen $s_k := \sum_{n=0}^k a_n$, $k \in \mathbb{N}$, in V gegen s konvergiert. Konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \ a_n\ _V$ in \mathbb{R} so heißt die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent . Ist die Reihe nicht konvergent, so nennt man sie divergent .
5.6.2	Eine Menge $M \subseteq V$ heißt beschränkt, falls es ein ≥ 0 gibt, so dass $\ x\ _V \leq C$ für alle $x \in M$ gilt.
5.6.8	a) Es seien $x_0 \in V$ und $r \in (0, \infty)$. Dann heißt die Menge $B_r(x_0) := \{x \in V : \ x - x_0\ _V < r\}$ (offene) Kugel um x_0 (Mittelpunkt) mit Radius r .
	b) Eine Menge $M \subseteq V$ heißt offen , falls es für jeden Punkt $x_0 \in M$ einen Radius $r > 0$ gibt, so dass $B_r(x_0) \subseteq M$ gilt.
	c) Eine Menge $M \subseteq V$ heißt abgeschlossen , wenn die Menge $M^c = V \setminus M$ offen ist.
	d) Es sei $M \subseteq V$. Ein Punkt $x_0 \in M$ heißt innerer Punkt von M , falls es ein $r > 0$ gibt, so dass $B_r(x_0) \subseteq M$ ist. Man nennt $M^\circ := \{x \in M : x \text{ innerer Punkt von } M\}$ das Innere von } M .
5.6.13	Ist V ein endlichdimensionaler normierter \mathbb{R} -Vektorraum, so heißt eine Teilmenge $M \subseteq V$ kompakt , wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.
5.6.15	Es sei (a_n) eine Folge in $(V, \ \cdot\ _V)$.
	a) Ein $a \in V$ heißt Häufungswert von (a_n) falls für jedes $\epsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N} : \ a_n - a\ _V < \epsilon\} = \{n \in \mathbb{N} : a_n \in B_\epsilon(a)\}$ unendlich viele Elemente hat.
	b) Ist $\{n_1, n_2, n_3, \dots\}$ eine unendliche Teilmenge von \mathbb{N} mit $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, so heißt $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ eine Teilfolge von (a_n) .
5.6.19	Ein normierter \mathbb{R} -Vektorraum $(V, \ \cdot\ _V)$ heißt vollständig , wenn jede Cauchy-Folge in V konvergiert. Ein vollständiger normierter \mathbb{R} -Vektorraum wird auch Banachraum genannt. Wird die Norm $\ \cdot\ _V$ außerdem durch ein Skalarprodukt auf V induziert, so nennt man V Hilbertraum .

Sätze

	Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((a_{n,1}, a_{n,2}, \dots, a_{n,d})^T)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in \mathbb{R} mit der 2-Norm. Dann ist (a_n) in \mathbb{R} genau dann konvergent , wenn für jedes $j \in \{1, 2, \dots, d\}$ die Koordinatenfolge $(a_{n,j})_{n \in \mathbb{N}}$ in \mathbb{R} konvergent ist. In diesem Fall ist
5.6.5	$\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} a_{n,1} \\ a_{n,2} \\ \dots \\ a_{n,d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,2} \\ \dots \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,d} \end{pmatrix}.$ <p>Falls eine Komponente im Vektor divergiert, divergiert die ganze Folge.</p>
5.6.11	Eine Teilmenge M von V ist genau dann abgeschlossen , wenn für jede Folge in M , die in V konvergiert, der Grenzwert ein Element aus M ist.
5.6.17	<p>Satz von Bolzano-Weierstraß</p> <p>Sei $(V, \ \cdot\ _V)$ ein endlichdimensionaler normierter Raum und $M \subseteq V$ kompakt. Dann besitzt jede Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M.</p>
5.6.22	<p>Banach'scher Fixpunktsatz</p> <p>Es sei $(V, \ \cdot\ _V)$ ein Banachraum $M \subseteq V$ abgeschlossen und $f : M \rightarrow M$ eine Funktion. Weiter existiere ein $q \in (0, 1)$, so dass</p> $\ f(x) - f(y)\ _V \leq q \ x - y\ _V, \text{ für alle } x, y \in M$ <p>gilt. Dann gelten die folgenden Aussagen:</p> <p>a) Es gibt genau ein $v \in M$ mit $f(v) = v$. (d.h. f hat genau einen Fixpunkt in M)</p> <p>b) Für jedes $x_0 \in M$ konvergiert die Folge (x_n) mit $x_{n+1} = f(x_n)$, $n \in \mathbb{N}$, gegen v und es gelten die folgenden Fehlerabschätzungen für jedes $n \in \mathbb{N}^*$:</p> $\ x_n - v\ _V \leq \frac{q^n}{1-q} \ x_1 - x_0\ _V \text{ (A-priori-Abschätzung)}$ $\ x_n - v\ _V \leq \frac{q}{1-q} \ x_n - x_{n-1}\ _V \text{ (A-posterior-Abschätzung)}$
Bemerkungen	
	<p>Normierter Raum: $V =$ normierter Vektorraum mit Norm $\ \cdot\ _V$ (ermöglicht Abstandsmessung)</p> <p>Hier als Vorstellung \mathbb{R}^d mit Standard(2)-Norm (normaler Abstand im Raum)</p>
5.6.1	Genau dasselbe wie vorher, wir ersetzen nur den Betrag durch die jeweilige Norm
5.6.1	Cauchy-Folge: Abstand von je zwei Folgengliedern
	2-Norm: $\ x\ _2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$
5.6.5	<p>Der Satz gilt im endlichen Raum für alle Normen.</p> <p>Wenn eine Folge bezüglich einer Norm konvergiert, dann auch bzgl jeder anderen.</p> <p>Grenzwerte bleiben gleich.</p>
5.6.8	<p>Menge abgeschlossen: Rand gehört zur Menge</p> <p>Menge offen: Rand gehört nicht zur Menge</p> <p>Die meisten Menge sind weder offen noch abgeschlossen, keine Umkehrschlüsse!</p>
5.6.17	Ist $(V, \ \cdot\ _V)$ ein endlichdimensionaler normierter Raum, so besitzt jede beschränkte Folge in V mindestens einen Häufungswert. (Unendliche viele Punkte in einer beschränkten Menge müssen irgendwo klumpen)
5.6.19	<p>Standardvektorraum \mathbb{R} ist für jedes $d \in \mathbb{N}^*$ mit jeder Norm ein Banachraum.</p> <p>Wählt man außerdem die durch das Skalarprodukt induzierte 2-Norm, so ist $(\mathbb{R}, \ \cdot\ _2)$ ein Hilbertraum.</p>

Beispiele

5.6.3 $V = \mathbb{R}^{\#}$, 1-Norm: $\|x\|_1 = \sum_{j=1}^3 |x_j|$, $a_n := (1, \frac{1}{n}, \frac{n-1}{n})^T$, $n \in \mathbb{N}^*$
 Hier gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = (1, 0, 1)^T$. Zeige: Abstand von a_n zu Grenzwert beliebig klein:
 $\|a_n - (1, 0, 1)^T\|_1 = |0| + |\frac{1}{n}| + |\frac{n-1}{n} - 1| = \frac{2}{n}$ (Abstand geht gegen 0)
 Sei $\epsilon > 0$. Dann existiert $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $n_0 > \frac{2}{\epsilon}$. Für alle $n \geq n_0$ gilt:
 $\|a_n - (1, 0, 1)^T\|_1 = \frac{2}{n} \leq \frac{2}{n_0} \leq \frac{2\epsilon}{2} = \epsilon$
