

数理方程习题

中国语言文学系常代表办公室

2019/4/15

目录

1	调和方程	3
1.1	方程的物理背景和定解问题	3
1.1.1	内容提要	3
1.1.2	§1.1 第 5(4) 题	4
1.1.3	§1.1 第 6 题	6
1.2	调和函数的基本性质及应用	7
1.2.1	§1.2 第 9 题	7
1.2.2	§1.2 第 10 题	8
1.2.3	§1.2 第 11 题	8
1.3	极值原理及其应用	9
1.3.1	§1.3 第 2 题	9
1.3.2	§1.3 第 4 题	10
1.3.3	§1.3 第 6 题	12
1.3.4	§1.3 第 7 题	12
1.4	格林函数法	13
1.4.1	§1.4 第 2 题	13
1.4.2	§1.4 第 3 题	15
1.4.3	§1.4 第 6 题	16
1.4.4	§1.4 第 9 题	17
1.4.5	§1.4 第 10 题	18
1.4.6	§1.4 第 11 题	19
1.4.7	§1.4 第 12 题	19
1.4.8	§1.4 第 13 题	19

1 调和方程

1.1 方程的物理背景和定解问题

1.1.1 内容提要

- 这门课研究什么？
 1. 解方程 – 但是方程大多数时候没有显式解
 2. 解的性质: 适定性 (存在性、唯一性、稳定性)
 3. 定解问题和定解条件: 三类条件 Dirichlet, Neumann, Robin
- 调和函数 (满足 Laplace 方程, 齐次 Poisson 方程): $-\Delta u = 0$,
Poisson 方程: $-\Delta u = f$.
三类边值条件.
外问题 (通常需要给出 $|x| \rightarrow \infty$ 时的边界条件, 否则解可能不唯一).
- 变分原理: 调和函数 \leftrightarrow 能量最 (极) 小元

例:

$$E(u) = \inf_{v \in U} E(v), \quad E(v) := \int_{\Omega} \frac{1}{2} |\nabla v|^2 dx$$

- 背景知识
 1. Green 公式 (分部积分) 微积分基本定理

$$\int_a^b f' dx = f(b) - f(a)$$

分部积分公式

$$\int_a^b f' g dx = f g \Big|_a^b - \int_a^b f g' dx$$

高维时 (若 Ω 光滑)

$$\begin{cases} \int_{\Omega} f_{x_i} dx = \int_{\partial\Omega} f \cdot \nu_i dS, & \nu = (\nu_1, \dots, \nu_n) \text{ 为外法向} \\ \int_{\Omega} f_{x_i} g dx = \int_{\partial\Omega} f g \nu_i dS - \int_{\Omega} f g_{x_i} dx \end{cases}$$

或者写成以下形式

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \Delta f \cdot g dx &= - \int_{\Omega} \nabla f \cdot \nabla g dx + \int_{\partial\Omega} g \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS \\ &= \int_{\Omega} f \Delta g dx - \int_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} dS + \int_{\partial\Omega} g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS \end{aligned}$$

2. 常用引理: 若 $f \in C(\Omega)$ 且 $\int_{\Omega} f \varphi dx \equiv 0, \forall \varphi \in C(\Omega)$, 则 $f \equiv 0$.
3. 常用公式: $r = |y|, y \in \mathbb{R}^n$ 则 $\nabla r = \frac{y}{r}$, 且 $\Delta \frac{1}{|y|^{n-2}} = \Delta \frac{1}{r^{n-2}} = 0 (\forall n \geq 3)$, 而 $n = 2$ 时有 $\Delta \ln |r| = 0$.
4. 场论中的常用符号及计算

(a) 若 $\mathbf{f} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$,

$$\operatorname{curl} \mathbf{f} = \nabla \times \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{f} = \partial_1 P + \partial_2 Q + \partial_3 R$$

- (b) $\operatorname{div}, \operatorname{curl}$ 都是线性的
- (c) $\nabla \cdot (f\mathbf{a}) = f \cdot (\nabla \cdot \mathbf{a}) + \nabla f \cdot \mathbf{a}$
- (d) $\nabla \times (f\mathbf{a}) = f \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) + \nabla f \times \mathbf{a}$
- (e) $\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b}(\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a}(\nabla \times \mathbf{b})$
- (f) $\nabla \times (\nabla f) = (\nabla \times \nabla)f = 0$ 即: 梯度无旋
- (g) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0$ 即: 旋度零散
5. (习题 §1.1 第 1-2 题) Laplace 算子在 2 维极坐标 (r, θ) , 3 维球坐标 (r, θ, φ) , 3 维柱坐标 (r, θ, z) 下的表示:

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

6. (习题 §1.1 第 5 题) 若 $u(x) \in C^\infty$ 为 \mathbb{R}^n 上的调和函数, 则 $u(x)$ 在正交变换下保持调和.

Kelvin 变换:

$$v(y) = \frac{1}{|y|^{n-2}} u\left(\frac{y}{|y|^2}\right), \quad y \neq 0,$$

v 为 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的调和函数.

1.1.2 §1.1 第 5(4) 题

若 $u(x) \in C^\infty$ 为 \mathbb{R}^n 上的调和函数, 则 $u(x)$ 在正交变换下保持调和.

Kelvin 变换:

$$v(y) = \frac{1}{|y|^{n-2}} u\left(\frac{y}{|y|^2}\right), \quad y \neq 0,$$

v 为 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的调和函数.

解答:

最终要证明 $\Delta v = 0$, 也就是要把 v_{yy} 通过 u_{yy} 通过 u_{xx} 表示出来, 然后消掉得到 0.

首先, 我们做一些准备工作, 因为要用 u_{xx} 把 u_{yy} 表示出来, 所以 x 会是中间变量, 先做一些简单的整理, 方便后续工作. 记

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{y_i}{|y|^2} \\ \frac{\partial |y|^k}{\partial y_i} &= k \cdot y_i \cdot |y|^{k-2} \\ \frac{\partial x_i}{\partial y_i} &= \frac{|y|^2 - 2y_i y_i}{|y|^4} \\ \frac{\partial x_i}{\partial y_j} &= \frac{-2y_i y_j}{|y|^4}, \quad \forall i \neq j. \end{aligned}$$

利用复合函数求导性质 $u = u(x), x(y) = \frac{y}{|y|^2}$, 可以预见的是接下来会出现 $u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}$. 而 u_x 与 u_{xx} 最终要用于表示其它量, 不用计算, 直接保留, 所以剩下 3 个量我们下面就开始算.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y_i} &= \sum_j \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial y_i} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{1}{|y|^2} - 2 \frac{y_i}{|y|^4} \sum_j \frac{\partial u}{\partial x_j} y_j; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial y_j \partial x_i} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u}{\partial y_j} \right) \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \frac{1}{|y|^2} - 2 \frac{y_j}{|y|^4} \sum_k \frac{\partial^2 u}{\partial x_k \partial x_i} y_k; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i^2} &= \frac{\partial}{\partial y_i} \left(\frac{\partial u}{\partial y_i} \right) \\ &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial x_i} \frac{1}{|y|^2} + \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{-2x_i}{|y|^2} \right) + \left(-\frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{2x_i}{|y|^2} + \sum_j \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial x_j} \frac{2x_i y_j}{|y|^2} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{2y_j(|y|^2 - 4y_i^2)}{|y|^6} \right) \right) \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \frac{1}{|y|^4} + \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{(4 - 2n)x_i}{|y|^2}. \end{aligned}$$

算到这里, 内心应该觉得平静. 毕竟 u_{yy} 求和后确实能消掉 2 次项. 接下来我们关注如何从 v_{yy} 算到

u_{yy} . 回忆一下, $v(y) = \frac{1}{|y|^{n-2}}u(\frac{y}{|y|^2})$, 我们有

$$\frac{\partial v}{\partial y_i} = \frac{\partial u}{\partial y_i} \frac{1}{|y|^{n-2}} + (2-n)u \cdot y_i \cdot \frac{1}{|y|^n};$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v}{\partial y_i^2} &= \frac{\partial}{\partial y_i} \left(\frac{\partial v}{\partial y_i} \right) \\ &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y_i^2} \frac{1}{|y|^{n-2}} + \frac{\partial u}{\partial y_i} (2-n) \frac{y_i}{|y|^n} \right) + \left(\frac{\partial u}{\partial y_i} (2-n) \frac{y_i}{|y|^n} + (2-n) \cdot u \cdot \left(\frac{1}{|y|^n} - n \frac{y_i^2}{|y|^{n+2}} \right) \right). \end{aligned}$$

终于, 我们可以算

$$\begin{aligned} \Delta v &= \sum_i \frac{\partial^2 v}{\partial y_i^2} \\ &= \left(\sum_i \frac{\partial^2 u}{\partial y_i^2} \right) |y|^{2-n} + \left(\sum_i \frac{\partial u}{\partial y_i} y_i \right) (4-2n) |y|^{-n} \\ &= \left(\sum_i \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \frac{1}{|y|^4} + \sum_i \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{(4-2n)x_i}{|y|^2} \right) \cdot |y|^{2-n} + \left(\sum_i \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{1}{y^2} - \frac{2x_i}{|y|^2} \sum_j \frac{\partial u}{\partial x_j} y_j \right) \cdot y_i \right) \cdot (4-2n) \cdot |y|^{-n} \\ &= \sum_i \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{(4-2n)x_i}{|y|^2} \cdot |y|^{2-n} + \left(\sum_i \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{-y_i}{|y|^2} \right) \cdot (4-2n) \cdot |y|^{-n} \\ &= 0. \end{aligned}$$

就证明了我们想要的结论.

1.1.3 §1.1 第 6 题

设

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\partial\Omega} \left(\frac{1}{2} \sigma u^2 - gu \right) dS,$$

其中 Ω 为 n 维区域. 变分问题的提法为: 求 $u \in U$ 使得

$$J(u) = \inf_{v \in U} J(v),$$

其中 $U = C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$. 试导出与此变分问题等价的边值问题, 并证明两者的等价性.

解答:

先证明变分问题可以推导出一个边值问题:

记 $f(t) = J(u + tw)$, $w \in U$, 则 $f(t)$ 在 $t = 0$ 处取极小值, 即

$$\begin{aligned} 0 &= \left. \frac{df}{dt} \right|_{t=0} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla(u + tw)|^2 dx + \int_{\partial\Omega} \left(\frac{1}{2} \sigma(u + tw)^2 - g(u + tw) \right) dS \right) \Big|_{t=0} \\ &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dx + \int_{\partial\Omega} (\sigma u w - g w) dS \\ &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} - \int_{\Omega} \Delta u \cdot w dx + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} w dS + \int_{\partial\Omega} (\sigma u w - g w) dS \\ &= - \int_{\Omega} \Delta u \cdot w dx + \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma u - g \right) w dS. \end{aligned}$$

考察满足 $w|_{\partial\Omega} = 0$ 的函数类, 由背景知识第 2 条中的引理, 易知 $\Delta u = 0$, 如此, 方程变为

$$0 = \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma u - g \right) w dS = 0 \xrightarrow{\text{再由上述引理}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma u = g, \quad \text{on } \partial\Omega.$$

这个边值问题的解也是前述变分问题的解:

有

$$\begin{aligned} J(u + w) &= J(u) + \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \sigma w^2 dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dx + \int_{\partial\Omega} (\sigma u - g) w dS \\ &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} J(u) + \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \sigma w^2 dx - \int_{\Omega} \Delta u \cdot w dx + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} w dS + \int_{\partial\Omega} (\sigma u - g) w dS \\ &= J(u) + \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \sigma w^2 dx - \int_{\Omega} \Delta u \cdot w dx + \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \sigma u - g \right) w dS \\ &= J(u) + \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \sigma w^2 dx \\ &\stackrel{\sigma > 0}{\geq} J(u) \end{aligned}$$

1.2 调和函数的基本性质及应用

1.2.1 §1.2 第 9 题

设 u 为带状区域 $\Sigma = \{(x_1, x_2) | |x_1| \leq 1, -\infty < x_2 < \infty\}$ 上的非负调和函数, 证明:

$$u(x) \leq u(0) e^{C|x_2|}, \quad \forall |x_1| \leq \frac{1}{4}, \quad -\infty < x_2 < \infty$$

其中常数 C 不依赖于 u . (提示: Harnack 不等式)

解答:

对于任意的 $x = (x_1, x_2) \in \Sigma$, 取半径为 $\frac{3}{16}$ 的圆, 用“滚圆法”折线连接 $(x_1, x_2), (x_1, 0), (0, 0)$ 三点, 假设总共需要 $N+2$ 个圆 $\{B_k\}_{k=1}^{N+2}$, 那么第 1, $N, N+2$ 个圆的圆心即为这三个点, 记这些圆的圆心分别为 $\{x^k\}_{k=1}^{N+2}$.

此时满足注 1.2.3 的条件, 可以使用 Harnack 不等式的推论, 有

$$\begin{aligned}
 u(x) &= u(x^1) \\
 &\leq C(n)u(x^2) \\
 &\leq (C(n))^2u(x^3) \\
 &\leq \dots \\
 &\leq (C(n))^{N+1}u(x^{N+2}) \\
 &= (C(n))^{N+1}u(0)
 \end{aligned}$$

且显然有

$$\begin{aligned}
 (N-1)\frac{3}{16} &\leq |x_2| \\
 \Rightarrow N &\leq \frac{16}{3}|x_2| + 1 \\
 \Rightarrow N+1 &\leq \frac{16}{3}|x_2| + 2 \\
 \Rightarrow u(x) &\leq (C(n))^{\frac{16}{3}|x_2|+2}u(0)
 \end{aligned}$$

原题应当有误, 右端还应该多一个常数.

1.2.2 §1.2 第 10 题

设 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ 为 $\overline{\mathbb{R}_+^n} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_n \geq 0\}$ 上的调和函数. 若满足 $u(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = 0$ 且 $u(x)$ 为有界函数, 证明 $u \equiv 0$. (提示: 延拓为全空间调和函数) 若把 u 改为下有界函数, 试举出例子使得结论不成立.

解答:

对 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, -x_n)$.

我们给出 u 的全空间调和延拓的构造, 然后应用 Liouville 型定理即可.

$$v(x) = \begin{cases} u(x) & \text{if } x_n \geq 0 \\ \overline{u(\bar{x})} & \text{if } x_n < 0 \end{cases}$$

若把 u 改为下有界函数, 结论不成立, 反例有 $u(x) = x_n$.

1.2.3 §1.2 第 11 题

若 u 为 \mathbb{R}^2 上的调和函数. 设 $0 < a \leq b \leq c$ 满足 $b^2 = ac$, 证明

$$\int_{\mathbb{S}^1} u(x^0 + a\omega)u(x^0 + c\omega)dS_\omega = \int_{\mathbb{S}^1} u^2(x^0 + b\omega)dS_\omega$$

(提示: 固定 b 后, 对上式左端求导.) 上述结论对一般维数 \mathbb{R}^n 也成立, 有兴趣的同学可以自己证明.

解答:

固定 b , 记 $f(a) = \int_{\mathbb{S}^1} u(x^0 + a\omega)u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)dS_\omega$, 只要证明 $f'(a) = 0$ 即可.

$$\begin{aligned} f'(a) &= \int_{\mathbb{S}^1} \omega \cdot \nabla u(x^0 + a\omega)u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)dS_\omega - \frac{b^2}{a^2} \int_{\mathbb{S}^1} \omega \cdot \nabla u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)u(x^0 + a\omega)dS_\omega \\ &= \frac{1}{a} \left(\int_{\mathbb{S}^1} a\omega \cdot \nabla u(x^0 + a\omega)u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)dS_\omega - \int_{\mathbb{S}^1} \frac{b^2}{a} \omega \cdot \nabla u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)u(x^0 + a\omega)dS_\omega \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(\int_{\mathbb{S}^1} \frac{\partial u(x^0 + a\omega)}{\partial n_\omega} u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)dS_\omega - \int_{\mathbb{S}^1} \frac{\partial u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)}{\partial n_\omega} u(x^0 + a\omega)dS_\omega \right) \\ &\stackrel{\text{Green 第二公式}}{=} \frac{1}{a} \left(\iint_{B_1} \Delta u(x^0 + a\omega)u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)d\omega - \iint_{B_1} \Delta u(x^0 + \frac{b^2}{a}\omega)u(x^0 + a\omega)d\omega \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

1.3 极值原理及其应用

1.3.1 §1.3 第 2 题

对一般的椭圆型方程

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu = 0$$

其中 (a_{ij}) 为正定阵, $c \leq 0$. 证明弱极值原理, 强极值原理成立.

解答:

首先我们必须叙述清楚一般椭圆型方程极值原理的含义.

弱极值原理:

若 $u \in C^2(B_1) \cap C(\bar{B}_1)$, 满足一般椭圆方程, 则 u 不能在 B_1 内部取到非负最大值/非正最小值.

强极值原理:

若 $u \in C^2(B_1) \cap C(\bar{B}_1)$, 满足一般椭圆方程. 设 $x^0 \in \partial B_1$, 使得

$$u(x^0) > u(x), \forall x \in B_1$$

则有

$$\liminf_{t \rightarrow 0^+} \frac{u(x^0) - u(x^0 - t\mathbf{n})}{t} > 0$$

其中 \mathbf{n} 为 ∂B_1 在 x_0 处的单位外法向量.

证明:

先证弱极值原理. 记题中方程左端为 $L(u)$, 其中 L 是椭圆型微分算子, 容易验证它是线性的. 则椭圆型方程可以简写成 $L(u) = 0$. 只证明非负最大值不能在内部取得. 我们先考虑 $L(u) > 0$ 时的情形, 然后用摄动的方法推证 $L(u) = 0$ 时也成立.

$L(u) > 0$, 用反证法, 假设 $\exists x_0 \in B_1$, 使得 u 在 x_0 处达到了非负最大值. 那么有

$$\begin{cases} u|_{x_0} & \geq 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x_i}|_{x_0} & = 0, \forall i \\ H = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i,j}|_{x_0} & \leq 0 \end{cases}$$

但是, 在 x_0 处, 有

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} > -cu \geq 0$$

记 $A = (a_{ij})$, 则它是正定阵, 那么在 x_0 处, 有

$$\begin{aligned} & \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} > 0 \\ \Rightarrow & \operatorname{tr}(AH) > 0 \\ \Rightarrow & \operatorname{tr}(C^T CH) > 0, \exists C \in \mathbb{R}^{n \times n} \\ \Rightarrow & \operatorname{tr}(CHC^T) > 0 \\ \Rightarrow & H \text{ 正定, 矛盾!} \end{aligned}$$

下面考虑一般的情形, 取 $h = e^{kx_1}$, 其中 $k > 0$, 考察函数 $u_\epsilon = u + \epsilon h$, 有 $L(u_\epsilon) = L(u + \epsilon h) = L(u) + \epsilon L(h) = 0 + \epsilon(a_{11}k^2 + b_1kh + ch)h$, 我们希望有 $L(u + \epsilon h) > 0$, 可以取 h 足够大, 那么对足够小的 ϵ, u_ϵ 的非负最大值恒在边界上取得, 考虑到 u_ϵ 的连续性, 令 $\epsilon \rightarrow 0$, 即得证.

下面证明强极值原理. 我们希望构造函数 $w = u - v$, 对 w 使用弱极值原理. 而函数 v 满足

$$\begin{cases} v|_{\partial B_1} = 0 \\ L(v) < 0, \text{ in } B_1 \setminus B_{\frac{1}{2}} \\ \frac{\partial v}{\partial n} > 0 \end{cases}$$

可以取

$$v = v_\alpha = e^{-\alpha} - e^{-\alpha r^2}$$

取 α 足够大就可以满足上面的要求, 剩下的工作和书上的做法是类似的.

在新版教材上, 删去了常数 c , 那么极值原理的描述就与书上的一样了.

1.3.2 §1.3 第 4 题

给出一个函数 φ 的例子, 满足定理 1.3.3 中截断函数的性质.

解答: 首先我们给出所需要的性质:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & x \in B_{\frac{1}{2}} \\ 0 & x \in B_1 \setminus B_{\frac{3}{4}} \end{cases} \quad \varphi \in C_c^\infty(B_1)$$

考虑使用磨光算子的方法.

考察

$$\bar{\varphi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{e^{|x|^2}-1} & \text{if } |x| < 1 \\ 0 & \text{if } |x| \geq 1 \end{cases}$$

显然, $\bar{\varphi} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp}(\bar{\varphi}) = B_1$, 我们记

$$c = \int_{\mathbb{R}^n} \bar{\varphi}(x) dx$$

如果

$$\alpha(x) = \frac{1}{c} \bar{\varphi}(x)$$

那么

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha(x) dx = 1$$

下面构造一族 ϵ -相关的函数

$$\alpha_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon^n} \alpha\left(\frac{x}{\epsilon}\right)$$

则 $\alpha_\epsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp}(\alpha_\epsilon) = B_\epsilon$, 并且 $\int_{\mathbb{R}^n} \alpha_\epsilon(x) dx = 1$. 直观上, α_ϵ 这个函数的主要部分都集中在一个很小的球内.

我们只在径向上考虑这个问题, 取

$$\psi(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } |x| \leq \frac{5}{8} \\ 0 & \text{if } |x| > \frac{5}{8} \end{cases}$$

令

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \psi(x) * \alpha_\epsilon \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \psi(y) \alpha_\epsilon(x-y) dy \end{aligned}$$

可以看到, 积分区域其实是 $\{y \mid |x-y| \leq \epsilon\}$, 因此我们可以取 $\epsilon = \frac{1}{16}$. 由卷积转移求导的性质, 易见径向函数 $\varphi(x)$ 即为所求.

1.3.3 §1.3 第 6 题

证明球 B_R 上的梯度估计: 若 $u \in C^2(B_R) \cap C(\bar{B}_R)$ 为调和函数, 则成立

$$\sup_{B_{\frac{R}{2}}} |\nabla u| \leq \frac{c(n)}{R} \sup_{\partial B_R} |u|,$$

其中 $c(n)$ 为只依赖于空间维数 n 的正常数.

解答:

两种做法, 其一是使用 Bochner 技巧, 依照书上的推导过程再写一遍, 只要将 R 固定, 取新的截断函数 $\varphi_R(x) = \varphi\left(\frac{x}{R}\right)$ 即可.

另一种做法是直接利用单位球 B_1 上的梯度估计.

对于上述的函数 u , 构造函数 $v(x) = u(Rx)$, 于是 $v \in C^2(B_1) \cap C(\bar{B}_1)$, 所以

$$\begin{aligned} \sup_{B_{\frac{1}{2}}} |\nabla v| &\leq c(n) \sup_{\partial B_1} |v| \\ \Rightarrow R \sup_{B_{\frac{R}{2}}} |\nabla u| &\leq c(n) \sup_{\partial B_R} |u| \\ \Rightarrow \sup_{B_{\frac{R}{2}}} |\nabla u| &\leq \frac{c(n)}{R} \sup_{\partial B_R} |u|. \end{aligned}$$

1.3.4 §1.3 第 7 题

利用梯度估计证明若 $u \in C^\infty$ 为 \mathbb{R}^n 上的调和函数, 且存在自然数 k 使得

$$|u(x)| \sim |x|^k, \quad x \rightarrow \infty.$$

则 u 必为 k 阶多项式.(这些多项式称为调和多项式.)

解答:

所谓存在自然数 k 使得 $|u(x)| \sim |x|^k$, $x \rightarrow \infty$, 即 $\exists c_1, c_2 > 0, c_1|x|^k \leq u(x) \leq c_2|x|^k, x \rightarrow \infty$. 事实上, 如果承认调和函数的解析性, 这个问题就变得十分容易, 但这里一定要用梯度估计来做. 我们分两步证明这个问题.

1. $u(x)$ 是不超过 k 次的多项式;
2. $u(x)$ 的增长阶不低于 k 次多项式.

事实上, 第二步由 $|u(x)| \sim |x|^k$, $x \rightarrow \infty$ 马上就可以得到, 我们只证明第一步. 由梯度估计

$$\begin{aligned} \sup_{B_{\frac{R}{2}}} |\nabla u| &\leq \frac{c(n)}{R} \sup_{\partial B_R} |u| \\ &\stackrel{R \text{ 足够大}}{\leq} \frac{c(n)}{R} c_2 |R|^k \\ &\stackrel{c(n) \cdot c_2 \text{ 仍记作 } c(n)}{=} c(n) R^{k-1} \\ &= c(n) \left(\frac{R}{2}\right)^{k-1} \cdot 2^{k-1} \\ &\stackrel{c(n) \cdot 2^{k-1} \text{ 仍记作 } c(n)}{=} c(n) \left(\frac{R}{2}\right)^{k-1}. \end{aligned}$$

即 R 足够大时, 有

$$\sup_{B_R} |\nabla u| \leq c(n) R^{k-1}.$$

由于 $u \in C^\infty$ (事实上这是个多余的条件), ∇u 的每一个分量都是调和函数. 且 $\forall i, \sup_{B_R} |\partial_i u| \leq c(n) R^{k-1}$. 如此, 重复上面的过程, 我们可以得到

$$\sup_{B_R} |\nabla(\partial_i u)| \leq c(n) R^{k-2}.$$

有限维情形下, 总是

$$\exists c > 0, \quad \sup_{B_R} |\nabla^2 u| \leq c \sup_{B_R} \sum_{i=1}^n |\nabla(\partial_i u)| \leq c(n) R^{k-2}.$$

迭代有限次, 便可以得到

$$\sup_{B_R} |\nabla^{k+1} u| \leq c(n) R^{-1}.$$

在上面令 $R \rightarrow \infty$, 得到 $\sup_{\mathbb{R}^n} |\nabla^{k+1} u| = 0$. 做有限次积分就可以得到要证的结论.

1.4 格林函数法

1.4.1 §1.4 第 2 题

证明 Green 函数的性质 1-4.

1. $G(x, y) = 0, x \in \Omega, y \in \partial\Omega$,
2. $G(x, y) \in C^2(\bar{\Omega} \times \bar{\Omega} \setminus \{y = x\})$, 满足

$$0 \leq G(x, y) \leq \begin{cases} \Gamma(x - y), & n \geq 3 \\ \Gamma(x - y) + \frac{1}{2\pi} \ln \text{diam}(\Omega), & n = 2. \end{cases}$$

当 $y \rightarrow x$ 时, $G(x, y) \rightarrow +\infty$, 其阶数和 $\Gamma(x - y)$ 相同.

$$3. G(x, y) = G(y, x), \quad \forall x, y \in \Omega, y \neq x.$$

$$4. \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(x, y)}{\partial \mathbf{n}_x} dS_x = -1, \quad \forall y \in \bar{\Omega}.$$

解答:

1. 由定义这是显然的, 另外由性质 3 还可以得到 $G(x, y) = 0, x \in \partial\Omega, y \in \Omega$.
2. 由定义, $\gamma(x, y)$ 在 Ω 上调和, 且在边界上取有限值, 于是 $|\gamma(x, y)|$ 在 $\bar{\Omega}$ 上有上界 $M < \infty$. 又 $\Gamma(x - y)$ 在 $\{y = x\}$ 附近趋于 $+\infty$, 因此 $\exists r > 0, s.t. \Gamma(x - y)|_{y \in B_r(x) \setminus \{x\}} > M$. 如此定义 $\Omega_r = \bar{\Omega} \setminus B_r(x)$, 易见 $G(x, y) = \Gamma(x - y) - \gamma(x - y)$ 在 Ω_r 上调和, 且在 $\partial\Omega_r$ 上取值恒非负, 由调和函数的极值原理, 可以得到

$$G(x, y) \geq 0, \quad \forall y \in \Omega_r$$

再结合 Ω_r 满足的条件, 可以得到左边的不等号成立.

另外一边, 由定义, $\gamma(x, y)$ 在 Ω 上调和, 于是由极值原理

$$\max_{y \in \bar{\Omega}} \gamma(x, y) = \max_{y \in \partial\Omega} \gamma(x, y) = \max_{y \in \partial\Omega} \Gamma(x - y).$$

同样

$$\begin{aligned} \min_{y \in \bar{\Omega}} \gamma(x, y) &= \min_{y \in \partial\Omega} \gamma(x, y) \\ &= \min_{y \in \partial\Omega} \Gamma(x - y) \\ &= \begin{cases} \min_{y \in \partial\Omega} \frac{1}{(n-2)w_{n-1}} \frac{1}{|x-y|^{n-2}} & n \geq 3 \\ \min_{y \in \partial\Omega} \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x-y|} & n = 2 \end{cases} \\ &\geq \begin{cases} 0 & n \geq 3 \\ -\frac{1}{2\pi} \ln \text{diam}\Omega & n = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

于是

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - \gamma(x - y) \leq \begin{cases} \Gamma(x - y) & n \geq 3 \\ \Gamma(x - y) + \frac{1}{2\pi} \ln \text{diam}\Omega & n = 2. \end{cases}$$

最后

$$\lim_{y \rightarrow x} \left| \frac{G(x, y)}{\Gamma(x - y)} \right| = \lim_{y \rightarrow x} \left| 1 - \frac{\gamma(x, y)}{\Gamma(x - y)} \right| \stackrel{\gamma \text{ 调和}}{=} 0.$$

3. 只要证明 $G(x, z)|_{z=y} = G(y, z)|_{z=x}$. 而

$$G(x, z) \in C^2(\Omega \setminus \overline{Br(x)}) \cap C^1(\overline{\Omega \setminus Br(x)})$$

$$G(y, z) \in C^2(\Omega \setminus \overline{Br(y)}) \cap C^1(\overline{\Omega \setminus Br(y)})$$

这两个函数的定义域严格而言并非完全相同, 但几乎是差不多的, 因此我们考虑这样的区域:

$$\tilde{\Omega} := \Omega \setminus (\overline{B_\epsilon(x)} \cup \overline{B_\epsilon(y)}).$$

其中, ϵ 满足 $\overline{B_\epsilon(x)} \cap \overline{B_\epsilon(y)} = \emptyset$. 为了简化书写, 我们记

$$v(z) := G(x, z), \quad w(z) := G(y, z),$$

在 $\tilde{\Omega}$ 上, 我们可以使用 Green 公式

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{\Omega}} (w \Delta v - v \Delta w) dx &= \int_{\partial \tilde{\Omega}} \left(w \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial w}{\partial \mathbf{n}} \right) dS_z \\ &\xrightarrow{v, w \text{ 的基本性质}} \int_{\partial B_\epsilon(x)} \left(w \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial w}{\partial \mathbf{n}} \right) dS_z = \int_{\partial B_\epsilon(y)} \left(w \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial w}{\partial \mathbf{n}} \right) dS_z. \end{aligned}$$

再由与 Green 恒等式的推导类似的过程, 令 $\epsilon \rightarrow 0$, 便可以得到 $w(x) = v(y)$, 这就是我们要证的.

4. 在表达式

$$u(x) = - \int_{\Omega} G(x, y) \Delta u(y) dy - \int_{\partial \Omega} u(y) \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}_y}(x, y) dS_y$$

中, 取 $u(x) \equiv 1$ 即可.

1.4.2 §1.4 第 3 题

验证 2 维圆盘的 Green 函数和半空间的 Green 函数公式成立.

解答:

考虑 $x \in B_R$ 关于 ∂B_R 的反演点

$$\tilde{x} = \frac{R^2}{|x|^2} x.$$

电势函数为

$$\Gamma(x - y) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x - y|}.$$

限制在边界 $y \in \partial B_R$ 上时, 我们有

$$\begin{aligned} \Gamma(\tilde{x} - y) &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|\tilde{x} - y|} \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\left| \frac{R^2}{|x|^2} x - y \right|} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{|x|}{R} + \ln \frac{1}{|x - y|} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{|x|}{R} + \Gamma(x - y). \end{aligned}$$

则令

$$\begin{aligned}\gamma(x, y) &= \Gamma(\tilde{x} - y) - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{|x|}{R} \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{R}{|x|} \cdot \frac{1}{|\tilde{x} - y|} \right).\end{aligned}$$

如此, Green 函数

$$\begin{aligned}G(x, y) &= \Gamma(x - y) - \gamma(x, y) \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x - y|} - \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{R}{|x|} \cdot \frac{1}{|\tilde{x} - y|} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x - y|} - \frac{1}{2\pi} \ln \left| \frac{R}{|x|} x - \frac{|x|}{R} y \right|\end{aligned}$$

便完成了构造. 至于上半平面的 Green 函数, 构造起来非常容易, 问题在于验证衰减性条件可以保证 Green 恒等式仍然成立. 我们将这个问题作为一个独立的题目, 在下一个习题中给出解答.

1.4.3 §1.4 第 6 题

证明 u 满足 (1.59) 时, Green 恒等式 (1.47) 依然成立.

解答:

(1.59) 即:

$$u(x) = o(1), \quad |\nabla u(x)| = o\left(\frac{1}{|x|}\right), \quad |x| \rightarrow \infty.$$

要证的 Green 恒等式 (1.47) 为

$$u(x) = - \int_{\Omega} \Gamma(x - y) \Delta u(y) dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma(x - y) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_y}(x, y) \right) dS_y.$$

此时 Ω 是无界区域, 我们希望使用有界区域去逼近之. 记 $\Omega_R = \Omega \cap B_R(x)$, $\gamma_1 = \partial\Omega_R \setminus \partial B_R(x)$, $\gamma_2 = \partial\Omega_R \setminus \partial\Omega$, 如图 1 所示.




图 1: Ω_R

于是利用 Green 公式, 对每个固定的 R , 我们可以证明

$$\begin{aligned} u(x) &= - \int_{\Omega_R} \Gamma(x-y) \Delta u(y) dy + \int_{\partial\Omega_R} \left(\Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_y}(x, y) \right) dS_y \\ &= - \int_{\Omega_R} \Gamma(x-y) \Delta u(y) dy + \int_{\gamma_1} \left(\Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_y}(x, y) \right) dS_y \\ &\quad + \int_{\gamma_2} \left(\Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_y}(x, y) \right) dS_y. \end{aligned}$$

显然我们有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \Omega_R = \Omega, \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \gamma_1 = \partial\Omega,$$

关键在于证明

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_2} \left(\Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_y}(x, y) \right) dS_y = 0.$$

$n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} &\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_{\gamma_2} \left(\Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_y}(y) - u(y) \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_y}(x, y) \right) dS_y \right| \\ &\leq \lim_{R \rightarrow \infty} C(n) R^{n-1} \left(\left| \Gamma(x-y) \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_y}(y) \right| + \left| u(y) \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}_y}(x, y) \right| \right) \\ &\leq \lim_{R \rightarrow \infty} C(n) R^{n-1} \left(O\left(\frac{1}{R^{n-2}}\right) \cdot o\left(\frac{1}{R}\right) + o(1) \cdot O\left(\frac{1}{R^{n-1}}\right) \right) \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} C(n) R^{n-1} \left(o\left(\frac{1}{R^{n-1}}\right) + o\left(\frac{1}{R^{n-1}}\right) \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$n = 2$ 时, 上面第一项的估计会难以进行, 我们认为需要加强衰减性条件, 需要

$$u(x) = o(1), \quad |\nabla u(x)| = o\left(\frac{1}{|x| \ln|x|}\right), \quad |x| \rightarrow \infty.$$

在新修订的教材上, 添加了这样的条件 $\exists a, C > 0$, 使得

$$|x|^a u(x) + |x|^{1+a} |Du(x)| + |x|^{2+a} |D^2 u(x)| \leq C.$$

如此, 我们的证明可以进行下去了. 其中二阶导数的控制条件应当是为了使得要证的式子第一项积分有意义.

1.4.4 §1.4 第 9 题

1. 求半圆区域上的 Dirichlet 问题的 Green 函数;
2. 求 $H = \{(x_1, \dots, x_n) | x_{n-1}, x_n > 0\}$ 上的 Dirichlet 问题的 Green 函数.

1.4.5 §1.4 第 10 题

利用公式 (1.54) 重新证明单位球上调和函数的 Harnack 不等式.

解答:

公式 (1.54) 指的是

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} u(y) \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}_y} dS_y.$$

应当指出, 书上证明 Harnack 不等式主要使用的是平均值性质, 容易看出公式 (1.54) 形式上也是一种平均性质.

$\Omega = B_1$, 不妨 Ω' 取成半径较小的同心球 B_r . 我们首先指出在单位球面上有

$$\frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}_y} = - \frac{1 - |x|^2}{w_{n-1}|x - y|^n}, \quad \forall n.$$

虽然这个等式只要求个导数就能得到, 但为了让这份习题解答更受用户的满意, 我们决定稍后补上这个等式的证明. 现在

$$\begin{aligned} u(x) &= - \int_{\partial B_1} u(y) \frac{\partial G}{\partial \mathbf{n}_y} dS_y \\ &= \int_{\partial B_1} u(y) \frac{1 - |x|^2}{w_{n-1}|x - y|^n} dS_y \\ &\begin{cases} \leq \frac{1}{(1-r)^n} \frac{1}{w_{n-1}} \int_{\partial B_1} u(y) dS_y \\ \geq \frac{1-r^2}{(1+r)^n} \frac{1}{w_{n-1}} \int_{\partial B_1} u(y) dS_y \end{cases} \\ &\begin{cases} \leq \frac{1}{(1-r)^n} u(0) \\ \geq \frac{1-r^2}{(1+r)^n} u(0) \end{cases} \end{aligned}$$

接下来的操作和书上的做法是类似的, 请读者自行完成. 我们接下来将给出单位球面上 Green 函数的径向导数的公式证明. 读者必须注意, 虽然维数不同, Green 函数的形式略有不同, 但它们的径向

导数并没有区别, 因此我们在这里不对维数 n 进行讨论.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial G}{\partial n_y} \frac{\text{单位球面}}{\frac{\partial G}{\partial |y|}} \\
 &= \frac{\partial G}{\partial y} \cdot n_y \\
 & \frac{\text{单位球面}}{\frac{\partial G}{\partial y}} \cdot y \\
 &= -\frac{1}{w_{n-1}} \left(|x-y|^{-(n-1)} \frac{y-x}{|y-x|} - \left| \frac{R}{|x|} x - \frac{|x|}{R} y \right|^{-(n-1)} \frac{\frac{|x|}{R} y - \frac{R}{|x|} x}{\left| \frac{|x|}{R} y - \frac{R}{|x|} x \right|} \frac{|x|}{R} \right) \cdot y \\
 & \frac{\text{单位球面}}{\frac{\partial G}{\partial y}} - \frac{1}{w_{n-1}} \left(|x-y|^{-(n-1)} \frac{y-x}{|y-x|} - \left| \frac{1}{|x|} x - |x| y \right|^{-(n-1)} \frac{|x| y - \frac{1}{|x|} x}{\left| |x| y - \frac{1}{|x|} x \right|} |x| \right) \cdot y \\
 & \frac{|x-y| = \left| \frac{x}{|x|} - |x| y \right|}{\frac{\text{单位球面}}{\frac{\partial G}{\partial y}}} - \frac{1}{w_{n-1} |x-y|^n} (y-x - |x|^2 y + x) \cdot y \\
 & \frac{y \cdot y = 1}{\frac{\text{单位球面}}{\frac{\partial G}{\partial y}}} - \frac{1 - |x|^2}{w_{n-1} |x-y|^n}.
 \end{aligned}$$

1.4.6 §1.4 第 11 题

(1) **Harnack 第一定理** 设函数序列 $\{u_k\} \subset C(\bar{\Omega})$ 为 Ω 上的调和函数列. 若 $\{u_k\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 则它在 Ω 上也一致收敛, 并且极限函数 u 也是 Ω 上的调和函数.

(2) **Harnack 第二定理** 设 $\{u_k\}$ 为 Ω 上的一个单调不减的调和函数列. 若 $\{u_k\}$ 在 Ω 中的某点 P 处收敛, 则它内闭一致收敛于 Ω 上的一个调和函数 u .

解答:

1.4.7 §1.4 第 12 题

证明 Dirichlet 外问题和 Dirichlet 问题的等价性. (提示: 利用 Kelvin 变换和奇点可去性定理.) 利用该等价性证明有界区域外定义的调和函数若在无穷远衰减到 0, 则衰减速度至少为 $O(\frac{1}{r})$.

解答:

1.4.8 §1.4 第 13 题

证明满足平均值性质的连续函数一定是调和函数.(提示: 利用 Poisson 公式和极值原理的证明思想)

解答:

按照提示, 设 u 是满足平均值性质的连续函数, 由平均值性质可以推出极值原理, 故 u 有极值原理. 由 Poisson 公式, 记以 u 的边界值为边界的调和函数为 v , 则 $u - v$ 也满足极值原理, 但是在边界上取值恒为 0, 故 $u - v \equiv 0$.

另外, 也可以先证明 $u \in C^\infty$, 再将证明平均值性质的过程倒推回去即可. 事实上, 由调和函数的解析性, $u \in C^\infty$ 是显然的.