

# Шкалы оценки новорождённого

nSOFA · NIPS · N-PASS — полиорганная дисфункция, боль и седация

## Считать удобнее в мини-приложении

В боте эти же шкалы открываются кнопками: отмечаешь пункты пальцем, сумма и трактовка считаются сами. Здесь — та же самая шкала целиком, чтобы можно было распечатать и держать в карте.

## 1. NSOFA — ПОЛИОРГАННАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Neonatal Sequential Organ Failure Assessment. Оценивается **ежедневно** у детей в ОПИТ. Для каждой системы берётся **самый худший** показатель, имевший место в течение суток. Итог — сумма трёх систем, максимум 15 баллов.

| Балл                                                                                                                                   | Признак                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Дыхательная система                                                                                                                 |                                                                   |
| 0                                                                                                                                      | Не интубирован, либо интубирован при $SpO_2/FiO_2 \geq 300$       |
| +2                                                                                                                                     | Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 300$                                  |
| +4                                                                                                                                     | Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 200$                                  |
| +6                                                                                                                                     | Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 150$                                  |
| +8                                                                                                                                     | Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 100$                                  |
| 2. Сердечно-сосудистая система — Адренергические и дофаминэргические средства — код АТХ C01CA, системные кортикостероиды — код АТХ N02 |                                                                   |
| 0                                                                                                                                      | Нет ни вазопрессоров, ни кортикостероидов                         |
| +1                                                                                                                                     | Вазопрессоров нет, кортикостероиды используются                   |
| +2                                                                                                                                     | Один вазопрессор, кортикостероидов нет                            |
| +3                                                                                                                                     | Два и более вазопрессора, либо один вазопрессор + кортикостероиды |
| +4                                                                                                                                     | Два и более вазопрессора и кортикостероиды                        |
| 3. Система крови                                                                                                                       |                                                                   |
| 0                                                                                                                                      | Тромбоциты $\geq 150 \times 10^9/л$                               |
| +1                                                                                                                                     | Тромбоциты $100\text{--}149 \times 10^9/л$                        |
| +2                                                                                                                                     | Тромбоциты $< 100 \times 10^9/л$                                  |
| +3                                                                                                                                     | Тромбоциты $< 50 \times 10^9/л$                                   |

## Трактовка суммы

| Баллы | Трактовка             | Что делать                                                                                        |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | 0 баллов              | Признаков органной дисфункции по шкале нет.                                                       |
| 1-3   | Низкий балл           | Дисфункция минимальна. Продолжать ежедневную оценку.                                              |
| 4-7   | Умеренная дисфункция  | Риск неблагоприятного исхода повышается с ростом балла. Пересмотреть терапию и объём мониторинга. |
| 8-15  | Выраженная дисфункция | Высокий балл связан с высокой вероятностью неблагоприятного течения и летального исхода.          |

КР формулируют трактовку одной фразой: с увеличением оценки вероятность неблагоприятного течения и летального исхода возрастает. Жёстких порогов КР не задают — диапазоны выше приведены только для навигации по шкале.

2. NIPS — ОСТРАЯ И ПРОЦЕДУРНАЯ БОЛЬ

Neonatal Infant Pain Scale, 6 пунктов, максимум 7 баллов. Оценивать **до, во время и после** процедуры. У интубированного ребёнка плач оценивается по мимике беззвучного крика.

| Балл                             | Признак                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Выражение лица                |                                                                       |
| 0                                | Расслабленное, спокойное                                              |
| +1                               | Гримаса: напряжённые мышцы лица, нахмуренные брови, сжатый подбородок |
| 2. Плач                          |                                                                       |
| 0                                | Отсутствует, спокоен                                                  |
| +1                               | Хныканье: слабое, периодическое                                       |
| +2                               | Энергичный крик: громкий, пронзительный, непрерывный                  |
| 3. Дыхание                       |                                                                       |
| 0                                | Обычное для этого ребёнка                                             |
| +1                               | Изменённое: нерегулярное, учащённое, задержки дыхания                 |
| 4. Руки                          |                                                                       |
| 0                                | Расслаблены, движения редкие и случайные                              |
| +1                               | Напряжены: прямые, ригидные, быстрое сгибание-разгибание              |
| 5. Ноги                          |                                                                       |
| 0                                | Расслаблены, движения редкие и случайные                              |
| +1                               | Напряжены: прямые, ригидные, быстрое сгибание-разгибание              |
| 6. Состояние сна и бодрствования |                                                                       |
| 0                                | Спит или спокойно бодрствует                                          |
| +1                               | Беспокоен, суетлив, часто просыпается                                 |

Трактовка суммы

| Баллы | Трактовка               | Что делать                                                                                                                  |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-2   | Боли нет или минимальна | Продолжать наблюдение, поддерживать охранительный режим.                                                                    |
| 3     | Пограничный балл        | Нефармакологические методы: сахароза, непитательное сосание, пеленание, контакт кожа к коже. Переоценить через 15-30 минут. |
| 4     | Умеренная боль          | Нефармакологические методы, при процедуре — местная анестезия. Если балл держится, обсудить системную аналгезию.            |
| 5-7   | Выраженная боль         | Показана аналгезия. Найти и устранить причину, переоценить после вмешательства.                                             |

Распространённая трактовка: балл выше 3 указывает на боль, требующую вмешательства. Локальный протокол отделения может задавать свои пороги.

3. N-PASS — БОЛЬ, ВОЗБУЖДЕНИЕ И СЕДАЦИЯ

Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale. По каждому из пяти критериев выбирается одно наблюдаемое состояние от -2 до +2. **Положительная сумма — боль и возбуждение, отрицательная — глубина седации.**

| Балл                        | Признак                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Плач и раздражительность |                                               |
| -2                          | Нет плача даже на болезненный стимул          |
| -1                          | Стонет или слабо плачет на болезненный стимул |

| Балл                                                   | Признак                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                      | Соответствует норме для этого ребёнка                                                                       |
| +1                                                     | Раздражителен, плачет с перерывами, успокаивается                                                           |
| +2                                                     | Громкий или беззвучный непрерывный крик, не успокаивается                                                   |
| 2. Поведение и состояние                               |                                                                                                             |
| -2                                                     | Не пробуждается на стимулы, спонтанных движений нет                                                         |
| -1                                                     | Слабо пробуждается, спонтанных движений мало                                                                |
| 0                                                      | Соответствует возрасту                                                                                      |
| +1                                                     | Беспокоен, извивается, часто просыпается                                                                    |
| +2                                                     | Выгибается, брыкается, либо постоянно бодрствует и почти не движется                                        |
| 3. Выражение лица                                      |                                                                                                             |
| -2                                                     | Рот расслаблен, мимики нет                                                                                  |
| -1                                                     | Минимальная мимика на стимулы                                                                               |
| 0                                                      | Спокойное, соответствует норме                                                                              |
| +1                                                     | Болевая гримаса появляется периодически                                                                     |
| +2                                                     | Болевая гримаса постоянно                                                                                   |
| 4. Тонус конечностей                                   |                                                                                                             |
| -2                                                     | Хватательного рефлекса нет, тонус резко снижен                                                              |
| -1                                                     | Хватательный рефлекс слабый, тонус снижен                                                                   |
| 0                                                      | Расслаблены, кисти и стопы в обычном положении                                                              |
| +1                                                     | Кулаки сжаты или пальцы стоп растопырены, тело не напряжено, периодически                                   |
| +2                                                     | Кулаки сжаты, пальцы стоп растопырены, тело напряжено, постоянно                                            |
| 5. Витальные показатели: ЧСС, ЧД, АД, SpO <sub>2</sub> |                                                                                                             |
| -2                                                     | Нет реакции на стимулы, гиповентиляция или апноэ                                                            |
| -1                                                     | Изменения менее 10 % от исходных при стимуляции                                                             |
| 0                                                      | В пределах исходных значений                                                                                |
| +1                                                     | Рост на 10-20 % от исходных, SpO <sub>2</sub> 76-85 % при стимуле, быстрое восстановление                   |
| +2                                                     | Рост более 20 %, SpO <sub>2</sub> ≤ 75 % при стимуле, восстановление медленное, десинхронизация с аппаратом |

Поправка на недоношенность

| Балл | Гестационный возраст |
|------|----------------------|
| +3   | Менее 28 недель      |
| +2   | 28-31 неделя         |
| +1   | 32-35 недель         |
| 0    | 36 недель и более    |

Поправка прибавляется **только к баллу боли** и только при положительной сумме: чем глубже недоношенность, тем слабее поведенческий ответ на боль.

Если сумма положительная — боль

| Баллы | Трактовка               | Что делать                                                                           |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-2   | Боли нет или минимальна | Продолжать наблюдение и охранительный режим.                                         |
| 3     | Пограничный балл        | Нефармакологические методы, переоценка через 15-30 минут.                            |
| ≥ 4   | Боль, требующая лечения | Балл выше 3 — показание к аналгезии. Найти причину, переоценить после вмешательства. |

Если сумма отрицательная — седация

| Баллы | Трактовка        | Что делать                                                                          |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-2   | Седации нет      | Уровень бодрствования соответствует норме.                                          |
| 3-5   | Лёгкая седация   | Обычно приемлемый уровень при респираторной поддержке.                              |
| 6-10  | Глубокая седация | Оценить, нужна ли такая глубина. Риск гиповентиляции, задержки экстубации и отмены. |

**Об упрощении**

В оригинальной шкале седация и боль могут оцениваться по каждому критерию отдельно, двумя колонками. Здесь по каждому критерию выбирается одно наблюдаемое состояние, а знак суммы определяет, о чём идёт речь. Так шкала чаще применяется у постели, но если в отделении принят оригинальный двухколоночный подсчёт — считайте по нему.

4. ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И КОГДА

| Шкала  | Когда                                                             | Как часто                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| nSOFA  | Ребёнок в ОРИТ, оценка тяжести и динамики органной дисфункции     | Ежедневно, по худшему показателю за сутки   |
| NIPS   | Процедурная и острая боль: венепункция, санация, перевязка        | До, во время и после процедуры              |
| N-PASS | Продлённая боль, а также подбор и контроль глубины седации на ИВЛ | Каждые 2-4 ч и после каждого изменения дозы |

Ни одна шкала не заменяет клиническую оценку. Если ребёнок выглядит хуже, чем говорит балл, — верить ребёнку.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912\_1, размещены 20.05.2025. [https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1)
- nSOFA — приложение Г1 указанных КР. Оригинал: Wynn J.L., Polin R.A. A neonatal sequential organ failure assessment score predicts mortality to late-onset sepsis in preterm very low birth weight infants. *Pediatr Res*, 2020.
- NIPS — Lawrence J. et al. The development of a tool to assess neonatal pain. *Neonatal Netw*, 1993. В рубрикаторе КР МЗ РФ эта шкала не приводится.
- N-PASS — Hummel P. et al. Clinical reliability and validity of the N-PASS: neonatal pain, agitation and sedation scale. *J Perinatol*, 2008. В рубрикаторе КР МЗ РФ эта шкала не приводится.