

The firefighter problem

Klara Travnik in Karolina Šavli

16. november 2022

OPIS PROBLEMA IN NAČRT DELA

The firefighter problem oziroma problem gasilca obravnava širjenje in omejevanje požara na grafu. Na začetku (v času 0) požar izbruhne na nekem nizu točk. V vsakem časovnem koraku se lahko na poljubno še nepogorelo oglišče postavi nov gasilec in požar omeji tako da lahko napreduje zgolj na vozlišča, ki še niso zavarovana z gaslici in imajo za soseda vozlišče, ki gori. Cilj problema je zajezitev požara, tako da čim več vozlišč ostane nepogorelih. Problem se lahko oplicira na mnoge probleme v realnem življenju, kot je na primer širjenje nalezljive bolezni.

FORMALIZACIJA PROBLEMA

Podan imamo graf z vozlišči $V(G)$ in povezavami $E(G)$. Število vozlišč in povezav označimo z $n = |V(G)|$ in $m = |E(G)|$. Dano imamo tudi fiksno število gasilcev in sicer D .

V času $t = 0$ požar izbruhne v nizu vozlišč $B_{init} \subseteq V$. Pogorela vozlišča označimo kot *burnt*. V času $t = 1$ se D gasilcev postavi na še nepogorela vozlišča. Slednja vozlišča označimo kot *defended*. V naslednjem časovnem koraku se lahko požar razširi zgolj na sosednja vozlišča, ki niso še *defended*. Za tem gasilci izbirajo vozlišča in proces se ponavlja dokler požar ni zajezjen. Za dan problem lahko zapišemo celoštevilki linearni program (CLP), pri

katerem bomo maksimirali število nepogorelih vozlišč:

$$\max |V| - \sum_{v \in V} b_{v,T}$$

pri pogojih:

$$b_{v,t} + d_{v,t} - b_{v',t-1} \geq 0 \quad \forall v \in V, \forall v' \in N(v), \forall t \in \mathbb{N} \, 1 \leq t \leq T$$

$$b_{v,t} + d_{v,t} \leq 1 \quad \forall v \in V, \forall t \in \mathbb{N}, \, 1 \leq t \leq T$$

$$b_{v,t} - b_{v,t-1} \geq 0 \quad \forall v \in B, \forall t \in \mathbb{N}, \, 1 \leq t \leq T$$

$$d_{v,t} - d_{v,t-1} \geq 0 \quad \forall v \in B, \forall t \in \mathbb{N}, \, 1 \leq t \leq T$$

$$\sum_{v \in V} (d_{v,t} - d_{v,t-1}) \leq D \quad \forall t \in \mathbb{N}, \, 1 \leq t \leq T$$

$$b_{v,0} = 1 \quad \forall v \in B_{init}$$

$$b_{v,0} = 0 \quad \forall v \in V \setminus B_{init}$$

$$d_{v,0} = 0 \quad \forall v \in V$$

$$b_{v,t}, d_{v,t} \in \{0, 1\} \quad \forall v \in V, \forall t \in \mathbb{N}, \, 1 \leq t \leq T$$

Obrazložitev spremenljivk in korakov:

VIRI