
(a) Dónde: profundidad de la inelástica del primario en el medio
Inelásticas por neutrón / 2 cm
0.0200
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
0
20
40
60
80
100
Profundidad desde la cara de entrada [cm]
(b) Resultado: multiplicidad de los productos
Partículas por inelástica
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
n
p
d
t
$^{3}$He
α
$\pi^{+}$
$\pi^{-}$
$\pi^{0}$
γ
res.
(c) Energía de los productos (agua pura; punteada: 500 MeV)
n
p
α
d
$\pi^{-}$
$\pi^{0}$
γ
dN/d(ln E) por inelástica
$10^{1}$
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-1}$
$10^{0}$
$10^{1}$
$10^{2}$
Energía cinética [MeV]
(d) Núcleo residual (blanco $^{16}$O en el 97 %)
$^{12}$C
$^{15}$N
$^{15}$O
$^{14}$N
$^{8}$Be
$^{13}$C
$^{14}$C
$^{16}$O
$^{11}$B
$^{13}$N
$^{10}$B
$^{11}$C
0
5
10
15
% de las inelásticas
Agua pura
Agua + 2,5 % NaCl
Agua + 5 % NaCl
Agua + 10 % NaCl