Background clades

- Invertebrates
- Vertebrates
- Viridiplantae
- Fungi
- Protists
- Other

Branch subclades (within background clades)

- Fungi: Ascomycete
- Fungi: Basidiomycete
- Fungi: Mucoromycota
- Invertebrates: Annelida
- Invertebrates: Blattodea
- Invertebrates: Bryozoa
- Invertebrates: Chelicerata
- Invertebrates: Cnidaria
- Invertebrates: Coleoptera
- Invertebrates: Dermaptera
- Invertebrates: Diptera
- Invertebrates: Echinodermata
- Invertebrates: Entomobryomorpha
- Invertebrates: Ephemeroptera
- Invertebrates: Hemiptera
- Invertebrates: Hymenoptera
- Invertebrates: Lepidoptera
- Invertebrates: Mollusca
- Invertebrates: Nematoda
- Invertebrates: Nemertea
- Invertebrates: Neuroptera
- Invertebrates: Odonata
- Invertebrates: Plecoptera
- Invertebrates: Porifera
- Invertebrates: Psocodea
- Invertebrates: Symphypleona
- Invertebrates: Thecostraca
- Invertebrates: Trichoptera
- Invertebrates: Tunicata
- Protists: Alveolata
- Protists: Discoba
- Vertebrates: Actinopterygii
- Vertebrates: Aves
- Vertebrates: Mammalia
- Vertebrates: Reptilia
- Viridiplantae: Algae
- Viridiplantae: Bryophyta
- Viridiplantae: Dicots
- Viridiplantae: Monocots

Centromere type

- Satellite
- Transposon
- Mixed (Sat/Trans)
- Holocentric

HOR regimentation (max/species)

100
75
50
25
0

Main satellite AT %

80
60
40
20

HOR score (max/species)

80
60
40
20

Main satellite monomer length (bp)

1000
300
100
30