

Física Computacional I

Lista 8

Jacinto Paulo da Silva Neto

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Departamento de Física

11 de Maio de 2019

1. Demonstrações

Problema 4

(a)

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x), \quad \hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \quad \text{e} \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{\pi nx}{L} \quad (1)$$

A partir das relações acima, podemos fazer

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \hat{H} \sin \frac{\pi nx}{L} = \sum_{n=1}^{\infty} E \psi_n \sin \frac{\pi nx}{L} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{\pi mx}{L} \hat{H} \sin \frac{\pi nx}{L} &= \sum_{n=1}^{\infty} E \psi_n \sin \frac{\pi mx}{L} \sin \frac{\pi nx}{L} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \int_0^L \left[\sin \frac{\pi mx}{L} \hat{H} \sin \frac{\pi nx}{L} \right] dx &= \sum_{n=1}^{\infty} E \psi_n \int_0^L \left[\sin \frac{\pi mx}{L} \sin \frac{\pi nx}{L} \right] dx, \end{aligned}$$

desde que

$$\int_0^L \sin \frac{\pi m x}{L} \sin \frac{\pi n x}{L} dx = \frac{L}{2} \delta_{mn}, \quad (2)$$

então

$$\sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \int_0^L \left[\sin \frac{\pi m x}{L} \hat{H} \sin \frac{\pi n x}{L} \right] dx = \frac{L}{2} E \psi_m. \quad (3)$$

Fica simples agora mostrar que

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} H_{mn} \psi_n &= \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \int_0^L \left[\sin \frac{\pi m x}{L} \hat{H} \sin \frac{\pi n x}{L} \right] dx = E \psi_m \\ \sum_{n=1}^{\infty} H_{mn} \psi_n &= E \psi_m, \end{aligned} \quad (4)$$

a equação acima é uma equação matricial sobre o índice m, tal que pode ser reescrita da seguinte forma

$$\boxed{\mathbf{H} \vec{\psi} = E \vec{\psi}.} \quad (5)$$

(b) Quando temos um potencial do tipo $V(x) = ax/L$, os elementos da matriz hamiltoniana (energética) ficam

$$\begin{aligned} H_{mn} &= \frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{\pi m x}{L} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{ax}{L} \right] \sin \frac{\pi n x}{L} dx \\ &= \frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{\pi m x}{L} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \left(\sin \frac{\pi n x}{L} \right) + \frac{ax}{L} \sin \frac{\pi n x}{L} \right] dx, \end{aligned}$$

onde

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\sin \frac{\pi n x}{L} \right) = -\frac{\pi^2 n^2}{L^2} \left(\sin \frac{\pi n x}{L} \right),$$

teremos

$$H_{mn} = \frac{2}{L} \left[\frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2mL^2} \int_0^L \sin \frac{\pi m x}{L} \sin \frac{\pi n x}{L} dx + \frac{a}{L} \int_0^L x \sin \frac{\pi m x}{L} \sin \frac{\pi n x}{L} dx \right].$$

Podemos aplicar as condições dadas no problema sobre a segunda integral acima e as condições para a primeira que decorrem da equação (2) para computarmos os elementos da matriz \mathbf{H} . Logo,

- Caso $m = n$, obtemos os termos da diagonal H_{nn} :

$$H_{nn} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2 m L^2} + \frac{1}{2} a \quad (6)$$

- Caso $m \neq n$, os dois com mesma paridade: se n é ímpar, m também será.

$$H_{mn} = 0 \quad (7)$$

- Caso $m \neq n$, os dois com paridade diferente: se n é ímpar, m será par e vice-versa.

$$H_{mn} = -\frac{8a}{\pi^2} \frac{m n}{(m^2 - n^2)^2}. \quad (8)$$

Através das equações (6, 7 e 8) podemos notar que \mathbf{H} é, portanto, simétrica e real.

Calculando a constante de normalização da função de onda $\psi(x)$

$$\langle \psi | \psi \rangle = C^2 \sum_{n,m=1}^{\infty} \psi_n^* \psi_m \int_0^L dx \left[\sin \frac{\pi n x}{L} \sin \frac{\pi m x}{L} \right] = 1$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = \frac{LC^2}{2} \sum_{n,m=1}^{\infty} \psi_n^* \psi_m \delta_{nm} = 1$$

$$C = \sqrt{\frac{2}{L \sum_n |\psi_n|^2}}$$