

## Tables

Table A1. Summary Black Sea Bass assessment results; Spawning Stock Biomass (SSB) in metric tons (mt); Recruitment (R) at age 0 in millions; Fishing Mortality (F) for age of peak fishery selection, ages 6-7. North-South averages, unadjusted for retrospective bias.

	SSB	R	F
1989	3,182	24,387	1.14
1990	3,045	29,782	1.09
1991	3,135	34,072	1.04
1992	3,434	29,043	0.93
1993	3,450	19,965	1.06
1994	3,477	28,660	0.87
1995	4,091	36,894	0.74
1996	4,310	26,616	0.92
1997	4,133	26,819	0.84
1998	4,638	22,881	0.60
1999	5,896	37,238	0.55
2000	7,486	46,766	0.54
2001	9,560	27,539	0.61
2002	10,085	31,600	0.66
2003	9,583	19,698	0.58
2004	8,250	15,713	0.57
2005	7,774	16,563	0.52
2006	6,446	30,813	0.55
2007	6,728	35,319	0.55
2008	9,545	45,517	0.49
2009	11,127	34,060	0.67
2010	14,062	34,417	0.76
2011	14,130	39,648	0.41
2012	16,730	144,665	0.60
2013	23,656	47,777	0.57
2014	34,706	26,202	0.42
2015	33,231	34,238	0.33
2016	30,710	79,194	0.35
2017	26,103	47,279	0.53
2018	22,518	10,051	0.32