

Table: Spawning stock biomass, fishing mortality and recruitment time-series from the 2015 Southern New England – Mid-Atlantic winter flounder operational ASAP assessment.

Year	SSB (MT)	F	Recruits (000s)
1981	21020	0.65	68685
1982	22154	0.54	60952
1983	19713	0.64	63254
1984	17162	0.77	42165
1985	12155	1.02	36738
1986	9765	0.8	42796
1987	7963	0.95	35216
1988	6551	1.08	34456
1989	5724	0.98	34108
1990	5751	0.82	20372
1991	6055	0.96	15478
1992	5308	0.82	17281
1993	4252	0.88	25443
1994	4359	0.53	18911
1995	6318	0.47	25525
1996	7082	0.46	20751
1997	8355	0.47	29271
1998	8645	0.4	22820
1999	9190	0.4	15964
2000	10011	0.48	13262
2001	9374	0.6	15640
2002	7188	0.54	7646
2003	6628	0.48	7562
2004	5919	0.41	15520
2005	5386	0.34	13393
2006	5844	0.39	7393
2007	6710	0.36	6157
2008	5801	0.28	9140
2009	5178	0.12	7075
2010	5878	0.07	6532
2011	6932	0.1	4873
2012	6964	0.12	4464
2013	6763	0.21	2390
2014	5661	0.19	4102
2015	5090	0.2	5742
2016	4360	0.21	7549