




Le Sommeil & votre récupération

Livret patient • Kinésithérapie



Comprendre votre sommeil pour mieux récupérer.
Un guide pratique, basé sur la science.

Noémie Bouisset

Kinésithérapeute • 125 Rue de Mulhouse, 68310 Wittelsheim

Création : Mars 2026 • Révision : Mars 2028



Sommaire

	Introduction : pourquoi ce livret ?	3
	Le sommeil, comment ça marche ?	4
	Les cycles du sommeil en détail	5
	Sommeil et récupération musculaire	6
	Sommeil et douleur : le cercle vicieux	7
	Les conséquences du manque de sommeil	8
	Auto-évaluation : votre sommeil	9
	Règle n°1 : la régularité	10
	Règle n°2 : l'environnement idéal	11
	Règle n°3 : alimentation et stimulants	12
	Exercice 1 : respiration 4-7-8	13
	Exercice 2 : relaxation musculaire progressive	14
	Exercice 3 : étirements du soir	15
	Conseils au quotidien	16
	Tableau de suivi : semaines 1 et 2	17
	Tableau de suivi : semaines 3 et 4	18
	Sources et références	19
	Pour aller plus loin / Contact	20



Pourquoi ce livret ?

Vous suivez des séances de kinésithérapie pour retrouver votre mobilité ou récupérer après une blessure. Votre corps travaille en séance, mais c'est **pendant votre sommeil** qu'il se répare vraiment.



Beaucoup de patients me disent « je dors mal depuis que j'ai mal ». Douleur et sommeil s'influencent mutuellement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir dessus.

Ce livret vous aidera à :

- Comprendre les mécanismes du sommeil
- Identifier ce qui perturbe vos nuits
- Mettre en place des habitudes concrètes
- Pratiquer des exercices de relaxation
- Suivre vos progrès sur 4 semaines

À retenir

Le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est le traitement le moins coûteux et le plus efficace dont vous disposez pendant votre rééducation.

« Depuis que je dors mieux, j'ai l'impression que mes séances de kiné sont deux fois plus efficaces. »

— Patient, 52 ans



Le sommeil, comment ça marche ?

Votre sommeil est gouverné par deux mécanismes biologiques qui travaillent ensemble, comme deux horloges synchronisées.



Horloge circadienne

Votre cerveau possède une horloge interne calée sur 24 heures. La lumière du jour la remet à l'heure chaque matin. Le soir, quand la lumière baisse, votre cerveau libère la **mélatonine** : le signal « il est l'heure de dormir ».



Pression de sommeil

Plus vous restez éveillé(e), plus une substance appelée **adénosine** s'accumule dans votre cerveau. C'est elle qui crée l'envie de dormir. Pendant le sommeil, elle est éliminée. Au réveil, le compteur repart à zéro.



Adénosine ↗ ↗ ↗



Mélatonine

6h

14h

22h

⚠ Attention

Le café bloque l'adénosine sans l'éliminer. Vous ne ressentez plus la fatigue, mais elle est toujours là. Quand l'effet du café s'estompe (après 5 à 7 heures), la fatigue revient d'un coup.




Exemple concret

Si vous vous réveillez à 7h, la pression de sommeil devient suffisante vers 22h30/23h pour vous endormir facilement. Traîner devant un écran jusqu'à minuit repousse le signal de la mélatonine, sans réduire pour autant votre besoin de sommeil.



Les cycles du sommeil en détail

Une nuit de sommeil se compose de 4 à 6 **cycles** d'environ 90 minutes chacun. Chaque cycle comprend plusieurs phases, avec des fonctions bien distinctes.



Phase	Durée	Rôle principal
Endormissement	5 à 10 min	Transition veille → sommeil. Muscles relâchés, respiration ralentie.
Sommeil léger	~50% nuit	Le corps se stabilise. Facile de se réveiller. Préparation au sommeil profond.
Sommeil profond	~20% nuit	Réparation physique : hormones de croissance, reconstruction musculaire, renforcement immunitaire.
Sommeil paradoxal	~25% nuit	Consolidation mémoire : apprentissage moteur, gestion émotionnelle, rêves.

💡 À retenir

Le sommeil profond domine en début de nuit (avant 2h du matin). Se coucher tard, c'est perdre la phase qui répare vos muscles et vos tissus. Votre kiné travaille en séance, votre sommeil profond termine le travail la nuit.

👉 *Le sommeil profond, c'est le mécanicien de nuit de votre corps.*



Sommeil et récupération musculaire

Pendant le sommeil profond, votre corps passe en mode « chantier ». Voici ce qui se passe concrètement pendant que vous dormez.



Réparation tissulaire

L'hormone de croissance (GH) est libérée par pic pendant le sommeil profond. Elle stimule la synthèse des protéines et la réparation des fibres musculaires endommagées.



Inflammation régulée

Le sommeil réduit les marqueurs inflammatoires (IL-6, CRP). Un sommeil insuffisant augmente l'inflammation systémique, ce qui ralentit la cicatrisation.



Apprentissage moteur

Les gestes travaillés en séance de kiné se consolident pendant le sommeil paradoxal. Votre cerveau « rejoue » les mouvements et les affine.



Concrètement, si vous dormez mal :

- 1 Moins d'hormone de croissance sécrétée
- 2 Réparation musculaire plus lente
- 3 Inflammation persistante
- 4 Seuil de douleur abaissé
- 5 Apprentissage moteur compromis
- 6 Récupération globale ralentie




À retenir

Une seule nuit de mauvais sommeil suffit à réduire de 30% la sécrétion d'hormone de croissance (Van Cauter, 2000). Deux nuits courtes d'affilée et les marqueurs inflammatoires augmentent de façon mesurable.



Sommeil et douleur : le cercle vicieux

La relation entre sommeil et douleur fonctionne dans les deux sens. Mal dormir amplifie la douleur, et la douleur empêche de bien dormir. Comprendre ce mécanisme, c'est le premier pas pour en sortir.



Ce que dit la science :

- 1 **Seuil de douleur abaissé** : après une nuit trop courte, votre système nerveux devient plus réactif. Des stimulations normalement indolores peuvent devenir gênantes (Krause et al., 2019).
- 2 **Inflammation amplifiée** : le manque de sommeil augmente les cytokines pro-inflammatoires, ce qui entretient la douleur même quand la lésion initiale est en voie de guérison.
- 3 **Humeur et perception** : la fatigue rend la douleur plus difficile à supporter psychologiquement. Le cerveau fatigué catastrophise davantage.

💡 À retenir

Améliorer votre sommeil peut réduire votre douleur de 20 à 30%, indépendamment de tout autre traitement (Finan et al., 2013). C'est un levier thérapeutique à part entière.

👉 *On peut casser ce cercle. Mieux dormir baisse l'inflammation, ce qui baisse la douleur, ce qui améliore le sommeil.*



Les conséquences du manque de sommeil

Le manque de sommeil ne cause pas juste de la fatigue. Il touche l'ensemble du corps.

Domaine	Effet à court terme	Effet à long terme
 Musculaire	Récupération ralentie, courbatures prolongées	Risque accru de blessure, sarcopénie précoce
 Cognitif	Concentration réduite, mémoire floue	Risque de déclin cognitif
 Cardiovasculaire	Tension artérielle augmentée	Risque accru d'AVC et d'infarctus
 Métabolique	Envies de sucre, prise de poids	Résistance à l'insuline, diabète de type 2
 Immunitaire	Vulnérabilité aux infections	Inflammation chronique
 Émotionnel	Irritabilité, anxiété accrue	Risque de dépression


⚠ Chiffres clés

-25% de performance physique après 24h sans dormir

×4,2 risque de tomber malade avec <6h de sommeil

+73% de risque d'obésité si sommeil <5h/nuit

-40% de capacité de mémorisation après une mauvaise nuit



💡 À retenir

7 à 9 heures par nuit suffisent pour la plupart des adultes. C'est la régularité et la qualité qui comptent, plus que la quantité brute.



Auto-évaluation : votre sommeil

Répondez honnêtement à ces questions. Entourez le chiffre qui vous correspond le mieux.

Question	Jamais 0	Parfois 1	Souvent 2
Je mets plus de 30 min à m'endormir	0	1	2
Je me réveille pendant la nuit et j'ai du mal à me rendormir	0	1	2
Je me sens fatigué(e) au réveil	0	1	2
J'utilise mon téléphone au lit	0	1	2
Je consomme de la caféine après 14h	0	1	2
Mes heures de coucher varient de plus d'1h selon les jours	0	1	2
Ma chambre est bruyante, lumineuse ou trop chaude	0	1	2
Mes douleurs me réveillent la nuit	0	1	2

Votre score :

 / 16

0 à 4 Bon dormeur. Quelques ajustements possibles.

5 à 9 Sommeil fragile. Ce livret va vous aider.

10 à 16 Sommeil perturbé. Parlez-en à votre kiné ou médecin.



Comment utiliser ce score

Refaites ce questionnaire dans 4 semaines, après avoir appliqué les conseils de ce livret. Comparez vos scores : même une baisse de 2 à 3 points traduit une amélioration réelle de votre qualité de sommeil.



Règle n° 1 : la régularité

Votre horloge interne a besoin de repères fixes. Quand vos horaires varient trop, votre cerveau ne sait plus quand déclencher l'endormissement.

✓ Ce qui fonctionne

- 1 Se coucher et se lever à la même heure, **y compris le week-end** (± 30 min max)
- 2 Choisir une heure de lever réaliste pour la semaine et s'y tenir
- 3 S'exposer à la lumière vive dans les 30 min après le réveil
- 4 Créer un « rituel du soir » : même séquence chaque jour, 30 min avant le coucher

✗ Ce qui dérègle

- 1 Grasse matinée de +2h le week-end (« jet lag social »)
- 2 Sieste après 15h ou de plus de 20 min
- 3 Se coucher « quand on est fatigué » sans heure fixe
- 4 Compenser une mauvaise nuit en se couchant très tôt le lendemain

Exemple d'horaire régulier

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
22h30	22h30	22h30	22h30	23h	23h	22h30

💡 À retenir

La régularité prime sur la durée. 7 heures de sommeil régulier valent mieux que 9 heures décalées. Votre corps s'adapte à un rythme stable et s'endort plus vite quand l'heure est prévisible.

⚠ Le « jet lag social »

Se lever à 7h la semaine et à 10h le dimanche crée un décalage équivalent à un voyage de 3 fuseaux horaires. Votre lundi commence alors avec un vrai jet lag. C'est une des causes les plus fréquentes de fatigue chronique.



Règle n° 2 : l'environnement idéal

Votre chambre doit devenir un sanctuaire du sommeil. Trois paramètres à maîtriser : température, obscurité, silence.



Température

16 à 18°C dans la chambre. Votre corps doit baisser sa température interne d'1°C pour déclencher l'endormissement. Une pièce trop chaude bloque ce processus.



Idéal : 18°C



Obscurité

Noir complet si possible. La moindre source lumineuse (veilleuse, LED de veille, téléphone) peut perturber la sécrétion de mélatonine, même à travers les paupières fermées.




Objectif : 100% obscurité



Silence

<30 dB idéalement. Si vous ne pouvez pas supprimer les bruits (rue, voisins), des bouchons d'oreilles ou un bruit blanc constant peuvent aider.



Cible : <30 dB

Checklist de votre chambre :

- | | |
|---|--|
| ☐ Rideaux occultants ou masque de sommeil | ☐ Pas de téléphone sur la table de nuit |
| ☐ Pas d'écran allumé visible (TV, routeur) | ☐ Pas de lumière bleue 1h avant le coucher |
| ☐ Température réglée sous 19°C | ☐ Aération 10 min avant le coucher |
| ☐ Literie confortable et adaptée | ☐ Le lit sert uniquement au sommeil (et à l'intimité) |



À retenir

Si vous ne faites qu'une seule chose : sortez votre téléphone de la chambre. C'est la perturbation n°1 du sommeil chez les adultes de 20 à 55 ans.



Frais, sombre, calme. Les trois mots à retenir pour votre chambre.



Règle n° 3 : alimentation et stimulants

Ce que vous mangez et buvez influence votre capacité à vous endormir. Quelques ajustements suffisent.

Substance	Effet sur le sommeil	Recommandation
 Caféine	Bloque l'adénosine 5 à 7h. Réduit le sommeil profond.	Stop après 14h .
 Alcool	Sédatif puis fragmentation. Réduit le sommeil paradoxal.	Éviter 3h avant le coucher.
 Nicotine	Stimulant. Augmente l'endormissement et les réveils.	Pas après 19h .
 Repas lourd	Digestion active = température élevée = endormissement difficile.	Dîner léger, 2 à 3h avant.
 Eau	Trop boire = réveils nocturnes (nycturie).	Réduire 1h30 avant.

Aliments favorisant le sommeil :



Laitiers



Banane



Cerises



Noix



Céréales



Tisane

⚠ Attention

Le « petit verre pour dormir » est un faux ami. L'alcool vous endort plus vite mais fragmente votre nuit et supprime une grande partie du sommeil paradoxal. Vous dormez plus mais récupérez moins.



Exercice 1 : respiration 4-7-8

Cette technique, popularisée par le Dr Andrew Weil, active votre système nerveux parasympathique (le « mode repos »). Elle ralentit le rythme cardiaque et prépare le corps au sommeil. Pratiquez-la allongé(e), dans votre lit, lumières éteintes.



Pas à pas :

- 1 **Position** : allongé(e) sur le dos, une main sur le ventre, une sur la poitrine. Yeux fermés.
- 2 **Expirez complètement** par la bouche en faisant un léger souffle (vider les poumons).
- 3 **Inspirez par le nez** en comptant mentalement jusqu'à 4. Sentez votre ventre gonfler.
- 4 **Retenez votre souffle** en comptant jusqu'à 7. Restez détendu(e), pas de tension.
- 5 **Expirez lentement par la bouche** en comptant jusqu'à 8. Videz bien à fond.
- 6 **Recommencez** pour 4 cycles complets. Puis laissez votre respiration revenir naturellement.

💡 À retenir

Ne cherchez pas à être parfait(e) avec les durées. L'important est que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. C'est ce ratio qui active la détente. Avec la pratique quotidienne, l'effet s'amplifie.

📌 Quand pratiquer

Au lit, lumières éteintes, juste avant de dormir. Mais aussi en journée si vous ressentez une montée de stress ou de douleur. 4 cycles prennent moins de 2 minutes.



Exercice 2 : relaxation musculaire progressive

Mise au point par le Dr Jacobson, cette technique consiste à contracter puis relâcher chaque groupe musculaire, des pieds à la tête. Le contraste tension/détente apprend à votre corps à reconnaître l'état de relâchement.

Mode d'emploi :

Allongé(e) confortablement. Pour chaque zone : contractez 5 secondes, puis relâchez 10 secondes.

- 1 **Pieds** : recroquevillez les orteils, serrez fort, puis relâchez.
- 2 **Mollets** : pointez les pieds vers le sol, maintenez, relâchez.
- 3 **Cuisses** : contractez les quadriceps, maintenez, relâchez.
- 4 **Fessiers** : serrez, maintenez, relâchez.
- 5 **Ventre** : rentrez le nombril, maintenez, relâchez.
- 6 **Mains** : serrez les poings très fort, puis ouvrez les mains.
- 7 **Bras** : fléchissez les biceps, maintenez, relâchez.
- 8 **Épaules** : haussez-les vers les oreilles, maintenez, laissez tomber.
- 9 **Visage** : plissez tout le visage, maintenez, relâchez.
- 10 **Corps entier** : contractez tout à la fois, 5s, puis relâchez tout.



💡 À retenir

Ne contractez pas au point de vous faire mal, surtout dans les zones sensibles ou douloureuses. L'objectif n'est pas la force mais la prise de conscience du contraste entre tension et détente. L'exercice complet prend 10 à 15 minutes.

⚠️ Adaptation

Si vous avez une zone douloureuse (épaule opérée, dos en crise), sautez cette zone ou contractez très légèrement. Demandez conseil à votre kinésithérapeute pour adapter l'exercice à votre situation.



Exercice 3 : étirements du soir

5 étirements doux, 20 minutes avant le coucher. Pas de forçage, pas de douleur. Tenez chaque position 30 secondes en respirant lentement.

1 Étirement du cou

Assis(e), inclinez doucement l'oreille vers l'épaule droite. Main droite sur la tête, sans tirer. Maintenez 30s. Changez de côté.

2 Chat / vache (dos)

À quatre pattes, alternez dos rond (tête rentrée, expiration) et dos creux (tête levée, inspiration). 8 répétitions, lentement.

3 Posture de l'enfant

À genoux, asseyez-vous sur les talons, bras tendus devant, front au sol. Respirez dans le bas du dos. 30 à 60 secondes.

4 Étirement des ischio-jambiers

Allongé(e), une jambe au sol, l'autre levée avec une serviette ou sangle autour du pied. Tirez doucement, genou légèrement fléchi. 30s par côté.

5 Rotation douce du tronc

Allongé(e), genoux pliés, laissez tomber les deux genoux d'un côté, bras en croix. Regardez du côté opposé. 30s par côté.

Durée totale : ~8 minutes

Cou

Chat/vache

Enfant

Ischio

Rotation

💡 À retenir

Ces étirements ne doivent jamais provoquer de douleur. Si un mouvement est inconfortable, réduisez l'amplitude. Le but est de signaler à votre système nerveux que la journée est finie et que le corps peut se relâcher.

📌 Astuce

Faites-les toujours dans le même ordre. Votre cerveau associera cette séquence à « c'est bientôt l'heure de dormir », ce qui accélérera l'endormissement avec le temps.



Conseils au quotidien

Les habitudes les plus efficaces selon la recherche, par moment de la journée. Commencez par en choisir 2 ou 3.

Le matin

- ☐ Lever à heure fixe (même le week-end)
- ☐ Lumière naturelle dans les 30 premières min
- ☐ Petit-déjeuner dans l'heure

L'après-midi

- ☐ Sport / kiné avant 18h
- ☐ Dernière caféine avant 14h
- ☐ Sieste courte si besoin (avant 15h, max 20 min)

Le soir

- ☐ Dîner léger, 2 à 3h avant le coucher
- ☐ Baisser la lumière dès 20h
- ☐ Arrêter les écrans 30 à 60 min avant
- ☐ Rituel du soir : tisane, lecture, étirements

Au coucher

- ☐ Chambre fraîche, sombre, silencieuse
- ☐ Téléphone hors de la chambre
- ☐ Se coucher quand on a sommeil
- ☐ Pas endormi(e) après 20 min ? Se lever.

À retenir

La règle des 20 minutes : si vous ne dormez pas après 20 min au lit, levez-vous. Le lit ne doit pas devenir un lieu où vous ruminez. Votre cerveau doit associer le lit au sommeil, pas à l'insomnie.

❧ Choisissez 2 habitudes. Tenez-les 3 semaines. Ajoutez-en une nouvelle ensuite.



Tableau de suivi : semaines 1 et 2

Notez chaque jour : ✓ (fait) ou ✗ (pas fait).

Semaine 1 — du ___/___ au ___/___

Habitude	L	M	Me	J	V	S	D	Tot
Lever à heure fixe								
Lumière le matin								
Pas de caféine après 14h								
Écrans coupés 1h avant								
Rituel du soir								
Exercice respiration								
Coucher avant __h								
Qualité perçue (1 à 5)								Moy:

Semaine 2 — du ___/___ au ___/___

Habitude	L	M	Me	J	V	S	D	Tot
Lever à heure fixe								
Lumière le matin								
Pas de caféine après 14h								
Écrans coupés 1h avant								
Rituel du soir								
Exercice respiration								
Coucher avant __h								
Qualité perçue (1 à 5)								Moy:



Comment remplir

Remplissez chaque matin en repensant à la veille. La **qualité perçue** : 1 = très mauvaise nuit, 5 = excellente nuit. Pas besoin d'être précis, fiez-vous à votre ressenti au réveil.



Tableau de suivi : semaines 3 et 4

Comparez vos moyennes avec les semaines 1 et 2.

Semaine 3 — du ___/___/___ au ___/___/___

Habitude	L	M	Me	J	V	S	D	Tot
Lever à heure fixe								
Lumière le matin								
Pas de caféine après 14h								
Écrans coupés 1h avant								
Rituel du soir								
Exercice respiration								
Coucher avant __h								
Qualité perçue (1 à 5)								Moy:

Semaine 4 — du ___/___/___ au ___/___/___

Habitude	L	M	Me	J	V	S	D	Tot
Lever à heure fixe								
Lumière le matin								
Pas de caféine après 14h								
Écrans coupés 1h avant								
Rituel du soir								
Exercice respiration								
Coucher avant __h								
Qualité perçue (1 à 5)								Moy:

💡 Bilan à 4 semaines

Avant : ___/16 · Après : ___/16 · Moy : ___/5

⏪ 3 semaines pour créer une habitude. Soyez patient(e).



Sources et références

Ce livret s'appuie sur des données scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture.

Walker M.	<i>Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams</i> . Scribner, 2017.
Van Cauter E. et al.	Age-related changes in slow wave sleep and REM sleep and relationship with growth hormone. <i>JAMA</i> , 2000; 284(7): 861-868.
Irwin M. et al.	Sleep disturbance, sleep duration, and inflammation. <i>Biological Psychiatry</i> , 2016; 80(1): 40-52.
Krause A. et al.	The sleep-deprived human brain. <i>Journal of Neuroscience</i> , 2019; 39(44): 8527-8535.
Finan P. et al.	The association of sleep and pain. <i>Sleep Medicine Reviews</i> , 2013; 17(3): 173-183.
Buysse D. et al.	The Pittsburgh Sleep Quality Index. <i>Psychiatry Research</i> , 1989; 28(2): 193-213.
Wittmann M. et al.	Social jetlag: misalignment of biological and social time. <i>Chronobiology International</i> , 2006; 23(1-2): 497-509.
Prather A. et al.	Behaviorally assessed sleep and susceptibility to the common cold. <i>Sleep</i> , 2015; 38(9): 1353-1359.
Cappuccio F. et al.	Sleep duration and all-cause mortality. <i>Sleep</i> , 2010; 33(5): 585-592.
St-Onge M. et al.	Effects of diet on sleep quality. <i>Advances in Nutrition</i> , 2016; 7(5): 938-949.
Ma X. et al.	The effect of diaphragmatic breathing on attention and stress. <i>Frontiers in Psychology</i> , 2017; 8: 874.
Morin C.	<i>Insomnia: A Clinical Guide to Assessment and Treatment</i> . Springer, 2003.

Livret rédigé par Noémie Bouisset, Kinésithérapeute · 125 Rue de Mulhouse, 68310 Wittelsheim

Création : Mars 2026 · Révision prévue : Mars 2028

Ce document est un outil d'éducation thérapeutique. Il ne remplace pas une consultation médicale.

Pour aller plus loin

N'hésitez pas à me poser vos questions en séance

Coordonnées du cabinet

Praticienne	Noémie Bouisset, Kinésithérapeute
Adresse	125 Rue de Mulhouse, 68310 Wittelsheim
Téléphone	[TÉLÉPHONE]
RDV en ligne	[LIEN DOCTOLIB]
Email	[EMAIL]

Cabinet conventionné · Carte Vitale acceptée · Sur ordonnance

Autres livrets disponibles :



La lombalgie



Entorse de cheville



Gestion de la douleur



Mes notes

Prenez soin de votre sommeil, il prend soin de vous.