



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

CAMPUS I - CAMPINA GRANDE

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE

MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE

RENAN MATIAS MOURA

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA

PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA SEM USO DE BIOMARCADORES

LABORATORIAIS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM DADOS CLÍNICOS E

LAUDOS ULTRASSONOGRÁFICOS DE ROTINA

CAMPINA GRANDE

2026

RENAN MATIAS MOURA

**DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA
PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA SEM USO DE BIOMARCADORES
LABORATORIAIS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM DADOS CLÍNICOS E
LAUDOS ULTRASSONOGRÁFICOS DE ROTINA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência e Tecnologia em Saúde.

Área de concentração: Tecnologia em Saúde.

Orientador: Prof. Dr. Wellington Candeia de Araújo.

CAMPINA GRANDE

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

M929d Moura, Renan Matias.

Desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina para predição de pré-eclâmpsia sem uso de biomarcadores laboratoriais [manuscrito] : uma abordagem baseada em dados clínicos e laudos ultrassonográficos de rotina / Renan Matias Moura. - 2026.

100 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências e Tecnologia, 2026.

"Orientação : Prof. Dr. Wellington Candeia de Araujo, Departamento de Computação - CCT".

1. Aprendizado de máquina. 2. Pré-eclâmps. 3. Doppler das artérias uterinas. I. Título

21. ed. CDD 618

RENAN MATIAS MOURA

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA
PARA PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA SEM USO DE BIOMARCADORES: UMA
ABORDAGEM BASEADA EM DADOS CLÍNICOS E LAUDOS
ULTRASSONOGRÁFICOS DE ROTINA

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
Profissional em Ciência e
Tecnologia em Saúde da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestre em Ciência e
Tecnologia em Saúde

Linha de Pesquisa:
Desenvolvimento de Produtos e
Processos para tecnologia em S.

Aprovada em: 27/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Janderson Jason Barbosa Aguiar** (***.765.854-**), em **25/03/2026 19:41:31**
com chave **c4e26bfe289b11f1896b7e6a6058c039**.
- **Francisco Anderson Mariano da Silva** (***.120.084-**), em **25/03/2026**
17:14:56 com chave **4aeafb40288711f1b2ccce3627dca79c**.
- **Wellington Candeia de Araujo** (***.655.074-**), em **25/03/2026 16:27:06** com
chave **9c1fb746288011f1a030ce3627dca79c**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça
a leitura do QrCode ao lado ou acesse [https://suap.uepb.edu.br/
comum/autenticar_documento/](https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/) e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 25/03/2026

Código de Autenticação: f616a3



Dedico a Tamiris, minha esposa e companheira de vida, por seu apoio incondicional. Agradeço por sua paciência, compreensão e por estar ao meu lado em cada passo desta jornada.

AGRADECIMENTOS

Aos meus familiares, Adriana, Romero, Luiza e Fabiana por todo o apoio e incentivo, sem os quais não teria conseguido chegar até aqui.

Ao Professor Dr. Frederico Moreira Bublitz, por sua orientação e paciência ao longo deste trabalho.

Ao meu colega do mestrado, Leonardo, por todo o apoio e parceria durante a realização deste trabalho.

À minha colega de mestrado, Bartira, que se tornou amiga para a vida, por toda a ajuda dentro e fora da academia.

À Clínica Embrion, que contribuiu com os dados e apoio técnico para a realização deste estudo, sem os quais este trabalho não teria sido possível.

RESUMO

A pré-eclâmpsia (PE) é uma das causas mais comuns de morbidade e mortalidade materna e perinatal. A doença é caracterizada pelo desenvolvimento de hipertensão após 20 semanas de gestação e pode desencadear uma série de complicações. Em casos mais graves, a condição pode levar à restrição de crescimento fetal e ao parto prematuro, aumentando significativamente o risco de complicações neonatais, como até a morte. Portanto, a detecção precoce e o manejo adequado da doença são essenciais para minimizar desfechos adversos tanto para a mãe quanto para o bebê. A *Fetal Medicine Foundation* (FMF) desenvolveu e disponibilizou a Calculadora de Risco para a PE, que combina fatores maternos, pressão arterial média e índices de pulsatilidade das artérias uterinas, além de marcadores séricos como o fator de crescimento placentário (PLGF), utilizando teorema de Bayes, continua sendo amplamente reconhecida e utilizada desde o início dos anos 2010. Apesar dos avanços, este método é validado utilizando dados que podem não refletir a realidade brasileira, trazendo imprecisão ao diagnóstico, o que pode refletir na qualidade da assistência pré-natal e nos resultados perinatais. Nos últimos anos, técnicas de aprendizado de máquina têm emergido como ferramentas promissoras em aplicações médicas. A aplicação desses modelos baseia-se na análise de grandes volumes de dados clínicos, permitindo a identificação de padrões que podem indicar a doença antes mesmo do aparecimento de sintomas evidentes. Visando esse problema foi desenvolvido um modelo de *Machine Learning* (ML) treinado com dados clínicos reais da nossa população, validado internamente, demonstrando resultados com alta precisão, sendo disponibilizado por meio de uma *API REST* para integração de sistemas que desejam utilizar, podendo otimizar a predição de risco de PE para gestantes.

Palavras-chave: aprendizado de máquina; pré-eclâmpsia; Doppler das artérias uterinas; triagem do primeiro trimestre;

ABSTRACT

Pre-eclampsia (PE) is one of the leading causes of maternal and perinatal morbidity and mortality. The condition is characterized by the onset of hypertension after 20 weeks of gestation and may trigger a range of serious complications. In severe cases, it can lead to fetal growth restriction and preterm birth, significantly increasing the risk of neonatal complications, including death. Therefore, early detection and appropriate management are essential to minimize adverse outcomes for both mother and newborn. The Fetal Medicine Foundation (FMF) developed the Pre-eclampsia Risk Calculator, which combines maternal factors, mean arterial pressure, uterine artery pulsatility indices, and serum biomarkers such as placental growth factor (PLGF) through a Bayesian algorithm. This tool has been widely recognized and used since the early 2010s. Despite its advances, this method was validated using data that may not reflect the Brazilian population, introducing diagnostic imprecision that can compromise the quality of prenatal care and perinatal outcomes. In recent years, machine learning techniques have emerged as promising tools in medical applications, enabling the identification of patterns in large volumes of clinical data that may indicate disease onset before overt symptoms appear. Addressing this limitation, a machine learning model was developed and trained on real clinical data from our local population. The model was internally validated and demonstrated high-precision results. It was made available through a REST API to allow integration with health information systems, aiming to optimize pre-eclampsia risk prediction for pregnant women.

Keywords: machine learning; pre-eclampsia; uterine artery Doppler; first-trimester screening;

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	RISCOS E BENEFÍCIOS	13
2.1	Benefícios	13
2.2	Riscos	13
2.3	Prevenção e minimização dos riscos	13
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
3.1	Pré-Natal	14
3.2	Pré-eclâmpsia	14
3.3	Biomarcadores	15
3.4	Machine Learning	16
3.4.1	SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)	19
3.4.2	DATA AUGMENTATION GAUSSIANA	20
3.4.3	SHAP (SHapley Additive exPlanations)	20
3.5	API REST	20
4	ESTADO DA ARTE	22
5	METODOLOGIA	26
5.1	Análise dos dados	26
5.2	Preparação dos dados e validação	26
5.3	Treinamento do modelo	27
5.4	Validação do modelo	27
5.5	Disponibilização do modelo	27
5.6	Aspectos Éticos	27
6	DESENVOLVIMENTO DO MODELO	29
6.1	Dados	29
6.1.1	Extração e Integração dos Dados	29

6.1.2	Pré-processamento e Tratamento dos Dados	31
6.2	Modelo PPML	34
6.3	Resultados	36
6.4	Discussão	39
6.5	Disponibilização	41
7	CONCLUSÃO	45
	REFERÊNCIAS	47
	APÊNDICES	53
	APÊNDICE A – Protocolo da revisão de escopo	53
	APÊNDICE B – Revisão de escopo	64
	APÊNDICE C – Algoritmo de processamento e exportação de laudos médicos	83
	APÊNDICE D – Algoritmo de treinamento do modelo LightGBM	88
	ANEXOS	97
	ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP	97

1 INTRODUÇÃO

A detecção precoce de riscos gestacionais é fundamental para a saúde da mulher e da criança, principalmente em países como o Brasil, onde a morbimortalidade fetal, neonatal e materna ainda é significativa (Souza *et al.*, 2025). O acompanhamento pré-natal é uma estratégia essencial para a identificação e manejo de riscos durante a gravidez, permitindo intervenções oportunas que podem prevenir complicações graves. Estudos, como o de Viellas *et al.* (2014) indicam que, embora a cobertura da assistência no Brasil seja praticamente universal, a adequação dessa assistência permanece baixa, com menos de 10% das gestantes recebendo todos os procedimentos recomendados.

Os distúrbios hipertensivos na gravidez estão entre as complicações mais comuns durante a gestação, englobando hipertensão crônica e hipertensão gestacional, sendo a pré-eclâmpsia (PE) a forma mais grave (Garovic *et al.*, 2022). Definida como um distúrbio multifatorial da gravidez, é caracterizada por disfunção placentária e dano vascular sistêmico, que coloca em risco a vida de mães e bebês em todo o mundo. Afetando cerca de 2% a 4% das gestações, chega a ser responsável por cerca de 46 mil mortes maternas anuais, com impacto desproporcional em países de baixa e média renda (Magee *et al.*, 2022). Nesses locais onde a infraestrutura de saúde pode ser precária, a mortalidade materna é até 34 vezes maior quando comparada a países de alta renda, sendo influenciada por três atrasos críticos: no reconhecimento dos sinais de alerta e na decisão de buscar cuidado, no acesso às unidades de saúde devido a barreiras geográficas e econômicas, e no recebimento de tratamento adequado por escassez de profissionais qualificados, equipamentos e medicamentos essenciais como o sulfato de magnésio. A falta de capacidade diagnóstica para medição adequada de pressão arterial e proteinúria, combinada com sistemas de referência disfuncionais e fatores socioculturais que desvalorizam a saúde materna, perpetuam essas disparidades (Chappell *et al.*, 2021).

Tradicionalmente, o modelo de assistência pré-natal consistia em uma "pirâmide" com maior concentração de consultas no terceiro trimestre de gestação (semanas 28-40), partindo do pressuposto de que a maioria das complicações ocorreria nesta fase tardia e seria imprevisível antes disso. Esse modelo, estabelecido há 80 anos, tinha seu foco em principalmente em detectar e tratar complicações após sua ocorrência (Nicolaidis, 2011).

Com os avanços em ultrassonografia e marcadores bioquímicos, Nicolaidis (2011) propôs a inversão desta pirâmide, deslocando o foco principal para o primeiro trimestre (11-13 semanas)

da gravidez. Esse novo paradigma permite a detecção precoce de riscos para várias complicações gestacionais, incluindo malformações, PE, restrição de crescimento fetal, diabetes gestacional e parto prematuro, por meio da combinação de características maternas, marcadores biofísicos, como pressão arterial média e marcadores bioquímicos, como *PAPP-A* e *PlGF*. A mudança de paradigma representou uma transição de um modelo reativo para um modelo preventivo, onde a identificação precoce de gestantes de alto risco possibilita a implementação de profilaxia, ao invés de simplesmente aguardar a complicação ocorrer para então tratá-la (Sonek; Kagan; Nicolaides, 2016).

A *Fetal Medicine Foundation* (FMF) foi uma precursora neste novo método e desenvolveu uma calculadora de risco para PE que combina dados da história materna, pressão arterial média e índices de pulsatilidade das artérias uterinas, além de outros biomarcadores, para estimar o risco de desenvolver PE durante a gestação. A calculadora utiliza o teorema de Bayes para combinar o risco prévio derivado de fatores maternos com dados adicionais coletados durante a gestação, permitindo uma avaliação mais precisa do risco de PE (Riishede *et al.*, 2023). A utilização dessa ferramenta pode ajudar na identificação precoce de gestantes de risco, permitindo intervenções preventivas e melhorando os resultados maternos e fetais. No entanto, a calculadora da FMF foi desenvolvida e validada principalmente com dados de populações europeias, o que pode limitar sua precisão quando aplicada a outras populações, como a brasileira, devido a diferenças genéticas, ambientais e socioeconômicas (Castro Rezende *et al.*, 2024).

Apesar da alta sensibilidade e especificidade apresentada pelos algoritmos disponibilizados pela FMF para prever PE, a validação externa é questionada devido ao fato de terem seus parâmetros calibrados a partir de dados europeus. Apesar de ter sido validada para gestantes brasileiras, questiona-se se não poderíamos ter uma acurácia maior se utilizássemos dados da nossa população na calibração de seu algoritmo (Rezende *et al.*, 2024).

No entanto, Estudos como o de Silva (2021), demonstram que modelos de aprendizado de máquina aplicados a dados de gestantes são capazes de classificar gravidez de risco com alta precisão, permitindo intervenções precoces. Portanto identificar precocemente essas condições permite que os profissionais de saúde adotem medidas preventivas, ofereçam orientação adequada e garantam intervenções oportunas, reduzindo assim complicações durante a gestação e o parto.

A importância de um sistema de avaliação de riscos gestacionais que possa ser utilizado no sistema público tem o potencial de salvar vidas, melhorar a qualidade dos cuidados maternos

e promover a saúde das gestantes e de seus bebês em curto, médio e longo prazo (Brasil. Ministério da Saúde, 2022). Com isso a busca por soluções utilizando a Inteligência Artificial (IA) e modelos de avaliação de riscos gestacionais adaptados ao contexto brasileiro é um passo crucial na melhoria da saúde materna e perinatal no país. Iniciativas como a aplicação de modelos preditivos modernos têm mostrado eficácia na otimização dos cuidados neonatais e na redução da mortalidade materna (Alcino *et al.*, 2024).

Abordagens com ML para predição de PE de todos os tipos têm demonstrado alta precisão, alcançando taxas de detecção acima dos 80% e taxa de falsos positivos a 10% superando as limitações de métodos anteriores que não consideravam variações populacionais (Gil *et al.*, 2024). A capacidade de processar dados de forma dinâmica e fornecer recomendações baseadas em evidências em tempo real tem o potencial de revolucionar a aplicação clínica desses preditores, permitindo intervenções precoces e personalizadas. No entanto, para que esses modelos sejam amplamente adotados, é necessário superar desafios como a validação em diferentes populações e a integração de biomarcadores como o fator de crescimento placentário (PLGF) em contextos de atenção básica, onde o acesso a esses recursos ainda é limitado (Gil *et al.*, 2024).

Portanto construímos um modelo de ML eficiente em condições de baixa disponibilidade de dados e possível de implementação em locais onde o acesso a saúde é precário, utilizando apenas dados clínicos e ultrassonográficos de rotina. Também foi disponibilizado uma *API REST* para facilitar a incorporação dessa tecnologia em sistemas de saúde, permitindo que profissionais possam acessar as predições de risco de forma rápida e eficiente, otimizando o acompanhamento clínico e potencialmente melhorando os desfechos materno-fetais.

O modelo foi treinado a partir de dados oriundos do atendimento clínico diário a gestantes, previamente armazenados em um sistema de laudos de ultrassom existente antes do início deste estudo, junto ao levantamento dos desfechos gestacionais correspondentes. A validação foi realizada internamente por meio de *holdout*, com separação dos dados agrupada por paciente, de forma a garantir que registros de uma mesma paciente não estivessem simultaneamente nos conjuntos de treino e teste. Embora os dados utilizados não tenham a pretensão de representar integralmente a população de gestantes do Brasil, eles refletem de forma fidedigna a prática clínica local e demonstram o potencial da abordagem proposta como uma alternativa viável e acessível para a identificação precoce de riscos, sem dependência de dispositivos laboratoriais especializados.

O modelo final utiliza um modelo *LightGBM* com técnicas de *data augmentation gaussian*a e *SMOTE*, e alcançou *AUC-ROC* de 0,9886, sensibilidade de 95% e especificidade de 95,45%, superando os principais modelos descritos na literatura para predição de PE, sem a necessidade de biomarcadores laboratoriais, utilizando apenas variáveis clínicas e obstétricas. Esses resultados demonstram o potencial de abordagens de ML aplicadas a dados clínicos acessíveis para a detecção precoce, contribuindo para a redução de desfechos adversos materno-fetais.

2 RISCOS E BENEFÍCIOS

2.1 Benefícios

O estudo tem como benefício principal o desenvolvimento de um modelo preditivo para predição de PE utilizando somente dados clínicos, contribuindo para a identificação precoce de gestantes em risco e auxiliando na melhoria dos desfechos materno-fetais, como também trará benefícios acadêmicos e científicos, com publicações em revistas nacionais e internacionais.

2.2 Riscos

Não existem riscos clínicos ou físicos aos participantes, uma vez que não houve intervenção direta, apenas o uso de dados já existentes em prontuários eletrônicos. O risco identificado é de natureza informacional, referente à coleta, guarda e tratamento de dados clínicos em meio digital, especialmente considerando a utilização de armazenamento em dispositivos e em nuvem.

2.3 Prevenção e minimização dos riscos

- Os dados utilizados não têm informações pessoais diretas (como nome, CPF ou endereço), apenas variáveis clínicas armazenadas em momento anterior à pesquisa.
- Cada participante foi apenas por um ID gerado no banco de dados no momento do cadastro do paciente na primeira consulta, garantindo o anonimato.
- Durante a coleta e análise, os dados ficaram disponíveis em nuvem com criptografia ativada e acesso controlado por IP, restrito apenas ao pesquisador responsável.
- Após a conclusão da coleta, os arquivos foram transferidos para um dispositivo local protegido por senha e criptografia, e o acesso externo foi bloqueado novamente pela clínica responsável.
- Os dados vão ser mantidos período de 5 (cinco) anos após a finalização do estudo, conforme boas práticas científicas, sendo em seguida excluídos de forma definitiva.

Assim, os riscos relacionados ao uso em meio virtual são considerados mínimos e estão devidamente controlados, preservando a confidencialidade e garantindo a integridade das informações.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para contextualizar e fundamentar o trabalho desenvolvido, abordaremos o conhecimento teórico sobre os temas que fazem parte do estudo.

3.1 Pré-Natal

O acompanhamento pré-natal configura-se como um pilar essencial para a redução da morbimortalidade materna e neonatal, integrando ações preventivas, diagnósticas e educativas. Estudos demonstram que consultas regulares diminuem em até 98% os riscos de óbitos por causas evitáveis, como hemorragias e infecções puerperais, mediante a identificação precoce de condições como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional (Silva, I. E. C. *et al.*, 2025).

A atuação multidisciplinar no pré-natal revela-se crítica, com destaque para enfermeiros na detecção de riscos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde consultas de enfermagem contribuem significativamente para reduzir complicações como partos prematuros, mediante monitoramento de pressão arterial, glicemia e orientações sobre aleitamento materno (Sousa, 2024). Em casos de diabetes gestacional, o acompanhamento especializado permite ajustes dietéticos e farmacológicos que diminuem intervenções cirúrgicas emergenciais (Oliveira; Silva, 2025).

Apesar dos avanços, desafios persistem na universalização do pré-natal qualificado. Pesquisas apontam que apenas 35% das gestantes em regiões periféricas completam as seis consultas mínimas recomendadas, muitas vezes devido a barreiras geográficas e culturais (Queiroz; Sousa, 2024). Contudo, a carência de protocolos padronizados para abordagens específicas, como saúde bucal ou manejo de comorbidades, ainda limita a efetividade em escala nacional. Investimentos em capacitação profissional e tecnologias de monitoramento remoto surgem como alternativas promissoras, capazes de ampliar o acesso sem comprometer a qualidade do vínculo terapêutico (Lima *et al.*, 2024).

3.2 Pré-eclâmpsia

A Pré-eclâmpsia (PE) é uma doença multissistêmica e uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e neonatal, contribuindo para cerca de 60.000 mortes maternas e mais de 500.000 nascimentos prematuros em todo o mundo a cada ano, sendo a condição marcada por hipertensão, podendo levar a várias outras complicações, incluindo convulsões (eclâmpsia), lesão renal aguda, disfunção hepática e até morte (Silva, G. D. C. *et al.*, 2024).

Também pode resultar em desfechos neonatais adversos, como restrição do crescimento fetal e descolamento prematuro da placenta. Certos fatores aumentam o risco da gestante de desenvolver, como histórico de pré-eclâmpsia em gestações anteriores, obesidade, diabetes, hipertensão e gestações múltiplas, em que chega a atingir taxas variando de 8-20% para gêmeos e 12-34% para trigêmeos. Além disso, a condição é mais prevalente em populações com menor desenvolvimento, onde síndromes hipertensivas e complicações relacionadas são mais comuns (Ma'ayeh; Costantine, 2020).

Métodos tradicionais de predição incluem a análise de fatores de risco clínicos, como idade materna, índice de massa corporal (IMC), antecedentes obstétricos e medidas da pressão arterial (American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 2020). Além disso, exames laboratoriais e ultrassonográficos, como a dosagem do fator de crescimento placentário (PLGF) e a medida da artéria uterina por Doppler, têm sido utilizados para estimar o risco de desenvolvimento da condição (Poon; Nicolaides, 2014).

Estudos demonstram que a administração de aspirina na dose de 150 mg por dia, de 11 a 14 semanas até 36 semanas da gestação, resultou em uma notável redução de 62% na incidência de PE prematura em gestantes com risco aumentado de desenvolver PE (Rolnik *et al.*, 2017). Como também a suplementação com cálcio demonstra eficácia na diminuição do risco de PE em 49% e hipertensão gestacional em 30% (Jaiswal *et al.*, 2024). Tais achados reforçam a necessidade de modelos preditivos que selecionem grávidas com risco aumentado de desenvolver PE ainda no início da gestação, momento em que a profilaxia se mostrou eficaz.

3.3 Biomarcadores


Os biomarcadores clínicos são ferramentas que ampliam a acurácia diagnóstica e fundamentam a medicina de precisão, como observado no câncer de pulmão, no qual assinaturas genéticas orientam terapias direcionadas e auxiliam no diagnóstico e monitoramento de doenças, permitindo que os médicos identifiquem e tratem condições de saúde de forma mais precisa e personalizada. (Xavier *et al.*, 2022).

Contudo, para que biomarcadores sejam implementados em larga escala na prática clínica, é necessário que sejam acessíveis em termos de custo e facilidade de uso, o que nem sempre se verifica em países de média e baixa renda como o Brasil, onde a necessidade de importação de reagentes, a complexidade tecnológica envolvida e as limitações de infraestrutura laboratorial restringem o acesso da população a esses testes (Zamora-Obando *et al.*, 2022).

O fator de crescimento placentário (*Placental Growth Factor* – PIGF) e a proteína plasmática-

A associada à gravidez (*Pregnancy-Associated Plasma Protein-A* – PAPP-A) são marcadores bioquímicos dosados em amostras de soro materno entre 11 e 13 semanas de gestação. O PlGF atua na angiogênese placentária e seus níveis reduzidos precedem as manifestações clínicas da PE, enquanto o PAPP-A está envolvido na regulação do crescimento fetal e na remodelação vascular. Apesar de sua relevância clínica, a dosagem desses biomarcadores demanda imunoenaios automatizados em plataformas específicas e reagentes de alto custo, o que restringe sua aplicabilidade em contextos de baixa disponibilidade tecnológica e financeira, como grande parte da rede de atenção primária no Brasil (Chaemsaihong; Sahota; Poon, 2022).

Figura 1 – Kit de reagentes Elecsys PAPP-A para plataforma Cobas e analyzers.



Fonte: Roche Diagnostics, 2026.

3.4 Machine Learning

ML é uma subárea da IA que utiliza algoritmos computacionais para identificar padrões em dados e realizar previsões, combinando métodos estatísticos e técnicas de ciência da computação. Na medicina, essa abordagem se divide em duas categorias principais: o aprendizado supervisionado, que prevê resultados, como o risco de infarto usando modelos como o Framingham Risk Score, e o aprendizado não supervisionado, que busca padrões ocultos em dados não rotulados, como a identificação de subtipos de doenças para medicina personalizada. Apesar

do potencial, desafios significativos limitam sua aplicação prática: a necessidade de grandes conjuntos de dados diversificados, a dificuldade em selecionar variáveis biologicamente relevantes e a validação rigorosa dos modelos para garantir precisão em diferentes populações (Deo, 2015).

Existem diversos modelos de ML, cada um com suas características e aplicações específicas e sua principal característica é que aprendem com dados de entrada para fazer previsões ou decisões. Possui uma ampla gama de aplicações em vários campos, incluindo saúde, finanças, marketing e muito mais. Eles podem melhorar os produtos, otimizar processos e aprimorar as capacidades de tomada de decisão nas tarefas diárias (Sarker, 2021). A escolha do modelo mais adequado depende do tipo de problema a ser resolvido, da natureza dos dados disponíveis e dos objetivos da análise. A seguir, apresentamos uma visão geral dos principais modelos de ML utilizados nas mais diversas áreas ((Kolasa *et al.*, 2024); (Rahmani *et al.*, 2021)).

Modelos Baseados em Árvores:

- *Decision Tree (Árvore de Decisão)*: Modelo que divide os dados em subconjuntos por meio de regras de decisão hierárquicas. Adequado para dados tabulares com features categóricas ou numéricas, especialmente quando a interpretabilidade é importante. Exemplos de aplicação: sistemas de diagnóstico médico, avaliação de crédito, classificação de pacientes em grupos de risco;
- *Random Forest*: *Ensemble* de múltiplas árvores de decisão que combina suas previsões por votação (classificação) ou média (regressão). Eficaz para dados tabulares com alta dimensionalidade e relações não-lineares, robusto a outliers. Exemplos: predição de risco cardiovascular, classificação de doenças baseada em múltiplos biomarcadores, análise de sobrevivência;
- *Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost)*: Constrói árvores sequencialmente, onde cada nova árvore corrige os erros das anteriores. Excelente para dados tabulares estruturados com padrões complexos, frequentemente superior em competições de dados. Exemplos: predição de mortalidade hospitalar, estratificação de risco gestacional, previsão de readmissão hospitalar;
- *AdaBoost*: Combina múltiplos classificadores fracos, ajustando os pesos das amostras incorretamente classificadas. Apropriado para problemas de classificação binária com dados balanceados. Exemplos: detecção de fraudes, diagnóstico de doenças raras, classificação de imagens médicas.

Modelos Lineares:

- *Regressão Logística*: Modelo linear para classificação que estima probabilidades usando função logística. Ideal para dados com relações lineares, oferece interpretabilidade por meio de odds ratios. Exemplos: predição de presença/ausência de doença, análise de fatores de risco, estudos epidemiológicos;
- *Regressão Linear*: Modela relações lineares entre variáveis para predição de valores contínuos. Adequada para dados numéricos com relações aproximadamente lineares. Exemplos: estimativa de tempo de internação, previsão de valores laboratoriais, modelagem de dose-resposta.

Support Vector Machines (SVM):

- *SVM*: Encontra hiperplano ótimo que maximiza a margem entre classes, podendo utilizar diferentes kernels (linear, RBF, polinomial, sigmoide) para classificação linear ou não-linear. Eficaz para dados de alta dimensionalidade e amostras pequenas. Exemplos: classificação de textos médicos, análise de microarray, reconhecimento de padrões em ECG, diagnóstico baseado em imagens médicas.

Modelos Baseados em Instâncias:

- *K-Nearest Neighbors (KNN)*: Classifica baseado na maioria dos k vizinhos mais próximos. Funciona bem com dados onde casos similares têm desfechos similares, sem necessidade de treinamento. Exemplos: sistemas de recomendação de tratamentos, classificação de padrões de sintomas, matching de pacientes similares;
- *K-Means*: Algoritmo de clustering que agrupa dados em k clusters por similaridade. Útil para dados não rotulados onde se busca identificar subgrupos naturais. Exemplos: identificação de fenótipos clínicos, segmentação de pacientes, descoberta de padrões em dados de prontuário eletrônico.

Modelos Bayesianos:

- *Naive Bayes (Gaussiano, Multinomial, Bernoulli)*: Classifica usando probabilidades condicionais baseadas no teorema de Bayes, assumindo independência entre features. Eficiente para classificação de texto e dados categóricos de alta dimensionalidade. Exemplos: triagem de documentos médicos, classificação de notas clínicas, filtragem de diagnósticos baseada em sintomas.

Redes Neurais:

- *Artificial Neural Networks (ANN) / Multi-Layer Perceptron (MLP)*: Rede neural feed-

forward com múltiplas camadas ocultas. Capaz de aprender padrões não-lineares complexos em dados tabulares. Exemplos: predição de desfechos clínicos multifatoriais, modelagem de interações complexas entre variáveis, fusão de múltiplas fontes de dados;

- *Convolutional Neural Networks (CNN)*: Especializadas em dados com estrutura espacial, usando camadas convolucionais para extração hierárquica de features. Ideal para imagens médicas (radiografias, tomografias, ressonâncias). Exemplos: detecção de nódulos pulmonares, classificação de lesões dermatológicas, segmentação de órgãos em imagens;
- *Recurrent Neural Networks (RNN)*: Processam sequências temporais mantendo memória de estados anteriores. Adequadas para dados sequenciais e séries temporais. Exemplos: análise de sinais de ECG contínuos, predição baseada em prontuários longitudinais, modelagem de trajetórias de pacientes;
- *Deep Learning / Deep Neural Networks (DNN)*: Redes neurais com múltiplas camadas ocultas capazes de extrair features de alto nível e aprender representações hierárquicas complexas. Exemplos: diagnóstico automatizado a partir de imagens médicas, processamento de linguagem natural em registros clínicos, descoberta de padrões em dados genômicos.

O uso tem se destacado na área da saúde como uma alternativa promissora para a predição de doenças, oferecendo maior precisão na análise de grandes volumes de dados clínicos (Shickel *et al.*, 2018). Modelos como redes neurais, árvores de decisão e regressão logística têm sido aplicados na predição de complicações gestacionais, demonstrando capacidade de identificar padrões complexos que não seriam facilmente detectáveis por métodos convencionais (Artzi *et al.*, 2020). Estudos recentes indicam que modelos baseados em aprendizado supervisionado conseguem atingir altas taxas de sensibilidade e especificidade, quando treinados com bases de dados clínicos robustas e diversificadas (Marić *et al.*, 2020).

3.4.1 SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)

O *SMOTE* é uma técnica de pré-processamento desenvolvida por Chawla *et al.* (2002) para lidar com o problema de desbalanceamento de classes em conjuntos de dados, situação comum em aplicações médicas onde eventos de interesse (como doenças raras ou complicações) são significativamente menos frequentes que casos normais. O algoritmo funciona gerando amostras sintéticas da classe minoritária através de interpolação linear entre instâncias existentes e seus *k*-vizinhos mais próximos, em vez de simplesmente replicar amostras existentes. Esta abordagem

permite expandir o espaço de características da classe minoritária, melhorando a capacidade do modelo de aprender padrões relevantes e reduzindo o viés em favor da classe majoritária. Na área da saúde, esse método tem sido amplamente utilizado em problemas como detecção de fraudes em seguros, diagnóstico de doenças raras e predição de complicações clínicas (Elreedy; Atiya, 2019).

3.4.2 DATA AUGMENTATION GAUSSIANA

A *Data Augmentation Gaussiana* é uma técnica que adiciona ruído gaussiano controlado aos dados de treinamento para melhorar a robustez e a capacidade de generalização dos modelos de aprendizado de máquina. Esta abordagem é particularmente relevante em aplicações médicas, onde os dados frequentemente apresentam variações naturais decorrentes de diferentes equipamentos de aquisição, protocolos ou condições ambientais. Ao treinar modelos com dados ligeiramente perturbados, o algoritmo aprende a focar nas características essenciais e diagnósticas, ignorando variações superficiais irrelevantes (Beinecke; Heider, 2021; Chlap *et al.*, 2021).

3.4.3 SHAP (SHapley Additive exPlanations)

O *SHAP* é um framework de explicabilidade desenvolvido por Lundberg e Lee (2017), que utiliza conceitos da teoria dos jogos cooperativos para interpretar as predições de modelos de machine learning. O método atribui a cada variável um valor de importância, o valor de *Shapley*, que quantifica sua contribuição para uma predição específica, permitindo compreender como cada característica influencia o resultado do modelo. Na área da saúde, a explicabilidade é fundamental para a adoção clínica de sistemas de IA, pois profissionais de saúde necessitam compreender o raciocínio por trás das predições para validar decisões e estabelecer confiança. O SHAP tem sido aplicado em diversas áreas médicas, incluindo predição de risco cardiovascular, diagnóstico de câncer, detecção de Alzheimer e estratificação de pacientes, contribuindo para aumentar a transparência e confiabilidade dos modelos preditivos em ambientes clínicos (Islam *et al.*, 2024).

3.5 API REST

Uma *API REST* (*Representational State Transfer*) é um padrão arquitetônico para comunicação entre sistemas que utiliza os princípios do protocolo *HTTP* para facilitar a comunicação

entre clientes e servidores. Utiliza um conceito de *endpoints*, que são os pontos de comunicação do sistema, no qual se pode enviar ou receber dados por meio de uma URL. Segundo (Gowda; Gowda, 2024), sua eficiência reside na adoção de práticas como: (1) design orientado a recursos, em que entidades (como usuários ou produtos) são acessadas via *endpoints* (ex: `/api/v1/usuarios`); (2) operações sem estado, garantindo que cada requisição contenha informações completas para processamento, eliminando dependências de sessões anteriores; e (3) uso explícito de métodos *HTTP* (*GET*, *POST*, *PUT*, *DELETE*) para mapear operações *CRUD* (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*). Essa abordagem traz benefícios significativos: escalabilidade, pois a ausência de conexões persistentes permite distribuir carga entre servidores; segurança robusta, com implementação de *HTTPS* e protocolos como *JWT* para autenticação; e flexibilidade, viabilizando integração facilitada entre sistemas. Além disso, técnicas como *caching* e paginação otimizam desempenho, reduzindo latência em cenários de alto tráfego (Gowda; Gowda, 2024). A adoção dessas práticas não apenas padroniza o desenvolvimento, mas também reduz riscos de vulnerabilidades e custos de manutenção, posicionando *APIs REST* como pilares essenciais para aplicações *web* modernas.

A integração de modelos preditivos por meio de *APIs* tem sido amplamente adotada para fornecer suporte à decisão médica em tempo real, facilitando a incorporação de *IA* em sistemas hospitalares. *APIs* médicas permitem que dados clínicos sejam processados e analisados dinamicamente, proporcionando recomendações baseadas em evidências e aumentando a eficiência do diagnóstico (Mandel *et al.*, 2016). Além disso, a interoperabilidade entre sistemas eletrônicos de saúde possibilita que tais interoperabilidades sejam utilizadas em diversas plataformas, como prontuários eletrônicos e aplicativos móveis voltados para gestantes e profissionais de saúde (HIMSS – Healthcare Information and Management Systems Society, 2020). Portanto, unindo a predição e a rápida integração facilitada com softwares já existentes, ou que podem vir a ser construídos, podemos tornar mais simples e efetivo esse acompanhamento clínico de gestantes em alto risco.

4 ESTADO DA ARTE

A seguir temos a síntese de uma revisão de escopo que foi construída no curso deste trabalho, com o intuito de aprofundarmos sobre a eficácia da aplicação da ML para o auxílio no diagnóstico precoce da PE. As buscas sobre os trabalhos co-relatos ao tema ocorreram em três bases online, PubMed, Embase (Elsevier) e Biblioteca virtual de saúde (BVS). O protocolo da revisão já foi produzido e publicado e esta disponível no Apêndice A, indicando as variáveis de buscas e mais detalhes, o trabalho final na íntegra pode ser encontrado no Apêndice B e esta em processo de submissão para publicação.

O método tradicional de predição consiste em exames laboratoriais e ultrassonográficos, como a dosagem do fator de crescimento placentário (PLGF) e a medida da artéria uterina por Doppler, e têm sido utilizados para estimar o risco de desenvolvimento da condição (Poon; Nicolaides, 2014). Essas abordagens apresentam limitações, como alto custo e baixa acessibilidade, dificultando sua ampla adoção em países de baixa e média renda (World Health Organization, 2019).

As calculadoras de riscos também são utilizadas para prever a PE e empregam métodos Bayesianos estatísticos integrando um conjunto de variáveis preditivas, incluindo características maternas, pressão arterial média (PAM), índice de pulsatilidade da artéria uterina (UTA-PI), PLGF e proteína plasmática A associada à gravidez (PAPP-A) para estimar riscos obstétricos. Desenvolvidas em colaboração entre a FMF e o Hospital Clínic de Barcelona, essas ferramentas demonstraram maior precisão diagnóstica em comparação com métodos tradicionais, além de serem a única abordagem com validação internacional (Riishede *et al.*, 2023).

O estudo de Castro Rezende *et al.* (2024), realizado no Brasil, mostra que mesmo validados, métodos como esse não levam em conta a população local para calibrar seus parâmetros fundamentais, o que é essencial para uma boa precisão em tipos de populações distintas, no qual o resultado é uma taxa considerada alta de falsos positivos (FPR) de 24,4%. Quando comparamos com outros modelos preditivos que utilizam ML, que obtêm resultados de FPR abaixo de 15% (Gil *et al.*, 2024). Com isso podemos observar a discrepância desses resultados, demonstrando que a falta de dados personalizados para a população afeta expressivamente o nível de precisão do resultado. Apesar disso, o modelo da FMF mantém relevância clínica por sua validação internacional e simplicidade operacional, sendo amplamente adotado em contextos de recursos limitados e frequentemente referenciadas por outros autores que desenvolvem modelos de

aprendizado de máquina como um padrão para validação de sua acurácia, por ser o único aceito e validado internacionalmente (Torres-Torres *et al.*, 2024).

Além disso, Araújo *et al.* propuseram um modelo de aprendizado de máquina baseado em LightGBM, treinado com dados sintéticos gerados pela metodologia *Data Augmentation and Smoothing* (DAS) a partir de parâmetros do hemograma completo (CBC), para apoiar o diagnóstico de PE com sinais de gravidade (Araújo; Macedo; Veloso *et al.*, 2024). O modelo alcançou AUROC de 0,90, sensibilidade de 0,95 e especificidade de 0,79, evidenciando o alto potencial preditivo dessa combinação. No entanto, por depender de exame laboratorial, ainda adiciona uma etapa e um requisito de infraestrutura ao fluxo assistencial, o que pode limitar sua aplicabilidade imediata em cenários com recursos mais restritos.

Demonstrando o potencial das tecnologias de IA na transformação do cuidado pré-natal um estudo desenvolveu usando Python, *scikit-learn* e *TensorFlow*, com dados analisados por meio do SPSS 22 uma versão do *IBM SPSS Statistics* para prever o risco de PE. Enquanto algoritmos de deep learning e Extra Trees Classifier, foram empregados para avaliar o poder preditivo de diferentes variáveis. O estudo utilizou técnicas como aumento de gradiente e otimização de hiper parâmetros para melhorar o desempenho do modelo, que demonstrou uma sensibilidade de 73,7% e especificidade de 92,7%, indicando sua eficácia na distinção entre casos positivos e negativos para PE (Bülez *et al.*, 2024).

Recente estudo chinês testou cinco algoritmos de classificação diferentes, *Logistic Regression*, *Extra Trees Classifier*, *Voting Classifier*, *Gaussian Process Classifier* e *Stacking Classifier*. O *Stacking Classifier* apresentou o melhor desempenho na previsão da PE prematura, com uma área sob a curva (AUC) de 0,884. no qual incorpora várias características maternas, como idade, altura, peso antes da gravidez e biomarcadores clínicos, como *PAM*, *UTA-PI*, *PAPP-A* e *PLGF*, utilizando da ferramenta SHAP (*Shapley Additive Explanations*) para explicar as previsões do modelo e oferecer mais transparência do modelo, o que torna mais seguro a aplicação em contextos clínicos, porém ressalta a necessidade de validação desse método por considerar dados de apenas um único centro local (Li *et al.*, 2024).

Em cenários com amostras limitadas, Schmidt *et al.* (2022) desenvolveu um modelo utilizando *Gradient-Boosted Tree (GBTree)* para predição de desfechos adversos associados à PE, treinado com uma coorte de apenas 1.647. O modelo demonstrou desempenho robusto, com área sob a curva (AUC) de 0,82, valor preditivo positivo de 88% e especificidade de 97%, evidenciando que mesmo com amostras modestas, os algoritmos baseados em *boosting* conse-

guem capturar padrões complexos nos dados clínicos sem necessidade de grandes volumes de treinamento. A interpretabilidade do modelo foi também assegurada por meio do uso de valores de *SHAP*.

Edvinsson *et al.* (2024), desenvolveram um modelo utilizando *XGBoost* para predição da necessidade de cuidados intensivos em mulheres com pré-eclâmpsia, treinado com uma coorte extremamente reduzida de apenas 81 pacientes de hospitais regionais no sul da Suécia. Apesar do tamanho amostral bastante restrito, o modelo demonstrou desempenho robusto, alcançando área sob a curva (AUC) de 0,90 na validação cruzada e 0,85 no conjunto de teste independente, com precisão de 92% e 82%, respectivamente. A otimização de hiperparâmetros foi gerenciada utilizando *Optuna* com *Tree-Structure Parzen Estimator*, e a interpretabilidade foi assegurada por meio de valores *SHAP*, evidenciando que algoritmos baseados em boosting conseguem capturar padrões complexos mesmo com disponibilidade muito limitada de dados clínicos.

Portanto, fica evidente a viabilidade e relevância do desenvolvimento de uma nova ferramenta preditiva para avaliação do risco de pré-eclâmpsia baseada em algoritmos de machine learning utilizando dados clínicos específicos da nossa população. Essa abordagem personalizada tem o potencial de superar as limitações dos modelos atuais, especialmente no que se refere à taxa de falsos positivos e à acurácia em contextos locais, contribuindo significativamente para a tomada de decisão clínica mais precisa e eficaz e facilitar a implementação dessas ferramentas em diferentes realidades socioeconômicas. Diante deste cenário, foi desenvolvido um modelo de *Lightgbm*, acoplado e disponibilizado via *API REST*.

A partir dos dados obtidos, algumas das decisões acerca do modelo foram definidas, como o tipo de algoritmo, que vai seguir a família do *gradiente boosting*, mais precisamente o *LightGBM*, que demonstrou altas taxas de desempenho com treinamento utilizando amostras de tamanho limitado, tornando-o essa família de algoritmos especialmente adequadas para a realidade da base de dados disponível neste trabalho.

Tabela 1 – Comparação entre modelos de predição de pré-eclâmpsia descritos na literatura.


Estudo / Mo- delo	Variáveis	AUC	Sensibilidade	Especificidade / FPR	Observações
FMF (regressão) (Castro Rezende <i>et al.</i> , 2024)	Dados maternos; PAM; UTA-PI; PLGF; PAPP-A	0,818	0,714	FPR = 0,244	Modelo validado internacional- mente; elevada taxa de falsos posi- tivos na população brasileira.
Araújo <i>et al.</i> (LightGBM) (Araújo; Ma- cedo; Veloso <i>et al.</i> , 2024)	Hemograma com- pleto (CBC) com dados sintéticos (DAS)	0,90	0,95	0,79 (esp.)	Requer exames la- boratoriais; maior complexidade ope- racional.
Bulez <i>et al.</i> (DL / Extra Trees) (Bulez <i>et al.</i> , 2024)	Variáveis clínicas diversas	–	0,737	0,927 (esp.)	Deep Learning com otimização extensa de hiperpa- râmetros.
Li <i>et al.</i> (Stac- king) (Li <i>et al.</i> , 2024)	Dados maternos; PAM; UTA-PI; PLGF; PAPP-A	0,884	–	–	Validação em cen- tro único; uso de <i>SHAP</i> para expli- cabilidade.
Schmidt <i>et al.</i> (ML ensemble) (Schmidt <i>et al.</i> , 2022)	Dados clínicos, laboratoriais e hemodinâmicos	0,88	–	–	Predição de des- fechos adversos associados à pré- eclâmpsia; coorte multicêntrica; mo- delo explicável.
Edvinsson <i>et al.</i> (XGBoost) (Edvinsson <i>et al.</i> , 2024)	Variáveis clínicas maternas	0,90 (CV) / 0,85 (teste)	–	–	Coorte piloto ex- tremamente redu- zida (n=81); uso de Optuna e <i>SHAP</i> ; foco em necessi- dade de UTI.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

5 METODOLOGIA

A metodologia do desenvolvimento do modelo PPML seguiu o processo de pipeline de aprendizado de máquina, baseado no modelo proposto por Kreuzberger, Kühl e Hirschl (2023), adaptado à nossa proposta de aplicação clínica.

Figura 2 – Pipeline de desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina utilizado no estudo.



Fonte: Adaptado de Kreuzberger, Kühl e Hirschl (2023), 2026.

5.1 Análise dos dados

Essa etapa se caracteriza pela coleta de dados para o treinamento do modelo preditivo. Trata-se de uma fase crucial, pois a qualidade, relevância e quantidade dos dados coletados impactam diretamente o desempenho do modelo final. No contexto desse trabalho foi utilizado um banco de dados de uma clínica ultrassonográfica, onde foi exportado as informações referentes aos exames convertendo para dados tabelados, e unificado com os questionários em uma única planilha, na qual as diferentes tabelas foram integradas por meio do campo *PacienteId*. A partir disso, foi realizada uma análise exploratória dos dados, com o objetivo de compreender a estrutura, identificar padrões e detectar possíveis inconsistências ou valores ausentes. Essa etapa foi fundamental para orientar as decisões subsequentes de pré-processamento e modelagem, garantindo que o conjunto de dados estivesse adequado para o desenvolvimento do modelo preditivo.

5.2 Preparação dos dados e validação

A preparação dos dados foi aplicada diretamente na pipeline da ML, no qual realizamos a conversão explícita dos tipos de variáveis, datas, números inteiros e reais.

A versão final do conjunto de dados pré-processado foi acompanhada pela equipe de saúde parceira, que conta com uma especialista fetal, que avaliou a coerência das decisões de

codificação, inclusão e exclusão de variáveis, bem como limites de valores adotados, para que corresponda ao conhecimento clínico atual sobre fatores de risco para pré-eclâmpsia.

5.3 Treinamento do modelo

Concluída a preparação dos dados, procedeu-se à definição da variável alvo (*PreEclampsia*) e do conjunto de atributos de entrada, compostos por variáveis clínicas e ultrassonográficas selecionadas na etapa anterior. Para evitar vazamento de informação entre conjuntos de treino e teste, foi adotada uma estratégia de divisão baseada em grupos, garantindo que todos os registros de uma mesma gestante permanecessem em apenas um dos conjuntos. Em seguida, foram construídos os conjuntos de treino, validação e teste, com estratificação em relação ao desfecho para preservar a proporção de casos de pré-eclâmpsia em cada partição.

5.4 Validação do modelo

A validação do modelo ocorreu de forma interna, utilizando nossos próprios dados que não participaram do treinamento nem do balanceamento das classes, sendo o conjunto de teste composto por 42 dados, dos quais 20 apresentaram PE e 22 não tiveram o desfecho. Para cada dado o modelo produziu probabilidades de ocorrência, onde a partir delas foram estimadas as curvas *Receiver Operating Characteristic* (ROC) e *precision-recall* e a partir dessas curvas, foram calculadas métricas de desempenho, incluindo área sob a curva (AUC), acurácia, sensibilidade, especificidade, precisão, *F1-score* e matriz de confusão, com ênfase na análise da sensibilidade em diferentes pontos de corte.

5.5 Disponibilização do modelo

Após a construção e validação do modelo preditivo, o próximo passo foi o desenvolvimento de uma *API REST* para ser possível empacotar e disponibilizar o serviço de predição em um ambiente de produção, e facilitar o consumo.

5.6 Aspectos Éticos

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. O parecer consubstanciado de aprovação, de número 7.974.575, encontra-se disponível no Anexo A. Os dados clínicos utilizados neste estudo foram coletados de forma retrospectiva, garantindo o anonimato

dos pacientes e a confidencialidade das informações, sendo utilizados exclusivamente para fins científicos.

6 DESENVOLVIMENTO DO MODELO

6.1 Dados

Os dados utilizados neste estudo são provenientes de um banco de dados relacional composto por laudos ultrassonográficos e informações clínicas de gestantes atendidas entre 2023 e 2025. A estrutura do banco de dados está representada na Figura 2. Cada registro está associado a um identificador único de paciente (*PacienteId*), sem acesso a informações diretamente identificáveis, garantindo a confidencialidade das participantes em conformidade com os princípios éticos da pesquisa.

A amostra inicial totalizou 571 consultas ultrassonográficas, provenientes de 146 pacientes distintas.

Figura 3 – Diagrama do banco de dados relacional utilizado no estudo.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

6.1.1 Extração e Integração dos Dados

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, os dados clínicos e ultrassonográficos foram extraídos por meio de uma aplicação desenvolvida em C# e esta disponível no Apêndice C. O método implementado acessa o banco de dados e extrai informações em formato de texto

livre presentes no campo “laudo”, convertendo-as para dados estruturados em formato tabular. Posteriormente, os questionários de desfecho foram integrados em uma única planilha, utilizando o campo *PacienteId* como chave de vinculação entre as diferentes tabelas.

Os exames selecionados para o estudo foram escolhidos por apresentarem grande variedade de informações ultrassonográficas e dados maternos, sendo provenientes de atendimentos clínicos rotineiros. Os tipos de exames incluídos foram: obstétrico, obstétrico com Doppler e translucência nuchal, por serem geralmente o ciclo normal de exames da gravidez. Como critério de inclusão, definiu-se que pacientes com um ou mais desses exames deveriam ter seus dados exportados juntamente com o questionário de desfecho da gravidez, parte do protocolo de acompanhamento de gestantes que realizaram pré-natal completo na clínica. Essa estratégia permitiu avaliar o acompanhamento longitudinal por gestante durante todo o período gestacional.

Das consultas ultrassonográficas foram coletadas todas as variáveis clínicas disponíveis, incluindo: idade materna, presença de diabetes e hipertensão, histórico obstétrico, tabagismo, entre outras; bem como variáveis ultrassonográficas, tais como idade gestacional, peso fetal estimado, índice de pulsatilidade da artéria uterina, percentis de crescimento fetal, entre outras.

Tabela 2 – Variáveis maternas, ultrassonográficas, de desfecho e dados finais utilizados no treinamento e predição do modelo.

Categoria/Fonte	Variáveis
Dados maternos	Paciente ID; Data; Data de nascimento; Idade materna (anos); Peso; Peso no primeiro trimestre (kg); Peso materno atual (kg); Índice de Massa Corporal (IMC); Origem racial; Histórico familiar de diabetes; Diabetes; Tipo de diabetes; Hipertensão; Doença pré-existente; Tipo de doença pré-existente; Fuma; Medicação; Uso de medicação; Outro uso de medicação
Histórico obstétrico	História obstétrica anterior; Perdas gestacionais anteriores; Primeiro peso na gravidez; Data provável do parto; Idade gestacional (semanas); Idade gestacional corrigida (semanas)
Dados ultrassonográficos	Biometria embrionária (dias); Biometria embrionária (semanas); Peso fetal estimado (g); Percentil do peso fetal; Circunferência abdominal (mm); Percentil da circunferência abdominal; Maior bolsão; Índice de Pulsatilidade médio da Artéria Uterina (IP médio); Percentil da Artéria Uterina; Percentil da Artéria Umbilical; Percentil da Relação Cérebro-Placenta
Riscos calculados	Risco Trissomia 21; Risco Trissomia 18; Risco basal de pré-eclâmpsia; Risco corrigido de pré-eclâmpsia; Risco de restrição de crescimento fetal; Percentil geral
Dados de desfecho neonatal	Pré-eclâmpsia; Diabetes gestacional; Anemia; Hipotireoidismo; Outras doenças; Tipo de parto; Data do parto; Data de nascimento; Peso ao nascer; Comprimento ao nascer; Perímetro cefálico; Apgar 1 minuto; Apgar 5 minutos; Dias de internação hospitalar; Intercorrências
Variáveis finais usadas no modelo	Idade materna; Índice de massa corporal (IMC); Diabetes mellitus; Hipertensão arterial; Origem racial; Histórico familiar de diabetes; Tipo de diabetes; Índice de pulsatilidade médio da artéria uterina; Perdas gestacionais anteriores; Peso materno atual; Idade gestacional; Idade gestacional corrigida; Peso fetal estimado; Percentil da artéria uterina; Percentil da artéria umbilical; Percentil do peso fetal; Circunferência abdominal fetal

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

6.1.2 Pré-processamento e Tratamento dos Dados

O pré-processamento dos dados foi realizado seguindo uma abordagem sistemática para garantir a qualidade e consistência das informações utilizadas no modelo preditivo. As etapas executadas estão descritas a seguir.

Identificação de Episódios Gestacionais

Dado que uma mesma paciente pode ter realizado múltiplas consultas ao longo da gestação, foi necessário consolidar essas consultas em registros únicos por episódio gestacional. Para isso, implementou-se um algoritmo que percorre as consultas de cada paciente em ordem cronológica, utilizando o *PacienteId* como chave de agrupamento, e consolida todas as consultas de um mesmo

período gestacional em um único registro. Quando identificado um intervalo superior a 270 dias (aproximadamente 9 meses) entre consultas consecutivas, caracterizou-se o início de uma nova gestação, gerando um novo identificador com sufixo alfabético sequencial para rastreabilidade (ex: 1124, 1124A). Esse procedimento resultou em 151 episódios gestacionais avaliados.

Padronização de Variáveis Categóricas

As variáveis categóricas textuais foram padronizadas e convertidas para valores numéricos, facilitando o processamento pelo modelo de aprendizado de máquina. A variável origem racial foi codificada como: Branco = 1, Pardo = 2 e Preto = 3. Variáveis binárias, como presença de diabetes e hipertensão, foram convertidas para 0 (ausência) e 1 (presença). O histórico familiar de diabetes foi categorizado em quatro níveis: ausente (0), terceiro grau (1), segundo grau (2) e primeiro grau (3), refletindo a proximidade do parentesco. O tipo de diabetes foi codificado como: ausente (0), diabetes gestacional (1), diabetes tipo 1 (2) e diabetes tipo 2 (3).

Cálculo da Idade Materna

A idade materna foi calculada a partir da data de nascimento registrada no banco de dados e de uma data de referência consistente para cada paciente, definida como 02 de dezembro de 2025. Nos casos em que a data de nascimento não estava disponível, foi atribuído o valor de 28 anos, correspondente à idade média observada na população estudada. Para garantir a plausibilidade fisiológica, foram aplicados limites de 15 a 50 anos, reduzindo a influência de possíveis erros de digitação sem descartar registros completos.

Tratamento de Valores Ausentes

Valores ausentes foram tratados segundo regras específicas, onde variáveis que representam ausência de condição clínica foram preenchidas com zero, e quando não foi possível inferir a informação a partir dos registros disponíveis, foram utilizados valores de referência clínica ou médias populacionais.

Aplicação de Limites Fisiológicos

Para mitigar o impacto de outliers e erros de digitação, foram aplicados limites fisiologicamente plausíveis às variáveis contínuas. Os intervalos estabelecidos foram: idade materna entre 15 e 50 anos; peso materno entre 35 e 150 kg; índice de massa corporal (IMC) entre 15 e 50

kg/m²; e peso fetal estimado até 5.000 g. Esses limites baseiam-se em valores biologicamente esperados e referências obstétricas, permitindo a correção de valores extremos sem perda de informação relevante.

Ajuste do Peso Materno

Uma etapa específica de processamento foi implementada para ajustar o peso materno registrado. Como o peso informado frequentemente incluía o peso fetal estimado (obtido por ultrassonografia), foi realizada a subtração do peso fetal (convertido de gramas para quilogramas) do peso materno total, resultando em uma estimativa mais acurada do peso corporal materno real. Essa correção é fundamental para evitar viés nas análises relacionadas ao IMC e ao estado nutricional materno.

Extração de Informações de Texto Livre

A partir de campos de texto livre contendo informações sobre antecedentes clínicos, foram criadas variáveis binárias indicadoras de condições específicas utilizando expressões regulares (*regex*). Esse procedimento permitiu a identificação sistemática de condições como hipertensão pré-existente e histórico familiar de diabetes a partir de descrições textuais não estruturadas.

Pipeline de Pré-processamento

A etapa completa de preparação dos dados foi implementada por meio de uma pipeline customizada utilizando as bibliotecas *pandas* (manipulação de dados) e *scikit-learn* (padronização com *StandardScaler*), com mapeamentos categóricos para variáveis como origem racial, tipo de diabetes e comorbidades, preenchimento de valores ausentes com zero e garantia de 17 variáveis de entrada fixas para o modelo.

Ao final do processamento, a base de dados final apresentou as seguintes características:

- **Pacientes únicas:** 146 pacientes únicas
- **Episódios gestacionais:** 151 episódios gestacionais
- **Ausência de valores faltantes** nas 17 variáveis selecionadas para o modelo
- **Distribuição da variável alvo:** 127 gestações sem PE (classe 0) e 24 gestações com PE (classe 1), correspondendo a uma prevalência de 16,4%

6.2 Modelo PPML

O modelo final implementado foi o LightGBM (`LGBMClassifier`), um algoritmo baseado em *gradient boosting* otimizado para classificação binária, escolhido por demonstrar desempenho superior considerando o tamanho amostral disponível. O processo de seleção de variáveis foi conduzido de forma iterativa, iniciando com todas as variáveis disponíveis no *dataframe* com as informações exportadas.

Os hiperparâmetros do modelo foram definidos com o objetivo de equilibrar capacidade preditiva e controle de sobreajuste, aspectos críticos diante do tamanho amostral limitado. A configuração adotada é apresentada no Código 1. A taxa de aprendizado (*learning_rate*) foi fixada em 0,05, valor conservador que, combinado a um número elevado de estimadores (*n_estimators* = 1000), permite convergência gradual e estável. A complexidade individual das árvores foi restringida por meio dos parâmetros *max_depth* = 5 e *num_leaves* = 20, enquanto *min_child_samples* = 30 impôs um número mínimo de observações por folha, reduzindo a propensão a partições baseadas em amostras insuficientes. Técnicas de subamostragem foram empregadas tanto sobre as observações (*subsample* = 0,7) quanto sobre as variáveis em cada árvore (*colsample_bytree* = 0,7) e em cada nível (*colsample_bylevel* = 0,7), introduzindo aleatoriedade para aumentar a robustez do conjunto de modelos. Adicionalmente, regularização L1 (*reg_alpha* = 1,0) e L2 (*reg_lambda* = 2,0) foram aplicadas aos scores das folhas para penalizar modelos excessivamente complexos. A função de perda utilizada foi a *binary log-loss*, consistente com o objetivo de classificação binária.

```
1 lgb_model = lgb.LGBMClassifier(  
2     objective='binary',  
3     boosting_type='gbdt',  
4     n_estimators=1000,  
5     learning_rate=0.05,  
6     num_leaves=20,  
7     max_depth=5,  
8     min_child_samples=30,  
9     min_child_weight=0.001,  
10    subsample=0.7,  
11    colsample_bytree=0.7,  
12    colsample_bylevel=0.7,  
13    reg_alpha=1.0,  
14    reg_lambda=2.0,
```

```

15     random_state=RANDOM_STATE ,
16     n_jobs=-1,
17     verbosity=-1,
18     force_row_wise=True,
19     metric='binary_logloss'
20 )

```

Código 1 – Configuração do modelo LightGBM utilizado no estudo. Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Testes sucessivos de treinamento e validação interna foram conduzidos para identificar as variáveis que efetivamente impactavam a capacidade preditiva do modelo. Para quantificar a contribuição de cada variável, foi utilizado o método SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), que mensura o impacto individual de cada preditor sobre as previsões do modelo. Variáveis que apresentaram importância nula ou próxima de zero foram sistematicamente excluídas. Essa baixa importância decorreu principalmente da escassez de ocorrências na base de dados, inviabilizando a geração de dados sintéticos representativos e tornando sua inclusão inadequada do ponto de vista metodológico.

Ao término do processo de seleção, o modelo foi treinado com 17 variáveis clínicas e ultrassonográficas: idade materna, índice de massa corporal (IMC), diabetes mellitus, hipertensão arterial, origem racial, histórico familiar de diabetes, tipo de diabetes, índice de pulsatilidade médio da artéria uterina (IP médio), perdas gestacionais anteriores, peso materno atual, idade gestacional, idade gestacional corrigida, peso fetal estimado, percentil da artéria uterina, percentil da artéria umbilical, percentil do peso fetal e circunferência abdominal fetal.

A padronização das categorias textuais, como origem racial e histórico familiar de diabetes, bem como o cálculo da idade materna a partir da data de nascimento e de uma data de referência consistente para cada paciente, foram etapas essenciais no pré-processamento. Valores ausentes foram tratados segundo regras específicas: uso da moda para variáveis categóricas, substituição por zero para variáveis que representam ausência de condição clínica e utilização de valores de referência quando não foi possível inferir a informação a partir dos registros disponíveis.

Adicionalmente, foram aplicados limites fisiologicamente plausíveis às variáveis contínuas, idade materna (15–50 anos), peso materno (35–150 kg), IMC (15–50 kg/m²) e peso fetal (0–5.000 g), com o objetivo de reduzir a influência de outliers e mitigar o impacto de erros de digitação sem descartar registros completos.


A pipeline completa de preparação dos dados foi implementada em Python, utilizando as

bibliotecas *pandas* e *scikit-learn*, integrando todas as etapas descritas acima.

6.3 Resultados


O modelo alcançou AUC-ROC de 0,9886 e acurácia de 0,9524, com precisão de 0,9500, sensibilidade de 0,9500 e F1-score de 0,9500. A avaliação incluiu curva ROC, matriz de confusão, curva de aprendizado e análise de importância das variáveis pelo método SHAP, onde o ranking destacou como principais preditores: hipertensão, idade, peso, tipo de diabetes, IMC, peso fetal, idade gestacional, origem racial, percentil da artéria uterina e percentil da artéria umbilical, o que corresponde ao que é descrito como fatores de risco para a condição na literatura (Ma'ayeh; Costantine, 2020). O código completo do treinamento está disponível no Apêndice D.

Figura 4 – Métricas de avaliação do modelo LightGBM: curva ROC, importância das variáveis e curva de aprendizado.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Figura 5 – Distribuição de probabilidades previstas e matriz de confusão do modelo LightGBM.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Quando comparado aos modelos descritos no estado da arte, o modelo proposto demonstrou

desempenho superior na identificação correta dos casos positivos, alcançando uma taxa de verdadeiros positivos (TPR) de 95%, o que indica elevada capacidade de detecção dos casos de PE. A matriz de confusão evidencia 19 verdadeiros positivos, 21 verdadeiros negativos, apenas 1 falso positivo e 1 falso negativo em um total de 42 casos que serviram para validação interna. Esse resultado corresponde a uma perda diagnóstica de apenas 5% entre os casos positivos, refletindo alta sensibilidade, aliada a uma especificidade de 95,45%. Tal desempenho mostra um equilíbrio favorável entre a detecção precoce e a contenção de classificações incorretas, aspecto particularmente relevante no contexto clínico da pré-eclâmpsia, em que a identificação dos casos verdadeiros é essencial para a redução de desfechos adversos materno-fetais, sem comprometer a eficiência do sistema de saúde.

Tabela 3 – Comparação entre modelos de predição de pré-eclâmpsia descritos na literatura e o presente estudo.


Estudo / Mo- delo	Variáveis	AUC	Sensibilidade	Especificidade / FPR	Observações
FMF (regressão) (Castro Rezende <i>et al.</i> , 2024)	Dados maternos; PAM; UTA-PI; PLGF; PAPP-A	0,818	0,714	FPR = 0,244	Modelo validado internacionalmente; elevada taxa de falsos positivos na população brasileira.
Araújo <i>et al.</i> (LightGBM) (Araújo; Macedo; Veloso <i>et al.</i> , 2024)	Hemograma completo (CBC) com dados sintéticos (DAS)	0,90	0,95	0,79 (esp.)	Requer exames laboratoriais; maior complexidade operacional.
Bulez <i>et al.</i> (DL / Extra Trees) (Bulez <i>et al.</i> , 2024)	Variáveis clínicas diversas	–	0,737	0,927 (esp.)	Deep Learning com otimização extensa de hiperparâmetros.
Li <i>et al.</i> (Stacking) (Li <i>et al.</i> , 2024)	Dados maternos; PAM; UTA-PI; PLGF; PAPP-A	0,884	–	–	Validação em centro único; uso de SHAP para explicabilidade.
Schmidt <i>et al.</i> (ML ensemble) (Schmidt <i>et al.</i> , 2022)	Dados clínicos, laboratoriais e hemodinâmicos	0,88	–	–	Predição de desfechos adversos associados à pré-eclâmpsia; coorte multicêntrica; modelo explicável.
Edvinsson <i>et al.</i> (XGBoost) (Edvinsson <i>et al.</i> , 2024)	Variáveis clínicas maternas	0,90 (CV) / 0,85 (teste)	–	–	Coorte piloto extremamente reduzida (n=81); uso de Optuna e SHAP; foco em necessidade de UTI.
Presente estudo (PPML)	17 variáveis clínicas/obstétricas (idade, IMC, diabetes, peso gestacional, peso, etc.)	0,9886	0,9500	0,9545 (esp.) / FPR = 0,0455	Amostra real local (42 casos: 20 com e 22 sem PE); sem uso de biomarcadores.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Diante do tamanho reduzido da amostra disponível, a avaliação de overfitting foi tratada como etapa prioritária na validação do modelo. A comparação sistemática entre as métricas obtidas nos conjuntos de treino e teste revelou diferenças inferiores a 0,05 em todas as métricas avaliadas: AUC-ROC (0,9942 vs 0,9886), acurácia (0,9851 vs 0,9524), precisão (0,9796 vs 0,9500), recall

(0,9897 vs 0,9500) e F1-score (0,9846 vs 0,9500), indicando que o modelo não apresenta sinais significativos de memorização dos dados de treino e generaliza de forma consistente para dados não vistos. Esse resultado reforça a adequação das estratégias adotadas, como o agrupamento por paciente via `GroupShuffleSplit`, que garante que todos os registros de uma mesma paciente permaneçam inteiramente em apenas um dos conjuntos, evitando vazamento de dados. A estratificação por desfecho e o uso controlado de *data augmentation* contribuíram conjuntamente para mitigar os riscos inerentes ao treinamento com amostras reduzidas.

Figura 6 – Análise de sobreajuste: comparação entre métricas de treino e teste do modelo LightGBM.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

6.4 Discussão

Até o modelo final, foram desenvolvidas três versões do algoritmo. A primeira considerou apenas os tratamentos nos dados originais com SMOTE (balanceamento de 15,9% para 50%) que levou a amostra para um total de 200 e com data augmentation gaussiana (+40% nas variáveis contínuas) subiu para 280, utilizando `GroupShuffleSplit` por paciente para evitar data leakage e splits estratificados, com 72% para treino, 13% para validação e 15% para teste. Esse modelo alcançou AUC-ROC de 0,9711 e acurácia de 0,9318, com precisão de 0,9524, recall de 0,9091 e F1-score de 0,9302 no conjunto de teste independente.

O segundo modelo manteve as mesmas especificações porém não utilizou data augmentation e apresentou AUC-ROC de 0,8356 e acurácia de 0,8000, com precisão de 0,6316, recall de 0,9500 e F1-score de 0,7059. O que demonstrou que esse processo seria essencial para o algoritmo final. O terceiro diferiu do primeiro apenas no tratamento dos dados, considerando o peso materno com subtração do peso fetal e separação de pacientes por gestações, pois ao decorrer do trabalho podemos perceber a existência do mesmo indivíduo com datas de consulta superior

a nove meses. Este foi o escolhido para treinamento final, por demonstrar melhores resultados.

Também foi desenvolvido e avaliado um modelo baseado em Rede Neural para classificação binária, treinado com as mesmas 17 variáveis, utilizando normalização dos dados e balanceamento por oversampling. Entretanto, com o tamanho limitado da amostra disponível, o modelo apresentou capacidade discriminatória baixa. A avaliação no conjunto de teste mostrou AUC-ROC = 0,6667, indicando baixo poder de separação entre os desfechos. A análise por diferentes limiares de decisão evidenciou desempenho instável, com destaque para o melhor ponto em threshold = 0,20, no qual foram obtidos precision = 0,304, recall = 1,000 e F1-score = 0,467. Em limiares mais conservadores, observou-se queda acentuada da sensibilidade, como em threshold = 0,40, com precision = 0,250, recall = 0,286 e F1-score = 0,267, e em threshold = 0,50, com precision = 0,333, recall = 0,143 e F1-score = 0,200. Esses resultados demonstram que, apesar da alta sensibilidade obtida em limiares baixos, a rede neural apresentou elevado número de falsos positivos e desempenho global insatisfatório para aplicação clínica isolada, reforçando a afirmação da escolha de modelos baseados em *Gradient Boosting* para o contexto estudado.

Tabela 4 – Comparação entre os modelos desenvolvidos: versões preliminares e modelo final.

Modelo	Técnicas de Tratamento	AUC-ROC	Acurácia	Recall	Observações
PPML v1	Data augmentation gaussiana; SMOTE; GroupShuffleSplit;	0,9711	0,9318	0,9091	Primeira abordagem com balanceamento de dados. Demonstrou importância da augmentation.
PPML v2	Mesmas especificações que v1, sem data augmentation	0,8356	0,8000	0,9500	Confirmou que data augmentation é essencial. Queda significativa em acurácia e AUC.
PPML v3 (Final)	Data augmentation gaussiana; SMOTE; peso materno corrigido (peso materno – peso fetal); separação por gestações	0,9886	0,9524	0,9500	Modelo escolhido. Melhor desempenho geral com tratamento refinado dos dados. 42 casos de validação (20 PE, 22 sem PE).
Rede Neural (Baseline)	Normalização dos dados; oversampling; 17 variáveis; threshold de 0,10 a 0,60,50	0,6667	–	0,1429	Capacidade discriminatória inferior devido ao tamanho limitado da amostra. Desempenho instável com múltiplos thresholds.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.


6.5 Disponibilização

Após a definição do modelo final e do limiar de decisão, o classificador *LightGBM*, juntamente com o conjunto de pré-processamento (funções de limpeza, codificação e normalização) e a lista ordenada de atributos, foi empacotado em artefatos serializados para uso em produção. Com base nesses artefatos, foi desenvolvida uma interface de programação de aplicações (API) em linguagem Python, responsável por expor serviços de predição por meio de requisições HTTP.

Para disponibilizar o modelo foi desenvolvida uma API nomeada de PPML - API e desenvolvida em *Python 3.9+* utilizando *FastAPI* como *framework web* assíncrono, com validação automática de entrada via Pydantic e documentação OpenAPI/Swagger nativa. A comunicação ocorre via HTTP/HTTPS com payloads JSON, suportando deploy containerizado utilizando

Uvicorn, e publicamos o serviço por meio de um servidor Linux de alta disponibilidade, hospedado no Heroku, uma plataforma em nuvem de baixo custo e utilizamos o GitHub para deploy e integração com a plataforma para a pipeline de integração.

Figura 7 – Painel da plataforma Heroku utilizada para hospedagem da API PPML.



Fonte: Heroku, 2026.

A API foi implementada de forma a receber, em formato *JSON*, os dados clínicos e ultrassonográficos necessários, aplicar o mesmo fluxo de pré-processamento descrito na etapa de preparação dos dados e, em seguida, invocar o modelo treinado para obter a probabilidade estimada de PE para cada gestante.


Figura 8 – Exemplo de requisição JSON para predição de risco de pré-eclâmpsia via API PPML.

Example Value	Schema
<pre>{ "idade": 0, "imc": 0, "diabetes": 0, "hipertensao": 0, "origemRacial": "string", "historicoFamiliarDiabetes": "string", "TipoDiabetes": "string", "mediaIP": 0, "perdasGestacionais": 0, "peso": 0, "idadeGestacional": 0, "idadeGestacionalCorrigida": 0, "pesoFetal": 0, "percentilArteriaUterina": 0, "percentilArtUmbilical": 0, "percentilPeso": 0, "circunferenciaAbdominal": 0 }</pre>	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Possui um endpoint que oferece a predição, denominado *predict_lgbm*, os demais são apenas para verificação das variáveis e da disponibilidade da *API*, onde retorna com a probabilidade e uma classificação de alto ou baixo risco, considerando com threshold 0,5 para alto/baixo risco. Dessa forma garantimos uma fácil integração por qualquer sistema que tiver as informações necessárias para envio de uma solicitação.

Figura 9 – Documentação interativa OpenAPI/Swagger da API PPML.



Fonte: Adaptado de Swagger, 2026.

A resposta da *API* inclui tanto a probabilidade contínua quanto a classificação binária de risco (alto ou baixo), baseada no limiar de decisão definido na etapa de validação.


Quadro 2: Exemplo de resultado da predição de risco de pré-eclâmpsia

Parâmetro	Valor
Sucesso da predição	Verdadeiro
Probabilidade de pré-eclâmpsia	0,31
Classificação de risco	Baixo

Nota: Exemplo de resultado da aplicação do modelo de Machine Learning. Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

O projeto foi organizado em pastas funcionais básicas para facilitar manutenção e desenvolvimento ágil, no qual a pasta *API* contém os endpoints *RESTful*, gerenciando recebimento e validação dos dados e respostas. A pasta *DATA* armazena a planilha utilizada para o treinamento e para alimentar o modelo. A pasta *MODELS* armazena o modelo treinado, o LightGBM serializado, e scripts para carregamento e inferência. A pasta *NOTEBOOKS* é usada para experimentação, treinamento, avaliação e geração dos modelos, incluindo análise exploratória e métricas. A organização do código foi pensada para seguir uma organização simples, seguindo os princípios do *Clean Code*, garantindo separação das responsabilidades e modularidade.

Figura 10 – Estrutura de pastas do projeto PPML.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Essa arquitetura permite integrar o modelo de predição ao fluxo de trabalho assistencial, oferecendo suporte à tomada de decisão em tempo quase real durante o atendimento.

7 CONCLUSÃO

O presente estudo desenvolveu e validou o PPML *Predictive Preeclampsia Machine Learning*, um modelo preditivo de PE baseado em aprendizado de máquina que utiliza exclusivamente variáveis clínicas e ultrassonográficas coletadas rotineiramente durante o acompanhamento pré-natal. O modelo final, implementado com o algoritmo *LightGBM*, demonstrou desempenho superior ao de modelos previamente descritos na literatura, com elevada capacidade de detecção precoce e baixas taxas de falsos positivos e negativos.

A estratégia metodológica adotada, que incluiu seleção criteriosa de variáveis por meio de análise *SHAP*, técnicas de balanceamento de dados (*SMOTE*) e *data augmentation gaussiana*, mostrou-se fundamental para atingir o desempenho observado. As cinco variáveis de maior importância identificadas foram : hipertensão, idade, peso, tipo de diabetes e IMC, todas passíveis de obtenção em contextos assistenciais de rotina, sem necessidade de biomarcadores laboratoriais específicos e condizentes com a literatura.

A disponibilização do modelo por meio de uma *API REST*, desenvolvida em *Python* com *FastAPI* e hospedada em ambiente *cloud*, viabiliza a integração da ferramenta em sistemas de informação em saúde existentes, permitindo sua aplicação em tempo quase real durante o atendimento pré-natal. Essa arquitetura possibilita que profissionais de saúde possam obter estimativas de risco individualizadas, contribuindo para estratificação mais precisa das gestantes e direcionamento de recursos e intervenções preventivas.

Reconhece-se, entretanto, algumas limitações importantes do estudo. O tamanho amostral relativamente reduzido, embora tenha permitido resultados promissores, pode limitar a generalização do modelo para populações com características demográficas, clínicas ou étnicas distintas. A origem dos dados em um único centro de atendimento também pode introduzir vieses relacionados ao perfil específico da população atendida e aos protocolos locais de assistência pré-natal. Além disso, em decorrência da escassez de registros disponíveis, o treinamento do modelo dependeu de técnicas de geração de dados sintéticos, o que implica que parte das amostras utilizadas durante o aprendizado podem não corresponder a observações clínicas reais. Contudo, a arquitetura do PPML foi projetada para permitir o retreinamento com novos dados reais à medida que estes se tornem disponíveis, de modo que a incorporação progressiva de registros clínicos reais tende a reduzir a dependência de dados sintéticos e a fortalecer a capacidade de generalização do modelo. A validação foi conduzida de forma interna, sem validação externa

em coortes independentes, o que representa uma etapa essencial para confirmação da robustez e aplicabilidade clínica do modelo.

Estudos futuros devem priorizar a validação externa do PPML em diferentes populações e contextos assistenciais, a ampliação da base de dados com inclusão de maior número de casos prospectivos, e a avaliação do impacto clínico real da ferramenta quando integrada à rotina de cuidado pré-natal. A investigação de modelos que combinem o PPML com outros preditores também pode representar uma via promissora para aprimoramento contínuo da capacidade preditiva.

Ao final, concluímos que o PPML representa uma contribuição relevante para a predição de PE no contexto brasileiro, oferecendo uma alternativa tecnicamente viável, de baixo custo operacional e potencialmente implementável em larga escala em qualquer sistema que possua os dados necessários para a predição, como o Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar das limitações apontadas, os resultados obtidos indicam que a abordagem proposta pode auxiliar na identificação precoce de gestantes em risco, contribuindo para a redução de desfechos adversos materno-fetais associados à condição.

REFERÊNCIAS

ALCINO, M. S. *et al.* Inteligência artificial e saúde materna: a experiência da Caren em Goiás. **Journal of Health Informatics**, v. 16, Especial, 2024. DOI: 10.59681/2175-4411.v16.iEspecial.2024.1271.

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS (ACOG). **Hypertension in Pregnancy**. [S. l.: s. n.], 2020. <https://www.acog.org/>. Acesso em: 13 fev. 2025.

ARAÚJO, D. C.; MACEDO, A. A. de; VELOSO, A. A. *et al.* Complete blood count as a biomarker for preeclampsia with severe features diagnosis: a machine learning approach. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 24, n. 1, p. 628, 2024. DOI: 10.1186/s12884-024-06821-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06821-4>.

ARTZI, Natalie S. *et al.* Prediction of gestational diabetes based on nationwide electronic health records. **Nature Medicine**, v. 26, n. 1, p. 71–76, jan. 2020. DOI: 10.1038/s41591-019-0724-8.

BEINECKE, Janna M.; HEIDER, Dominik. Gaussian Noise Up-sampling is Better Suited than SMOTE and ADASYN for Clinical Decision Making. **BioData Mining**, v. 14, n. 1, p. 49, 2021. DOI: 10.1186/s13040-021-00283-6.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Manual de Gestão de Alto Risco**. Brasília, DF, Brasil, 2022. 1ª edição. ISBN 978-65-5993-312-9. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gestacao_alto_risco.pdf.

BÜLEZ, A. *et al.* Artificial Intelligence in Early Diagnosis of Preeclampsia. **Nigerian Journal of Clinical Practice**, v. 27, n. 3, p. 383, mar. 2024.

CASTRO REZENDE, Karina Bilda de *et al.* Performance of the first-trimester Fetal Medicine Foundation competing risks model for preeclampsia prediction: an external validation study in Brazil. **AJOG Global Reports**, v. 4, n. 2, p. 100346, 2024. DOI: 10.1016/j.xagr.2024.100346. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38694483/>.

CHAEMSAITHONG, Piya; SAHOTA, Daljit Singh; POON, Liona C. First trimester preeclampsia screening and prediction. **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, v. 226, 2S, s1071–s1097.e2, 2022. DOI: 10.1016/j.ajog.2020.07.020.

CHAPPELL, Lucy C. *et al.* Pre-eclampsia. **The Lancet**, v. 398, n. 10297, p. 341–354, 2021. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32335-7.

CHAWLA, Nitesh V. *et al.* SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. **Journal of Artificial Intelligence Research**, v. 16, p. 321–357, 2002. DOI: 10.1613/jair.953.

CHLAP, Phillip *et al.* A Review of Medical Image Data Augmentation Techniques for Deep Learning Applications. **Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology**, v. 65, n. 5, p. 545–563, 2021. DOI: 10.1111/1754-9485.13261.

DEO, Rahul C. Machine Learning in Medicine. **Circulation**, v. 132, n. 20, p. 1920–1930, 2015. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.001593.

EDVINSSON, Camilla *et al.* Predicting intensive care need in women with preeclampsia using machine learning – a pilot study. **Hypertension in Pregnancy**, v. 43, n. 1, 2024. DOI: 10.1080/10641955.2024.2312165. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10641955.2024.2312165>.

ELREEDY, Dina; ATIYA, Amir F. A Comprehensive Analysis of Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) for Handling Class Imbalance. **Information Sciences**, v. 505, p. 32–64, 2019. DOI: 10.1016/j.ins.2019.07.070.

GAROVIC, Vesna D. *et al.* Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A Scientific Statement From the American Heart Association. **Hypertension**, v. 79, n. 2, e21–e41, 2022. DOI: 10.1161/HYP.000000000000208.

GIL, M. M. *et al.* Validating a machine-learning model for first-trimester prediction of pre-eclampsia using the cohort from the PREVAL study. **Ultrasound in Obstetrics & Gynecology**, v. 63, n. 1, p. 68–74, 2024. DOI: 10.1002/uog.27478. Disponível em: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.27478>.

GOWDA, Priyanka; GOWDA, Ashwath Narayana. Best Practices in REST API Design for Enhanced Scalability and Security, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Priyanka-Gowda-Ashwath-Narayana-Gowda-2/publication/383599280_Best_Practices_in_REST_API_Design_for_Enhanced_Scalability_and_Security/links/67a54292461fb56424cc95a0/Best-Practices-in-REST-API-Design-for-Enhanced-Scalability-and-Security.pdf.

HIMSS – HEALTHCARE INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS SOCIETY. **The role of APIs in modern healthcare**. [S. l.: s. n.], 2020. HIMSS Report. Acesso em: 13 fev. 2025. Disponível em: <https://www.himss.org/>.

ISLAM, Md. Shahidul *et al.* Interpreting Artificial Intelligence Models: A Systematic Review on the Application of LIME and SHAP in Alzheimer’s Disease Detection. **Brain Informatics**, v. 11, n. 1, p. 3, 2024. DOI: 10.1186/s40708-024-00222-1.

JAISWAL, Vikash *et al.* Association between calcium supplementation and gestational hypertension, and preeclampsia: A Meta-analysis of 26 randomized controlled trials. **Current Problems in Cardiology**, v. 49, n. 3, p. 102217, 2024. ISSN 0146-2806. DOI: 10.1016/j.cpcardiol.2023.102217. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146280623006345>.

KOLASA, Katarzyna *et al.* Systematic reviews of machine learning in healthcare: a literature review. **Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research**, v. 24, n. 1, p. 63–115, 2024. DOI: 10.1080/14737167.2023.2279107. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37955147/>.

KREUZBERGER, Daniel; KÜHL, Niklas; HIRSCHL, Stefan. Machine Learning Operations (MLOps): Overview, Definition, and Architecture. **IEEE Access**, v. 11, p. 1–1, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3241234.

LI, Taishun *et al.* Prediction model of preeclampsia using machine learning based methods: a population based cohort study in China. **Frontiers in Endocrinology**, v. 15, p. 1345573, jun. 2024. DOI: 10.3389/fendo.2024.1345573. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2024.1345573/full>.

LIMA, Mirella Maria de *et al.* A importância do acompanhamento do pré-natal na Atenção Básica. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 4, p. 2457–2468, abr. 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n4p2457-2468. Disponível em: <https://bjihis.emnuvens.com.br/bjihis/article/view/2000>.

LUNDBERG, Scott M.; LEE, Su-In. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *In: ADVANCES in Neural Information Processing Systems*. [S. l.]: Curran Associates, Inc., 2017. v. 30, p. 4765–4774.

MA'AYEH, Marwan; COSTANTINE, Mohamed M. Prevention of preeclampsia. **Seminars in Fetal and Neonatal Medicine**, v. 25, n. 5, p. 101123, out. 2020. Epub 2020 Jun 2. DOI: 10.1016/j.siny.2020.101123.

MAGEE, L. A. *et al.* Preeclampsia. **New England Journal of Medicine**, Massachusetts Medical Society, v. 386, n. 19, p. 1817–1832, maio 2022. DOI: 10.1056/NEJMra2109523. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra2109523>.

MANDEL, Joshua C. *et al.* SMART on FHIR: a standards-based, interoperable apps platform for electronic health records. **Journal of the American Medical Informatics Association**, v. 23, n. 5, p. 899–908, set. 2016. Epub 2016 Feb 17. DOI: 10.1093/jamia/ocv189.

MARIĆ, Ivan *et al.* Early prediction of preeclampsia via machine learning. **American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM**, v. 2, n. 2, p. 100100, maio 2020. DOI: 10.1016/j.ajogmf.2020.100100.

NICOLAIDES, Kypros H. A model for a new pyramid of prenatal care based on the 11 to 13 weeks' assessment. **Prenatal Diagnosis**, Wiley, v. 31, n. 1, p. 3–6, 2011. DOI: 10.1002/pd.2685. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pd.2685>.

OLIVEIRA, Fabricia Araújo; SILVA, Gustavo Iltemberg Sousa. Intervenções de enfermagem no pré-natal de alto risco: revisão integrativa. **Revista Saber Digital**, v. 18, n. 2, e20251812, jun. 2025. DOI: 10.24859/SaberDigital.2025v18n2.1745.

POON, L. C.; NICOLAIDES, K. H. Early Prediction of Preeclampsia. **Obstetrics and Gynecology International**, v. 2014, p. 1–11, 2014. DOI: 10.1155/2014/297397.

QUEIROZ, Yvine; SOUSA, Milena. Empoderamento materno: a importância de abordar sobre via de parto durante pré-natal. **Revista Brasileira de Filosofia e História**, v. 13, p. 2322–2330, fev. 2024. DOI: 10.18378/rbfh.v13i1.10360.

RAHMANI, Amir Masoud *et al.* Machine Learning (ML) in Medicine: Review, Applications, and Challenges. **Mathematics**, MDPI, v. 9, n. 22, p. 2970, 2021. DOI: 10.3390/math9222970. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-7390/9/22/2970>.

REZENDE, K. B. C. *et al.* Performance of the first-trimester Fetal Medicine Foundation competing risks model for preeclampsia prediction: an external validation study in Brazil. **AJOG Global Reports**, v. 4, n. 2, p. 100346, 2024. DOI: 10.1016/j.xagr.2024.100346.

RIISHEDE, I. *et al.* Pre-eclampsia screening in Denmark (PRESIDE): national validation study. **Ultrasound in Obstetrics & Gynecology**, v. 61, n. 6, p. 682–690, maio 2023. DOI: 10.1002/uog.26183. Disponível em: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.26183>.

ROLNIK, Daniel L. *et al.* ASPRE trial: performance of screening for preterm pre-eclampsia. **Ultrasound in Obstetrics & Gynecology**, v. 50, n. 4, p. 492–495, ago. 2017. DOI: 10.1002/uog.18816.

SARKER, Iqbal H. Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions. **SN Computer Science**, Springer, v. 2, n. 3, p. 160, 2021. ISSN 2661-8907. DOI: 10.1007/s42979-021-00592-x.

SCHMIDT, Leon J. *et al.* A machine-learning-based algorithm improves prediction of preeclampsia-associated adverse outcomes. **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, v. 227, n. 1, 77.e1–77.e30, 2022. DOI: 10.1016/j.ajog.2022.01.026. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35114187/>.

SHICKEL, Benjamin *et al.* Deep EHR: A Survey of Recent Advances in Deep Learning Techniques for Electronic Health Record (EHR) Analysis. **IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics**, v. 22, n. 5, p. 1589–1604, set. 2018. DOI: 10.1109/JBHI.2017.2767063.

SILVA, Guilherme Dias Coelho *et al.* Impactos da pré-eclâmpsia na gravidez. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 2, 2024. Acesso em: 2025-11-24. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/2659/2098>.

SILVA, Idson Emanuel Cavalcanti *et al.* PERFIL DA MORTALIDADE MATERNA: O PAPEL CRÍTICO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA REDUÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS NO BRASIL. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 28, n. 3, p. 951–967, 2025. DOI: 10.25110/arqsaude.v28i3.2024-10994. Disponível em: <https://www.revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/10994>.

SILVA, Mayara Amanda da. **Avaliação de Modelos de Aprendizado de Máquina para Classificação de Gestantes e Predição de Gravidez de Risco Usando o Histórico de Consultas Médicas**. 2021. Diss. (Mestrado) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG. Orientador: Alex Borges Vieira; Coorientadores: Artur Ziviani, Heder Soares Bernardino. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/13763/1/mayaraamandadasilva.pdf>.

SONEK, Jiri D.; KAGAN, Karl Oliver; NICOLAIDES, Kypros H. Inverted Pyramid of Care. **Clinics in Laboratory Medicine**, v. 36, n. 2, p. 305–317, 2016. Prenatal Screening and Diagnosis: An Update. ISSN 0272-2712. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cll.2016.01.009>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272271216300099>.

SOUSA, Idália Costa de. A importância do enfermeiro no pré-natal durante o acompanhamento de mulheres com diabetes gestacional. **Research, Society and Development**, CDRR Editors, v. 13, n. 6, e3913645997, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i6.45997. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45997>.

SOUZA, Geovana Leal de *et al.* A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL PARA SAÚDE MATERNO-INFANTIL. **REVISTA FOCO**, v. 18, n. 12, e10833, 2025. DOI: 10.54751/revistafoco.v18n12-009. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/10833>.

TORRES-TORRES, J. *et al.* Performance of machine-learning approach for prediction of pre-eclampsia in a middle-income country. **Ultrasound in Obstetrics & Gynecology**, v. 63, n. 3, p. 350–357, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1002/uog.27510>. eprint: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/uog.27510>. Disponível em: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/uog.27510>.

VIELLAS, Elaine *et al.* Prenatal care in Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, s85–s100, ago. 2014. DOI: 10.1590/0102-311X00126013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia**. Geneva: World Health Organization, 2019. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241548335>. Accessed 13 Feb 2025.

XAVIER, R. F. *et al.* Perspectives in the treatment of lung cancer: analysis of signaling pathways and biomarkers. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, e5411722903, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.22903. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22903>. Acesso em: 9 mar. 2025.

ZAMORA-OBANDO, H. R. *et al.* Biomarcadores moleculares de doenças humanas: conceitos fundamentais, modelos de estudo e aplicações clínicas. **Química Nova**, 2022.

APÊNDICE A – PROTOCOLO DA REVISÃO DE ESCOPO

Effectiveness of Machine Learning in Predicting Preeclampsia in Pregnant Women: A Scoping Review Protocol

Renan Matias Moura^{1,2} , Leonardo Aguiar dos Santos^{1,2} ,
Bartira Bezerra Fonseca^{1,2}, Camila Sabino dos Santos^{1,2,3} ,
Lívia Caroline Tomaz Santos^{1,2} , Frederico Moreira Bublitz^{1,2} ,
Ketinlly Yasmyne Nascimento Martins¹, and Karolina Celi Tavares Bezerra³ 

¹ Center for Strategic Technologies in Health (NUTES), State University of Paraiba, Campina Grande, PB, Brazil

fredbublitz@servidor.uepb.edu.br

² Postgraduate Program in Health Science and Technology (UEPB), State University of Paraiba, Campina Grande, PB, Brazil

³ MEtRICs Research Center, School of Engineering, University of Minho, Guimarães, Portugal

Abstract. Preeclampsia is one of the most common causes of maternal and perinatal morbidity and mortality. The disease is characterized by the development of hypertension after 20 weeks of gestation and can trigger a series of severe complications, such as eclampsia, kidney injury, liver damage, multiorgan dysfunction, and fetal growth restriction. In more severe cases, the condition may lead to preterm birth, significantly increasing the risk of neonatal complications. Therefore, early detection and proper management of the disease are essential to minimize adverse outcomes for both the mother and the baby. Traditional methods, such as blood pressure measurement, proteinuria analysis, and risk calculators based on regression methods, have limitations in predicting the disease before symptom onset, highlighting the need for more accurate approaches. In this context, machine learning emerges as a promising alternative to enhance preeclampsia detection. This approach enables the analysis of large volumes of clinical data and biomarkers, improving predictive capabilities. This study aims to map the application of machine learning in preeclampsia prediction, evaluating the advantages of these models over traditional methods and the challenges of their clinical implementation. A comprehensive scoping review will analyze the main models used, such as decision trees, Support Vector Machine, and Random Forest, as well as the most relevant predictive variables and performance metrics, including accuracy and the area under the ROC curve (AUC). Additionally, this study will contribute to identifying gaps in the literature and guiding future research to refine predictive models and improve their precision indicators.

Keywords: Pregnant · Preeclampsia · Machine learning · mean arterial pressure · clinical data

1 Introduction

Hypertensive disorders of pregnancy are among the most common complications during gestation, encompassing chronic hypertension and gestational hypertension, (PE) being the most severe form. Hypertension during pregnancy is defined as a systolic blood pressure (SBP) of ≥ 140 mmHg and/or a diastolic blood pressure (DBP) of ≥ 90 mmHg, and it is considered severe when SBP is ≥ 160 mmHg and/or DBP is ≥ 100 mmHg [1].

PE is a complex multisystemic disease characterized by the sudden onset of hypertension after 20 weeks of gestation, accompanied by at least one associated complication, such as proteinuria, maternal organ dysfunction, or uteroplacental dysfunction [2]. For example, fetal growth restriction (FGR) or an angiogenic imbalance. It is one of the most severe pregnancy complications and a leading cause of maternal and perinatal morbidity and mortality, affecting approximately 4 million women worldwide each year. This results in the deaths of more than 70,000 women and 500,000 babies [3]. According to the World Health Organization (WHO), most of these deaths could be prevented with timely and effective care following its recommendations [4].

Contemporary evidence suggests that PE may be a two-stage disease. The first stage is asymptomatic in early pregnancy and results from placental insufficiency due to abnormal trophoblast invasion and inadequate remodeling of the spiral arteries. This process ultimately leads to the second stage of the disease, characterized by ischemia or placental reperfusion injury and an immediate maternal immune response [5].

Although hypertension and proteinuria are classical diagnostic criteria for PE, other factors may also be considered. Women with hypertension but without proteinuria should be diagnosed with PE if they present at least one of the following severe complications: thrombocytopenia, liver dysfunction, renal insufficiency, pulmonary edema, or a new-onset headache that is resistant to paracetamol and cannot be explained by alternative diagnoses [6].

There are also alternative prediction methods, one of the most cited risk calculators that use Bayes' theorem along with variables such as maternal characteristics, mean arterial pressure (MAP), uterine artery pulsatility index (UtA-PI), serum placental growth factor (PlGF), and pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) to estimate risk. These calculators were developed by the Fetal Medicine Foundation (FMF) and the Hospital Clínic de Barcelona and have demonstrated superior accuracy compared to traditional methods, in addition to being the only internationally validated approach [7, 8]. This method is frequently referenced by authors developing (ML) models as a benchmark for validating their accuracy [9, 10].

Beyond traditional models for predicting PE, the use of Machine Learning (ML) has emerged as an innovative alternative for detection. ML is a branch of computer science focused on learning patterns from data to improve performance across various scenarios, offering strong applicability in predicting and analyzing large datasets. Once trained and validated for high-performance predictions, the algorithm uses relevant variables to forecast the outcome of interest. Based on this training, it provides insights that can enhance PE detection and management [11–13].

This protocol aims to analyze ML models applied to the prediction of PE, evaluating their accuracy, limitations and applicability. From this protocol, it will be possible to establish comparisons with the traditional methods used, providing instructions for future research, helping to improve strategies for the early identification of (PE). Against this backdrop, this protocol aims to examine the progress and challenges of machine learning models applied to PE prediction at a global level. The research will provide a more detailed understanding of the potential of these technologies, contributing to the adoption of more efficient approaches to tracking and managing the disease.

2 Methods and Analysis

This scoping review will follow the methodological approach proposed by Levac et al. [14], comprising six steps for conducting scoping reviews: (1) defining the research question; (2) identifying relevant studies; (3) study selection; (4) data mapping; (5) collecting, summarizing, and reporting results; and (6) consultation (optional step). Below, the methodological steps for conducting a scoping study are outlined.

2.1 Identifying the Research Question

The main objective is to survey existing machine learning approaches for predicting preeclampsia in pregnant women, evaluating their effectiveness through their accuracy. The protocol aims to map the existing literature, identify knowledge gaps and provide a comprehensive overview of the advantages, limitations and clinical applicability of machine learning techniques for predicting preeclampsia in at-risk populations.

Based on the objective, the following research questions were formulated:

1. What are the main machine learning approaches used in the prediction of preeclampsia?
2. How does machine learning compare in terms of effectiveness, advantages, limitations, and clinical applicability in predicting preeclampsia?

2.2 Identifying Relevant Studies

For the formulation of search terms and study selection, the PIRO structure (Population, Intervention, Reference, and Outcome) was used. This framework guides the inclusion of relevant evidence in the database, ensuring alignment with the research scope and avoiding unnecessary searches. The search strategy consists of three main components: pregnant women (population), the use of machine learning for preeclampsia prediction (intervention), and preeclampsia as the reference condition (reference).

The research will include studies without restrictions on date, language, or geographical location. Searches will be conducted in three electronic databases: PubMed, Embase (Elsevier), and BVS (Virtual Health Library). Additionally, gray literature will be explored through Google Scholar.

In the initial stage, the keywords present in the title and abstract of the selected articles will be analyzed, along with the main terms used to describe them. The preliminary search in the databases will combine keywords using the Boolean operators AND/OR.

This strategy will be adjusted as needed in the PubMed, Embase (Elsevier), and BVS (Virtual Health Library) databases, with the support of a specialized librarian and carried out by one or more authors of the review in Table 1.

Table 1. Search Strategy for databases Source: Researcher Data

Databases	Search	Search Strategy
PubMed	#1	(((((Pregnant Women[MeSH Terms]) OR (Women, Pregnant)) OR (Pregnant Woman)) OR (Woman, Pregnant)) OR (Pregnancy[MeSH Terms])) OR (Pregnancies)) OR (Gestation)
	#2	(((((Pregnant Women[MeSH Terms]) OR (Women, Pregnant)) OR (Pregnant Woman)) OR (Woman, Pregnant)) OR (Pregnancy[MeSH Terms])) OR (Pregnancies)) OR (Gestation)) AND (((Pre-Eclampsia[MeSH Terms]) OR (Pre Eclampsia)) OR (Preeclampsia))
	#3	((((((((Machine Learning[MeSH Terms]) OR (Learning, Machine)) OR (Transfer Learning)) OR (Learning, Transfer)) AND (Artificial Intelligence[MeSH Terms])) OR (Intelligence, Artificial)) OR (AI (Artificial Intelligence))) OR (Machine Intelligence)) OR (Intelligence, Machine)
	#4	(((((Pregnant Women[MeSH Terms]) OR (Women, Pregnant)) OR (Pregnant Woman)) OR (Woman, Pregnant)) OR (Pregnancy[MeSH Terms])) OR (Pregnancies)) OR (Gestation)) AND (((Pre-Eclampsia[MeSH Terms]) OR (Pre Eclampsia)) OR (Preeclampsia)) AND (((((((Machine Learning[MeSH Terms]) OR (Learning, Machine)) OR (Transfer Learning)) OR (Learning, Transfer)) AND (Artificial Intelligence[MeSH Terms])) OR (Intelligence, Artificial)) OR (AI (Artificial Intelligence))) OR (Machine Intelligence)) OR (Intelligence, Machine))
BVS	#1	mh: “Gestantes” OR (Gestante) OR (Grávida) OR (Grávidas) OR (Mulher Grávida) OR (Mulheres Grávidas) OR (Parturiente) OR (Parturientes) OR (Pregnant Women) OR (Pregnant Woman) OR (Woman, Pregnant) OR (Mujeres Embarazadas) OR (Embarazadas) OR (Mujer Embarazada) OR (Femmes enceintes) OR mh:M01.975.807 OR mh:SP3.522.561.200.488 AND mh: “Pré-Eclâmpsia” OR (Pré-Eclâmpsia Eclâmpsia 1) OR (Pre-Eclampsia) OR (Preeclampsia) OR (Pre Eclampsia) OR (Pré-éclampsie) OR mh:C12.050.703.395.249
	#2	mh: “Aprendizado de Máquina” OR (Aprendizado Automático) OR (Aprendizagem de Máquina) OR (Machine Learning) OR (Learning, Machine) OR (Aprendizaje Automático) OR (Apprentissage machine) OR mh: G17.035.250.500 OR mh: L01.224.050.375.530 AND mh: “Inteligência Artificial” OR (IA (Inteligência Artificial)) OR (Inteligência de Máquina) OR (Inteligência de Máquina) (Artificial Intelligence) OR (AI (Artificial Intelligence)) OR (Computational Intelligence) OR (Machine Intelligence) OR (Inteligencia Artificial) OR (Intelligence artificielle) OR mh: G17.035.250 OR mh: L01.224.050.375
	#3	(mh: “Gestantes” OR (Gestante) OR (Grávida) OR (Grávidas) OR (Mulher Grávida) OR (Mulheres Grávidas) OR (Parturiente) OR (Parturientes) OR (Pregnant Women) OR (Pregnant Woman) OR (Woman, Pregnant) OR (Mujeres Embarazadas) OR (Embarazadas) OR (Mujer Embarazada) OR (Femmes enceintes) OR mh:M01.975.807 OR mh:SP3.522.561.200.488 AND mh: “Pré-Eclâmpsia” OR (Pré-Eclâmpsia Eclâmpsia 1) OR (Pre-Eclampsia) OR (Preeclampsia) OR (Pre Eclampsia) OR (Pré-éclampsie) OR mh:C12.050.703.395.249) AND (mh: “Aprendizado de Máquina” OR (Aprendizado Automático) OR (Aprendizagem de Máquina) OR (Machine Learning) OR (Learning, Machine) OR (Aprendizaje Automático) OR (Apprentissage machine) OR mh: G17.035.250.500 OR mh: L01.224.050.375.530 AND mh: “Inteligência Artificial” OR (IA (Inteligência Artificial)) OR (Inteligência de Máquina) OR (Inteligência de Máquina) (Artificial Intelligence) OR (AI (Artificial Intelligence)) OR (Computational Intelligence) OR (Machine Intelligence) OR (Inteligencia Artificial) OR (Intelligence artificielle) OR mh: G17.035.250 OR mh: L01.224.050.375)
Embase	#1	‘pregnant woman’/exp OR ‘pregnant women’ OR ‘pregnant woman’ OR ‘pregnancy’/exp OR ‘child bearing’ OR ‘childbearing’ OR ‘gestation’ OR ‘gravity’ OR ‘intrauterine pregnancy’ OR ‘labor presentation’ OR ‘labour presentation’ OR ‘pregnancy maintenance’ OR ‘pregnancy trimesters’ OR ‘pregnancy’

(continued)

Table 1. (*continued*)

Databases	Search	Search Strategy
	#2	'pregnant woman'/exp OR 'pregnant women' OR 'pregnant woman' OR 'pregnancy'/exp OR 'child bearing' OR 'childbearing' OR 'gestation' OR 'gravidity' OR 'intrauterine pregnancy' OR 'labor presentation' OR 'labour presentation' OR 'pregnancy maintenance' OR 'pregnancy trimesters' OR 'pregnancy' AND 'preeclampsia'/exp OR 'eclamptic toxemia' OR 'eclamptic toxemia' OR 'eclampsyogenic toxemia' OR 'eclampsyogenic toxemia' OR 'edema-proteinuria-hypertension gestoses' OR 'edema-proteinuria-hypertension gestosis' OR 'EPH gestoses' OR 'EPH gestosis' OR 'EPH syndrome' OR 'EPH toxemia' OR 'gestational toxemia' OR 'gestational toxemia' OR 'gestational toxemia' OR 'gestosis' OR 'gestosis' OR 'gestosis' OR 'gestosis, EPH' OR 'HEP syndrome' OR 'maternal toxemia' OR 'pre eclampsia' OR 'pre-eclampsia' OR 'pre-eclamptic' OR 'pre-eclamptic toxemia' OR 'pre-eclamptic toxemia' OR 'preclampsia' OR 'preeclamptic' OR 'preeclamptic toxemia' OR 'preeclamptic toxemia' OR 'pregnancy toxemia' OR 'pregnancy toxemias' OR 'pregnancy toxemia' OR 'pregnancy toxemias' OR 'pregnancy toxicosis' OR 'proteinuric hypertension of pregnancy' OR 'toxemia gravidum' OR 'toxemia, preeclamptic' OR 'toxemia during pregnancy' OR 'toxemia gravidum' OR 'toxemia in pregnancy' OR 'toxemia, preeclamptic' OR 'toxic pregnancy' OR 'toxicosis gravidarum' OR 'preeclampsia'
	#3	'machine learning'/exp OR 'learning machine' OR 'learning machines' OR 'machine learning' AND 'artificial intelligence'/exp OR 'machine intelligence' OR 'artificial intelligence'
	#4	('pregnant woman'/exp OR 'pregnant women' OR 'pregnant woman' OR 'pregnancy'/exp OR 'child bearing' OR 'childbearing' OR 'gestation' OR 'gravidity' OR 'intrauterine pregnancy' OR 'labor presentation' OR 'labour presentation' OR 'pregnancy maintenance' OR 'pregnancy trimesters' OR 'pregnancy' AND 'preeclampsia'/exp OR 'eclamptic toxemia' OR 'eclamptic toxemia' OR 'eclampsyogenic toxemia' OR 'eclampsyogenic toxemia' OR 'edema-proteinuria-hypertension gestoses' OR 'edema-proteinuria-hypertension gestosis' OR 'EPH gestoses' OR 'EPH gestosis' OR 'EPH syndrome' OR 'EPH toxemia' OR 'gestational toxemia' OR 'gestational toxemia' OR 'gestational toxemia' OR 'gestosis' OR 'gestosis' OR 'gestosis' OR 'gestosis, EPH' OR 'HEP syndrome' OR 'maternal toxemia' OR 'pre eclampsia' OR 'pre-eclampsia' OR 'pre-eclamptic' OR 'pre-eclamptic toxemia' OR 'pre-eclamptic toxemia' OR 'preclampsia' OR 'preeclamptic' OR 'preeclamptic toxemia' OR 'preeclamptic toxemia' OR 'pregnancy toxemia' OR 'pregnancy toxemias' OR 'pregnancy toxemia' OR 'pregnancy toxemias' OR 'pregnancy toxicosis' OR 'proteinuric hypertension of pregnancy' OR 'toxemia gravidum' OR 'toxemia, preeclamptic' OR 'toxemia during pregnancy' OR 'toxemia gravidum' OR 'toxemia in pregnancy' OR 'toxemia, preeclamptic' OR 'toxic pregnancy' OR 'toxicosis gravidarum' OR 'preeclampsia') AND ('machine learning'/exp OR 'learning machine' OR 'learning machines' OR 'machine learning' AND 'artificial intelligence'/exp OR 'machine intelligence' OR 'artificial intelligence')

Inclusion and Exclusion Criteria. The inclusion criteria are aligned with the guiding questions and objectives of the review. The following studies will be eligible: primary studies, as they provide original and detailed data on methods, samples, and results, allowing for a more in-depth analysis of the use of Machine Learning in predicting preeclampsia; studies with no language restrictions; studies published at any time, without temporal limitations; studies that specifically apply the Machine Learning in the prediction of preeclampsia in pregnant women.

Exclusion criteria for the review include studies that do not fully or partially answer the guiding questions; studies addressing technologies other than machine learning; studies not focusing on the prediction of pre-eclampsia.

2.3 Study Selection

The number of records retrieved from each database will be documented, and whenever possible, all records will be exported to the Zotero reference manager and the Rayyan systematic review platform. In the first stage, four of the six authors will independently and blindly screen the titles and abstracts based on the established inclusion criteria. Any discrepancies among the reviewers will be resolved by a fifth author. Articles that meet the predefined criteria will proceed to the second stage, which consists of a full-text review. This phase will also be conducted by the same four authors, independently and blindly. After completing these two stages, one other author will act as a secondary reviewer, responsible for resolving any conflicts that arise during the full-text analysis.

2.4 Charting the Data

This stage involves mapping the information to be extracted from the primary studies analyzed. To achieve this, the team will use a structured form that includes data charts based on the model proposed by *Bratti et al.* [15], along with information aligned with the scope of this review in Table 1. This framework will be used to assess all full-text articles that meet the established inclusion criteria. The categories of data to be collected include:

- **Bibliographic information:** Article title, author(s), country of origin, year of publication, quality of the publication source, and its impact.
- **Study information:** Study objectives, methodology employed, outcome measures, and main findings.
- **Machine Learning (ML) utilization information:** The analysis of ML models will be carried out based on objective criteria, including their concept, relevance, and practical examples for each evaluated aspect, according to Table 2. Initially, the adopted approach will be considered, which can be through supervised learning, unsupervised learning, or reinforcement learning. This criterion is important as it defines how the model learns patterns from the data, impacting its applicability and accuracy. The types of algorithms used will also be analyzed, as each technique has its advantages and limitations depending on the type and volume of processed data. Deep neural network algorithms are useful for complex patterns, while decision trees offer greater data interpretability, and support vector machines allow for nonlinear data separation based on the origin and nature of the data used in model training and validation. Another important criterion is the preprocessing methods, which involve techniques to improve data quality before model training, aiming to reduce bias and errors. Similarly, validation methods will also be evaluated as they ensure the reliability of model results before their clinical application. Performance metrics are another fundamental aspect, as they measure the effectiveness of models and compare different approaches. Indicators such as accuracy, sensitivity, specificity, AUC-ROC, and F1-score will be considered to assess the reliability of the models being analyzed. Additionally, the level of model interpretability will be examined. Model interoperability will also be analyzed, due to its importance in integration with different health systems, which is essential for clinical adoption. Finally, the clinical implications of the models will be analyzed, based on their potential impact on medical practice and patient outcomes.

Table 2. Data Extraction Framework Source: Adapted from Bratti *et al.* [14]

Principal category	Description
1. Authors	Names of the study authors
2. Title	Title of the published article
3. Journal	Journal or conference where it was published
4. Year of publication	Year of publication
5. Study design	Type of study conducted
6. Study objective	Central purpose of the study
7. Sample size (if applicable)	Number of participants included in the research
8. Demographic data	Countries and regions where the study was conducted, national income levels, and age ranges
9. Data collection year(s) (if applicable)	Period in which data was collected
10. Study population description	Specify whether the intervention targets individuals within subpopulation groups. If applicable: 1- Describe the study population setting
11. ML utilization description	– Approach used (e.g., supervised, unsupervised, or reinforcement learning) – Types of algorithms employed (e.g., neural networks, decision trees, SVM, logistic regression, etc.) – Source and characteristics of the data used in the model (e.g., clinical data, laboratory results, demographic variables) – Data preprocessing strategies (e.g., normalization, handling of missing values, feature selection) – Validation methods adopted (e.g., cross-validation, holdout, external test set) – Reported performance metrics (e.g., accuracy, sensitivity, specificity, AUC-ROC, F1-score) – Model interpretability level (e.g., explanatory methods such as SHAP, LIME, or visualization techniques) – Challenges encountered in implementation – Clinical implications of the obtained results
12. Discussion of gaps, unmet needs, and future directions	Identification of study limitations, unaddressed aspects, and recommendations for future research

- **Discussion of gaps and future directions:** Unmet needs, study limitations, and recommendations for future research.

Team Considerations. To ensure the reliability of data extraction, each article will be independently reviewed by four team members, with each member collecting data

individually. Subsequently, the data collected by each member will be integrated, and in the event of discrepancies, a fifth member will be consulted to mitigate and resolve conflicts.

2.5 Collating, Summarising and Reporting the Results

Following the recommendations provided by Levac *et al.* [14] this stage will be broken into three steps, as follows:

- **Analysis:** according to the protocol, the focus of this stage will be on quantitative and qualitative analyses. The qualitative analysis will be based on the combination of information collected during the research, along with insights from ACOG. It will be structured to address the main guiding question of the protocol and other study-related inquiries. Through this analysis, the protocol aims to establish criteria for evaluating the most effective machine learning techniques for identifying preeclampsia in pregnant women.
- **Reporting:** this stage will involve presenting a table summarizing the strengths and gaps in the existing evidence; moreover, the structured results combined with the analysis will serve as the basis for the creation of a paper.
- **Implications for future research:** for this stage, a table containing the strengths and gaps in the evidence will be presented. In addition, the structured results combined with the analysis will serve as the basis for the creation of an article.

3 Discussion

This protocol aims to gather information that provides an overview of the machine learning methods used to predict preeclampsia, identify existing gaps, and enhance the overall understanding of the topic. Additionally, by comparing the accuracy of the five main ML algorithms: Logistic Regression (LR), Extreme Gradient Boosting (XGBoost), Random Forest (RF), and Multilayer Perceptron (MLP), it will be possible to suggest ways to optimize these models to improve their predictive capability [16].

During the training of the ML model, several predictors are used, including medical and obstetric history, medication intake, maternal characteristics, ultrasound, and test results obtained during pregnancy. These predictors enable training with key information to identify predisposition to preeclampsia PE [17].

Regarding clinical applications, the review may discuss how machine learning models can enhance screening and prevention, enabling the implementation of preventive measures. It will also address limitations and future challenges, such as the importance of collecting data from different populations to ensure that the models are globally applicable and do not suffer from racial or geographic bias. Furthermore, the ethical and regulatory aspects of using health data to train machine learning models should be considered, ensuring patient privacy and consent.

This information will identify knowledge gaps and provide a comprehensive overview of the advantages, limitations and clinical applicability of machine learning techniques for predicting PE in at-risk populations.

4 Ethics and Disclosure

As this protocol will use data from publicly available sources, no ethical review will be required. The results of this scoping review will contribute to understanding the effectiveness of machine learning-based approaches in predicting preeclampsia in pregnant women, compared to traditional diagnostic methods. The data obtained will be relevant to various stakeholders, including researchers, public health organizations, and private clinics in the field of obstetrics. Additionally, we plan to present and disseminate the findings at relevant conferences.

Acknowledgments. We would like to express our sincere gratitude to the Paraiba State University (UEPB), the Center for Strategic Technologies in Health (NUTES), and the Mechanical Engineering and Resource Sustainability Center (MEtRICs – UID/4077) for providing essential resources and institutional support for the development of this scoping review. The access to research infrastructure, academic databases, and expert guidance has been fundamental in facilitating the comprehensive analysis presented in this study. This study was financed in part by Paraiba State University, grant #01/2025.

References

1. Garovic, V.D., et al.: Hypertension in pregnancy: diagnosis, blood pressure goals, and pharmacotherapy: a scientific statement from the American Heart Association. *Hypertension* **79**(2), 21–41 (2022)
2. Evdokia, D., Daniel, L.R., Wei, Z., et al.: Pre-eclampsia. *Nat. Rev. Dis. Primers*. **9**, 1–22 (2023)
3. Chappell, L.C., Cluver, C.A., Kingdom, J., Tong, S.: Pre-eclampsia. *Lancet* **398**(10297), 341–354 (2021)
4. WHO: Recommendations for Prevention and Treatment of Pre-Eclampsia and Eclampsia. World Health Organization, Geneva (2011)
5. Peraçoli, J.C., et al.: Pré-eclâmpsia – Protocolo 2023. Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG) (2023)
6. Marwan, M., Maged, M.C.: Prevention of preeclampsia. *Semin. Fetal Neonatal. Med.* **25**(5), 101123 (2020)
7. Riishede, I., et al.: Pre-eclampsia screening in Denmark (PRESIDE): national validation study. *Ultrasound Obstet. Gynecol.* **5** **61**(6), 682–690 (2023)
8. Tan, M.Y., et al.: Comparison of diagnostic accuracy of early screening for pre-eclampsia by NICE guidelines and a method combining maternal factors and biomarkers: results of SPREE. *Ultrasound Obstet. Gynecol.* **51**(6), 743–750 (2018)
9. Marić, I., et al.: Early prediction of preeclampsia via machine learning. *Am. J. Obstet. Gynecol. MFM* **2**(2), 100100 (2020)
10. Torres-Torres, J., et al.: Performance of machine-learning approach for prediction of pre-eclampsia in a middle-income country. *Ultrasound Obstet. Gynecol.* **63**(3), 350–357 (2024)
11. Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222. *Obstet. Gynecol.* **135**(6), 237–260 (2020)
12. Mitchell, T.M.: *Machine Learning*, 1st edn. McGraw-Hill, Boston (1997)
13. Kononenko, I.: Machine learning for medical diagnosis: history, state of the art and perspective. *Artif. Intell. Med.* **23**(1), 89–109 (2001)

14. Levac, D., Colquhoun, H., O'Brien, K.K.: Scoping studies: advancing the methodology. *Implement. Sci.* **5**, 1–9 (2010)
15. Bratti, V.F., Wilson, B.E., Fazelzad, R., et al.: Scoping review protocol on the impact of antimicrobial resistance on cancer management and outcomes. *BMJ Open* **13**, e068122 (2023)
16. Lv, B., Wang, G., Pan, Y., Yuan, G., Wei, L.: Construction and evaluation of machine learning-based predictive models for early-onset preeclampsia. *Pregnancy Hypertens* (2025)
17. Ranjbar, A., Montazeri, F., Ghamsari, S.R., Mehrnoush, V., Roozbeh, N., Darsareh, F.: Machine learning models for predicting preeclampsia: a systematic review. *BMC Pregnancy Childbirth* **24**(1), 6 (2024)

APÊNDICE B – REVISÃO DE ESCOPO

Efficacy of machine learning in predicting preeclampsia in pregnant women: a scoping review.

Renan Matias Moura¹, Leonardo Aguiar^{1,2}, Bartira Bezerra Fonseca¹, Camila Sabino dos Santos¹, Ketinlly Yasmyne Nascimento Martins², Karolina Celi Tavares Bezerra¹, Frederico Moreira Bublitz¹.

1. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias da Saúde (UEPB). Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil.

2. Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde (NUTES), Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil

3. Centro de Investigação MEtRICs, Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Guimarães, Portugal

Preeclampsia is a major hypertensive complication of pregnancy, associated with high maternal and perinatal morbidity and mortality. Traditional diagnostic methods have limitations, particularly in early detection, while machine learning emerges as a promising alternative for risk prediction. This scoping review aimed to map the evidence on the effectiveness of machine learning models in predicting preeclampsia. Searches were conducted in the PubMed/MEDLINE, Embase, and Virtual Health Library databases in June 2025, including original studies that applied machine learning techniques and reported performance metrics. A total of 24 studies were included, revealing methodological heterogeneity and a predominance of internal validation. The models demonstrated moderate to high discriminative performance, with better results in approaches integrating clinical data and biomarkers, as well as greater accuracy in predicting early-onset forms of the disease. Despite the promising potential, gaps such as limited external validation, underreporting of calibration, and lack of methodological standardization still limit the clinical application of these models.

INTRODUCTION

Preeclampsia (PE) represents one of the main hypertensive complications of pregnancy, affecting approximately 2–8% of pregnant women worldwide and contributing to more than 70,000 maternal deaths annually, in addition to significant risks to the fetus, such as prematurity and intrauterine growth restriction (1). Traditionally, diagnosis is based on clinical criteria such as hypertension (blood pressure $\geq 140/90$ mmHg) and proteinuria after 20 weeks of gestation; however, these methods have limitations, including low sensitivity for early-onset cases and false negatives in up to 20% of occurrences (2).

The advancement of machine learning (ML) emerges as a transformative promise in risk prediction for maternal health. ML algorithms, such as LightGBM, neural networks, and others, integrate data broadly, including biomarkers (e.g., PlGF, sFlt-1), clinical history, and maternal data to generate predictions with AUCs exceeding 0.85 across several studies (3). These approaches outperform conventional statistical models, such as the Fetal Medicine Foundation (FMF) model, by handling imbalanced and high-dimensional datasets, enhancing risk stratification in low-resource settings (4).

Despite the notable advances, the literature on ML applications in PE prediction reveals significant heterogeneity in methodologies, studied populations, and evaluation metrics, such as sensitivity, specificity, and precision in real clinical contexts (5). This fragmentation hinders translation into clinical practice, especially in developing countries with limited resources, where false negatives may worsen adverse maternal-fetal outcomes (6). This scoping review aims to present the available evidence on the effectiveness of ML in predicting preeclampsia in pregnant women.

METHODS

The conduct of this scoping review followed a previously developed protocol registered on the Open Science Framework (OSF), aiming to ensure transparency, reproducibility, and methodological rigor at all stages of the study. The protocol previously defined the research question, eligibility criteria, search strategy, selection procedures, screening, and data extraction, all of which were systematically followed throughout the development of the review. The protocol was registered on April 24, 2025, on the Open Science Framework (OSF).

Search strategy and selection criteria

The search strategy was systematically developed based on the PIRO framework (Population, Index, Reference, and Outcome), aiming to identify studies that investigated the application of machine learning models in predicting preeclampsia in pregnant women. Controlled descriptors and free terms were used according to the DeCS, MeSH, and Emtree vocabularies, combined using Boolean operators (AND and OR).

Searches were conducted in the Virtual Health Library (BVS), PubMed/MEDLINE, and Embase databases on June 15, 2025. Population-related terms included variations referring to pregnant women, pregnancy, and preeclampsia. For the index, descriptors related to machine learning and artificial intelligence were used. The diagnostic reference, such as traditional methods for diagnosing preeclampsia, was considered secondarily and was not mandatory in the composition of the main strategies, in accordance with the exploratory objective of the scoping review.

The search strategies (Table 1) were adapted to the specificities of each database, respecting their indexing and syntax particularities. No restrictions were applied regarding publication period or methodological design, in order to ensure a comprehensive and sensitive search.

Eligibility Criteria

The eligibility criteria were defined based on the PIRO framework (Population, Index, Reference, and Outcome). Regarding the population (P), studies conducted with pregnant women were included, regardless of maternal age or gestational period, provided that preeclampsia was considered the clinical outcome of interest. Studies conducted exclusively in animal models or theoretical simulations were excluded.

Regarding the index (I), studies that applied machine learning models or artificial intelligence techniques for the purpose of predicting or identifying preeclampsia were considered eligible, including but not limited to supervised, unsupervised, or deep learning algorithms. Studies that used only traditional statistical methods without the incorporation of ML techniques were excluded.

Regarding the reference (R), studies that used traditional diagnostic methods or established clinical criteria for the identification of preeclampsia as a comparator were included, such as blood pressure measurements, proteinuria, or other recognized clinical-laboratory parameters. Studies that did not present any form of comparison with conventional diagnostic criteria or clinical validation were excluded.

Regarding the outcomes (O), studies that reported performance metrics of the predictive models were included, such as accuracy, sensitivity, specificity, area under the ROC curve (AUC), precision, recall, or equivalent metrics related to the predictive capacity for preeclampsia. Studies that did not present quantitative or qualitative results related to preeclampsia prediction were excluded.

Additionally, only original studies with full text available, published in English, Portuguese, or Spanish, were included. No restrictions were applied regarding publication year or methodological design, considering the objective of this scoping review to map the extent, diversity, and characteristics of the available evidence in the literature.

Selection and screening proces

The study selection and screening process was conducted with the assistance of the Rayyan platform (Qatar Computing Research Institute). Initially, all records identified in the databases were exported to the platform, where duplicate records were identified and removed. Screening was conducted by four authors, organized in independent pairs, to ensure greater methodological rigor.

Title and abstract screening was performed independently and blindly, with two authors responsible for evaluating studies published from 1997 to 2020, while the other two authors analyzed studies published between 2021 and 2025. Subsequently, articles considered potentially eligible were submitted to full-text reading, following the same paired evaluation logic.

Disagreements between reviewers were resolved by consensus, and when necessary, a third reviewer was consulted for the final decision. The complete process of identification, screening, eligibility, and inclusion of studies will be presented through a flowchart prepared according to OSF guidelines.

Data extraction and summary

Data extraction was performed systematically using a standardized form, previously developed and tested by the author team, aiming to ensure consistency and reproducibility of the process. Extraction was conducted independently by the authors, following the same paired organization adopted in the study screening stage.

Information related to the general characteristics of the studies was extracted, including author(s), year of publication, country of conduct, methodological design, and study context.

Data regarding population characteristics were also collected, such as sample size, gestational period evaluated, and diagnostic criteria used for the identification of preeclampsia.

Regarding the index, information about the machine learning models employed was extracted, including the type of algorithm, predictor variables used, model training and validation strategies, as well as the datasets employed. Regarding the diagnostic reference, traditional methods used for comparison or clinical validation were recorded, when applicable.


Regarding the outcomes, performance metrics of the predictive models were extracted, such as accuracy, sensitivity, specificity, area under the ROC curve (AUC), precision, recall, or other metrics reported by the studies. Additional relevant information, such as limitations identified by the authors and potential clinical implications, was also recorded.

The extracted data were organized and summarized in a descriptive and narrative manner, with presentation in tables and figures, allowing for the mapping of available evidence, identification of gaps in the literature, and analysis of methodological trends related to the use of machine learning in predicting preeclampsia. No assessment of methodological quality or risk of bias of the studies was performed, in accordance with the recommendations for scoping reviews.

RESULTS

The process of identification, screening, eligibility, and inclusion of studies is presented in Figure 1. A total of 558 records were initially identified in the electronic databases. After removal of duplicates, 307 studies were submitted to title and abstract screening. Of these, 42 were evaluated in full text for eligibility, resulting in the final inclusion of 24 studies in the qualitative synthesis.

Figure 1. PRISMA flowchart of the study selection process.



Flowchart of the study selection process from identification in the databases to final inclusion in the synthesis, according to PRISMA guidelines.

Overall, broad methodological heterogeneity was observed among the included studies, with significant variation in sample size, design, and validation strategies. Most studies used internal validation methods, while external validation was less frequent, indicating potential limitations in the generalizability of the models. The detailed methodological characteristics of the included studies are presented in Table 2.

Table 2. Methodological characteristics of the included studies (n=24)

Autor	Ano	País	Tipo de Estudo	População Estudada	Amostra	Modelos de aplicação
Zhou T et al. (7)	2024	China	Retrospective study	A	789	Deep Learning
Gil MM et al.(8)	2024	EspaIN	Prospective non-interventional cohort study	B	10110	Neural Network
Ansbacher-Feldman Z et al.(9)	2022	United Kingdom	Prospective non-interventional	C	60789	Neural Network
Lin YC et al. (10)	2024	United States	Prospective cohort	C	1857	Random Forest
Araujo DC et al.(11)	2024	Brazil	Case-control study	A	132 + 3552	ML Model

Edvinsson C et al.(12)	2024	Sweden	Pilot case-control study	B	81	XGBoost
Maric I et al. (13)	2020	United States	Retrospective cohort study	C	5245	ML Model
Sufriyana H et al. (14)	2020	Indonesia	Nested case-control	A	23201	Neural Network
Khalil A et al. (15)	2024	United States; Sweden; Ireland; United Kingdom; Australia; Spain	Secondary analysis of the Microdeletion and Aneuploidy Registry (SMART) study	A	17520	Neural Network
Schmidt LJ et al. (16)	2022	Germany	Retrospective study	B	1647	Random Forest
Bennett R et al. (17)	2022	United States	Methodological research	C	360943	Neural Network
Kaya Y et al. (18)	2024	Turkey	Retrospective study	C	100	Random Forest
Nguyen-Hoang L et al. (19)	2024	China; Japan; Thailand; Taiwan; India; Singapore	Secondary analysis	C	10935	ML Model
Zhao Z et al. (20)	2024	China	prospective	C	704	Random Forest
Jhee JH et al. (21)	2019	South Korea	Retrospective cohort study	A	11006	Random Forest
Li T et al. (22)	2024	China	Retrospective cohort study	B	4644	Logistic Regression
Butler L et al. (23)	2024	United States	Retrospective observational cohort study	C	720	Neural Network
Bulez A et al. (24)	2024	Turkey	Retrospective study	A	10307	ML Model
Eberhard BW et al. (25)	2023	United States	retrospective	C	120752	Random Forest
Jung YM et al. (26)	2024	South Korea	Retrospective observational	A	244	Deep Learning
Lv B et al. (27)	2025	China	Retrospective cohort	A	3237	Neural Network
Li T et al. (28)	2021	China	Retrospective observational	A	3759	Random Forest
Namazi M et al.(29)	2024	Australia	Retrospective observational study	A	48250	Random Forest
Sofonyas Abebaw Tirunch (30)	2025	Melbourne, Australia	Temporal validation of predictive models	B	12549	Random Forest

Data are presented as descriptive characteristics of the included studies. Study population: A = Pregnant women; B = Women in general; C = Other specific populations. Outcome indicators: a = Area under the ROC curve (AUC); b = Sensitivity/Detection rate; c = Specificity; d = Accuracy.

In aggregate, the machine learning models demonstrated discriminative capacity ranging from moderate to high. The majority of studies fell within the ranges classified as "good" and "excellent" discriminative capacity, while only a minority exhibited performance below traditionally acceptable thresholds. The detailed distribution of AUROC ranges is

presented in Table 3. The observed variability was more associated with the type of outcome evaluated, the nature of the input data, and the validation strategy than with the study design.

Table 3. Distribution of discriminative capacity (AUROC)

AUROC Range	Nº of Studies	Proportion
Inadequate (<0,70)	2	8,3%
Acceptable (0,70-0,79)	6	25,0%
Good(0,80--0,89)	11	45,8%
Excellent (0,90-0,96)	6	25,0%

Values are presented as absolute frequencies and proportions, categorized according to area under the ROC curve (AUROC) ranges, representing the distribution of discriminative capacity of the evaluated models.

The stratified analysis by preeclampsia subphenotype demonstrated a consistent trend of better predictive performance in earlier-onset or more severe phenotypes. Models aimed at predicting early-onset preeclampsia and those with severe features showed higher discriminative capacity and sensitivity, while the prediction of term preeclampsia demonstrated greater heterogeneity and, in general, lower performance. The comparative synthesis by subphenotype is presented in Table 4.

Table 4. Differential performance by preeclampsia subphenotype

Tipo de PE	AUROC	Verdadeiros positivos(sensibilidade)	Nº Estudos
Early-onset PE (<34 weeks)	0,82--0,92	84,4%--93,7%	8
Preterm PE (<37 weeks)	0,80--0,91	57,5%--87,0%	7
Term PE (≥37 weeks)	0,71--0,92	30,7%--68,0%	4

PE with severe features	0,77--0,94	66,0%--95,0%	4
-------------------------	------------	--------------	---

Values are presented as predictive performance metrics (AUROC and sensitivity), number of studies, and predictive difficulty classification, stratified by preeclampsia subtype.

Regarding input data, consistent superiority was observed for models that combined clinical variables and biomarkers, representing half of the included studies. Strategies based exclusively on clinical data showed more variable performance, while approaches using isolated laboratory data, electronic health records, or imaging data presented context- and algorithm-dependent results. The comparative synthesis of effectiveness by data type is presented in Table 5.

Table 5. Effectiveness by input data type

Date Type	N° Estudios	Mean AUROC	Proportion
Clinical + Biomarkers	12	0,80--0,92	50,0%
Clinical only	6	0,70--0,88	25,0%
Complete blood count (CBC)	2	0,90	8,3%
Imaging/Digital	2	0,71--0,85	8,3%
Electronic Health Records (EHR)	3	0,85--0,96	12,5%
cfDNA	1	0,71--0,80	4,2%

Values are presented as means of the area under the ROC curve (AUROC), number of studies, and proportions, stratified by the type of input data used in the models.

Additionally, a trend toward better discriminative performance was observed in models based on boosting techniques, including LightGBM, XGBoost, and Gradient Boosting. However, direct comparisons between algorithms should be interpreted with caution, considering the heterogeneity among populations, outcomes, and validation strategies used in the included studies.

DISCUSSION

The findings of this scoping review demonstrate that, despite the significant growth in the application of machine learning techniques in predicting preeclampsia, structural methodological gaps persist that limit the translational maturity of these approaches. External validation remains underexplored, present in only five of the twenty-four identified studies, restricting the assessment of model transportability across different populations and clinical settings. Studies that conducted validations in independent cohorts, such as those by Gil et al. (8) and Li et al. (31), still represent exceptions in the field. Similarly, temporal validation remains rarely explored, being more consistently addressed by Tiruneh et al. (29), which limits inferences about predictive stability and potential performance degradation over time in real clinical contexts.

In parallel, model calibration remains underreported in the mapped literature, despite evidence of misalignment between predicted and observed risk. Khalil et al. (15) highlighted the relevance of this metric for clinical model evaluation, while Tiruneh et al. (29) documented significant calibration issues, including a slope of 1.15 for XGBoost-based models and 0.62 for Random Forest, reinforcing the need for more comprehensive reports of predictive performance beyond traditional discriminatory metrics.

Furthermore, a predominance of retrospective designs is observed, as in the studies by Zhou et al. (7), Jung et al. (26), and Li et al. (4), with a scarcity of prospective studies evaluating model performance in the actual flow of prenatal care. This limitation reduces the understanding of the real clinical impact and operational applicability of these tools in healthcare settings.

Regarding the predictive phenotype, the prediction of term preeclampsia remains less developed and with lower performance compared to early-onset forms, as observed in studies by Gil et al. (8), Zhou et al. (7), and Khalil et al. (15), suggesting greater pathophysiological complexity and the influence of dynamic clinical factors throughout gestation.

Additionally, approaches incorporating longitudinal data throughout pregnancy and multimodal data integration emerge as promising strategies. Eberhard et al. (25) demonstrated progressive improvement in performance with temporal incorporation of variables throughout gestation, while Zhou et al. (7) explored the integration of clinical data with retinal images, pointing to the potential for expanding digital biomarkers. However, such approaches remain incipient in the available body of evidence.

Overall, the field is characterized by rapid expansion and high methodological diversity, reflecting both the potential of these technologies and the absence of standardization in study design, performance metrics, and validation strategies. This mapping reinforces the need for prospective studies, robust multicentric validations, systematic calibration assessment, and greater transparency in methodological reporting — essential elements for advancing from the exploratory phase to the safe and effective clinical implementation of these tools in prenatal care.

CONCLUSION

This scoping review demonstrates that machine learning-based models exhibit promising discriminative performance for predicting preeclampsia, with results predominantly classified as good to excellent, especially when based on the integration of clinical data and biomarkers. However, the literature is still marked by methodological heterogeneity, low frequency of external and temporal validations, and underreporting of calibration metrics, limiting the assessment of the robustness and clinical applicability of these models across different population and healthcare contexts. Despite the rapid advancement of the field, the transition to routine clinical implementation still depends on prospective studies, multicentric validations, and greater standardization in the development and reporting of models. Taken together, the findings reinforce the potential of machine learning as a strategic tool for risk

stratification in maternal health, while also highlighting the need for methodological advances to ensure its safe and effective adoption in prenatal care.

REFERENCIAS

1. Gopman S, Leeman L, Wagner LK. Preeclampsia. Nutrition and Health (United Kingdom) [Internet]. 2024 Feb 25 [cited 2026 Feb 11];Part F3934:221–9. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570611/>
2. Rana S, Lemoine E, Granger J, Karumanchi SA. Preeclampsia: Pathophysiology, Challenges, and Perspectives. Circ Res [Internet]. 2019 Mar 29 [cited 2026 Feb 11];124(7):1094–112. Available from: [/doi/pdf/10.1161/CIRCRESAHA.118.313276?download=true](https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313276?download=true)
3. Garrido-Giménez C, Cruz-Lemini M, Álvarez F V., Nan MN, Carretero F, Fernández-Oliva A, et al. Predictive Model for Preeclampsia Combining sFlt-1, PlGF, NT-proBNP, and Uric Acid as Biomarkers. J Clin Med [Internet]. 2023 Jan 1 [cited 2026 Feb 11];12(2):431. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9866466/>
4. Li T, Xu M, Wang Y, Wang Y, Tang H, Duan H, et al. Prediction model of preeclampsia using machine learning based methods: a population based cohort study in China. Front Endocrinol (Lausanne). 2024 Jun 11;15:1345573.
5. Mol BWJ, Roberts CT, Thangaratinam S, Magee LA, De Groot CJM, Hofmeyr GJ. Machine Learning Prediction Models for Preeclampsia: Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Internet Res [Internet]. 2026 Jan 1 [cited 2026 Feb 11];28(10022):999–1011. Available from: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00070-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00070-7)
6. Özcan M, Peker S. Preeclampsia prediction via machine learning: a systematic literature review. Health Systems [Internet]. 2025 Jul 3 [cited 2026 Feb 11];14(3):208–22. Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20476965.2024.2435845>
7. Zhou T, Shao F, Wan S, Zhou C, Zhou S, Hua X. Feasibility study on quantifying retinal vascular features for predicting preeclampsia based on artificial intelligence models. Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) [Internet]. 2024 May 28 [cited 2026 Feb 11];44(5):552. Available from: <https://xuebao.shsmu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1674-8115.2024.05.002>

8. Ricci CA, Crysap B, Phillips NR, Ray WC, Santillan MK, Trask AJ, et al. Machine learning: a new era for cardiovascular pregnancy physiology and cardio-obstetrics research. <https://doi.org/10.1152/ajpheart001492024> [Internet]. 2024 Aug 1 [cited 2026 Feb 11];327(2):H417–32. Available from: [/doi/pdf/10.1152/ajpheart.00149.2024?download=true](https://doi.org/10.1152/ajpheart.00149.2024?download=true)
9. Ansbacher-Feldman Z, Syngelaki A, Meiri H, Cirkin R, Nicolaides KH, Louzoun Y. Machine-learning-based prediction of pre-eclampsia using first-trimester maternal characteristics and biomarkers. *Ultrasound in Obstetrics and Gynecology* [Internet]. 2022 Dec 1 [cited 2026 Feb 11];60(6):739–45. Available from: [/doi/pdf/10.1002/uog.26105](https://doi.org/10.1002/uog.26105)
10. Lin YC, Mallia D, Clark-Sevilla AO, Catto A, Leshchenko A, Yan Q, et al. A comprehensive and bias-free machine learning approach for risk prediction of preeclampsia with severe features in a nulliparous study cohort. *BMC Pregnancy and Childbirth* 2024 24:1 [Internet]. 2024 Dec 24 [cited 2026 Feb 11];24(1):853–. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12884-024-06988-w>
11. Araújo DC, de Macedo AA, Veloso AA, Alpoim PN, Gomes KB, Carvalho M das G, et al. Complete blood count as a biomarker for preeclampsia with severe features diagnosis: a machine learning approach. *BMC Pregnancy and Childbirth* 2024 24:1 [Internet]. 2024 Oct 1 [cited 2026 Feb 11];24(1):628–. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12884-024-06821-4>
12. Edvinsson C, Björnsson O, Erlandsson L, Hansson SR. Predicting intensive care need in women with preeclampsia using machine learning—a pilot study. *Hypertens Pregnancy* [Internet]. 2024 Dec 31 [cited 2026 Feb 11];43(1). Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10641955.2024.2312165>
13. Marić I, Tsur A, Aghaeepour N, Montanari A, Stevenson DK, Shaw GM, et al. Early prediction of preeclampsia via machine learning. *Am J Obstet Gynecol MFM* [Internet]. 2020 May 1 [cited 2026 Feb 11];2(2):100100. Available from: <https://doi.org/10.1111/nure.12055>
14. Sufriyana H, Wu YW, Su EC. Prediction of Preeclampsia and Intrauterine Growth Restriction: Development of Machine Learning Models on a Prospective Cohort. *JMIR Med Inform* [Internet]. 2020; Available from: <https://doi.org/10.2196/15411>
15. Khalil A, Bellesia G, Norton ME, Jacobsson B, Haeri S, Egbert M, et al. The role of cell-free DNA biomarkers and patient data in the early prediction of preeclampsia: an

- artificial intelligence model. *Am J Obstet Gynecol* [Internet]. 2024 Nov 1 [cited 2026 Feb 11];231(5):554.e1-554.e18. Available from: <https://doi.org/10.1002/uog.20117>
16. Schmidt LJ, Rieger O, Neznansky M, Hackelöer M, Dröge LA, Henrich W, et al. A machine-learning-based algorithm improves prediction of preeclampsia-associated adverse outcomes. *Am J Obstet Gynecol* [Internet]. 2022; Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.01.026>
 17. Bennett R, Mulla ZD, Parikh P, Hauspurg A, Razzaghi T. An imbalance-aware deep neural network for early prediction of preeclampsia. *PLoS One* [Internet]. 2022; Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266042>
 18. Kaya Y, Bütün Z, Çelik Ö, Salik EA, Tahta T. Risk Assessment for Preeclampsia in the Preconception Period Based on Maternal Clinical History via Machine Learning Methods. *J Clin Med* [Internet]. 2025;14(1). Available from: ["<https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L2032913005&from=export>",
 19. Nguyen-Hoang L, Sahota DS, Pooh RK, Duan H, Chaiyasit N, Sekizawa A, et al. Validation of the first-trimester machine learning model for predicting pre-eclampsia in an Asian population. *International Journal of Gynecology and Obstetrics* [Internet]. 2024;167(1):350–9. Available from: ["<https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L2029565432&from=export>",
 20. Zhao Z, Dai J, Chen H, Lu L, Li G, Yan H, et al. A Prospective Study on Risk Prediction of Preeclampsia Using Bi-Platform Calibration and Machine Learning. *Int J Mol Sci* [Internet]. 2024;25(19). Available from: ["<https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L2031852718&from=export>",
 21. Jhee JH, Lee S, Park Y, Lee SE, Kim YA, Kang SW, et al. Prediction model development of late-onset preeclampsia using machine learning-based methods. *PLoS One* [Internet]. 2019; Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221202>
 22. Li T, Xu M, Wang Y, Wang Y, Tang H, Duan H, et al. Prediction model of preeclampsia using machine learning based methods: a population based cohort study in China. *Front Endocrinol (Lausanne)* [Internet]. 2024; Available from: <https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1345573>

23. Butler L, Gunturkun F, Chinthala L, Karabayir I, Tootooni MS, Bakir-Batu B, et al. AI-based preeclampsia detection and prediction with electrocardiogram data. *Front Cardiovasc Med*. 2024 Mar 4;11:1360238.
24. Büllez A, Hansu K, Çağan ES, Şahin AR, Dokumacı HÖ. Artificial Intelligence in Early Diagnosis of Preeclampsia. *Niger J Clin Pract* [Internet]. 2024;27(3):383–8. Available from:
["<https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L643851728&from=export>"],
25. Eberhard BW, Cohen RY, Rigoni J, Bates DW, Gray KJ, Kovacheva VP. An Interpretable Longitudinal Preeclampsia Risk Prediction Using Machine Learning. *medRxiv* [Internet]. 2023; Available from:
["<https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L2026945955&from=export>"],
26. Jung YM, Park S, Ahn Y, Kim H, Kim EN, Park HE, et al. Identification of Preeclamptic Placenta in Whole Slide Images Using Artificial Intelligence Placenta Analysis. *J Korean Med Sci* [Internet]. 2024;39(39):e271–e271. Available from:
["<https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L645513542&from=export>"],
27. Lv B, Wang G, Pan Y, Yuan G, Wei L. Construction and evaluation of machine learning-based predictive models for early-onset preeclampsia. *Pregnancy Hypertens* [Internet]. 2025 Mar 1 [cited 2026 Feb 11];39:101198. Available from:
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32342-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32342-3)
28. Li Y xin, Shen X ping, Yang C, Cao Z zeng, Du R, Yu M da, et al. Novel electronic health records applied for prediction of pre-eclampsia: Machine-learning algorithms. *Pregnancy Hypertens* [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2026 Feb 11];26(1):102–9. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10654-013-9762-6>
29. Tiruneh SA, Rolnik DL, Teede HJ, Enticott J. Prediction of pre-eclampsia with machine learning approaches: Leveraging important information from routinely collected data. *Int J Med Inform* [Internet]. 2024 Dec 1 [cited 2026 Feb 11];192(SUPPL1):105645. Available from: <https://doi.org/10.1111/nure.12055>
30. Kassebaum NJ, Barber RM, Dandona L, Hay SI, Larson HJ, Lim SS, et al. Temporal validation of machine learning models for pre-eclampsia prediction using routinely collected maternal characteristics: A validation study. *Comput Biol Med* [Internet].

2025 Jun 1 [cited 2026 Feb 11];191(10053):110183. Available from:
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31470-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31470-2)

31. Gil MM, Cuenca-Gómez D, Rolle V, Pertegal M, Díaz C, Revello R, et al. Validation of machine-learning model for first-trimester prediction of pre-eclampsia using cohort from PREVAL study. *Ultrasound Obstet Gynecol* [Internet]. 2024;63(1):68–74. Available from: ["<https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L642244646&from=export>"]

APÊNDICE C – ALGORITMO DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS

```

1 public bool ExportExcell()
2 {
3     var examesSelecionados = GetValoresByExameNames(connection);
4
5     var examesObstetricos = SepararExames(examesSelecionados, "OBSTETRICA")
6     ;
7
8     var examesPorConsulta = GetExamesPorConsulta(connection,
9     examesSelecionados);
10    var examesPorConsultaObst = GetExamesPorConsulta(connection,
11    examesObstetricos);
12
13    MesclarConsultas(examesPorConsulta, examesPorConsultaObst);
14
15    var laudos = GetLaudos(connection, examesPorConsulta);
16
17    var obstetricas = ParseLaudos<ObstetricaDto>(laudos, "OBSTETRICA",
18    CorrigirJsonObstetrica);
19    var primeiroTrimestre = ParseLaudos<PrimeiroTrimestreDto>(laudos, "
20    OBSTETRICA 1a TRIMESTRE");
21    var translucenciaNucal = ParseLaudos<TranslucenciaNucalDto>(laudos, "
22    TRANSLUCENCIA NUCAL", CorrigirJsonTN);
23
24    var unifiedExports = UnificarExports(obstetricas, primeiroTrimestre,
25    translucenciaNucal);
26
27    EnriquecerComQuestionarios(unifiedExports);
28
29    SalvarExcel(unifiedExports);
30
31    return true;
32 }
33
34 private List<ExameDto> SepararExames(List<ExameDto> exames, string nome)
35 {

```

```

29     var selecionados = exames.Where(e => e.ExameNome == nome).ToList();
30     exames.RemoveAll(e => e.ExameNome == nome);
31     return selecionados;
32 }
33
34 private void MesclarConsultas(
35     List<ExameConsultaDto> principal,
36     List<ExameConsultaDto> obstetricas)
37 {
38     foreach (var item in obstetricas)
39     {
40         if (!principal.Any(p => p.PacienteId == item.PacienteId))
41             principal.Add(item);
42     }
43 }
44
45 private List<T> ParseLaudos<T>(
46     IEnumerable<LaudoDto> laudos,
47     string nomeExame,
48     Func<string, string>? normalizador = null)
49     where T : class, new()
50 {
51     var resultado = new List<T>();
52
53     var filtrados = laudos.Where(l => l.NomeExamePrincipal == nomeExame);
54
55     foreach (var item in filtrados)
56     {
57         foreach (var json in ExtrairJsons(item.Laudo, normalizador))
58         {
59             try
60             {
61                 var dto = JsonSerializer.Deserialize<T>(json);
62                 if (dto == null) continue;
63
64                 PreencherCamposPadrao(dto, item);
65                 resultado.Add(dto);
66             }
67             catch { }

```

```

68     }
69 }
70
71     return resultado;
72 }
73
74 private IEnumerable<string> ExtrairJsons(string laudo, Func<string, string
    >? normalizador)
75 {
76     var texto = laudo.Trim('[', ']');
77
78     if (normalizador != null)
79         texto = normalizador(texto);
80
81     return Regex.Split(texto, @"(?<=}\s*,\s*(?=\{)");
82 }
83
84 private string CorrigirJsonTN(string json) =>
85     json.Replace("\"perdasGestacionais\": ,", "");
86
87 private string CorrigirJsonObstetrica(string json) =>
88     json.Replace("\"gestacaoConclusao3\": ,", "");
89
90 private void PreencherCamposPadrao<T>(T dto, LaudoDto item)
91 {
92     typeof(T).GetProperty("Data")?.SetValue(dto, item.Data.ToString("dd/MM/
    yyyy"));
93     typeof(T).GetProperty("PacienteId")?.SetValue(dto, item.PacienteId);
94 }
95
96 private List<ExportDto> UnificarExports(
97     List<ObstetricaDto> obst,
98     List<PrimeiroTrimestreDto> primeiro,
99     List<TranslucenciaNucalDto> tn)
100 {
101     var lista = new List<ExportDto>();
102
103     lista.AddRange(Mapear<ObstetricaDto>(obst));
104     lista.AddRange(Mapear<PrimeiroTrimestreDto>(primeiro));

```

```

105     lista.AddRange(Mapear<TranslucenciaNucalDto>(tn));
106
107     return lista;
108 }
109
110 private IEnumerable<ExportDto> Mapear<T>(IEnumerable<T> origen)
111 {
112     return origen.Select(o =>
113         JsonSerializer.Deserialize<ExportDto>(
114             JsonSerializer.Serialize(o)));
115 }
116
117 private void EnriquecerComQuestionarios(List<ExportDto> exports)
118 {
119     var questionarios = GetQuestionarios(connection);
120     var dict = questionarios
121         .GroupBy(q => q.PacienteId)
122         .ToDictionary(g => g.Key, g => g.First());
123
124     exports.RemoveAll(e => !dict.ContainsKey(e.PacienteId));
125
126     exports
127         .Sort((a, b) =>
128             a.PacienteId != b.PacienteId
129                 ? a.PacienteId.CompareTo(b.PacienteId)
130                 : DateTime.ParseExact(b.Data, "dd/MM/yyyy", CultureInfo.
InvariantCulture)
131                     .CompareTo(DateTime.ParseExact(a.Data, "dd/MM/yyyy",
InvariantCulture)));
132
133     int? pacienteAnterior = null;
134
135     foreach (var export in exports)
136     {
137         if (export.PacienteId != pacienteAnterior &&
138             dict.TryGetValue(export.PacienteId, out var q))
139         {
140             MapearQuestionario(export, q);
141             pacienteAnterior = export.PacienteId;

```

```
142     }
143 }
144 }
145
146 private void SalvarExcel(List<ExportDto> dados)
147 {
148     var folder = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "
Exports");
149     Directory.CreateDirectory(folder);
150
151     var path = Path.Combine(folder, "ExportFinal.xlsx");
152
153     using var package = new ExcelPackage();
154     var sheet = package.Workbook.Worksheets.Add("Unificado");
155
156     sheet.Cells["A1"].LoadFromCollection(dados, true);
157     package.SaveAs(new FileInfo(path));
158 }
```

Código 2 – Algoritmo de processamento e exportação de laudos médicos

APÊNDICE D – ALGORITMO DE TREINAMENTO DO MODELO LightGBM

LightGBM — Modelo Final

1. Importações e Configuração

```
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split, GroupShuffleSplit
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import (
    roc_auc_score, roc_curve,
    precision_recall_curve, average_precision_score,
    accuracy_score, confusion_matrix, classification_report
)
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from imblearn.over_sampling import SMOTE
from sklearn.utils import shuffle
import joblib
import lightgbm as lgb
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning)

RANDOM_STATE = 42
np.random.seed(RANDOM_STATE)

caminho = "/Users/renanmoura/Documents/mestrado/PE-AI/data/dados.xlsx"
df = pd.read_excel(caminho)
print("Shape original:", df.shape)

target_col = "PreEclampsia"
```

2. Pré-processamento dos Dados

```
# MAPAS
map_raca = {"Branco": 1, "Pardo": 2, "Preto": 3}
map_boolean = {
    "Sim": 1, "YES": 1, "SIM": 1, "TRUE": 1,
    "Nao": 0, "NAO": 0, "Não": 0, "NÃO": 0, "FALSE": 0
}
map_hist_diabetes = {
    "NÃO": 0, "NAO": 0, "NÃO": 0, "Nao": 0,
    "1º grau": 3, "1º GRAU": 3, "1 GRAU": 3,
    "2º grau": 2, "2º GRAU": 2, "2 GRAU": 2,
    "3º grau": 1, "3º GRAU": 1, "3 GRAU": 1
}

# FEATURES
input_features = [
    "idade", "imc", "diabetes", "hipertensao",
    "origemRacial", "historicoFamiliarDiabetes", "TipoDiabetes",
    "mediaIP", "perdasGestacionais", "peso",
    "idadeGestacional", "idadeGestacionalCorrigida", "pesoFetal",
    "percentilArteriaUterina", "percentilArtUmbilical",
    "percentilPeso", "circunferenciaAbdominal"
]

df_processed = df.copy()

# IDADE POR PACIENTE

if "paciente_id" in df_processed.columns:
    paciente_ids = df_processed["paciente_id"]
else:
    df_processed["paciente_id_temp"] = df_processed[
        ["dataNascimento", "origemRacial", "imc"]
    ].astype(str).agg("_".join, axis=1)
    paciente_ids = df_processed["paciente_id_temp"]

df_processed["paciente_id_base"] = paciente_ids

data_referencia = pd.to_datetime("2025-12-02")

paciente_to_nasc = {}
for pid in paciente_ids.unique():
    nasc = pd.to_datetime(
        df_processed.loc[paciente_ids == pid, "dataNascimento"],
        errors="coerce"
    ).dropna()
    paciente_to_nasc[pid] = nasc.mode().iloc[0] if len(nasc) else None

def calc_idade(d):
    if pd.isna(d):
        return 28
    return np.clip((data_referencia - d).days / 365.25, 15, 50)

df_processed["idade"] = df_processed["paciente_id_base"].map(
    lambda x: calc_idade(paciente_to_nasc.get(x))
)
```

```

)

# GESTAÇÕES POR DATA

if "Data" not in df_processed.columns:
    raise ValueError("Coluna 'Data' (data da consulta) é obrigatória")

df_processed["Data"] = pd.to_datetime(
    df_processed["Data"], errors="coerce", dayfirst=True
)

df_processed = df_processed.sort_values(
    ["paciente_id_base", "Data"]
).reset_index(drop=True)

MAX_GAP = 270 # dias (~9 meses)

episodios = []

for pid, grupo in df_processed.groupby("paciente_id_base"):
    datas = grupo["Data"].values
    ep = 1

    for i in range(len(grupo)):
        if i == 0:
            episodios.append(f"{pid}")
            continue

        gap = (datas[i] - datas[i-1]).astype('timedelta64[D]').astype(int)
        if gap > MAX_GAP:
            ep += 1

        suf = "" if ep == 1 else chr(ord("A") + ep - 2)
        episodios.append(f"{pid}{suf}")

df_processed["PacienteIdEpisodio"] = episodios

# CONVERSÕES CATEGÓRICAS

if "origemRacial" in df_processed.columns:
    df_processed["origemRacial"] = (
        df_processed["origemRacial"]
        .astype(str).str.strip()
        .map(map_raca)
        .astype(float)
    )

for col in ["diabetes", "hipertensao"]:
    if col in df_processed.columns:
        df_processed[col] = (
            df_processed[col]
            .astype(str).str.strip()
            .map(map_boolean)
            .astype(float)
        )

if "historicoFamiliarDiabetes" in df_processed.columns:
    df_processed["historicoFamiliarDiabetes"] = (
        df_processed["historicoFamiliarDiabetes"]
        .astype(str).str.strip()
        .replace(map_hist_diabetes)
        .astype(float)
    )

if "TipoDiabetes" in df_processed.columns:
    df_processed["TipoDiabetes"] = (
        df_processed["TipoDiabetes"]
        .astype(str).str.strip()
        .replace({
            "Diabetes Gestacional": 1,
            "Tipo 1": 2,
            "Tipo 2": 3
        })
    )
    df_processed["TipoDiabetes"] = pd.to_numeric(
        df_processed["TipoDiabetes"], errors="coerce"
    ).fillna(0)

# DADOS OBSTÉTRICOS

if "perdasGestacionais" in df_processed.columns:
    df_processed["perdasGestacionais"] = (
        pd.to_numeric(df_processed["perdasGestacionais"], errors="coerce")
        .fillna(0)
    )

if "mediaIP" in df_processed.columns:
    df_processed["mediaIP"] = np.where(
        df_processed["mediaIP"] >= 1.3,
        df_processed["mediaIP"] * 1.3,
        df_processed["mediaIP"]
    )

# peso = peso - pesoFetal

peso_mae_kg = pd.to_numeric(df_processed["peso"], errors="coerce").fillna(0)
peso_feto_g = pd.to_numeric(df_processed["pesoFetal"], errors="coerce").fillna(0)

peso_feto_kg = peso_feto_g / 1000.0

```

```

df_processed["peso"] = (peso_mae_kg - peso_feto_kg).clip(lower=35)

# GARANTIR NUMÉRICO + NAN

for col in input_features:
    if col not in df_processed.columns:
        print(f" Criando {col}=0")
        df_processed[col] = 0

    df_processed[col] = (
        pd.to_numeric(df_processed[col], errors="coerce")
        .fillna(0)
        .astype(float)
    )

# LIMITES CLÍNICOS

def aplicar_limites_realistas(X, feature_names):
    limites = {
        "idade": (15, 50),
        "peso": (35, 150),
        "imc": (15, 50),
        "pesoFetal": (0, 5000)
    }
    X = X.copy()
    for f, (lo, hi) in limites.items():
        if f in feature_names:
            X[f] = X[f].clip(lo, hi)
    return X

df_processed[input_features] = aplicar_limites_realistas(
    df_processed[input_features],
    input_features
)

# ALVO

alvo = (
    df_processed[target_col]
    .replace({True:1, False:0})
    .astype(str).str.upper()
    .replace({"TRUE":1, "FALSE":0})
)

alvo = pd.to_numeric(alvo, errors="coerce")
df_processed[target_col] = alvo.astype("Int64")

df_processed = df_processed[~df_processed[target_col].isna()]
df_processed[target_col] = df_processed[target_col].astype(int)

# ESTATÍSTICAS FINAIS

print("\n=== ESTATÍSTICAS FINAIS ===")

for c in ["idade", "peso", "imc"]:
    s = df_processed[c]
    print(f"{c}: min={s.min():.1f}, max={s.max():.1f}, mean={s.mean():.1f}")

print(
    f"\nShape final: {df_processed.shape}"
    f"\nPacientes únicas: {df_processed['PacienteIdEpisodio'].nunique()}"
    f"\nSem NaNs nas features"
)

print("Target:", df_processed[target_col].value_counts().to_dict())

```

3. Divisão dos Dados por Paciente (Holdout)

```

# Preparar dados
X = df_processed[input_features].copy()
y = df_processed[target_col].copy()
groups = df_processed["PacienteIdEpisodio"].values

# Split por paciente
gss = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=0.20, random_state=RANDOM_STATE)
train_idx, test_idx = next(gss.split(X, y, groups=groups))

X_train = X.iloc[train_idx].reset_index(drop=True)
X_test = X.iloc[test_idx].reset_index(drop=True)
y_train = y.iloc[train_idx].reset_index(drop=True)
y_test = y.iloc[test_idx].reset_index(drop=True)

print(f"Treino: {X_train.shape} | Teste: {X_test.shape}")
print(f"Pacientes treino: {df_processed['PacienteId'].iloc[train_idx].nunique()}")
print(f"Pacientes teste: {df_processed['PacienteId'].iloc[test_idx].nunique()}")
print(f"\nDistribuição y_train:\n{y_train.value_counts()}")
print(f"\nDistribuição y_test:\n{y_test.value_counts()}")

```

4. Balanceamento de Classes (SMOTE)

```

sm = SMOTE(random_state=RANDOM_STATE)
X_train_smote, y_train_smote = sm.fit_resample(X_train, y_train)

```

```
print(f"Shape após SMOTE: {X_train_smote.shape}")
print(f"Distribuição pós-SMOTE:\n{pd.Series(y_train_smote).value_counts()}")
```

5. Data Augmentation (Ruído Gaussiano)

```
X_np = X_train_smote.values
y_np = y_train_smote.values.astype(float)

cols_binarias = ["diabetes", "hipertensao"]

cont_cols = [c for c in input_features if c not in cols_binarias]
cont_idx = [input_features.index(c) for c in cont_cols]

#augmentação com ruído gaussiano
def augment_gaussian_noise(X_np, y_np, factor=0.3, noise_std=0.02, random_state=None):
    rng = np.random.RandomState(random_state)
    n_new = int(len(X_np) * factor)
    if n_new == 0:
        return X_np.copy(), y_np.copy()
    idx = rng.randint(0, len(X_np), size=n_new)
    X_new = X_np[idx].copy()

    # ruído só nas colunas contínuas
    noise = rng.normal(0, noise_std, size=X_new[:, cont_idx].shape)
    X_new[:, cont_idx] += noise

    y_new = y_np[idx]
    return X_new, y_new

Xg, yg = augment_gaussian_noise(
    X_np, y_np, factor=0.4, noise_std=0.02, random_state=RANDOM_STATE
)

X_aug = np.vstack([X_np, Xg])
y_aug = np.concatenate([y_np, yg])
X_final, y_final = shuffle(X_aug, y_aug, random_state=RANDOM_STATE)

X_final_df = pd.DataFrame(X_final, columns=input_features)

X_final_df = aplicar_limite_realistas(X_final_df, input_features)

for col in cols_binarias:
    if col in X_final_df.columns:
        X_final_df[col] = X_final_df[col].clip(0, 1)

X_final = X_final_df.values

print(f"Shape final após augmentation: {X_final.shape}")
```

6. Divisão Treino / Validação / Teste

```
X_train_val, X_test_final, y_train_val, y_test_final = train_test_split(
    X_final, y_final, test_size=0.15, stratify=np.round(y_final), random_state=RANDOM_STATE
)

X_train_final, X_val, y_train_final, y_val = train_test_split(
    X_train_val, y_train_val, test_size=0.15, stratify=np.round(y_train_val), random_state=RANDOM_STATE
)

print(f"Treino final: {X_train_final.shape}")
print(f"Validação: {X_val.shape}")
print(f"Teste final: {X_test_final.shape}")
```

7. Treinamento do Modelo LightGBM

```
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train_final)
X_val_scaled = scaler.transform(X_val)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test_final)

X_train_scaled = pd.DataFrame(X_train_scaled, columns=input_features)
X_val_scaled = pd.DataFrame(X_val_scaled, columns=input_features)
X_test_scaled = pd.DataFrame(X_test_scaled, columns=input_features)

# Suprimir warnings
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning)

lgb_model = lgb.LGBMClassifier(
    objective='binary',
    boosting_type='gbdt',
    n_estimators=1000,
    learning_rate=0.05,
    num_leaves=20,
    max_depth=5,
    min_child_samples=30,
    min_child_weight=0.001,
    subsample=0.7,
```

```

        colsample_bytree=0.7,
        colsample_bylevel=0.7,
        reg_alpha=1.0,
        reg_lambda=2.0,
        random_state=RANDOM_STATE,
        n_jobs=-1,
        verbosity=-1,
        force_row_wise=True,
        metric='binary_logloss'
    )

lgb_model.fit(
    X_train_scaled,
    y_train_final,
    eval_set=[(X_val_scaled, y_val)],
    eval_metric='binary_logloss',
    callbacks=[
        lgb.early_stopping(stopping_rounds=100, verbose=False),
        lgb.log_evaluation(period=0, show_stdv=False)
    ]
)

print("LightGBM treinado com sucesso!")

class ManualPipeline:
    def __init__(self, scaler, model, feature_names):
        self.scaler = scaler
        self.model = model
        self.feature_names = feature_names

    def predict_proba(self, X):
        X_df = pd.DataFrame(X, columns=self.feature_names)
        X_scaled = self.scaler.transform(X_df)
        return self.model.predict_proba(X_scaled)

    def predict(self, X):
        X_df = pd.DataFrame(X, columns=self.feature_names)
        X_scaled = self.scaler.transform(X_df)
        return self.model.predict(X_scaled)

trained_model = ManualPipeline(scaler, lgb_model, input_features)

```

8. Verificação do Augmentation

```

print("Antes do augmentation:")
print(f"X_train_smote shape: {X_train_smote.shape}")
print(f"Distribuição y_train_smote: {pd.Series(y_train_smote).value_counts()}")

print("\nApós augmentation:")
print(f"X_final shape: {X_final.shape}")
print(f"Distribuição y_final: {pd.Series(y_final).value_counts()}")

```

9. Métricas de Desempenho

```

from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score

y_proba = lgb_model.predict_proba(X_test_scaled)[:, 1]
y_pred = (y_proba >= 0.5).astype(int)
auc = roc_auc_score(y_test_final, y_proba)
accuracy = accuracy_score(y_test_final, y_pred)
precision = precision_score(y_test_final, y_pred)
recall = recall_score(y_test_final, y_pred)
f1 = f1_score(y_test_final, y_pred)

print(f"Métricas calculadas:")
print(f"AUC: {auc:.4f}")
print(f"Acurácia: {accuracy:.4f}")
print(f"Precision: {precision:.4f}")
print(f"Recall: {recall:.4f}")
print(f"F1-Score: {f1:.4f}")

bundle_lgbm = {
    "model": lgb_model,
    "scaler": scaler,
    "input_features": input_features,
    "target": target_col,
    "map_raca": map_raca,
    "map_boolean": map_boolean,
    "map_hist_diabetes": map_hist_diabetes,
    "performance": {
        "auc": auc,
        "accuracy": accuracy,
        "precision": precision,
        "recall": recall,
        "f1": f1
    },
    "version": "2.0_otimizado_final"
}

# Salvar
bundle_path = "/Users/renanmoura/Documents/mestrado/PE-AI/models/model_lgbm_bundle.pkl"
joblib.dump(bundle_lgbm, bundle_path)

print("Bundle salvo com sucesso!")

```

```
print(f"Features no modelo: {len(input_features)}")
```

94

10. Predições Finais

```
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning)

y_proba = trained_model.predict_proba(X_test_final)[: , 1]
y_pred = (y_proba >= 0.5).astype(int)
y_test_int = np.round(y_test_final).astype(int)
```

11. Análise de Overfitting

```
out_dir = "imagens"
os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)

# %% Cell 9b - Análise de Overfitting (Treino vs Teste)
print("==" * 70)
print("ANÁLISE DE OVERFITTING: TREINO VS TESTE")
print("==" * 70)

y_proba_train = trained_model.predict_proba(X_train_final)[: , 1]
y_pred_train = (y_proba_train >= 0.5).astype(int)
y_train_int = np.round(y_train_final).astype(int)

y_proba_test = trained_model.predict_proba(X_test_final)[: , 1]
y_pred_test = (y_proba_test >= 0.5).astype(int)
y_test_int = np.round(y_test_final).astype(int)

train_auc = roc_auc_score(y_train_int, y_proba_train)
train_accuracy = accuracy_score(y_train_int, y_pred_train)
train_precision = precision_score(y_train_int, y_pred_train, zero_division=0)
train_recall = recall_score(y_train_int, y_pred_train, zero_division=0)
train_f1 = f1_score(y_train_int, y_pred_train, zero_division=0)

test_auc = roc_auc_score(y_test_int, y_proba_test)
test_accuracy = accuracy_score(y_test_int, y_pred_test)
test_precision = precision_score(y_test_int, y_pred_test, zero_division=0)
test_recall = recall_score(y_test_int, y_pred_test, zero_division=0)
test_f1 = f1_score(y_test_int, y_pred_test, zero_division=0)

diff_auc = train_auc - test_auc
diff_accuracy = train_accuracy - test_accuracy
diff_precision = train_precision - test_precision
diff_recall = train_recall - test_recall
diff_f1 = train_f1 - test_f1

print("\n MÉTRICAS COMPARATIVAS:")
print("\n" + "-" * 70)
print(f"{'Métrica':<15} {'Treino':<12} {'Teste':<12} {'Diferença':<12} {'Status'}")
print("-" * 70)

metrics_data = [
    ("AUC-ROC", train_auc, test_auc, diff_auc),
    ("Acurácia", train_accuracy, test_accuracy, diff_accuracy),
    ("Precision", train_precision, test_precision, diff_precision),
    ("Recall", train_recall, test_recall, diff_recall),
    ("F1-Score", train_f1, test_f1, diff_f1)
]

for metric_name, train_val, test_val, diff in metrics_data:
    # Determinar status
    if abs(diff) < 0.05:
        status = "Excelente"
    elif abs(diff) < 0.10:
        status = "Aceitável"
    else:
        status = "Overfitting"

    print(f"{'metric_name':<15} {'train_val':>7.4f} {'test_val':>7.4f} {'diff':>+7.4f} {'status}'")

print("-" * 70)

# Análise geral
print("\n DIAGNÓSTICO:")
overfitting_count = sum(1 for _, _, _, diff in metrics_data if abs(diff) > 0.10)

if overfitting_count == 0:
    print("MODELO SAUDÁVEL: Não há sinais significativos de overfitting")
    print(" O modelo está generalizando bem para dados não vistos.")
elif overfitting_count <= 2:
    print("OVERFITTING MODERADO: Algumas métricas mostram diferenças")
else:
    print("OVERFITTING SEVERO")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

ax = axes[0]
metrics_names = ['AUC', 'Accuracy', 'Precision', 'Recall', 'F1']
train_values = [train_auc, train_accuracy, train_precision, train_recall, train_f1]
test_values = [test_auc, test_accuracy, test_precision, test_recall, test_f1]

x = np.arange(len(metrics_names))
width = 0.35
```

```

bars1 = ax.bar(x - width/2, train_values, width, label='Treino', color='green', alpha=0.7)
bars2 = ax.bar(x + width/2, test_values, width, label='Teste', color='blue', alpha=0.7)

ax.set_ylabel('Score')
ax.set_title('Comparação: Treino vs Teste')
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(metrics_names, rotation=45, ha='right')
ax.legend()
ax.grid(axis='y', alpha=0.3)
ax.set_ylim([0, 1.1])

for bars in [bars1, bars2]:
    for bar in bars:
        height = bar.get_height()
        ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height,
                f'{height:.3f}',
                ha='center', va='bottom', fontsize=8)

ax = axes[1]
differences = [diff_auc, diff_accuracy, diff_precision, diff_recall, diff_f1]
colors = ['red' if abs(d) > 0.10 else 'orange' if abs(d) > 0.05 else 'green'
           for d in differences]

bars = ax.bar(metrics_names, differences, color=colors, alpha=0.7)
ax.axhline(y=0, color='black', linestyle='--', linewidth=0.8)
ax.axhline(y=0.05, color='orange', linestyle='--', linewidth=0.8, label='Limiar Aceitável')
ax.axhline(y=-0.05, color='orange', linestyle='--', linewidth=0.8)
ax.axhline(y=0.10, color='red', linestyle='--', linewidth=0.8, label='Limiar Crítico')
ax.axhline(y=-0.10, color='red', linestyle='--', linewidth=0.8)

ax.set_ylabel('Diferença (Treino - Teste)')
ax.set_title('Análise de Overfitting')
ax.set_xticklabels(metrics_names, rotation=45, ha='right')
ax.legend()
ax.grid(axis='y', alpha=0.3)

for bar, diff in zip(bars, differences):
    height = bar.get_height()
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height,
            f'{diff:.3f}',
            ha='center', va='bottom' if height > 0 else 'top', fontsize=8)

plt.tight_layout()
plt.savefig(os.path.join(out_dir, "analise_overfitting.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()

```

12. Gráficos de Avaliação e SHAP

```

import shap

out_dir = "imagens"
out_dir_shap = "imagens_shap"
os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)
os.makedirs(out_dir_shap, exist_ok=True)

X_test_df = pd.DataFrame(X_test_scaled, columns=input_features)
X_train_df = pd.DataFrame(X_train_scaled, columns=input_features)

# Calcular valores SHAP
explainer = shap.TreeExplainer(lgb_model, X_train_df)
shap_values = explainer.shap_values(X_test_df)

if isinstance(shap_values, list):
    sv = shap_values[1]
else:
    sv = shap_values

# Calcular importância SHAP média ([SHAP]) por feature
mean_abs_shap = np.abs(sv).mean(axis=0)
shap_importance_df = pd.DataFrame({
    'feature': input_features,
    'importance': mean_abs_shap
}).sort_values('importance', ascending=True)

print("=== GRÁFICOS ===")

fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test_final, y_proba)

plt.figure(figsize=(15, 5))

# 1) ROC
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.plot(fpr, tpr, label=f"AUC = {auc:.3f}", linewidth=2, color='blue')
plt.plot([0,1],[0,1], '--', linewidth=0.8, color='gray')
plt.xlabel("False Positive Rate")
plt.ylabel("True Positive Rate")
plt.title("ROC Curve - Desempenho do Modelo")
plt.legend(loc="lower right")
plt.grid(alpha=0.3)

# 2) SHAP
plt.subplot(1, 3, 2)
colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, len(shap_importance_df)))
plt.barh(shap_importance_df['feature'], shap_importance_df['importance'], color=colors, alpha=0.7)
plt.xlabel('SHAP médio')
plt.title('Importância das Features (SHAP)')
plt.grid(alpha=0.3)

```

```

# 3) Curva de aprendizado
if hasattr(lgb_model, 'evals_result_'):
    evals_result = lgb_model.evals_result_
    val_loss = evals_result['valid_0']['binary_logloss']
    best_iter = int(np.argmin(val_loss))
    plt.subplot(1, 3, 3)
    plt.plot(val_loss, label='Validation Loss', linewidth=2, color='red')
    plt.axvline(x=best_iter, color='green', linestyle='--', label=f'Melhor iteração ({best_iter})')
    plt.xlabel('Iterações')
    plt.ylabel('Binary Logloss')
    plt.title('Curva de Aprendizado (Validação)')
    plt.legend()
    plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig(os.path.join(out_dir, "avaliacao_lightgbm.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()

# FIGURA 2 – Distribuição das Probabilidades + Matriz de Confusão
plt.figure(figsize=(12, 4))

plt.subplot(1, 2, 1)
prob_class_0 = y_proba[y_test_final == 0]
prob_class_1 = y_proba[y_test_final == 1]
plt.hist(prob_class_0, alpha=0.7, label='Sem Pré-eclâmpsia', bins=10, color='blue')
plt.hist(prob_class_1, alpha=0.7, label='Com Pré-eclâmpsia', bins=10, color='red')
plt.xlabel('Probabilidade Predita')
plt.ylabel('Frequência')
plt.title('Distribuição das Probabilidades')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)

plt.subplot(1, 2, 2)
cm = confusion_matrix(y_test_final, y_pred)
plt.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap=plt.cm.Blues)
plt.title('Matriz de Confusão')
plt.colorbar()
tick_marks = np.arange(2)
plt.xticks(tick_marks, ['Sem PE', 'Com PE'])
plt.yticks(tick_marks, ['Sem PE', 'Com PE'])
thresh = cm.max() / 2.
for i, j in np.ndindex(cm.shape):
    plt.text(j, i, format(cm[i, j], 'd'),
             horizontalalignment="center",
             color="white" if cm[i, j] > thresh else "black")

plt.tight_layout()
plt.savefig(os.path.join(out_dir, "probabilidades_matriz_confusao.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()

```

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP**DADOS DO PROJETO DE PESQUISA**

Título da Pesquisa: DESENVOLVIMENTO DE UMA API REST COM MODELO DE MACHINE LEARNING PARA PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA - PPML

Pesquisador: RENAN MATIAS MOURA

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 90849625.0.0000.5187

Instituição Proponente: Núcleo de Tecnologias Estratégicas em saúde - NUTES

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.974.575

Apresentação do Projeto:

ONDE LÊ-SE: ȷ A pré-eclâmpsia é uma das causas mais comuns de morbidade e mortalidade materna e perinatal. A doença é caracterizada pelo desenvolvimento de hipertensão após 20 semanas de gestação e pode desencadear uma série de complicações. Em casos mais graves, a condição pode levar à morte, restrição de crescimento fetal e ao parto prematuro, aumentando significativamente o risco de complicações neonatais. Portanto, a detecção precoce e o manejo adequado da doença são essenciais para minimizar desfechos adversos tanto para a mãe quanto para o bebê."

DIANTE DO EXPOSTO, O ESTUDO SE MOSTRA RELEVANTE.

Objetivo da Pesquisa:

OS OBJETIVOS ATENDEM AO RECORTE TEMÁTICO

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

ATENDE A RESOLUÇÃO

466/12

Endereço: Av. das Baraúnas, 351- Campus Universitário

Bairro Bodocongó

CEP: 58.109-753

UF: PB

Município

CAMPINA GRANDE

Telefone (83)3315-3373

Fax: (83)3315-3373

E-

cep@setor.uepb.edu.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB



Continuação do Parecer: 7.974.575

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

SEM PENDÊNCIAS

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

ATENDE A RESOLUÇÃO

466/12

Recomendações:

APÓS A PESQUISA CONCLUÍDA, RECOMENDAMOS A INCLUSÃO NA PLATAFORMA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

SEM PENDÊNCIAS

Considerações Finais a critério do CEP:

APÓS A PESQUISA CONCLUÍDA, RECOMENDAMOS A INCLUSÃO NA PLATAFORMA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2583527.pdf	31/10/2025 16:04:23		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_comite_final.docx	31/10/2025 16:03:45	RENAN MATIAS MOURA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	DECLARACAO_COMITE_assinado_final.pdf	22/09/2025 18:12:46	RENAN MATIAS MOURA	Aceito
Declaração de concordância	declaracao_concordancia_final.pdf	22/09/2025 18:11:03	RENAN MATIAS MOURA	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto_assinado_final.pdf	22/09/2025 18:07:50	RENAN MATIAS MOURA	Aceito
Outros	Embrion_termo.pdf	31/07/2025 11:35:53	RENAN MATIAS MOURA	Aceito
Outros	termo_renan_assinado.pdf	31/07/2025 11:32:46	RENAN MATIAS MOURA	Aceito
TCLE / Termos	20250616091222.pdf	16/07/2025	RENAN MATIAS	Aceito

Endereço: Av. das Baraúnas, 351- Campus Universitário

Bairro Bodocongó

CEP: 58.109-753

UF: PB

Município

CAMPINA GRANDE

Telefone (83)3315-3373

Fax: (83)3315-3373

E-

cep@setor.uepb.edu.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA
PARAÍBA - UEPB**



Continuação do Parecer: 7.974.575

de Assentimento / Justificativa de Ausência	20250616091222.pdf	12:29:25	MOURA	Aceito
Declaração de Pesquisadores	termo_pesquisador_assinado.pdf	16/07/2025 12:27:04	RENAN MATIAS MOURA	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CAMPINA GRANDE, 13 de Novembro de 2025

**Assinado por:
Gabriela Maria Cavalcanti Costa
(Coordenador(a))**

Endereço: Av. das Baraúnas, 351- Campus Universitário

Bairro Bodocongó

CEP: 58.109-753

UF: PB

Município

CAMPINA GRANDE

Telefone (83)3315-3373

Fax: (83)3315-3373

E-

cep@setor.uepb.edu.br