대장내시경 검사 설명서 및 동의서

대장내시경 검사에 관하여

대장내시경 검사는 대장 내부 이상을 진단하기 위하여 항문을 통하여 유연성이 있는 내시경을 삽입하여, 직장, 하행 결장, 횡행 결장, 상행 결장 및 맹장을 검사하고 조직검사를 할 수 있습니다. 필요시 올 가미를 이용하여 대장 용종을 제거하거나 출혈부위에 대한 지혈 (클립처치 : **비보험**) 등 간단한 치료를 할 수 있습니다.

대장내시경 검사의 준비

정확한 검사를 위해서는 대장 내 대변이 남아 있어서는 안 됩니다. 검사 전날 저녁부터는 금식하시고 장세척 액을 지시대로 복용하십시오. 평소 복용 하시던 약물은 평소대로 복용하시고 아스피린이나 와파 린 등 **항혈소판제제, 항응고제**를 복용하시는 분은 검사 전 1주일 전부터 드셔서는 안 됩니다.

검사과정

검사 전 의사와 간호사가 검사에 대하여 설명합니다. 과거 다른 내시경 검사를 받으신 적이 있거나 약물 알러지가 있는 경우 미리 말씀하십시오. 설명을 듣고 나서 대장내시경 검사 동의서에 서명하십시오. 검사 중에는 검사 가운을 입으시고 안경, 의치 및 콘택트렌즈를 제거하십시오. 검사대에서는 좌측 와위로 누우면 진정제를 주사합니다. 항문을 통해서 내시경을 삽입 한 후 직장과 상부 대장으로 내시경을 진입시키는데 약간의 복통과 복부 팽만감을 느낄수 있습니다. 이는 검사 과정에서 누구나 경험하는 불편감이며 곧 좋아집니다. 검사 중 자세 변화가 필요한 경우가 있으며 검사는 통상 15~60분이 소요됩니다.

검사이후

검사 전 주사한 약물 효과가 소진 될 때까지 한 시간 정도 안정이 필요합니다. 검사 후 반드시 보호자와 함게 귀가 하십시오. 검사 당일에는 운전과 기계조작과 같은 일을 해서는 안됩니다.

위험성

대장내시경 검사의 부작용으로는 약에 의한 부작용과 **대장천공, 출혈** 등이 있습니다. 부작용이 발생할 확률은 1000명 중의 한명 정도로 매우 낮으나 신속한 대처가 필요하며 수술이 필요할 수 있습니다. 부작용은 용종절제술과 같은 내시경 적 치료를 한 경우에 증가합니다. 대장내시경 검사 후 심한복통, 혈변, 발열, 검사 수 시간 후부터의 구토가 발생하는 경우 즉시 연락해 주십시오.

추가비용발생

용종제거 시술 시행 시에 사용되는 물품 및 시술비용 등의 추가 비용이 발생될 수 있습니다.

대장내시경 검사 동의서

이번 대장내시경 검사를 하는데 있어 담당의사로부터 검사내용과 그 필요성에 대하여 충분한 설명을 듣고 모든 것을 양해하오니 검사를 부탁드립니다.

원장 앞

20 년 월 일

환자 서명 (성명) (인)

또는 대리인 서명 (성명) (인)