

상부위장관 내시경 검사 설명서/동의서

검사전 주의사항

- 1) 검사 전날 저녁 식사는 오후 6시경 소화되기 쉬운 음식을 드시고 밤 9시부터 물 이외에는 아무것도 드시지 마십시오. 밤 12시 이후로는 물도 드시지 마십시오. 술, 담배도 안됩니다. 단, 혈압약은 물 반컵 정도로 검사 당일 아침에 꼭 드십시오.
- 2) 아스피린과 같은 항혈소판제제나 항응고제(와파린 등)를 드시는 분은 담당 주치의에게 약 복용 여부에 대해 반드시 확인 후 복용 중지 여부 및 기간에 대해 상의 받으시기 바랍니다.
- 3) 당뇨병이 있는 분은 검사 당일 아침에 인슐린 주사를 맞지 마시고 당뇨약도 드시지 마십시오.
- 4) 간, 심장, 폐, 신장, 혈액 질환, 고혈압, 당뇨병 등 각종 병력이 있을 경우 반드시 담당 의사와 상의해야 합니다.
- 5) 도난, 분실의 염려가 있는 귀중품은 가지고 오지 마십시오.
- 6) 검사 도중 조직검사나 기타 검사를 시행한 경우에는 추가 수납이 있습니다.
- 7) 검사 전에는 의치를 빼 주십시오.

검사 과정 중 발생할 수 있는 합병증 및 문제점

- 1) 장운동 억제제를 투여 받을 경우에 녹내장 및 전립선비대증 환자에게서 부작용을 일으킬 수 있으므로 사전에 의료진에게 알려주셔야 예방할 수 있습니다.
- 2) 내시경 삽입하는 과정에서 치아가 부러지거나 빠져서 기도로 들어갈 위험이 발생할 수 있습니다.
- 3) 위 내에 잔여물이 남아 있거나 환자의 협조가 어려워 더 이상 내시경 검사를 진행할 수 없는 경우에는 내시경을 삽입하였더라도 검사를 중단할 수 있습니다.
- 4) 내시경 검사를 시행하는 동안 사용하는 약물에 의한 과민반응, 저산소증이나 폐렴 같은 호흡기 합병증, 뇌졸중, 심근경색증 및 쇼크 같은 순환기계 합병증, 감염, 출혈, 천공, 복통 등이 발생할 수 있습니다. 내시경 검사 중 발생하는 출혈의 경우 대부분 내시경을 이용하여 지혈이 가능하나 일부 출혈의 경우 혈관 색전술 치료 또는 수술적 치료를 위해 입원이 필요한 경우도 있을 수 있습니다. 또한, 천공이 발생한 경우 내시경을 이용한 봉합술, 항생제 치료 또는 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. 극히 드물지만, 합병증에 대한 적절한 치료에도 불구하고 치료에 반응하지 않을 경우 사망에 이를 수도 있습니다.

검사 후 주의사항

- 1) 검사 후 목마침로 인해 이물감이 느껴지지만 한 시간 정도 지나면 대부분 가라앉습니다.
- 2) 물이나 음식은 목 마침이 완전히 풀린 후 (검사 1~2시간 후) 드십시오.
- 3) 검사 후 2~3일 정도는 목이 불편할 수 있습니다.
- 4) 검사 후 출혈(혈변, 검은색 변)이 발생하면 내시경실로 연락주시거나 바로 내원하십시오.
- 5) 검사 당일 너무 뜨겁거나 자극적인 음식은 피하시고 특히 술과 담배는 삼가십시오.
- 6) 진정내시경을 받는 경우 검사 당일에는 운전하면 안되고 환자 안전을 위해 보호자가 동반해야 합니다. 또한 운동 및 사우나를 자제하시고, 기계를 다루거나, 중요한 결정을 내리는 일을 시행하여서는 안됩니다.
- 7) 조직검사 결과는 1주일 정도 소요됩니다. 검사 결과는 외래 진료 예약일에 확인하시면 됩니다.

이에 본인(또는 대리인)은 시술의 필요성, 과정 및 합병증에 대하여 의료진으로부터 설명을 듣고 충분히 이해하였으며, 검사 전후 주의 사항, 불가항력적으로 야기될 수 있는 합병증 또는 환자의 특이체질로 우발적 사고가 일어날 수 있는 것을 사전 설명으로 충분히 이해하였습니다. 이에 자신의 자유로운 의사에 따라 본인(또는 상기 피검인)이 내시경 검사와 그에 따른 처치를 받기를 위하여 귀 병원에 검사/처치를 서면으로 신청합니다.