


18 16 14 12 10 8 6
Thousands of Years (B.P.)

! Infectious diseases and human history !

페스트균의 확산 과정



페스트균의 확산 과정

설치류 서식 패턴

- ◆어느 정도 성장 후, 무리에서 쫓겨나 새로운 근거지, 새로운 무리 형성(땅속 굴)
- ◆스텝 초원 지역에서 설치류 서식지 확산
- ◆한 해 15~30Km 씩 확산
- ◆페스트 확산의 중요한 패턴

몽골제국의 발흥과 중세 흑사병

- ◆1346년 이후, 유럽과 서아시아는 페스트가 완전히 자리 잡고 오늘날까지 계속 새로운 변종
- ◆1346년, 유럽을 페스트에 감염에 노출 시킨 어떤 결정적 계기
 - 13세기 후반(1252~1253), 몽골기병대, 원난, 미얀마 지역 침공

페스트균의 확산 과정

몽골제국의 발흥과 중세 흑사병

- ◆ 1252년 이후, 몽골군은 자신도 모르는 사이 고향인 초원지대의 설치류에 페스트 균을 전파했을 것으로 추정
- ◆ 1310년에서 1340년 사이에 중앙아시아 초원에서 차츰 독성이 강한 감염병으로 변이를 일으킴
- ◆ 대상(隊商)들의 이동 경로와 몽골군의 네트워크를 따라 유라시아 대륙의 여러 지역으로 광범위하게 확산
 - 서쪽 방면으로 이동한 흑사병은 1346년경 마침내 흑해지역 카파에까지 전파
 - 선박을 통해 콘스탄티노폴리스 주변 및 지중해 지역에 광범위하게 전파되기 시작
- ◆ 원난, 미얀마 같은 자연상태의 오래된 감염 중심지나, 만주-몽골 스텝지대의 혈거성 설치류에 뿌리를 내린 새로운 감염원으로부터 전파된 페스트균이 1331년 중국에 침입했을 가능성
- ◆ 그후, 15년 동안 아시아의 대상 교역로를 경유해 1346년 크림반도에 도달
- ◆ 이후, 선박, 해양루트를 통해 여러 항구로 전파
- ◆ 다시 내륙지방으로 전파
- ◆ 대부분의 유럽과 서아시아 지역에 페스트 균 침투(주요 매개 숙주:곰쥐와 벼룩)

페스트균의 확산 과정

1346년 크림반도의 교역도시 ‘카파’

- ◆카파를 공격하던 몽골군대에서 페스트 처음 발생
- ◆흑사병은 순식간에 지중해 전역으로 확산
- ◆1921년 만주 페스트의 치사율은 거의 100%에 육박
- ◆1943년 항생제 개발 이전 평균 치사율 60~70%
- ◆1346~1350년, 유럽전역 인구의 1/3 가량 사망 추정

관련 기록

- ◆“환자와 함께 있는 경우뿐만 아니라 멀리서 보기만 해도 병에 걸렸다. 이 때문에 환자는 간호해줄 사람도 없이 죽어갔고, 매장에 입회할 사제도 없었다. 부모는 자식을 돌아보지 않았고, 자식도 부모를 내팽개쳤다. 자선은 소용이 없었고 희망은 사려져버렸다” 흑사병에 걸린 프랑스 외과의사 기 드 솔리아크, <<대외과학>> 중에서