


! Infectious diseases and human history !

새로운 질병의 시대



새로운 질병의 시대

14세기 흑사병 창궐

- ◆ 유라시아 대륙의 교역로를 따라 흑해지역에 도달한 흑사병은 콘스탄티노폴리스와 지중해 지역을 중심으로 폭발적으로 창궐
 - 페스트균은 아시아에서 유럽으로 주기적으로 유입되었으며, 특히 지중해 주요 항구에 입항한 선박들이 페스트균의 매개생물인 감염된 쥐와 벼룩을 지속적으로 서쪽으로 공급하였으리라고 추정
- ◆ 동서 교역로를 통해 이동한 페스트균은 얼마 후, 이 교역로를 이어주던 유럽과 몽골 두 문명에게 모두 치명적인 타격을 가함으로써 동서 교역로마저 단절시키는 결과를 초래
- ◆ 1346년부터 약 7년에 걸친 1차 유행 때 페스트균은 소아시아, 중동, 북아프리카, 그리고 유럽 대부분 지역을 유린
 - 최소 30%에서 50% 사이의 희생자가 발생
- ◆ 유럽의 흑사병
 - 1347~53년 사이 1차 유행
 - 1360~63년, 1369년, 1374~75년, 1382~83년 등 되풀이되어 발병하면서 인구를 회복할 여력마저 앗아감
 - 잉글랜드 통계에 따르면 2차와 3차 유행의 경우에도 사망률이 10%를 상회한 것으로 추정
 - 유럽의 인구는 1460년대까지 계속 하강곡선을 그렸으며, 이 시기의 인구는 1300년경 인구의 절반에도 미치지 못함

새로운 질병의 시대

유럽 사회에서의 감염병 창궐

- ◆소빙기 현상들이 더욱 심화되면서 지구 전체적으로 기후가 불안정하여 당대인의 생존 조건을 더욱 악화시킴
- ◆기후가 인간의 활동과 산업에 부정적으로 작용하였으며, 감염병의 발병까지 지속되면서 인구와 경제의 회복을 억제
- ◆흑사병이 주기적으로 발병하여 사람들이 차츰 적응력을 갖게 되던 15세기 후반, 유럽에는 천연두, 말라리아, 장티푸스, 이질 등 오래 전에 유럽에서 발병하였던 감염병들이 재차 출현
- ◆잉글랜드의 경우
 - 1430년에서1480년 사이 반세기동안
 - 전국적 규모로 약 11회 시기적으로는 18년에 걸쳐 감염병이 유행
 - 지역 단위에서는 적어도 20회에 걸쳐 다른 역병이 추가로 발병한 사실이 문헌 사료에서 확인
 - 흑사병이 가장 빈번했고 또 치명적이었지만, 그 외 다른 감염병들이 동시에 출현하여 상황을 악화시킴

새로운 질병의 시대

새로운 질병의 시대

- ◆ 1440~1480년 인구 최저점에 도달
 - 생물학적 적응과 문화적 적응 진행
- ◆ 나병환자의 격리를 규정한 성경구절 준용
- ◆ 페스트 환자 40일 간 격리
 - 주로 항구의 선박 위에서 선박에서 40일 격리 후 입항 허가
 - 격리검역은 라구사(1465), 베네치아(1485)에서 차례로 제도화
 - 이후, 항구에서 격리검역제도로 일반화
- ◆ 19세기 들어 전염성에 대한 새로운 관념이 등장하면서 검역이 완화
 - 격리이론의 근거는 전염병이 사람들간의 접촉에 의해 전파된다는 것
 - 19세기 중반부터 감염설이 생활환경의 오염이 전염병의 주범이므로 공중위생에 역점을 두어야 한다는 주장이 제기
 - 예) 콜레라: 오염된 물에 의한 수인성 감염 → 상하수도 공공위생 중요성 인식