2026학년도 대학수학능력시험

강대모의고사K 31회 정답 및 해설

강남대성 수능연구소

• 수학 영역 •

공통과목									
8	③	9	④	10	②	11	③	12	②
13	①	14	③	18	10	19	16	20	12
21	23								

기하									
26	①	27	③	28	②	29	208		

※ 강대모의고사K 31회 발췌 60분 편집본 (원본 번호 유지)
※ 공통 8~14·18~21번, 선택 26~29번: 15문항 55점 만점
※ 8·18·19·26·27번 3점, 나머지 10문항 4점

MEMO

공통과목

8. 정답 ③

0의 여섯제곱근 중 실수인 것의 개수는 1이므로

$f(5)=1$

-1의 일곱제곱근 중 실수인 것의 개수는 1이므로

$f(6)=1$


따라서 $f(5)+f(6)=2$

9. 정답 ④

$f(x)=x^3-9x^2+15x$에서

$$f'(x)=3x^2-18x+15$$
$$=3(x^2-6x+5)$$
$$=3(x-1)(x-5)$$

이므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극댓값을 갖고, $x=5$에서 극솟값을 갖는다.
이때 $f(1)=7$, $f(5)=5^3-9\times5^2+15\times5=-25$이고, $f(0)=0$이므로
$x>0$에서 함수 $f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



방정식 $f(x)=k$의 양의 실근의 개수는 $x>0$에서 함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 개수와 같고, 교점의 개수가 2가 되도록 하는 k의 값의 범위는

$-25<k\le0$, $k=7$

따라서 정수 k의 개수는 $0-(-25)+1=26$

10. 정답 ②

삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{BC}\times\sin B$로 구할 수 있고,

삼각형 ABC의 넓이가 $6\sqrt{6}$, $\overline{AB}\times\overline{BC}=30$이므로

$6\sqrt{6}=\frac{1}{2}\times30\times\sin B$, 곧 $\sin B=\frac{2\sqrt{6}}{5}$

따라서 $\cos^2B=1-\sin^2B=1-\frac{24}{25}=\frac{1}{25}$이고,

삼각형 ABC가 예각삼각형이므로 $\cos B=\frac{1}{5}$

$\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$, $\overline{AB}=c$라 하면 $ac=30$, $a+b+c=18$이므로
삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$b^2=a^2+c^2-2ac\times\cos B$$
$$=a^2+c^2-2\times30\times\frac{1}{5}$$
$$=a^2+c^2-12$$

$=(a+c)^2-2ac-12$

$=(18-b)^2-72$

곧, $b=7$

따라서 선분 AC의 길이는 7이다.

11. 정답 ③

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하면 첫째항이 40이고 $d<0$이므로

$a_k>0$, $a_{k+1}<0$을 만족시키는 자연수 k가 존재한다.

$n\le k$일 때 $a_n>0$이므로 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{a_n+d}{a_n}=1+\frac{d}{a_n}<1$이고,

$n>k$일 때 $a_n<0$이므로 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{a_n+d}{a_n}=1+\frac{d}{a_n}>1$

따라서 $n>k$에서 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$의 값이 최대가 된다.

$n>k$일 때 n의 값이 커짐에 따라 $|a_n|$의 값은 커지므로 $1+\frac{d}{a_n}$의 값은 작아진다.

따라서 $n=k+1$에서 $1+\frac{d}{a_n}$의 값이 최대이므로

$k+1=6$, 곧 $k=5$

$a_5>0$이므로 $40+4d>0$, $d>-10$이고,

$a_6<0$이므로 $40+5d<0$, $d<-8$

따라서 $-10<d<-8$에서 정수 d의 값은 -9이고,

$a_3=40+2\times(-9)=22$, $a_4=40+3\times(-9)=13$이므로

$a_3+a_4=22+13=35$


[다른 풀이]

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하면

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{40+nd}{40+(n-1)d}=\frac{1}{n-1+\frac{40}{d}}+1$$

$f(x)=\frac{1}{x-1+\frac{40}{d}}+1$이라 하면 $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$, … 의 최댓값이

$f(6)$이므로 $f(5)<1<f(6)$이다.



따라서

$5<1-\frac{40}{d}<6$

$-4d<40<-5d$ ($\because d<0$)

$-10<d<-8$

이고 음의 정수 d의 값은 -9이다.

$a_3=40+2\times(-9)=22$, $a_4=40+3\times(-9)=13$이므로

$a_3+a_4=22+13=35$

12. 정답 ②

ㄱ. 참

$v_1(t)=t^2-(p+3)t+3p=(t-3)(t-p)$,

$v_2(t)=t^2-(q+3)t+3q=(t-3)(t-q)$이고,

$v_1(t)=v_2(t)$에서 $(t-3)(t-p)=(t-3)(t-q)$,

$(p-q)(t-3)=0$

조건에 의하여 $p\neq q$이므로 $t=3$

ㄴ. 참

조건에 의하여 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간

두 점 P, Q의 가속도의 합이 0이므로

두 점 P, Q의 시각 $t\,(t>0)$에서의 가속도를 각각 $a_1(t)$, $a_2(t)$라 하면

$a_1(t)=\frac{d}{dt}v_1(t)=2t-(p+3)$,

$a_2(t)=\frac{d}{dt}v_2(t)=2t-(q+3)$

따라서 $a_1(3)+a_2(3)=0$에서

$a_1(3)=3-p$, $a_2(3)=3-q$이므로

$(3-p)+(3-q)=0$, $p+q=6$

ㄷ. 거짓

점 P가 시각 $t=3$에서 원점을 지나므로 $\int_0^3 v_1(t)\,dt=0$

$$\int_0^3 v_1(t)\,dt=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{p+3}{2}t^2+3pt\right]_0^3$$

$$=9-\frac{9}{2}(p+3)+9p$$

$$=\frac{9}{2}p-\frac{9}{2}$$

이고, $\frac{9}{2}p-\frac{9}{2}=0$에서 $p=1$, $q=5$

$v_1(t)=t^2-4t+3=(t-1)(t-3)$, $v_2(t)=t^2-8t+15=(t-3)(t-5)$이므로

방정식 $v_2(t)=0$의 실근은 3 또는 5이다.

시각 $t\,(t\ge 0)$에서의 점 Q의 위치를 $x_2(t)$라 하면

$x_2'(t)=v_2(t)$이므로 함수 $x_2(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	…	3	…	5	…
$v_2(t)$		+	0	−	0	+
$x_2(t)$	0	↗	(극대)	↘	(극소)	↗

점 Q는 $t=3$일 때와 $t=5$일 때 운동 방향이 바뀌므로

출발한 후 점 Q의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각은 $t=5$

점 P의 시각 $t=5$에서의 속도는

$v_1(5)=(5-1)(5-3)=8$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

13. 정답 ①

두 실수 a, b가 방정식 $f'(x)=2$의 실근이므로

$f'(a)=f'(b)=2$ ····· ㉠

㉠에 의하여 $f'(b)=2$이고 조건 (나)에 의하여 $f(b)=2a$이므로

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(b, f(b))$에서의 접선의 방정식은

$y=f'(b)(x-b)+f(b)$

$y=2(x-b)+2a$, 곧 $2x-y-2b+2a=0$

조건 (가)에 의하여

원점과 직선 $2x-y-2b+2a=0$ 사이의 거리가 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$이므로

$$\frac{|-2b+2a|}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$|-b+a|=2$

$b=a+2\ (\because a<b)$ ..... ㉡

조건 (나)에 의하여 $f(a)=f(b)=2a$이므로

$f(x)=p(x-a)(x-b)(x-c)+2a\ (p\neq 0)$

이라 하면

$f'(x)=p(x-b)(x-c)+p(x-a)(x-c)+p(x-a)(x-b)$

$=p\{3x^2-2(a+b+c)x+ab+bc+ca\}$

이때 ㉠에 의하여 $f'(a)=f'(b)$이므로

이차함수 $f'(x)$의 그래프는 직선 $x=\frac{a+b}{2}$에 대하여 대칭이고,

이차함수 $f'(x)$의 그래프의 축은 $x=\frac{a+b+c}{3}$이므로

$$\frac{a+b}{2}=\frac{a+b+c}{3}$$

$$c=\frac{a+b}{2}$$

이때 ㉡에 의하여 $c=a+1$

따라서 $b=a+2$, $c=a+1$이므로

$f'(x)=p(x-a-2)(x-a-1)+p(x-a)(x-a-1)+p(x-a)(x-a-2)$

㉠에 의하여 $f'(a)=2$이므로

$f'(a)=2p=2$

$p=1$

따라서 $f(x)=(x-a)(x-a-1)(x-a-2)+2a$

주어진 조건에서 $f(0)=-4$이므로

$f(0)=-a(a+1)(a+2)+2a=-4$

$a^3+3a^2-4=0$

$(a+2)^2(a-1)=0$

이고 a는 양수이므로 $a=1$

따라서 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+2$이고

$f(4)=3\times 2\times 1+2=8$

참고

이차함수의 대칭성을 사용하지 않고 대수적인 풀이를 이용해서 a, c의 관계식과 p의 값을 구할 수도 있다.

$f'(x)=p(x-b)(x-c)+p(x-a)(x-c)+p(x-a)(x-b)$에서

㉠과 ㉡에 의하여 $f'(a)=f'(b)=2$이고 $b=a+2$이므로

$f'(a)=p(a-b)(a-c)=-2p(a-c)=2$

$p(a-c)=-1$ ..... ㉢

$f'(b)=p(b-a)(b-c)=2p(a-c+2)=2$

$p(a-c+2)=1$ ..... ㉣

㉢과 ㉣을 연립하면 $c=a+1$, $p=1$

14. 정답 ③

a_n의 부호에 따른 a_{n+1}의 부호를 먼저 살펴보자.

$a_n<0$인 경우 $a_{n+1}=-3a_n$이므로 $a_{n+1}>0$이다.

$a_n\geq 0$인 경우 $a_{n+1}=a_n+k$이고 a_{n+1}의 부호가 확정되지 않는다.

따라서 a_n의 부호에 따른 a_{n+1}의 부호를 표로 나타내면 다음과 같다.

a_n	a_{n+1}
$-$	$+$
$+,\ 0$	$+$
	0
	$-$

곧, a_{n+1}의 부호에 따른 a_n의 부호를 살펴보면 $a_{n+1}<0$일 때 $a_n\geq 0$이어야 한다. ..... ㉠

조건에서 $a_5-a_4=4$이므로 ..... ㉡

$a_4\geq 0$인 경우와 $a_4<0$인 경우로 나누어 살펴보자.

(ⅰ) $a_4\geq 0$인 경우

$a_5=a_4+k$이므로

$a_5-a_4=(a_4+k)-a_4=k=4$

이때 a_3의 부호에 따른 a_3, a_2의 값을 구하면 다음 표와 같다.

a_5	a_4	a_3	a_2
a_4+4	a_4	$a_4-4\ (a_3\geq 0)$	
		$-\frac{1}{3}a_4\ (a_3<0)$	$-\frac{1}{3}a_4-4$

$a_3\geq 0$이면 $a_4=a_3+k$, $a_4-a_3=4$이다.

$a_3<0$이면 ㉠에 의하여 $a_2\geq 0$이어야 하므로 $a_3=a_2+k$, $a_3-a_2=4$이다.

따라서 $a_4\geq 0$이면 $a_{m+1}-a_m=4$인 자연수 m의 최솟값이 4라는 조건을 만족시키지 않는다.

(ⅱ) $a_4<0$인 경우

$a_5=-3a_4$이므로 ㉡에 의하여

$a_5-a_4=-3a_4-a_4=-4a_4=4$이고 $a_4=-1$이다.

따라서 ㉠에 의하여 $a_3\geq 0$이고 $a_4=a_3+k$, $a_3=-k-1$, $k\leq -1$

$a_2\geq 0$, $a_1\geq 0$인 경우를 먼저 살펴보자.

$a_2\geq 0$인 경우 $a_2=-2k-1$, $k\leq -\frac{1}{2}$이고,

$a_1\geq 0$인 경우 $a_1=-3k-1$, $k\leq -\frac{1}{3}$

따라서 $a_2\geq 0$, $a_1\geq 0$인 경우 가능한 k의 값의 범위는 $k\leq -1$

위와 동일한 방법으로 각 항의 부호에 따른 a_2, a_1의 값을 구하고 가능한 k의 값의 범위를 구하면 다음 표와 같다.

a_4	a_3	a_2	a_1	k의 값의 범위
-1	$-k-1$	$-2k-1\ (a_2\geq 0)$	$-3k-1\ (a_1\geq 0)$	$k\leq -1$
			$\frac{2k+1}{3}\ (a_1<0)$	$k\leq -1$
		$\frac{k+1}{3}\ (a_2<0)$	$\frac{-2k+1}{3}\ (a_1\geq 0)$	$k<-1$

이때 $k=-1$이면 모든 a_1의 값은 $-3k-1$, $\frac{2k+1}{3}$뿐이고

모든 a_1의 값의 합은 $2+\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{3}$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $k<-1$이고 모든 a_1의 값의 합은

$$-3k-1+\frac{2k+1}{3}+\frac{-2k+1}{3}=-3k-\frac{1}{3}=3$$

이므로 $k=-\frac{10}{9}$

따라서 $p=-1$, $q=-\frac{10}{9}$, $f(k)=\frac{-2k+1}{3}$이므로

$$f(2p)+q=\frac{5}{3}-\frac{10}{9}=\frac{5}{9}$$

참고

$k=-\frac{10}{9}$일 때, a_2-a_1, a_3-a_2, a_4-a_3의 값이 모두 4가 아님을 다음과 같이 확인할 수 있다.

$a_2-a_1=(-2k-1)-(-3k-1)=k\neq 4$

$a_2-a_1=(-2k-1)-\frac{2k+1}{3}=-\frac{8k}{3}-\frac{4}{3}\neq 4$, 곧 $k\neq -2$

$a_2-a_1=\frac{k+1}{3}-\frac{-2k+1}{3}=k\neq 4$

$a_3-a_2=(-k-1)-(-2k-1)=k\neq 4$

$a_3-a_2=(-k-1)-\frac{k+1}{3}=-\frac{4}{3}k-\frac{4}{3}\neq 4$, 곧 $k\neq -4$

$a_4-a_3=-1-(-k-1)=k\neq 4$

18. 정답 10

$\sum_{k=1}^{5}(a_k-k)^2=80$에서

$\sum_{k=1}^{5}\left(a_k^2-2ka_k+k^2\right)=80$

$\sum_{k=1}^{5}\left(a_k^2+k^2\right)-2\sum_{k=1}^{5}ka_k=80$

이때 $\sum_{k=1}^{5}\left(a_k^2+k^2\right)=100$이므로 $\sum_{k=1}^{5}ka_k=10$

19. 정답 16

곡선 $y=4x^3-12x^2-x+12$ 위의 두 점 A(1, 3), B(3, 9)에 대하여
직선 AB의 방정식은 $y=3x$
따라서 곡선 $y=4x^3-12x^2-x+12$와 선분 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_1^3\left|(4x^3-12x^2-x+12)-3x\right|dx$$

이때 $1\le x\le 3$인 모든 실수 x에 대하여 $4x^3-12x^2-x+12\le 3x$이므로

$$\int_1^3\left|(4x^3-12x^2-x+12)-3x\right|dx$$

$$=\int_1^3\left\{3x-(4x^3-12x^2-x+12)\right\}dx$$

$$=\int_1^3(-4x^3+12x^2+4x-12)\,dx$$

$$=\left[-x^4+4x^3+2x^2-12x\right]_1^3$$


$$=(-81+108+18-36)-(-1+4+2-12)$$

$$=9-(-7)$$

$$=16$$

20. 정답 12

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}a$는 다음과 같다.




닫힌구간 [0, 2]에서 함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}a$의 교점의 x좌표는

$a\sin\pi x=\frac{\sqrt{2}}{2}a$, $\sin\pi x=\frac{\sqrt{2}}{2}$에서 $x=\frac{1}{4}$ 또는 $x=\frac{3}{4}$이다.

이때 $g\left(\frac{1}{4}\right)=b\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}b>\frac{\sqrt{2}}{2}a$이므로

$$g\left(\frac{1}{4}\right)>f\left(\frac{1}{4}\right)$$

따라서 직선 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}a$가 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 만나는 점 중 x좌표가 가장 작은 점 A는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이다.



곧, 점 A의 x좌표는 $\frac{1}{4}$이고 점 C의 x좌표는 $\frac{3}{4}$이다.

두 점 F, H는 각각 두 점 C, A와 점 (1, 0)에 대하여 대칭이므로

점 F의 x좌표는 $\frac{5}{4}$이고 점 H의 x좌표는 $\frac{7}{4}$이다.

점 B의 x좌표를 p라 하면 대칭성에 의하여

점 E의 x좌표는 $1-p$, 점 G의 x좌표는 $1+p$, 점 D의 x좌표는 $2-p$이다.

$\overline{CD}=(2-p)-\frac{3}{4}=\frac{5}{4}-p$, $\overline{EH}=\frac{7}{4}-(1-p)=p+\frac{3}{4}$이므로

$\overline{CD}:\overline{EH}=11:13$에서

$$\left(\frac{5}{4}-p\right):\left(p+\frac{3}{4}\right)=11:13$$

$$\frac{65}{4}-13p=11p+\frac{33}{4}$$

$$24p=8$$

$p=\frac{1}{3}$

따라서 두 점 B, G의 좌표는 $B\left(\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$, $G\left(\frac{4}{3}, -\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$이므로

$\overline{BG}=\sqrt{\left(\frac{1}{3}-\frac{4}{3}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a+\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2}=\sqrt{1+2a^2}=3$에서

$1+2a^2=9$

$a^2=4$

$a=2\ (\because a>0)$

따라서 점 B의 좌표가 $B\left(\frac{1}{3}, \sqrt{2}\right)$이고

점 B는 함수 $g(x)$의 그래프 위의 점이므로

$\sqrt{2}=b\times\cos\frac{\pi}{3}$, $b=2\sqrt{2}$

따라서 $a^2+b^2=4+8=12$

21. 정답 23

함수 $g(t)=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}$에서 $f(t)\neq t$이면

$\lim_{x\to t}(x-t)^n=0$이고 $\lim_{x\to t}\{f(x)-t\}=c\ (c\neq 0)$이므로 $g(t)=0$

따라서 $f(t)=t$를 만족시키는 t의 값에서만 함수 $g(t)$가 불연속일 가능성이 있다.

곧, $f(0)=0$, $f(a)=a$가 되어야 하고 조건에서 $f(2)=2$이므로

방정식 $f(x)-x=0$은 서로 다른 세 실근 0, 2, a를 갖는다. ····· ㉠

이때 함수 $g(t)$는 $t=2$에서 연속이므로 $g(2)=0$

따라서 $f(t)=t$일 때, 함수 $g(t)$를 확인하여 $g(2)=0$이 되기 위한 자연수 n의 값의 범위를 먼저 찾아보자.

$f(t)-t=0$이면 다항식 $f(x)-t$는 $x-t$를 인수로 갖는다.

$f(x)-t$는 삼차함수이므로 다항식 $f(x)-t$가 $(x-t)^m\ (m=1, 2, 3)$을 인수로 갖는다고 하자.

곧, $f(x)-t=(x-t)^m h(x)$ ($h(x)$는 $h(t)\neq 0$인 다항식)이라 하자.

$n<m$이면 $\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}=\lim_{x\to t}\frac{1}{(x-t)^{m-n}h(x)}$은 발산하므로

함수 $g(t)$가 정의되지 않아 조건을 만족시키지 않는다. ····· ㉡

$n=m$이면 $\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}=\frac{1}{h(t)}\neq 0$ ····· ㉢

$n>m$이면 $\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^{n-m}}{h(x)}=0$ ····· ㉣

따라서 함수 $g(t)$가 $t=2$에서 연속이려면 $n>m$이어야 한다.

곧, n은 2 이상의 자연수가 되어야 하므로

n의 값에 따라 범위를 나누어 살펴보자.

(i) $n=2$인 경우

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 불연속이려면

$g(0)\neq 0$, $g(a)\neq 0$이 되어야 하므로 ㉡, ㉢, ㉣에 의하여

다항식 $f(x)$는 x^2을 인수로 가지고 x^3을 인수로 갖지 않는다.

다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^2$을 인수로 가지고 $(x-a)^3$을 인수로 갖지 않는다.

㉠에 의하여

$f(x)-x=px(x-2)(x-a)$

$f(x)=px(x-2)(x-a)+x$ (p는 상수)

이때 $f(x)=x\{p(x-2)(x-a)+1\}$이 x^2을 인수로 가지므로

다항식 $p(x-2)(x-a)+1$에 $x=0$을 대입했을 때 식의 값이 0이다.

$2ap+1=0$, 곧 $ap=-\frac{1}{2}$

또한

$f(x)-a=px(x-2)(x-a)+x-a$

$f(x)-a=(x-a)\{px(x-2)+1\}$

이 $(x-a)^2$을 인수로 가지므로

다항식 $px(x-2)+1$에 $x=a$를 대입했을 때 식의 값이 0이다.

$pa(a-2)+1=0$, 곧 $ap=-\frac{1}{2}$이므로 $-\frac{1}{2}(a-2)+1=0$

이때 $a=4$이고 $p=-\frac{1}{8}$

따라서 $f(x)=-\frac{1}{8}x(x-2)(x-4)+x$

이때 $f(2)=2$이고,

$$g(2)=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)^2}{f(x)-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)^2}{-\frac{1}{8}x(x-2)(x-4)+x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{-\frac{1}{8}x(x-4)+1}$$

$$=0$$

이므로 조건을 만족시킨다.

(ii) n이 3 이상인 경우

$n=3$인 경우

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 불연속이려면

$g(0)\neq 0$, $g(a)\neq 0$이 되어야 하므로

㉡, ㉢, ㉣에 의하여 다항식 $f(x)$는 x^3을 인수로 갖고,

다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^3$을 인수로 갖는다.

다항식 $f(x)$가 x^3을 인수로 가지면 $f(x)=qx^3$ (q는 상수)이다.

이때 $f(x)-a=qx^3-a$이므로 다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^3$을 인수로 가질 수 없다.

또한 $n\geq 4$인 경우 $f(x)$는 삼차함수이므로

x^n 또는 $(x-a)^n$을 인수로 가질 수 없다.

따라서 (ii)의 경우 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 $n=2$이고, $f(x)=-\frac{1}{8}x(x-2)(x-4)+x$이므로

$8\times\{n+f(-1)\}=8\left(2+\frac{7}{8}\right)=23$

참고!

$\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}$의 분자와 분모를 $x-t$로 나누면

$$g(t)=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^{n-1}}{\frac{f(x)-t}{x-t}}$$

이때 $f(t)=t$인 t에 대하여 $g(t)=\frac{0}{f'(t)}$ 또는 $g(t)=\frac{1}{f'(t)}$이고

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 함숫값 0을 갖지 않으므로

$f'(0)=0$, $f'(a)=0$임을 이용할 수 있다.

참고2

삼차함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 점을 관찰하여 $n=2$임을 보일 수도 있다.

(i) $n=2$인 경우

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 불연속이려면

$g(0)\neq 0$, $g(a)\neq 0$이 되어야 하므로 ㉡, ㉢, ㉣에 의하여


다항식 $f(x)$는 x^2을 인수로 가지고 x^3을 인수로 갖지 않는다.

다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^2$을 인수로 가지고 $(x-a)^3$을 인수로 갖지 않는다.

곧, 삼차함수 $f(x)$의 그래프는 점 $(0, f(0))$에서 x축에 접하고

점 $(a, f(a))$에서 직선 $y=a$에 접하므로

삼차함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값 0, $x=a$에서 극댓값 a를 갖는다.



이 경우 함수 $f(x)$의 그래프는 직선 $y=2$에 접하지 않아

다항식 $f(x)-2$는 $(x-2)^2$을 인수로 갖지 않는다.

따라서 (i)의 경우 조건을 만족시킨다.

(ii) n이 3 이상인 경우

$n=3$인 경우

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 불연속이려면

$g(0)\neq 0$, $g(a)\neq 0$이 되어야 하므로

㉡, ㉢, ㉣에 의하여 다항식 $f(x)$는 x^3을 인수로 갖고,

다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^3$을 인수로 갖는다.


이때 $f(x)$가 삼차함수이므로


다항식 $f(x)$가 x^3을 인수로 가지면

다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^3$을 인수로 가질 수 없고,

다항식 $f(x)-a$가 $(x-a)^3$을 인수로 가지면

다항식 $f(x)$는 x^3을 인수로 가질 수 없다.





또한 $n\geq 4$인 경우 $f(x)$는 삼차함수이므로

x^n 또는 $(x-a)^n$을 인수로 가질 수 없다.

따라서 (ii)의 경우 조건을 만족시키지 않는다.

기하

26. 정답 ①

$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$이므로 두 삼각형 ABD, BCD는 한 변의 길이가 4인 정삼각형이고


$|\overrightarrow{AC}|=4\sqrt{3}$, $|\overrightarrow{BD}|=4$

$\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MD'}=\overrightarrow{AD'}$이 되도록 하는 점을 D'이라 하면

사각형 ABCD가 마름모이므로 두 직선 MD', AC는 서로 수직이다.

곧, 점 M을 지나고 직선 BD와 평행한 직선이 직선 AC와 만나는 점을 H라 하면

삼각형 AHD'은 직각삼각형이고 다음과 같다.



직각삼각형 AHD'에서

$|\overrightarrow{AH}|=\frac{3}{4}\times|\overrightarrow{AC}|=3\sqrt{3}$, $|\overrightarrow{HD'}|=\frac{5}{4}\times|\overrightarrow{BD}|=5$이므로

$|\overrightarrow{AD'}|=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+5^2}=2\sqrt{13}$

[다른 풀이]

$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$이므로 두 삼각형 ABD, BCD는 한 변의 길이가 4인 정삼각형이고

$|\overrightarrow{AC}|=4\sqrt{3}$, $|\overrightarrow{BD}|=4$

네 점 A, B, C, D의 좌표를 각각 $(2, 2\sqrt{3})$, $(0, 0)$, $(2, -2\sqrt{3})$, $(4, 0)$이라 하자.

점 M의 좌표는 $(3, -\sqrt{3})$이고

$\overrightarrow{AM}=(1, -3\sqrt{3})$

따라서 $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BD}=(5, -3\sqrt{3})$이고

$|\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BD}|=\sqrt{5^2+(-3\sqrt{3})^2}=2\sqrt{13}$

27. 정답 ③


타원 C의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$이라 하자.

점 P는 타원 C 위의 점 중 직선 l까지의 거리가 최소인 점이므로

점 P에서의 접선은 직선 l과 평행하다.

타원 위의 점 중 접선의 기울기가 음수가 되는 점은 제1사분면 또는 제3사분면에 있고 $\angle PFF'=\frac{\pi}{2}$이므로 점 P는 제1사분면 위의 점이다.

주어진 상황은 다음과 같다.



점 P의 x좌표가 3이므로

$\frac{9}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에서 $y^2=b^2\times\frac{a^2-9}{a^2}$

타원의 초점의 x좌표에 의하여 $a^2-b^2=9$이므로

점 P의 좌표는 $\left(3, \frac{b^2}{a}\right)$이다.

점 $P\left(3, \frac{b^2}{a}\right)$에서의 접선의 방정식은 $\frac{3x}{a^2}+\frac{1}{a}y=1$

접선의 기울기와 직선 l의 기울기가 같아야 하므로

$-\frac{3}{a}=-\frac{3}{5}$에서 $a=5$이고 $b=4$

$\overline{PF}=\frac{16}{5}$이고 $\overline{PF'}+\overline{PF}=10$이므로

$\overline{PF'}=10-\frac{16}{5}=\frac{34}{5}$

28. 정답 ②

평면 ABC, ABD를 각각 α, β라 할 때,

직선 OO_1과 평면 α가 수직이고, 직선 OO_2와 평면 β가 수직이다.

이때 $\overline{OA}=\sqrt{\overline{OO_1}^2+\overline{O_1A}^2}=\sqrt{\overline{OO_2}^2+\overline{O_2A}^2}$이고

$\overline{O_1A}=\overline{O_2A}$이므로 $\overline{OO_1}=\overline{OO_2}$


선분 AB의 중점을 M이라 하자.

$\angle BMO=\angle BMO_1=\angle BMO_2=\frac{\pi}{2}$이므로 점 M은 평면 OO_1O_2 위에 있다.

따라서 사각형 OO_1MO_2에서 $\angle O_1MO_2=\frac{\pi}{3}$이고

두 평면 α, β가 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{3}$이다.

따라서 주어진 상황은 다음과 같다.



직각삼각형 O_2MB에서 $\overline{O_2B}=4$, $\overline{MB}=2\sqrt{3}$이므로

피타고라스 정리에 의하여 $\overline{O_2M}=\sqrt{4^2-(2\sqrt{3})^2}=2$


$\overline{AB}=4\sqrt{3}$이고 $\tan(\angle AO_2M)=\tan(\angle BO_2M)=\sqrt{3}$이므로

$\angle AO_2B=2\times\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}$

이때 원주각의 성질에 의하여 $\angle ADB=\frac{\pi}{3}$이고 $\overline{AB}=\overline{BD}$이므로

삼각형 ABD는 정삼각형이다.

따라서 $\overline{AD}=\overline{BD}$이므로 점 D에서 직선 AB에 내린 수선의 발은 점 M이다.



$\overline{O_2M}=2$이므로 $\overline{HM}=\overline{O_2M}\times\cos\frac{\pi}{3}=1$


삼각형 O_1AM에서 $\angle O_1MA=\frac{\pi}{2}$, $\overline{O_1M}=\sqrt{\overline{O_1A}^2-\overline{AM}^2}=2$이므로

$\overline{O_1H}=\overline{O_1M}-\overline{HM}=1$

또한 $\overline{CH}=5$, $\overline{O_1C}=4$이므로 점 C는 직선 O_1H 위의 점이다.

삼각형 ACD의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이를 구하기 위하여

삼각형 ACD의 넓이와 두 평면 ACD와 BCD가 이루는 예각의 크기를 구하자.




점 D에서 평면 α에 내린 수선의 발을 D'이라 하자.

$\angle DMD'=\frac{\pi}{3}$이므로 $\overline{MD'}=3$, $\overline{DD'}=3\sqrt{3}$

$\overline{CD'}=\overline{CM}-\overline{MD'}=6-3=3$이므로

$\overline{CD}=\sqrt{\overline{CD'}^2+\overline{DD'}^2}=6$



선분 CD의 중점을 M'이라 할 때,

삼각형 ACD는 $\overline{AC}=\overline{AD}$이므로 $\overline{AM'}=\sqrt{(4\sqrt{3})^2-3^2}=\sqrt{39}$

이때 삼각형 BCD는 삼각형 ACD와 합동이므로 $\overline{BM'}=\sqrt{39}$이고,

두 평면 ACD와 BCD가 이루는 예각의 크기를 θ라 하면

이면각의 정의에 의하여 $\angle AM'B=\theta$

$\overline{AB}=4\sqrt{3}$이므로 삼각형 AM'B에서 코사인법칙에 의하여

$\cos\theta=\frac{(\sqrt{39})^2+(\sqrt{39})^2-(4\sqrt{3})^2}{2\times\sqrt{39}\times\sqrt{39}}=\frac{5}{13}$


삼각형 ACD의 넓이를 S라 하면

$S=\frac{1}{2}\times\overline{CD}\times\overline{AM'}=3\sqrt{39}$

정사영의 넓이는 $S\times\cos\theta=3\sqrt{39}\times\frac{5}{13}=\frac{15\sqrt{39}}{13}$

29.

정답 208



쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$의 한 초점이 $F(c, 0)$이므로 $c=\sqrt{a^2+b^2}$

이때 $\overline{BF}:\overline{BF'}=3:2$이고 $\overline{BF}=\sqrt{a^2+b^2}+a$, $\overline{BF'}=\sqrt{a^2+b^2}-a$이므로

$(\sqrt{a^2+b^2}+a):(\sqrt{a^2+b^2}-a)=3:2$

$\sqrt{a^2+b^2}=5a$

$b^2=24a^2$

따라서 $\overline{FF'}=2\sqrt{a^2+b^2}=10a$

$\overline{AF}=7p$라 하자.

$\overline{AF'}=8p$이고 쌍곡선의 정의에 의하여 $\overline{AF'}-\overline{AF}=2a$이므로

$p=2a$

따라서 $\overline{AF}=14a$, $\overline{AF'}=16a$이고

점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하면

$\overline{AF}=\sqrt{\overline{AH}^2+\overline{FH}^2}=\sqrt{(8\sqrt{3})^2+(5a-k)^2}=14a$

곧, $k^2-10ak+192=171a^2$ ..... ㉠

이고, $\overline{AF'}=\sqrt{\overline{AH}^2+\overline{F'H}^2}=\sqrt{(8\sqrt{3})^2+(5a+k)^2}=16a$

곧, $k^2+10ak+192=231a^2$ ..... ㉡

㉡−㉠을 계산하면

$20ak=60a^2$, 곧 $k=3a$

점 A의 좌표는 $(3a, 8\sqrt{3})$이고 $\frac{(3a)^2}{a^2}-\frac{(8\sqrt{3})^2}{24a^2}=1$

$9-\frac{8}{a^2}=1$, 곧 $a=1$

따라서 점 A의 좌표는 $(3, 8\sqrt{3})$이다.

B의 좌표가 $(-1, 0)$이므로 $\overline{AB}^2=4^2+(8\sqrt{3})^2=208$