

#05-1. 수학적 귀납법

나정휘

<https://justicehui.github.io/>

목차

페아노 공리계

수학적 귀납법

수학적 귀납법의 예시

페아노 공리계

자연수 집합을 정의하는 방법

- 자연수 x 에 대해, $x = x$
- 자연수 x, y 에 대해, $x = y$ 이면 $y = x$
- 자연수 x, y, z 에 대해, $x = y$ 이고 $y = z$ 이면 $x = z$
- 자연수 x 에 대해, $x = y$ 이면 y 도 자연수

자연수의 동일성은 반사관계

자연수의 동일성은 대칭관계

자연수의 동일성은 추이관계

자연수 집합은 동일성에 대해 닫혀 있음

- 1은 자연수
- 자연수 n 에 대해, $S(n)$ 은 자연수

자연수 집합은 따름수 함수 S 에 대해 닫혀 있음

- 1은 자연수, 1의 다음 수인 2도 자연수, 2의 다음 수인 3도 자연수, ...

- 자연수 n 에 대해, $S(n) \neq 1$
- 자연수 n, m 에 대해, $S(n) = S(m)$ 이면 $n = m$

S 는 단사 함수

- $\{1, S(1), S(S(1)), \dots\}$ 는 서로 다른 원소로 이루어져 있으므로 자연수는 무한히 많음

- 1이 K 의 원소이고, 자연수 n 이 K 의 원소일 때 $S(n)$ 이 K 의 원소이면 K 는 모든 자연수를 포함함

- 수학적 귀납법: $P(1)$ 이 참이고, 임의의 자연수 n 에 대해 $P(n)$ 이 참일 때 $P(n + 1)$ 도 참이면 모든 자연수에서 참

수학적 귀납법

수학적 귀납법

- 자연수에 대한 명제 $P(n)$ 이 모든 자연수에 대해 참임을 증명
- 또는 어떤 정수 n_0 에 대해, $n \geq n_0$ 을 만족하는 모든 n 에 대해 $P(n)$ 은 참
- (기저 조건) $P(n_0)$ 이 참이다.
- (귀납 조건) $n \geq n_0$ 일 때 $P(n)$ 이 참이면 $P(n+1)$ 이 참이다.
- $n \geq n_0$ 인 모든 정수 n 에 대해 $P(n)$ 은 참
 - $P(n_0) \Rightarrow P(n_0+1) \Rightarrow P(n_0+2) \Rightarrow P(n_0+3) \Rightarrow \dots$

수학적 귀납법

강한 수학적 귀납법

- 자연수에 대한 명제 $P(n)$ 이 모든 자연수에 대해 참임을 증명
- 또는 어떤 정수 n_0 에 대해, $n \geq n_0$ 을 만족하는 모든 n 에 대해 $P(n)$ 은 참
- (기저 조건) $P(n_0)$ 이 참이다.
- (귀납 조건) $n \geq n_0$ 일 때 $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n)$ 이 참이면 $P(n+1)$ 이 참이다.
- $n \geq n_0$ 인 모든 정수 n 에 대해 $P(n)$ 은 참
 - $P(n_0) \Rightarrow P(n_0+1)$
 - $P(n_0), P(n_0+1) \Rightarrow P(n_0+2)$
 - $P(n_0), P(n_0+1), P(n_0+2) \Rightarrow P(n_0+3)$

수학적 귀납법

자연수의 정렬성 원리 (Well-ordering Principle)

- 자연수 집합 N 의 부분집합 $S \neq \emptyset$ 는 항상 최소 원소를 찾는다.
- 대충 맞는 얘기인 것 같으니 넘어가자...
- 수학적 귀납법, 강한 수학적 귀납법, 정렬성 원리가 모두 서로 필요 충분 조건임을 보일 수 있음
 - 따라서 수학적 귀납법은 자연수 집합이 아니더라도 잘 정렬할 수 있는 집합에 대해 모두 사용할 수 있음
 - 정렬한 다음 순서대로 자연수를 배정한다고 생각하면 편함
- 귀류법을 역어서 무한강하법을 사용할 수도 있음

질문?

수학적 귀납법의 예시

예시 1. 1이 아닌 모든 자연수는 소수 여러 개의 곱으로 표현할 수 있음

- (기저 조건) $n = 2$ 이면 $2 = 2$ 로 쓸 수 있음
- (귀납 조건) $2, 3, \dots, n - 1$ 을 소수 여러 개의 곱으로 표현할 수 있을 때 n 도 가능함을 보이자.
 - n 이 소수이면 그 소수 하나만 쓰면 됨
 - n 이 합성수이면 2 이상 $n - 1$ 이하의 약수 d 를 찾을 수 있음
 - 귀납 가정에 의해 $2 \leq d, n/d < n$ 는 소수의 곱으로 표현할 수 있으므로 두 결과를 곱하면 됨

수학적 귀납법의 예시

예시 2. $2^n \times 2^n$ 크기의 격자에서 한 칸을 제거한 것은 L 모양 타일로 채울 수 있음

- BOJ 14601. 샤워실 바닥 깔기 (Large)
- $n \geq 1$ 일 때 크기가 $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ 인 한쪽 사분면을 제외한 나머지 부분을 L 모양 타일로 채울 수 있음
 - (기저 조건) $n = 1$ 이면 L 모양으로 3칸 비어 있으므로 그대로 넣으면 됨
 - (귀납 조건) $n \geq 2$ 이면 아래와 같이 $n - 1$ 짜리 형태 4개로 나눌 수 있고, 귀납 가정에 의해 각 조각을 채울 수 있음
 - XXAA
 - XXBA
 - CBBD
 - CCDD
- (기저 조건) $n = 0$ 이면 모든 칸이 채워져 있는 상태
- (귀납 조건) $n \geq 1$ 이면
 - 제거된 칸이 있는 사분면은 귀납 가정에 의해 채울 수 있고
 - 나머지 부분은 위에서 증명한 보조 정리에 의해 채울 수 있음

수학적 귀납법의 예시

예시 3

- $N \times N$ 격자에서 M 칸은 검은색, 나머지는 흰색으로 칠해져 있음
- 가장 위에 있는 줄과 오른쪽에 있는 줄은 흰색으로 고정
- 나머지 칸들은 1초가 지날 때마다 (자기 자신), (한 칸 위), (한 칸 오른쪽) 중 더 많은 색으로 바뀜
- M 초 후에 모든 칸이 흰색으로 바뀜
- (기저 조건) $M = 1$ 이면 자명하게 1초 뒤에 없어짐
- (귀납 조건) M 칸이 M 초 이내에 모두 없어진다고 할 때, $M + 1$ 칸은 $M + 1$ 초 이내에 모두 없어짐
 - 검은색 점의 좌표 중, x 좌표의 최솟값을 x' , y 좌표의 최솟값을 y' 이라고 하자
 - $x = x'$ 인 점들은 $x > x'$ 인 점에 영향을 미치지 못하고, $y = y'$ 인 점들도 $y > y'$ 인 점에 영향을 못 미침
 - 따라서 M 초 뒤에 $x > x'$ 인 점은 모두 없어지고, 마찬가지로 $y > y'$ 인 점도 모두 없어짐
 - M 초가 지난 이후에 검은색 점이 남아있을 수 있는 곳은 (x', y') 이 유일하고, 이건 $M + 1$ 초에 없어짐

질문?