알약 데이터셋 약품 정보

AI Hub 알약 데이터셋 | 총 56종 | 데이터 수 내림차순 정렬

일양하이트린정 2mg	
효능	고혈압(경증-중등도), 양성전립선비대에 의한 배뇨장애
복용량	**초회**: 취침 전 1mg (하이트린 1mg 1정 또는 동등량), 1일 1회. **유지량**: 이 약으로써 증상이 개선될 때까지 천천히 증량한다. 유지량으로 1일 1회 5-10mg을 경구투여한다. 치아짓계 이뇨제 및 다른 혈압강하제와 병용투여 : 치아짓계 이뇨제 또는 다른 혈압강하제와 병용투여하는 경우에는 이 약의 용량을 감량하며 필요한 경우 증량한다. 이러한 병용투여 요법시 저혈압이 나타날 수 있으므로 신중히 관찰한다.
부작용	어지러움, 두통, 졸음, 두근거림(빈맥), 손발 부종, 목마름, 가슴 통증, 기립성 저혈압, 현기증, 실신 등
보관법	실온(1~30℃), 기밀용기에 보관
데이터 수	153개
비고	혈압강하제와 병용투여하는 경우에는 혈압강하작용이 증가될 수 있다. 베라파밀과 병용투여하는 경우에는 상호작용이 증가될 수 있다.

기넥신에프정(은행엽엑스)(수출용)	
효능	말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료, 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림), 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료
복용량	성인 ① 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림): 은행엽건조엑스로서 (1회 40mg 1일 3회) 또는 (1회 80mg 1일 2회) 경구투여한다(먹는다, 복용한다). ② 기질성 뇌기능장애: 은행엽건조엑스로서 (1회 40mg~80mg 1일 3회) 또는 (1회 120mg 1일 2회) 경구투여한다(먹는다, 복용한다).

	연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
부작용	**드물게** 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응
보관법	기밀용기, 실온(1℃ ~ 30℃)보관
데이터 수	45개
비고	이름엔 표시되어있지 않으나, print_back에 G40 필드 있어 40mg짜리

아토젯정 10/40mg	
효능	원발성 고콜레스테롤혈증, 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증(HoFH) 의 식이요법 보조제
복용량	식사와 관계없이 1일 1회 투여
부작용	토르바스타틴 및 동일 계열의 다른 약물에서 미오글로빈뇨에 의한 이차적인 급성 신부전을 동반하는 횡문근융해가 드물게 보고
보관법	기밀용기, 30℃ 이하에서 보관, 제조일로부터 36 개월
데이터 수	37개
비고	시클로스포린, HIV 단백분해효소 저해제(티프라나비르와 리토나비르 병용), C형 간염 단백분해효소 저해제(텔라프레비르), 겜피브로질, 퓨시드산과 같이 투여하지 않는다

크레스토정 20mg	
효능	원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증을 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) : 식이 및 운동으로 조절이 안 될 경우 식이요법의 보조제
복용량	초회용량 : 1일 1회 5밀리그램이며, 더 많은 LDL-콜레스테롤치감소가 필요한 경우 유지용량으로 조절하여 투여, 유지용량: 1일 1회 10밀리그램으로 대부분의 환자는 이 용량에서 조절

부작용	근육통, 두통, 소화불량, 근육쇠약, 콜라색 소변, 황달
보관법	실온(1~30℃), 습기/직사광선 피함. 기밀 용기, 서늘한 곳
데이터 수	23개
비고	다른 약(단백분해효소 저해제 등) 상호작용, 알코올 과다/간질환자 주의. 정기 간/근육 검사 필요

아토르바정 10mg	
효능	레스테롤 합성을 억제하여 혈중 콜레스테롤 수치를 낮춰줌
복용량	식사와 관계없이 일정한 시간에 복용 권장 초회 용량 : 1일 1회 10 mg 더 많은 콜레스테롤 감소가 요구되는 환자 : 20mg 혹은 40mg
부작용	근육통, 근 쇠약감, 진한색 소변, 피로감
보관법	실온(1~30℃) 보관
데이터 수	22개
비고	자몽이나 자몽주스 섭취 x

리피토정 20mg	
효능	심장혈관 질환에 대한 위험성감소, 고지혈증의 식이요법 보조제
복용량	식사와 관계없이 일정한 시간에 복용 권장 초회 용량 : 1일 1회 10 mg 더 많은 콜레스테롤 감소가 요구되는 환자 : 20mg 혹은 40mg
부작용	일반적으로 부작용 x, 드물게 근육통, 근 쇠약감
보관법	실온(1~30℃) 보관
데이터 수	21개
비고	자몽이나 자몽주스 섭취x

플라빅스정 75mg	
효능	허혈뇌졸중, 심근경색 또는 말초동맥성질환이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선
복용량	1일 1회 75mg 경구투여, 음식물의 섭취와 상관없이 투여 가능
부작용	발진, 가려움, 비정상적인 출혈, 가슴통증
보관법	실온(1~30℃) 보관
데이터 수	20개
비고	원인모를 멍이 쉽게 생기거나 지혈시간이 길어질 수 있음

뉴로메드정(옥시라세탐)	
효능	혈관성 인지 장애 증상 개선
복용량	1회 1정, 1일 2회 경구 투여
부작용	흥분, 수면장애, 무력감, 구토, 위통
보관법	실온(1~30℃) 보관, 기밀용기
데이터 수	20개
비고	**2023년 1월 식약처의 임상 재평가 결과 유효성 입증 실패로 효능이 삭제되었으며, 현재 처방·조제가 중지된 약(유효성 부족)**

로수젯정10/5밀리그램	
효능	콜레스테롤 합성 및 소장에서의 흡수를 저해하여 혈중 콜레스테롤 농도를 감소
복용량	한번에 1정, 하루에 1회 복용(식사 무관, 매일 같은시간)
부작용	때때로 근육통이 나타날 수 있음

보관법	기밀용기, 습기를 피하여 실온(1~30℃) 보관
데이터 수	19개
비고	식이요법, 운동요법, 금연, 금주 등 철저한 자기 관리가 중요

가바토파정 100mg

효능	뇌전증 발작을 억제, 편두통을 예방
복용량	한번에 1정(100mg), 하루 1~2회
부작용	어지러움, 졸음, 감각 이상, 두통, 피로감, 식용저하, 경구피임약 효과 감소
보관법	기밀용기, 건조소보관, 25℃ 이하
데이터 수	18개
비고	증상 개선 시에도 **임의 중단 금지**. 신장질환자 사전 알림, **충분한 수분 섭취**

리바로정 4mg

효능	고지혈증 치료제(식이요법 보조)
복용량	초기: 1회 1~2mg, 1일 1회 (저녁, 식사 무관) 유지: 1~4mg 조절, 4주 간격으로 증감 (최대 4mg)
부작용	근육통, 근쇠약, 진한색 소변, 피로
보관법	차광·기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	18개
비고	**병용 금지**: **사이클로스포린** (근육독성 위험) **병용 주의**: **피브레이트(젬피브로질), 에리트로마이신, 항진균제(이트라코나졸), 와파린** (근육독성·간독성·출혈 위험)

로수바미브정 10/20mg

효능	콜레스테롤 합성을 억제하여 혈중 콜레스테롤 농도를 감소시키는 고지혈증 치료제
복용량	한번에 1정(4mg), 하루 1회 (저녁 권장, 식사 무관) 초회: 1~2mg 1일 1회, LDL-C 목표 미달 시 4주 간격으로 최대 4mg까지 증량
부작용	근육통
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
데이터 수	18개
비고	표준 콜레스테롤 저하식 병행, 중증 간장애·근육병증·임부 금기, 알코올 제한

콜리네이트연질캡슐 400mg	
효능	뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성/퇴행성 뇌기질성 정신증후군(기억력저하, 착란, 의욕저하 등)을 개선하는 뇌기능 개선제
복용량	한번에 1캡슐, 하루 2~3회 (증상에 따라 적절히 증감)
부작용	발진, 가려움증, 구역
보관법	습기가 적고 서늘한 곳
데이터 수	17개
비고	

마도파정	
효능	파킨슨증후군(약물로 인한 파킨슨병 제외): 서동, 강직 등 증상 완화
복용량	초기 단계 파킨슨병 환자: 1회 1/2정, 1일 3~4회 [3] 질환이 진행된 환자: 초기량의 2배(1회 1정, 1일 3~4회)
부작용	구역, 환각, 기립성 저혈압

보관법	실온(1~30℃), 기밀용기, 빛 피함
데이터 수	16개
비고	운전 금지, **임의 중단 금지**

리피로우정 20mg	
효능	콜레스테롤 합성을 억제하여 혈중 콜레스테롤을 낮춤(식이요법 보조)
복용량	한번에 1정(20mg), 하루 1회 (식사 무관, 저녁 권장)
부작용	근육통, 근쇠약, 진한색 소변
보관법	실온(1~30℃), 기밀용기
데이터 수	16개
비고	자몽/자몽주스 금지

글리틴정(콜린알포세레이트)	
효능	뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 뇌의 신경전달 작용을 원활하게 하고 신경세포 기능을 개선
복용량	한번에 1회 400mg(1정), 하루 2~3회 경구투여
부작용	발진, 발적, 가려움증, 구역
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	16개
비고	과량으로 투여하지 않도록 주의

카발린캡슐 25mg	
효능	성인에서 말초·중추 신경병증성 통증 치료, 간질 부분발작 보조제, 섬유근육

	통 치료
복용량	시작: 1일 150mg(75mg 1일 2회), 1주 후 1일 300mg(150mg 1일 2회)까지 증량 가능. 음식과 상관없이 1일 2회 분할
부작용	발진, 가려움, 다리 부종, 심한 우울감, 자살충동, 어지러움, 졸음
보관법	실온(15~30℃), 기밀용기 보관
데이터 수	16개
비고	임의 중단 금지, 당뇨환자 혈당 확인, 금주 권장

보령부스파정 5mg	
효능	불안장애의 치료 또는 불안증상의 단기완화
복용량	1회 5mg을 1일 3회 경구투여, 식사와 상관없이 일정한 시간에 복용
부작용	고열, 의식장애, 근육강직
보관법	실온(1~30℃) 차광 보관
데이터 수	15개
비고	졸음 가능성으로 운전·위험작업 주의, 효과 2~3주 후 나타날 수 있음, 임의 중단 금지

리리카캡슐 150mg	
효능	성인에서 말초·중추 신경병증성 통증 치료, 간질 부분발작 보조, 섬유근육통 치료
복용량	1회 1캡슐(150mg), 1일 2회(총 300mg)로 시작하며, 환자 반응에 따라 조절
부작용	발진, 가려움, 다리 부종, 심한 우울감, 자살충동
보관법	기밀용기, 실온(15-30℃) 보관
데이터 수	15개

비고	어지러움·졸음으로 운전·위험작업 주의, 임의 중단 금지, 당뇨환자 혈당 확인

에빅사정(메만틴염산염)(비매품)	
효능	중등도에서 중증의 알츠하이머병 치료
복용량	1일 1회 경구 투여, 매일 동일한 시간에 복용
부작용	변비, 혈압 상승, 고혈압 등
보관법	기밀용기, 실온(1-30℃) 보관
데이터 수	15개
비고	보호자가 복용 확인, **임의 중단 금지**

글리아타민연질캡슐	
효능	뇌의 신경전달 작용을 원활하게 하고 신경세포 기능을 개선
복용량	1회 1캡슐(400mg), 1일 2~3회 경구투여, 증상에 따라 적절히 증감 가능
부작용	발진, 가려움, 이차적인 도파민 작용에 기인한 구역
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
데이터 수	14개
비고	의사 처방에 따라 조절되며, 과량 복용 금지하고 임의 변경X

종근당글리아티린연질캡슐(콜린알포세레이트)	
효능	뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성/퇴행성 뇌기질성 정신증후군: 기억력 저하·착란, 방향감각장애, 집중력감소
복용량	1회 1캡슐(400mg), 1일 2~3회 (증상에 따라 증감)
부작용	발진, 가려움증

보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	13개
비고	임부·가임기 여성 금지, 과량 복용 금지

아질렉트정(라사길린메실산염)

효능	특발성 파킨슨병 치료제 : 초기 단독요법 또는 도파민 효능제 보조요법, 레보도파 보조요법
복용량	1회 1정, 1일 1회 (매일 동일 시간, 음식과 관계없이 경구)
부작용	이상한 꿈, 환각, 과도한 졸음
보관법	기밀용기, 1-25℃ 보관
데이터 수	12개
비고	병용 금지: 다른 MAO억제제(동시 또는 중단 후 2주 이내), 트라마돌

아모잘탄정 5/100mg

효능	암로디핀 또는 로사르탄 단독요법으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 본태성 고혈압 치료제
복용량	1회 1정, 1일 1회 (식사와 관계없이, 매일 같은 시간 권장)
부작용	발진, 가려움, 두통, 부종
보관법	실온(1~30℃), 기밀용기
데이터 수	12개
비고	병용 금지: 다른 MAO억제제(동시 또는 중단 후 2주 이내), 트라마돌 운전·위험 작업 주의: 어지러움·졸음 유발 가능

엑스포지정 5/160mg

효능	암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 본태성 고혈압 치료제
복용량	1회 1정, 1일 1회 (식사와 관계없이, 매일 같은 시간 권장)
부작용	발진, 가려움, 가슴통증, 부종
보관법	실온(1~30℃), 기밀용기
데이터 수	12개
비고	병용 금지: 알리스키렌(당뇨·신장애 환자), ACE억제제/ARB 병력 유전성 혈관부종 환자

자누메트정 50/850mg	
효능	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 위한 식사·운동요법 보조제
복용량	1일 2회, 1회 1정 (식사와 함께 또는 식후 즉시)
부작용	발진, 가려움, 피로감, 근육통, 호흡곤란, 저혈압, 저혈당(허기·어지러움)
보관법	실온(1~30℃)
데이터 수	12개
비고	병용 금지: 신장질환(크레아티닌 남1.5mg/dL↑·여1.4mg/dL↑), 심혈관 허탈·급성심근경색·패혈증 환자

트윈스타정 40/5mg	
효능	텔미사르탄 또는 암로디핀 단독요법으로 혈압이 적절히 조절되지 않는 본태성 고혈압 치료제
복용량	1일 1회 1정 (식사와 관계없이, 매일 같은 시간 권장)
부작용	알레르기 반응, 가슴통증, 불규칙 심장박동, 심한 어지러움, 설사
보관법	차광기밀용기, 실온(1~30℃)

데이터 수	12개
비고	병용 금지: 알리스키렌(당뇨·신장애 환자), 주성분 과민증 환자, 임산부·수유부, 담도폐쇄·중증 간장애

뮤테란캡슐 100mg	
효능	다음 질환에서의 객담배출곤란: 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성섬유증
복용량	급성질환: 성인 1회 200mg, 1일 3회 / 소아(6~14세) 1회 200mg, 1일 2회 [5] 만성질환: 성인 1회 200mg, 1일 2회 / 소아(6~14세) 1회 100mg, 1일 3회
부작용	구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사, **기관지경련** (천식 환자 특히 주의)
보관법	차광기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	9개
비고	금기: 위궤양·십이지장궤양 환자, 2세 미만 영아, 갈락토오스 불내성·락토오스 분해효소 결핍증·포도당-갈락토오스 불흡수 환자

트라젠타듀오정 2.5/850mg	
효능	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절 향상
복용량	1일 2회, 1회 1정 (식사와 함께 또는 식후 즉시)
부작용	발진, 가려움, 피로감, 근육통, 호흡곤란, 체온저하, 저혈압
보관법	실온(1~30℃), 습기 피함
데이터 수	9개
비고	병용 금지: 심장기능부전(NYHA 3~4급), 신부전(크레아티닌청소율 <30mL/min), 급성·만성 대사성산증

트라젠타정(리나글립틴)	
효능	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 위한 식사·운동요법 보조제
복용량	1일 1회 1정 (식사와 관계없이)
부작용	저혈당(현기증·피로감), 상기도감염, 두통, 피부병변, 간지방증
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	9개
비고	병용 주의: 저혈당 유발 약물(인슐린·설폰요소제 등)

자누비아정 50mg	
효능	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절 향상(식사요법 및 운동요법 보조제)
복용량	1일 1회 1정 (식사와 관계없이)
부작용	발진, 가려움, 비정상 피로감, 근육통, 호흡곤란
보관법	실온(1~30℃)
데이터 수	9개
비고	저혈당 시 당류 휴대

오마코연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)	
효능	내인성 고트리글리세라이드혈증 환자의 상승된 트리글리세라이드 수치 감소 보조
복용량	초회용량은 1일 2g(2캡슐), 필요시 1일 4g까지 증량할 수 있다. 1일 1회 또는 2회 투여(위장장애를 피하기 위하여 식사와 함께 복용)
부작용	소화불량, 속쓰림, 메스꺼움, 설사, 두통, 피로 (대개 경미, 용량 조절로 호전)
보관법	기밀용기, 25℃ 이하, 동결 피함

데이터 수	8개
비고	투여 금지 : 18세 미만의 소아

다보타민큐정 10mg/병	
효능	비타민과 미네랄 등을 공급하는 종합 영양제
복용량	1일 1회, 1회 1정 식후 복용
부작용	생리주기 변화, 구역·구토, 설사, 위부불쾌감, 발진·발적
보관법	실온(1~30℃), 직사광선 피하고 습기 적은 서늘한 곳
데이터 수	6개
비고	

노바스크정 5mg	
효능	고혈압, 협심증 (혈관평활근 이완, 칼슘 이온 유입 차단)
복용량	**성인**: 1일 1회 5mg 경구투여, 환자 반응에 따라 최대 10mg까지 증량 가능
부작용	어지러움, 피로감, 두통, 가슴앓이, 오심, 구토, 부종, 가슴두근거림, 근육통
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
데이터 수	6개
비고	**병용 금지**: 단트롤렌 **병용 주의**: 클래리트로마이신, 자몽주스

무코스타정(레바미피드)(비매품)	
효능	- 위궤양 치료 - 급성위염, 만성위염 급성악화기의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종) 개선

복용량	1일 3회 경구투여(공복 상태에서 복용)
부작용	발진, 발적, 가려움증, 구갈, 변비, 복부팽만, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상, AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승
보관법	차광·밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관
데이터 수	6개
비고	

스토가정 10mg	
효능	**소화성궤양(위염, 식도염 등)**: 위산 분비 억제 및 위점액 분비 촉진으로 위점막 보호
복용량	일 3회 1정, 공복 시 복용
부작용	어지러움·졸음
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
데이터 수	6개
비고	

비모보정 500/20mg	
효능	골관절염, 류마티스성 관절염, 강직성 척추염 증상 치료
복용량	1일 2회, 1회 1정(500/20mg), 식전 최소 30분 전 복용
부작용	**위장관**: 변비, 구내염, 복부팽만감, 흑변, 구갈, 식도염, 위염, 설염, 트림, 고창, 흑토증, 췌장염, 대장염, 염증성 장질환 악화 기타 : 알레르기 반응, 심한 위장장애, 호흡곤란, 혈토
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
데이터 수	6개

비고	

큐시드정 31.5mg/PTP	
효능	위통, 속쓰림, 소화불량, 구역 완화 (위산 중화 및 분비 억제)
복용량	1회 2정, 증상 완화되지 않으면 5시간 후 2정 추가, 1일 최대 4정
부작용	발진, 발적, 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통, 황달
보관법	실온(1~30℃), 기밀용기
데이터 수	6개
비고	다른 위장약을 동시에 병용(함께 복용)하면 작용이 강하게 발현(드러냄)되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

에어탈정(아세클로페낙)	
효능	마티스관절염, 강직성척추염, 골관절염, 견갑상완골 관절주위염, 치통, 외상 후염증, 요통, 좌골통, 비관절성 류마티즘으로 인한 통증 치료
복용량	아세클로페낙 100mg 1회, 12시간마다 1일 2회 복용 간장애 환자 : 초기 1일 100mg 투여
부작용	위장관: 소화불량, 복통, 구역, 설사, 복부팽만, 위염, 변비, 구토, 흑변 피부: 발진, 가려움, 두드러기 기타: 어지러움, 피로, 간효소 상승
보관법	실온(1~30℃), 기밀용기
데이터 수	5개
비고	병용 금지: 아스피린 등 프로스타글란딘 합성효소 저해제에 의한 천식·두드러기·급성비염 환자 관상동맥 우회로술(CABG) 전후 통증 치료

울트라셋이알서방정	
효능	중등도 및 중증 통증 경감
복용량	초회 2정으로 시작, 통상 1회 4정, 1일 2회 투여, 1일 최대 8정 초과 X
부작용	위장관: 위장장애, 구역, 구토, 변비 신경계: 어지러움, 졸음, 신경과민 기타: 발진, 가려움증, 비정상적인 심장박동, 황달과 같은 간기능 이상 징후
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	주의: 졸음이 올 수 있으므로 운전·위험한 기계조작 시 주의, 금주 권장

라비에트정 20mg	
효능	위궤양, 십이지장궤양, 미란성 또는 궤양성 위식도역류질환, 헬리코박터필로리 감염 소화기 궤양, 졸링거-엘리슨 증후군 치료
복용량	1일 1회 10mg 또는 20mg 경구투여
부작용	피부: 발진, 가려움 소화기: 심한 설사, 혈변 기타: 불규칙한 심장박동, 배뇨곤란, 관절통
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	임부·수유부 금지, 간기능 저하 환자 신중 투여

알드린정	
효능	위산 중화 및 펩신(단백분해효소) 작용 감소로 위내 통증·궤양 형성 방지

복용량	식후 30분~1시간 복용
부작용	심한 변비 또는 설사
보관법	밀폐용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	철분제 병용 시 최소 2시간 간격 두기

써스펜8시간이알서방정 650mg	
효능	해열 및 감기에 의한 통증, 두통, 치통, 근육통, 허리통증, 생리통, 관절통 완화
복용량	매 8시간마다 2정 복용, 24시간 동안 6정 초과하지 말 것
부작용	발진, 눈 및 피부 황변, 비정상적인 출혈, 두드러기
보관법	밀폐용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	통증 10일 이상, 발열 3일 이상 사용 금지

졸로푸트정 100mg	
효능	우울증, 강박장애, 공황장애, 외상후 스트레스 장애 치료에 사용되는 SSRI 항우울제
복용량	성인 우울증: 초회 1일 50mg, 유지량 50-100mg, 최대 200mg (최소 1주 간격 증량) 공황장애·외상후 스트레스 장애: 초회 25mg, 유지량 50-200mg 1일 1회 복용 (아침 또는 저녁 무관, 식사 후 복용 권장)
부작용	위장장애, 정신상태/행동 변화 관찰 필요
보관법	기밀용기, 실온(1-30℃)
데이터 수	3개

비고	병용 금지: MAO 저해제 병용 시 세로토닌 증후군 위험

아빌리파이정 10mg	
효능	조현병, 양극성장애 급성조증 및 혼재 삽화, 주요우울장애 부가요법, 자폐장애 관련 과민증 치료
복용량	성인 조현병: 초회 1일 10mg 또는 15mg, 용량 범위 10-30mg (2주 이내 증량 금지) 청소년(13-17세): 1일 10mg (초기 2mg→5mg→10mg 증량) 양극성장애 소아(10-17세): 1일 10mg (초기 2mg→5mg→10mg 증량
부작용	발진, 가려움, 자해·기분변화, 근육경련, 고열
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	어지러움·졸음으로 운전·위험작업 주의, 임의중단 금지

레일라정	
효능	골관절증의 증상 완화 (소염작용, 진통, 연골보호 작용)
복용량	1회 1정, 1일 2회 복용
부작용	구역, 구토, 설사, 부종, 발진
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	임산부 및 임신 가능성 여성은 투여 금지

에스원엠프정 20mg	
효능	위산 분비를 억제하여 위·십이지장궤양, 식도염, 위식도역류질환 증상 치료

복용량	1일 1회, 1회 1정 아침 식전 투여
부작용	발진, 가려움, 심한 설사, 혈변
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	수유부 금지

동아가바펜틴정 800mg	
효능	과도하게 흥분한 신경을 안정시켜 경련 빈도를 감소시키고 신경통을 개선하며, 부분발작(부종형, 전신형 전이 가능), 말초신경병성 통증 치료
복용량	전문가 지시에 따름, 쪼개거나 씹지 말고 그대로 삼키기
부작용	발진, 가려움, 심한 피로감, 행동장애, 초조, 우울감, 발열, 부종, 경련
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	**어지러움·졸음**으로 운전·위험작업 주의

제미메트서방정 50/1000mg	
효능	제미글립틴과 메트포르민의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절 향상을 위한 식사요법 및 운동요법 보조제
복용량	1일 1회, 1회 1정을 저녁식사와 함께 복용
부작용	소화불량, 코인두염, 어지럼증, 설사, 두통, 저혈당, 구역, 근육통, 무력증
보관법	
데이터 수	3개
비고	병용 금지 약물 : 인슐린, 설폰요소계 약물 등 다른 당뇨병용제 , 강력한 CYP3A4 유도제

	복용 금지 대상 : 중등도 이상 신장애 환자

맥시부펜이알정 300mg	
효능	**효능** 만성 다발성 관절염, 류마티스관절염, 관절증, 강직척추염, 외상 및 수술 후 통증성 부종/염증, 염증·통증·발열을 수반하는 감염증 치료
복용량	1회 600mg(2정)을 1일 2회, 12시간 간격으로 복용
부작용	소화불량, 속쓰림, 복통, 구역, 구토, 설사, 어지러움, 두통, 피로, 졸음 / 드물게 위장관 출혈, 급성신부전, 혈압 변화, 피부 반응 등
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	병용 금지 : 아스피린, 다른 NSAIDs (비스테로이드성 소염진통제), 고용량 메토트렉세이트 (항암 목적, 15mg/주 이상)

트루비타정 60mg/병	
효능	비타민·미네랄 복합제
복용량	1일 1회, 1회 1정 복용
부작용	구역, 구토, 설사, 변비, 발진, 두드러기, 저혈압, 심박동 불규칙, 탈모, 위장관 장애
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	병용 금지 : 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

신바로정	
효능	소염, 진통, 골관절증

복용량	성인 1일 2회, 1회 2정 복용
부작용	소화불량, 위염, 구역질, 어지러움, 두통, 변비, 부종, 졸음 등
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃), 용기를 바꾸지 말것
데이터 수	3개
비고	

카나브정 60mg	
효능	본태성 고혈압, 고혈압을 동반한 제2형 당뇨병성 만성 신장질환 환자의 단백뇨 감소
복용량	1일 1회 30~60mg을 식사와 관계없이 복용. 혈압이 충분히 조절되지 않으면 1일 1회 120mg으로 증량 가능. 가능하면 매일 같은 시간
부작용	두통, 어지러움(흔하게), 소화불량, 구토, 구역, 기침, 가려움증, 두드러기, 얼굴홍조, 무력증 등(흔하지 않게)
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃), 용기를 바꾸지 말것
데이터 수	3개
비고	레닌억제제(알리스키렌) - 당뇨병이나 중등도~중증 신장애 환자에서 병용금지 ACE 억제제 - 당뇨병성 신증 환자에서 병용금지. 칼륨 보존성 이뇨제·칼륨 보충제 - 고칼륨혈증 위험 복용 금지 대상: 임부 및 수유부(태아·신생아 손상·사망 위험), 신장투석 환자, 중등증~중증 간장애 환자, 담도폐쇄 환자

놀텍정 10mg	
효능	십이지장궤양, 위궤양, 미란성식도염의 단기치료, 헬리코박터필로리에 감염된 위·십이지장궤양의 재발 방지를 위한 항생제 병용요법
복용량	1일 1회, 1회 1정. 헬리코박터 제균요법: 1일 2회, 1회 1정(항생제와 병용, 1

	주간). 식사 1시간 전
부작용	두통, 설사, 발열(2% 이상), 상복부통, 구역, 기침, 어지러움, 불면증 등
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃), 용기를 바꾸지 말것
데이터 수	3개
비고	병용 금지 약물 : 아타자나비어(HIV 치료제), 릴피비린 함유제제, 테르페나딘·피모지드·아스테미졸

리렉스펜정 300mg/PTP	
효능	신경통, 근육통, 관절통, 요(허리)통, 염좌통(삔 통증), 견통(어깨결림), 근경련(근육경련), 근경직등 근육의 이상 긴장을 수반하는 여러 질환
복용량	1회 2정, 1일 4회까지 공복시를 피하여 복용
부작용	두드러기, 발적, 가려움증, 졸음, 어지러움, 두통, 위장장애. 드물게 간 손상, 위장출혈
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)
데이터 수	3개
비고	알코올이나 중추신경억제제와 병용투여 시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여

자누메트엑스알서방정 100/1000mg	
효능	시타글립틴과 메트포르민의 병용투여가 적절한 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절 향상을 위한 식사요법 및 운동요법 보조
복용량	1일 1회, 1회 1정을 식사와 함께 되도록 저녁에 복용
부작용	설사, 상기도감염, 두통, 구역, 구토, 저혈당(설포닐우레아 또는 인슐린 병용 시)
보관법	기밀용기, 실온(1~30℃)

데이터 수	3개
비고	병용 금지 약물 : 시타글립틴(중증의 과민반응 보고)

출처 : 의약품안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr), 약학정보원(health.kr)