全日本鍼灸学会雑誌 39巻4号（400～407）

原　著

下腿部陽経の経穴に関する標準部位の研究

元吉正幸*　山川忠治　木下晴都

要旨　下腿部の経穴部位を決定するため，文献の考証並びに実測に基づいて検討した。経穴の部位を定めるのに必要な条件は基準尺度であるが，下腿の外側は膝から外果までが16寸，後面は膝窩から踵骨上縁までが16寸と骨度篇に記されており，これが陽経の経穴を定める基準である。胃経は足三里と解谿が解剖学的に定まり，上巨虚，条口，下巨虚，豊隆は文献に記載され距離で配分した。胆経は陽陵泉，陽交，外丘，光明，陽輔，懸鐘は各分寸にしたがって比例配分を行った。ただし，陽光と外丘は同様の高さに並ぶが，外丘を最外側にして，腸交を腓骨の後縁に定めた。膀胱経は昆侖を解剖学的に決定し，合陽，承筋，承山，飛場，跗陽は，委中から昆侖までの高さを16寸として，文献記載の距離に準じて比例で配分した。とくに承山と飛揚は同一の高さになるが，承山を後面中央に，飛揚を外方に定めた。

経穴は，鍼灸医学の基礎であり，鍼灸治療には欠かすことのできない問題である。しかし，この経穴部位については，「素問」，「霊枢」を始めとして，現在まで多数の文献が残されているが，年代によって古典の記載に異説があったり，解釈の方法によっても，経穴の部位が異なったりする。また，古典の経穴部位は分寸で表示しているが，年齢，性別，身長，肥痩などの差による問題も生じる。現在，日本経穴委員会では，可能な限りその経穴の発見者の意向に近づけ，原著者の考えに基くという目的で，調査研究が進められている。また，WHO西太平洋地域事務局の主催による会議が，1981年より開催され，経穴の国際標準化のために検討が行なわれたが，我々も経穴部位を決定する一助として，下腿部陽経の経穴について，古典文献の考証と人体の実測に基づいて検討し，標準部位を定める研究を行った。

I　研究方法

古典文献の考証は，著作年代の古い順に採用する方法をとる。しかし，始めの経穴発見者が記述した経穴部位が不明な場合は，部位が明らかになるまで後代の文献を調査する方法をとる。経穴の部位表示方法は，可能な限り解剖学的に表現する。しかし，解剖学的に表現が困難な場合は，両側に骨，筋肉等の明確な基準点を定め，その間に比例配分により，分数で表示した。ただし分数表示が5/16などのように臨床的に利用しがたい数字となる場合には，実用的比例配分として，1/3と表現する方法をとった。

*Masayuki MOTOYOSHI 東京医療専門学校教員養成科
共同研究者：Tadaharu YAMAKAWA 東京医療専門学校教員養成科
Haruto KINOSHITA 呉竹学園東洋医学臨床研究所
Key Words：経穴，下腿部経穴，経穴標準部位

II　研究成績

A．基準尺度

「霊枢」[1]，骨度篇には下腿部の経穴部位を定める基準尺度が次のように記載されている，その①は〝膝以下至外踝，長一尺六寸〟であり，②は〝膝胭以下，下至跗属，長一尺六寸〟であり，③は〝内輔上廉，以下至下廉，長三寸半，内輔下廉，下至内踝，長一尺三寸〟である。この①は膝すなわち膝関節裂隙であるが，その高さを定めるには膝蓋骨尖と脛骨上縁との中央を膝隙点に定め，その膝隙点の高さを膝関節の高さとすれば，ほぼ関節間の高さが決定される。膝関節外側の膝隙点の高さから，外果頂点までを16寸とすれば，臨床的に便利な下腿の長さとなる。これは**表1**に示す実測値のとおり，357±24mmであり，その1寸に対する長さは22.3mmとなる。次に②の膝胭とは膝窩の屈曲線に相当し，その中央は委中である。跗属とは腫骨隆起を現わし，その上縁が相定される。この長さも骨度篇では16寸と示されており，実測値は**表1**のとおり371±28mmであるが，膀胱経の経穴を配分する基準尺度とみることができる。この委中の高さはX線により大腿骨の顆間線の上にあたっており，膝隙点の高さより上方にあたる。

表1　下腿部の基準尺度と実測値

	身　長	膝隙点の高さ～外果	膝隙点の高さ～内果	委中～踵骨上縁
平　均	1,624	357	329	371
標準偏差	84	24	23	28
骨度寸	75	16	14.5	16

また③の内輔上廉は大腿骨内側上顆の上縁であり，内輔下廉は脛骨内側顆の下縁を指しており，その間の3,5寸は大腿部の基準尺度を決定した研究からみて，膝隙点の高さから大腿骨内側上顆の上縁までが2寸であり，膝隙点の高さから脛骨内側顆の下縁までが1.5寸であることが実測上判明している。ゆえに，下腿陰経の経穴を定める基準尺度は**表1**のように14.5寸となり，その実測値は329±23mmであって，1寸は22.7mmに該当した。

B．経穴部位

1．足三里

「素問」[2]，鍼解論(54)に，〝三里者，下膝三寸也，所謂跗之者，挙膝分易見也〟と記載され，足三里は膝の下，すなわち膝関節裂隙の中央の高さから3寸下方であり，膝を屈して取穴すれば現れやすいとされている。「霊枢」本輸篇(2)に〝下陵膝下三寸，脁骨外三里也〟と記し，下陵すなわち足三里は，脁骨と呼ぶ脛骨前縁の外側にあたるという，その後「甲乙経」[3]以下は同様の記載であるが，「次註」[4]にいたり〝正在膝下三寸，骭外両筋肉分間，極重按之，則足跗動脈止矣〟と記載されている。膝下三寸の脛骨の外側を極めて強く圧迫して足背動脈の拍動が停止する所は，前脛骨動脈が下腿骨間膜の上部を貫ぬいて前方に出るところであり，それは前脛骨筋の外側縁に沿う部である。この部位は脛骨粗面下縁の高さで，脛骨前縁と腓骨頭頂点から垂直に下垂した線との間で，脛骨前縁からほぼ1/3にあたる。「霊枢」骨度(14)に〝膝以下至外踝長一尺六寸〟と記されているが，これを69名で実測した数値は前記のとおりである。

したがって，足三里は脛骨粗面下縁の高さにおいて，脛骨前縁の垂直線の間で，脛骨前縁から約1/3に定めた(**図1**以下同じ)。




図1　下腿部の胃経の経穴

2．上巨虚

「霊枢」本輸(2)に〝下三里三寸，為巨虚上廉〟とし，「甲乙経」には〝在三里下三寸〟としている。膝関節の下3寸が足三里であるが，犢鼻よりやや外方にあたり，その下3寸は膝から6寸になる。

したがって上巨虚は犢鼻と解谿との間で，犢鼻から約2/5(6/15.5)の高さの足三里の直下に定めた。

3．条　口

「甲乙経」に〝在下廉上一寸〟とある。下廉すなわち下巨虚は，「甲乙経」に〝在上廉下三寸〟と記載されている。ということは犢鼻からは8寸に相当する。解谿は下腿外側の基準尺度である16寸よりも約0.5寸上方にあるため，条口から解谿まで7.5寸にあたる。

したがって，条口は犢鼻と解谿との間で，解谿から約1/2(7.5/15.5)に定めた。

4．下巨虚

「霊枢」本輸(2)に〝下上廉三寸，為巨虚下廉〟とあるとおり，犢鼻の下9寸にあたる，解谿は外果頂点から約0.5寸上方であり，解谿から上巨虚までは約6.5寸に相当する。

したがって，下巨虚は犢鼻と解谿の間で，解谿から約2/5(6.5/15.5)に定めた。

5．豊　隆

「霊枢」経脈(10)に〝去踝八寸〟とあり，「甲乙経」には〝在踝上八寸，下廉胻外廉陥者中〟と記されているが，外果の上8寸は条口と同一の高さである。また下廉は脛骨前縁の外側であり，豊隆は更に外側に当るが，「鍼灸指南集」[5]には〝本経ヨリ二，三，四分ホドヨリテ〟とあるところから，脛骨前縁と腓骨外縁とのほぼ中央の高さが想定される。

したがって，豊隆は犢鼻と解谿の間で，解谿から約1/2(7.5/15.5)の脛骨前縁と腓骨外縁との中央に定めた。

6．解　谿

「霊枢」本輸(2)に〝上衝陽一寸半，陥者中也〟とあり，「甲乙経」に〝在衝陽後一寸五分，腕上陥者中〟と記している。腕とは距腿関節を指す。「大平聖恵方」[6]に〝在繋鼻處，陥者中〟とあり，「医学入門」[7]には〝足腕上，繋草鞋帯處，去内庭上六寸半〟としている。繋鞋とは履物(わらじ)のひも(帯)を内果と外果の下から，距腿関節の屈曲部にかける所にあたる。また「図翼」[8]には〝在足大指次指，直上跗上，陥者宛宛中〟と記述している。大指次指は足の第2指を示しており，第2指を擦上した所は足の長母指伸筋腱と，長指伸筋腱との間に相当し，「鍼灸要法」[9]に〝足ヲ挙横文ノ内，両大筋ノ陥ナル所〟とあるが，横文とは足を背屈したときの屈曲線であり，外果頂点より約0.5寸上にあたる。

したがって，解谿は距腿関節背面の屈曲線上で，足の母指伸筋腱と指伸筋腱の間に定めた。

b．胆　経

1．陽陵泉

「霊枢」本輸(2)に〝在膝外陥者中也〟とある。「甲乙経」には〝在膝下一寸，髀外廉陥者中〟とあって，膝下1寸は脛骨上縁の下1寸とみれば，上記の文と同意になる。髀は脛骨を指し，その外側の陥没した所を意味する。「千金翼方」[10]には，〝在膝下骨前陥中〟と記し，脛骨上部の外側で骨前陥中は，腓骨頭下縁の前部を示している。

したがって，陽陵泉は腓骨頭前下縁に定めた(**図2**，以下同じ)。




図2　下腿部の胆経の経穴

2．陽　交

「甲乙経」に〝在外踝上七寸，斜属三陽分肉間〟とある。外果の上7寸は外丘と同じ高さである。斜めに三陽に属すとは，胃経と膀胱経の間にある胆

経が斜めに下ると解され，分肉間とは，前と後の筋肉，すなわち長腓骨筋の筋間で，腓骨の後縁が想定される。その高さは，膝関節裂隙中央から脛骨上縁までは約1cmであり，腓骨頭下縁までは更に約2cmである。そこで膝関節裂隙中央から腓骨頭下縁までを約2寸と想定し，下腿外側の基準尺度である16寸から2寸を除いた14寸を基準とすれば，陽交はその中央に当る。この下腿の長さは前記のとおり357±24mmであった。

したがって，陽交は腓骨頭下縁と外果頂点との中央の高さで，腓骨の後縁に定めた。

3．外　丘

「甲乙経」に〝在内踝上七寸〟とあるが，「千金方」[11]では〝在外踝上七寸〟となっており，以下の文献もすべて外果に訂正されている。「甲乙経」の中の字は胆経の外側であることから想定し，外の伝写の誤りであろう。外丘は陽交と同様に外果から7寸であり，取穴は陽交と同方法で腓骨頭下縁と外果頂点との中央で「鍼灸指南集」に〝是ハ陽交ヨリ前へ三分ヨセテ付ル〟とあるように，腓骨の前縁を指している。

したがって，外丘は腓骨頭下縁と外果頂点との中央で，腓骨の前縁に定めた。

4．光　明

「甲乙経」に〝在足外踝上五寸〟と記され，以下ほとんどの文献がこれに準じている。

したがって，光明は膝隙点の高さの最外側と外果頂点との間で外果から約1/3(5/16)に定めた。

5．陽　輔

「霊枢」本輸(2)に〝外踝之上，輔骨之前及絶骨之端也〟とあるが，やや部位が不明確である。「甲乙経」には〝在足外踝四寸，輔骨前，絶骨端，如前三分，去丘墟七寸〟としている，輔骨は腓骨をさし，絶骨は腓骨下部が，筋肉で覆われていないところを示している。下腿外側の基準尺度は16寸であり，その外果頂点の4分上方で腓骨前縁にあたる。

したがって，陽輔は膝隙点の高さの最外側と外果頂点との間で，外果から約1/4(4/16)の腓骨前縁に定めた。

6．懸　鐘

「甲乙経」に〝外踝上三寸，動者脈中，足三陽絡，按之陽明脈絶，乃取之〟とあり，以下の文献もほぼ同様の記載が多い，外果の上3寸は腓骨が皮膚の直下に触れる高さにほぼ該当する。動脈の拍動を触知することは不可能であり，腓骨の前面にある足の長母指伸筋の下には，腓骨動脈が通じているが，この血管は外果部から足部の血管網を構成するもので，その拍動は触診で補足されない。また陽明の脈である前脛骨動脈の拍動を懸鐘穴の圧迫で停止させることもできない。そこで穴の決定は膝関節裂隙の外側中央と外果頂点との16寸に対し，下方から3寸の部に相当させた。

したがって，懸鐘は膝隙点の高さの最外側と外果頂点との間で，外果から約1/5(3/16)に定めた。

7．丘　墟

「霊枢」本輸(2)に〝外果之前下，陥者中也〟とある。ほぼ位置は推定できる。「甲乙経」には上記と同文の後に〝去臨泣一寸〟としているが「千金」以下は〝去臨泣三寸〟に改め，それ以後は3寸説が多く採用されている。「鍼灸大成」[12]に至り〝足外髁従前陥中，骨縫中〟とある。この骨縫中とは骨がぬい合わさるところで，それは足関節背面の屈曲線上に相当する。また，胆経は第4と第5の中足骨の間を通過するため，それを延長した屈曲線の交点は外果の前縁と下縁との接点の直前にあたる。

したがって，丘墟は腓骨外果の前縁と下縁との接点の直前に定めた。

c．膀胱経

1．合　陽

「甲乙経」に〝在膝約文中央下二寸と記載されている。膝約文は膝窩屈曲線であり，その中央は委中にあたる。この委中はX線で調べると，**図3**のように大腿骨遠位骨端にある顆間線の直上にほぼ相当することを委中の研究で明らかにした。下腿後面は「霊枢」骨度篇(14)によれば〝膝腘以下至跗属，長一尺六寸〟とされており，跗属とは足背の高さであり，後面では踵骨隆起の上縁にほぼ該当する。そこで委中から踵骨隆起上縁までの16寸に対し，上方から2寸にあたる。

したがって，合陽は委中と踵骨隆起の上縁中央との間で委中から1/8(2/16)に定めた(**図4**，以下同じ)。

2．承　筋

「素問」刺腰痛篇(41)に〝在踹上郄下五寸〟と記載



図3　膝関節の高さを示す
マル印：委中　曲線：膝蓋骨の下縁を示す




図4　下腿部の膀胱経の経穴

している。蹻は足をあげるの意であり，蹻脈の起るところで腓腹筋に相当し，承筋は腓腹筋のなかにあることを示す。郄は「次註」[13]によれば腘であり膝窩を示し，経穴では委中にあたる。その下方5寸が承筋であって，下腿後面の16寸のうち上から5寸に相当し，合陽の下3寸になる。

したがって，承筋は委中と踵骨隆起の上縁中央との間で，委中から約1/3(5/16)に定めた。

3．承　山

「甲乙経」に〝在兌腨腸下，分肉間陥者中〟とあり，兌はとおる，よろこぶ，あつまる，などの意があり，腨腸は，腓腹筋を指す。分肉間は筋肉のはざまである。ゆえに腓腹筋の筋腹の内側が集合する中央部に相当する。しかし，やや部位が不明確である。その後も類同の記述が続き，「医学入門」に至り〝腨股下分肉間，拱足去地一尺取之〟としている。拱はかえるの意があり，「兪穴弁解」[14]に〝拱足トハ一足ヲ立テ足ヲ揃ヘ踏付タル地ヨリ上腨ノ中也〟としており，一足を正しく立てて他の足は膝を屈した姿勢で，足の地底面から一尺上ったところが承山であるとしている。「霊枢」骨度(14)に〝跗属以下，至地長三寸〟にしたがい，踵骨隆起の上縁中央から接地面までの3寸を除くと，下腿後面の16寸に対し委中から9寸にあたり，踵骨上からは7寸になる。

したがって，承山は委中と踵骨隆起の上縁中央との間で，踵骨隆起上縁から約2/5(7/16)に定めた。

4．飛　揚

「霊枢」経脈(10)に〝足大陽之別，名曰飛揚，去踝七寸〟と記載し，その後も外果の上方7寸説が多い，この記載のみでは承山との位置関係が不明である。「医学入門」に〝外踝上七寸，骨後〟と記載されているが，骨後のみでは腓骨か脛骨かが明らかでない。「鍼灸抜萃大成」[15]に〝承山ト相並ブ，承山ハ腘ノ中央通の下，飛揚ハ外踝ノ後ノ通ノ上ノ踵ノ上七寸ニ点ズ〟と記してある。ということは飛揚は同じ高さに並ぶが，委中と踵骨との通りではなく，外果の後である昆侖の直上にあたる。

したがって，飛揚は承山の外方で昆侖の直上に定める。

5．跗　陽

「甲乙経」に〝在足外踝上三寸，大陽前少陽後，筋

骨間〟の記載で位置が決定する。外果の上方3寸は，下腿16寸中の下方3寸の高さであり，筋骨間といえばアキレス腱と腓骨の間である。

したがって，跗陽は委中と踵骨隆起の上縁中央との間で，踵骨隆起の上から約1/5(3/16)の高さで昆侖の直上に定めた。

6．昆　侖

「霊枢」本輸(2)に〝外踝之後，跟骨之上〟とあり，「甲乙経」に〝在足外踝之後，跟骨上陥中，細動脈応手〟とあり，外果頂点の後方は踵骨隆起の上縁とほぼ同じ高さであり，深部に腓骨動脈を通じているがやや触れがたい。

したがって，昆侖は外果頂点の高さで腓骨外果後縁とアキレス腱の間に定めた。

III 考　　察

経穴の部位を決定するのに必要な基準尺度として，下腿部には外側の長さと，後側の長さと並びに内側の長さが骨度篇に記載しておることを基準尺度の項にあげた。この基準尺度は各面によって基準点の高さが異なるため，古典に一尺六寸と記載してあっても，その1寸の長さは場所により長短があり，実測値からみても同一の長さではない。下腿外側の基準尺度は上位の基準点が膝隙点の高さで，下位の基準点は外果頂点であり，これは16寸とされている。下腿後側は上位の基準が膝窩屈曲線の中央である委中に定め，下位は踵骨隆起中央の上縁であり，これも16寸とされている。この両基準尺度を比較すると，後面の委中は膝隙点の高さより2cm余上方であり，下位の外果と踵骨上縁を比べると踵骨上縁が何mmか高いが，それでも後側の基準尺度の距離が長く，1寸の比は後側の基準尺度の距離が長く，外側が短くなる。また内側と外側の基準尺度を比較すると，上位の基準点は両者ともに膝隙点の高さで同一であるが，内果は外果よりも2cm前後高くなっており，内側基準尺度の1寸は外側よりも短くなっている。したがって，3基準尺度のうち最も短くなるのは内側基準尺度である。しかし，内側基準尺度は2cm内外短くなっているが，**表1**をみるように骨度篇からの換算尺度が14.5寸と短く定められているので，1寸に対する実測値の比は，外側基準尺度1寸である22.3mmよりも22.7mmと長くなっている。下腿部の基準尺度の1寸比は3面ともに同一ではないが，外側，後側に基準を設けたのは，一見煩雑に感じないでもないが，経穴の取穴に便宜であるという立場からみれば，優れた方法であったと思われる。

次に下腿3陽経の経穴のうち，上下の基準点として，解剖的にほぼ定まったのは，胃経では犢鼻，足三里，解谿であり，胆経では陽陵泉，丘墟があり，膀胱経では委中，昆侖であった。その他は文献の記載に基づいて，各基準尺度の間に分数で比例配分を行った。ことに胆経については，基準点以外で解剖学的に表示できた陽陵泉があったため，取穴の便宜性から陽交と外丘は，陽陵泉を上位の基準点に求めた。解剖学的に表示できない経穴は一般に寸の単位を用いて一方の基準点から寸を積み重ねる加算方式が多用されているが，この方式は経穴部位を合理的に表現できるものではない。一寸の長さは固定した長さではなく，部位によって長短のある尺度であるため，この寸によって部位を表現するには科学性がなく，国際的に客観性のある標準部位を定めるには，基準尺度に対し基準点と経穴間の距離を併記した，分数方式に改めることが必要である。

IV 結　　論

下腿部陽経の基準尺度は古典の記載を基礎にして，胃経と胆経の経穴配分は膝隙点の高さから外果頂点までを16寸とし，膀胱経は膝窩曲線の中央である委中から，踵骨隆起の上縁までを16寸とする尺度を用いた。次に各経穴の部位は次のように決定した。1)胃経：足三里は脛骨粗面下縁の高さにおいて，脛骨前縁と腓骨頭の垂線の間で，脛骨前縁から1/3，上巨虚は犢鼻と解谿の間で，解谿から約2/5(6/15.5)の足三里の直下，条口は犢鼻と解谿との間で，解谿から約1/2(7.5/15.5)，下巨虚は犢鼻と解谿の間で，解谿から約2/5(6.5/15.5)，豊隆は犢鼻と解谿の間で，解谿から約1/2(7.5/15.5)の脛骨前縁と腓骨外縁との中央，解谿は距腿関節背面の屈曲線上で，足の母指伸筋腱と指伸筋腱の間。

2)胆経：陽陵泉は腓骨頭の前下縁，陽交は腓骨

頭下縁と外果頂点との中央の高さで，腓骨の後縁，外丘は腓骨頭下縁と外果頂点との中央で，腓骨の前縁，光明は膝隙点の高さの最外側と外果頂点との間で，外果から約1/3，陽補は膝隙点の高さの最外側と外果頂点との間で，外果から1/4（4/16）の腓骨前縁，懸鐘は膝隙点の高さの最外側と外果頂点の間で，外果から約1/5(3/15)，丘墟は腓骨外果の前縁と下縁との接点の直前。

3)膀胱経：合陽は委中と踵骨隆起の上縁中央との間で，委中から1/8(2/16)，承筋は委中と踵骨隆起の上縁中央との間で，委中から約1/3(5/16)，承山は委中と踵骨隆起の上縁中央との間で，踵骨隆起の上縁から約2/5(7/16)，飛揚は承山の外側で昆侖の直上，跗陽は委中と踵骨隆起の上縁中央との間で，踵骨隆起の上縁から約1/5(3/16)の高さで昆侖の直上，昆侖は外果頂点の高さで，腓骨外果後縁とアキレス腱の間。

引用文献

1）著者不明：黄帝内経霊枢，2，骨度篇，30，B.C.，100～0.
2）著者不明：黄帝内経素問，6，鍼解論篇，54，B.C.，100～0.
3）黄甫謐：鍼灸甲乙経，3，約280.
4）王氷：重広補註黄帝内経素問，13，鍼解篇，54，762.
5）曲直瀬道三：鍼灸指南集，足陽明胃経，(1570)
6）王懐隠：大平聖恵方，100，貝則四十五人形，(992)
7）季梴：合類医学入門，3，四十五穴足陽明経穴，(1575)
8）張介賓：類経図翼，6，足陽明経穴，(1575)
9）岩田利斉：鍼灸要法指南，4，3，(1686)
10）孫思邈：千金翼方，87，足少陽経，4，(682)
11）孫思邈：千金要方，87，足少陽胆経，4，(674)
12）揚継洲：鍼灸大成，7，足少陽経穴主治，(1601)
13）王氷：黄帝内経素問次註，11，刺腰痛篇，41，(762)
14）村上宗占：兪穴弁解，1，足大陽膀胱経穴，(1742)
15）岡本一抱：鍼灸抜萃大成，中之下，陽足穴法，(1698)

（〒160 東京都新宿区三栄町3番地
東京医療専門学校教員養成科）

Research Concerning Standard Location of Meridian Points On the Yang Meridians of the Crus

Masayuki Motoyoshi and Tadaharu Yamakawa
Tokyo Therapeutic Institute Teacher's Course
Haruto Kinoshita
Institute of Clinical Oriental Medicine

With international standardization of location of meridian points which are fundamental to acupuncture as a goal we studied the location of meridian points on the Yang meridians of the crus. The method of research was to adopt the descriptions of point locations round in the classics using the classics chronologically and adding to this information based on actual measurement, conduct our studies. As a standard local scale for Yang meridians on the crus, as in the KOTSUDO chapter the distance from the height of the knee split point to the lateral malleolus is 16 fcun and the distance from the fold line in the popliteal fossa (B40) to the superior border of the calcaneus is given as 16 fcun, point locations which could not be explained anatomically were proportionally distributed with in the local scale. Thus on the Stomach Meridian as the classic locations of S36 and S41 can be assumed and expressed anatomically and the other points lie between S35 and S41, S37 was determined 2/5 from S35, S38 and S40 in the middle and S39 2/5 from S41. On the Gall Bladder Meridian, G34 and G40 are determined anatomically and the other points between the knee split point and the lateral malleolus, G35 and G36 in the middle front or back, G37 1/3 from the lateral malleolus, G38 1/4 from the lateral malleolus and G39 1/5 from the lateral malleolus. On the Bladder Meridian between B40 and the superior border of the calcaneum protrubence, B55 is 1/8 from B40, B56 is 1/3 from B40, B57 and B58 midway medially or laterally and B59 1/5 from the calcaneum protrubence.