## Ejercicios 1 - Primera Parte

1. Encuentra ecuaciones implícitas del conjunto

$$(1,0,0,\lambda) + \text{Gen}\{(0,-1,1,-1),(-1,-\lambda,\lambda,-\lambda),(2,0,0,0)\}$$

2. Encuentra, justificadamente, los valores de  $\lambda$  para los cuales puedes extraer vectores del conjunto  $C_1$  y completarlos hasta una base de  $\mathbb{R}^4$  usando vectores de  $C_2$ , donde

$$C_1 = \{(1, 0, 0, \lambda), (0, \lambda, 1, \lambda), (0, -\lambda, -1, 0)\},\$$

$$C_2 = \{(1, \lambda, 1, 2\lambda), (1, -2\lambda, -2, -\lambda), (\lambda, 0, 0, -1), (0, 1, \lambda, 0)\}.$$

Para esos valores de  $\lambda$  encuentra tal base.

3. Encuentra los valores de  $\lambda$  que hacen cierta la igualdad

$$Gen\{(1,1,-1),(4,-2,2)\} = Gen\{(0,\lambda,-1),(1,0,0)\}$$

- 4. Demuestra que si A es una matriz de orden  $n \times n$  entonces  $\det(\operatorname{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$ .
- 5. Estudia los valores de  $\lambda$  que hacen compatible determinado el siguiente sistema

$$\begin{array}{cccc} (\lambda - 1)x + (\lambda - 2)y - (2\lambda + 2)z & = & -2 \\ (-2\lambda + 2)x + (-\lambda + 2)y & = & -3\lambda + 1 \\ (\lambda - 2)y - (2\lambda + 2)z & = & -\lambda - 1 \end{array} \right\}$$

6. Encuentra la relación de recurrencia para calcular el determinante  $D_n$ , en términos de  $D_{n-1}$  y  $D_{n-2}$ , de la matriz de orden  $n \times n$ 

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

7. Demuestra, sin desarrollar el determinante, que

$$\begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & \sin(\alpha + \delta) \\ \sin \beta & \cos \beta & \sin(\beta + \delta) \\ \sin \gamma & \cos \gamma & \sin(\gamma + \delta) \end{vmatrix} = 0$$