

## DEDUCCIÓN NATURAL CON PREDICADOS

Las reglas y procedimientos primitivos de proposiciones se amplían con las siguientes reglas y procedimientos que introducen y eliminan los cuantificadores:

**Eliminación del universal.** Ponemos utilizar la regla de eliminación del universal ( $\forall E$ ) que tiene la siguiente forma:

$$\begin{array}{l|l} m & \forall x A(\dots x \dots x \dots) \\ & A(\dots c \dots c \dots) \quad \forall E \ m \end{array}$$

Notemos que todas las apariciones que haya de la variable  $x$  se sustituyen por el nombre de una constante que hemos denotado por  $c$  pero también se puede utilizar otros nombres:  $a, b, \dots$

Observemos que el radio de acción del cuantificador universal es todo la fórmula  $A(\dots x \dots x \dots)$  que está en la fila  $m$ .

Hemos de señalar que el nombre de la constante  $c$  puede que ya estuviera en el alfabeto de constantes, pero también es correcto aumentar el alfabeto con un nuevo nombre de constante  $c$ .

**Introducción del existencial.** Esta regla permite sustituir una aparición de una constante, digamos  $c$ , por una variable pongamos  $x$ . Si en un término depende de una constante  $c$  lo podemos indicar por ' $A(\dots c \dots c \dots)$ ' lo que indica que quizás aparezca varias veces. Además hemos de suponer que la variable  $x$  no aparece en esta fórmula. Entonces la regla de introducción del existencial  $\exists I$  es la siguiente:

$$\begin{array}{l|l} m & A(\dots c \dots c \dots) \\ & \exists x A(\dots x \dots c \dots) \quad \exists I \ m \end{array}$$

Damos un ejemplo de dos invocaciones correctas de la regla:

$$\begin{array}{l|l} 1 & Raad \\ \hline 2 & \exists x Rxad \quad \exists I \ 1 \\ 3 & \exists y \exists x Rxyd \quad \exists I \ 2 \end{array}$$

**Introducción del universal.** La regla de introducción del cuantificador universal ( $\forall I$ ) es la siguiente:

$m$	$\mathcal{A}(\dots c \dots c \dots)$	
	$\forall x \mathcal{A}(\dots x \dots x \dots)$	$\forall I \ m$

En muy importante asegurarse de que se verifican las siguientes condiciones:

El nombre  $c$  no debe aparecer en las premisas y supuestos no cancelados.

El nombre de variable  $x$  no debe aparecer en  $\mathcal{A}(\dots c \dots c \dots)$

Veamos con un ejemplo una invocación incorrecta de la regla:

1	$\forall x Lxk$	
2	$Lkk$	$\forall E \ 1$
3	$\forall x Lxx$	invocación incorrecta de $\forall I \ 2$

Notemos que en este caso existe la premisa (o supuesto) de la línea 1 contiene la letra  $k$  y por lo tanto se ha invocado de modo indebido la regla de introducción del universal.

Sin embargo si el supuesto ya ha sido cancelado, entonces si que se puede aplicar la regla:

1	$Gd$	
2	$Gd$	$R \ 1$
3	$Gd \rightarrow Gd$	$\rightarrow I \ 1-2$
4	$\forall z(Gz \rightarrow Gz)$	$\forall I \ 3$

En ese caso se prueba que ' $\forall z(Gz \rightarrow Gz)$ ' es un teorema.

**Procedimiento primitivo para eliminar el existencial.** El cuantificador universal se puede eliminar mediante el siguiente procedimiento (primitivo):

$m$	$\exists x \mathcal{A}(\dots x \dots x \dots)$	
$i$	$\mathcal{A}(\dots c \dots c \dots)$	
$j$	$\mathcal{B}$	
	$\mathcal{B}$	$\exists E \ m, i-j$

Hay que tener en cuenta las siguientes restricciones:

$c$  no debe aparecer en ninguna premisa o supuesto no descartado anterior a la línea  $i$ ,

$c$  no debe aparecer en  $\exists x \mathcal{A}(\dots x \dots x \dots)$ ,

$c$  no debe aparecer en la conclusión  $\mathcal{B}$ .

La moraleja es que si se quiere quitar el existencial hay que introducir un nuevo supuesto por sustitución de la variable por una nueva constante que no haya aparecido previamente y llevar la argumentación hasta que desaparezca esa constante.

1.- Probar por deducción natural las siguientes leyes lógicas o reglas de deducción:

1.  $\vdash \forall x Fx \vee \neg \forall x Fx$

1		$\forall x Fx$	
2		$\forall x Fx \vee \neg \forall x Fx$	$\vee I$ 1
3		$\neg \forall x Fx$	
4		$\forall x Fx \vee \neg \forall x Fx$	$\vee I$ 3
5		$\forall x Fx \vee \neg \forall x Fx$	LEM 1-2, 3-4

2.  $\vdash \forall z (Pz \vee \neg Pz)$

1		$Pa$	
2		$Pa \vee \neg Pa$	$\vee I$ 1
3		$\neg Pa$	
4		$Pa \vee \neg Pa$	$\vee I$ 3
5		$Pa \vee \neg Pa$	LEM 1-2, 3-4
6		$\forall x (Px \vee \neg Px)$	$\forall I$ 5

3.  $\forall x (Ax \rightarrow Bx), \exists x Ax \vdash \exists x Bx$

1		$\forall x (Ax \rightarrow Bx)$	
2		$\exists x Ax$	
3		$Aa$	
4		$Aa \rightarrow Ba$	$\forall E$ 1
5		$Ba$	$\rightarrow E$ 4, 3
6		$\exists x Bx$	$\exists I$ 5
7		$\exists x Bx$	$\exists E$ 2, 3-6

4.  $\forall x(Mx \leftrightarrow Nx), Ma \wedge \exists xRxa \vdash \exists xNx$
5.  $\forall x\forall yGxy \vdash \exists xGxx$
6.  $\vdash \forall xRxx \rightarrow \exists x\exists yRxy$
7.  $\vdash \forall y\exists x(Qy \rightarrow Qx)$
8.  $Na \rightarrow \forall x(Mx \leftrightarrow Ma), Ma, \neg Mb \vdash \neg Na$
9.  $\forall x\forall y(Gxy \rightarrow Gyx) \vdash \forall x\forall y(Gxy \leftrightarrow Gyx)$
10.  $\forall x(\neg Mx \vee Ljx), \forall x(Bx \rightarrow Ljx), \forall x(Mx \vee Bx) \vdash \forall xLjx$

2.- Las dos equivalencias de De Morgan cuantificadas dan cuatro reglas (dos a dos recíprocas), por ejemplo,  $\neg\forall xP(x) \vdash \exists x\neg P(x)$ , etc.. Demostradas las cuatro reglas sin utilizar reglas derivadas

3.- Probar por Deducción Natural los siguientes silogismos:

De la primera figura:

**Barbara:**  $\forall x(Gx \rightarrow Fx), \forall x(Hx \rightarrow Gx) \vdash \forall x(Hx \rightarrow Fx)$

**Celarent:**  $\forall x(Gx \rightarrow \neg Fx), \forall x(Hx \rightarrow Gx) \vdash \forall x(Hx \rightarrow \neg Fx)$

**Ferio:**  $\forall x(Gx \rightarrow \neg Fx), \exists x(Hx \wedge Gx) \vdash \exists x(Hx \wedge \neg Fx)$

**Darii:**

$\forall x(Gx \rightarrow Fx), \exists x(Hx \wedge Gx) \vdash \exists x(Hx \wedge Fx)$

Subalternos de la primera figura:

**Barbari:**

$\exists xHx, \forall x(Gx \rightarrow Fx), \forall x(Hx \rightarrow Gx) \therefore \exists x(Hx \wedge Fx)$

**Celarent:**

$\exists xHx, \forall x(Gx \rightarrow \neg Fx), \forall x(Hx \rightarrow Gx) \therefore \exists x(Hx \wedge \neg Fx)$

Subalternos de la segunda figura:

**Cesaro:**

$\exists xHx, \forall x(Fx \rightarrow \neg Gx), \forall x(Hx \rightarrow Gx) \therefore \exists x(Hx \wedge \neg Fx)$

**Camestrop:**  $\exists xHx, \forall x(Fx \rightarrow Gx), \forall x(Hx \rightarrow \neg Gx) \therefore \exists x(Hx \wedge \neg Fx)$

De la tercera figura:

**Felapton:**  $\exists xGx, \forall x(Gx \rightarrow \neg Fx), \forall x(Gx \rightarrow Hx) \therefore \exists x(Hx \wedge \neg Fx)$

**Darapti:**  $\exists xGx, \forall x(Gx \rightarrow Fx), \forall x(Gx \rightarrow Hx) \therefore \exists x(Hx \wedge Fx)$

Subalternos de la tercera figura:

**Calemop:**  $\exists xHx, \forall x(Fx \rightarrow Gx), \forall x(Gx \rightarrow \neg Hx) \therefore \exists x(Hx \wedge \neg Fx)$

De la cuarta figura:

**Fesapo:**  $\exists xGx, \forall x(Fx \rightarrow \neg Gx), \forall x(Gx \rightarrow Hx) \therefore \exists x(Hx \wedge \neg Fx)$

**Bamalip:**  $\exists xFx, \forall x(Fx \rightarrow Gx), \forall x(Gx \rightarrow Hx) \therefore \exists x(Hx \wedge Fx)$

Para resolver los siguientes ejercicios hay que cambiar previamente la sintaxis; por ejemplo  $Q(x)$  se cambia a  $Qx$

4.- También se pueden demostrar las tautologías, como si fueran reglas pero no hay premisas. Por ejemplo:

$$\forall x(P \rightarrow Q(x)) \rightarrow (P \rightarrow \forall xQ(x))$$

y también su recíproco.

Nótese que a la fórmula anterior le podemos asociar la regla:

$$\frac{\forall x(P \rightarrow Q(x))}{P \rightarrow \forall xQ(x)}$$

y análogamente con la fórmula recíproca. Compárese la demostración de estas reglas con las de las correspondientes leyes lógicas.

5.- Probar las siguientes reglas mediante deducción natural (cambiando la notación para que se pueda aplicar el corrector “proofs”)

$$\text{a) } \frac{\forall x \forall y (P(x) \wedge S(y) \rightarrow \neg R(x, y))}{\forall x (Q(x) \rightarrow \neg S(x))}$$

$$\frac{\forall x \forall y \exists z (A(x, y)) \vee Q(z)}{\exists x \exists y (\neg R(x, y) \vee (S(x) \wedge T(y)))}$$

$$\text{b) } \frac{\forall x (S(x) \rightarrow \exists y \exists z \neg A(y, z))}{\neg \exists x Q(x)}$$

$$\frac{\forall x \forall y \exists z (A(x, y) \vee Q(z))}{\neg \exists x Q(x)}$$

c) Probad la siguiente ley lógica

$$\neg(\neg \exists x \neg P(x) \wedge \neg \forall x P(x))$$