

# Lista de ejercicios 1 - Fundamentos de Probabilidad

3 de abril de 2019

Justo Andrés Manrique Urbina - 20091107

## 1. Pregunta 5.a.

Demuestre que  $A_1 \in \sigma(C)$ ,  $A_2 \in \sigma(C)$ , ...

**Demostración:**

Supongamos  $A_i \in C$ ,  $i = 1, 2, \dots$

Recordemos que, por definición 1.2. del texto de la clase,  $C \subset \sigma(C)$

Por lo tanto,  $A_i \in C \subset \sigma(C)$ ,  $i = 1, 2, \dots$

Finalmente,  $A_i \in \sigma(C)$ ,  $i = 1, 2, \dots$

## 2. Pregunta 5.b.

Demuestre que  $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \sigma(C)$ .

**Demostración:**

Supongamos que  $A_i \in \sigma(C)$ ,  $i = 1, 2, \dots$ ,

Por definición de  $\sigma$ -álgebra (definición 1.1 del texto de la clase), toda  $\sigma$ -álgebra es cerrada respecto a reuniones infinitas enumerables.

Dada la suposición y la definición de  $\sigma$ -álgebra, se concluye que  $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \sigma(C)$ .

## 3. Pregunta 16.a.

Demuestre que  $f^{-1}(\sigma(C))$  es una  $\sigma$ -álgebra en  $\Omega_1$ .

**Demostración:**

Si  $\sigma(C)$  es una  $\sigma$ -álgebra en  $\Omega_2$ , entonces se cumplen las siguientes definiciones:

- $\Omega_2 \in \sigma(C)$

- $\forall A \in \sigma(C) : A^c \in \sigma(C)$
- $\forall A_1, A_2, \dots \in \sigma(C) : \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \sigma(C)$

En base a ello, aplicamos la imagen inversa a la  $\sigma$ -álgebra generada y verificaremos si se cumple la definición en  $\Omega_1$ .

- $f^{-1}(\Omega_2) = \Omega_1 \in f^{-1}(\sigma(C))$
- $\forall f^{-1}(A) \in f^{-1}(\sigma(C)) : f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c \in f^{-1}(\sigma(C))$
- $\forall f^{-1}(A_1), f^{-1}(A_2), \dots \in f^{-1}(\sigma(C)) : f^{-1}(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \bigcup_{j=1}^{\infty} (f^{-1}(A_j)) \in f^{-1}(\sigma(C))$

Observamos que, aplicando la imagen inversa a  $\sigma(C)$ , la definición de  $\sigma$ -álgebra se mantiene en  $\Omega_1$ .

Por lo tanto,  $f^{-1}(\sigma(C))$  es una  $\sigma$ -álgebra en  $\Omega_1$ .

#### 4. Pregunta 16.b.

Demuestre que  $f^{-1}(C) \subset f^{-1}(\sigma(C))$

**Demostración:**

Recordemos que:

- $f^{-1}(C) = \{f^{-1}(A) : A \in C\}$
- $f^{-1}(A) = \{w \in \Omega_1 : f(w) \in A\}$

Debido a ello, se obtiene que  $f(w) \in A \in C$

Por definición,  $C \subset \sigma(C)$

Por lo tanto,  $f(w) \in A \in C \subset \sigma(C)$

Aplicando imagen inversa, se obtiene que:  $w \in f^{-1}(A) \in f^{-1}(C) \subset f^{-1}(\sigma(C))$

Finalmente, se observa que  $f^{-1}(C) \subset f^{-1}(\sigma(C))$ .