

Definición: Dadas las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \theta \in \Theta_0.$$

$$H_1 : \theta \in \Theta_1.$$

Fijado $\eta y \alpha$. Si $\forall \theta \in \Theta_1$, la regla de decisión óptima para el contraste

$$H_0 = \theta = \theta_0.$$

$$H_1: \theta = \theta_2.$$

es la misma, entonces esta regla se llama la regla de decisión uniformemente más poderosa.

1. Ejemplo

$$X \sim N(\mu, 10).$$

en dónde $n = 20$ y $\alpha = 0,05$. Deduzca, si existe, la regla UMP para el contraste:

$$H_0 : \mu = 5.$$

$$H_1 : \mu > 5.$$

Solución: Tenemos que:

$$\Theta_1 = \{\mu : \mu > 5\}.$$

$$H_0 : \mu = 5.$$

$$H_1 : \mu \in \Theta_1.$$

Sea $\mu_1 > 5 (\mu \in \Theta_1)$ y consideramos el contraste:

$$H_0 : \mu = 5.$$

$$H_1 : \mu = \mu_1.$$

Mediante Neyman-Pearson hallamos la regla de decisión óptima para estas hipótesis (es decir, la que minimiza β o maximiza la potencia $1 - \beta$). Se vió en un ejemplo anterior que:

$$l(\mu) = 20(-\ln(\sqrt{2\pi}) - \ln(\sqrt{10})) - \frac{1}{10} \sum_{j=1}^{20} (X_j - \mu)^2.$$

Se rechaza H_0 si:

$$\frac{L(\mu_1)}{L(5)} > 5.$$

$$20(-\ln(\sqrt{2\pi}) - \ln(\sqrt{10})) - \frac{1}{10} \sum_1^{20} (X_j - \mu_1)^2 - 20(-\ln(\sqrt{2\pi}) - \ln(\sqrt{10})) + \frac{1}{10} \sum (X_j - 5)^2 > c.$$

$$(\mu_1 - 5) \sum_{j=1}^{20} (X_j - 5)^2 > c.$$

$$\sum_{j=1}^{20} X_j > c.$$

Pues no depende de μ_1

$$\bar{X} > c.$$

Dónde c es tal que:

$$P(\text{Rechazar } H_0 \text{ siendo verdadera}) = 0,05.$$

$$P(\bar{X} > c, \mu = 5) = 0,05.$$

Por otra parte, tenemos que:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

$$Z \sim N(0, 1).$$

$$Z \sim \frac{\sqrt{20}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{10}} \sim N(0, 1).$$

En dónde:

$$F_z\left(\frac{\sqrt{20}(c - 5)}{\sqrt{10}}\right) = 0,95.$$

$$\frac{\sqrt{20}(c - 5)}{\sqrt{10}} = 1,645.$$

$$c = 6,1632.$$

Se rechaza H_0 si $\bar{X} > 6,1632$. Esta es la regla de decisión óptima (minimiza β o maximiza π). Como esta regla de decisión es la misma para cualquier valor de μ_1 (no depende de μ_2) entonces esta es la regla de decisión uniformemente más poderosa.

2. Ejercicio

En el ejemplo anterior determinar β (para el contraste original). **Solución:**

$$\beta = P(\text{Aceptar } H_0 \text{ siendo falsa}).$$

$$\beta = P(\bar{X} \leq 6,1632, \mu > 5).$$

$$\beta = \beta(\mu) = P(\bar{X} \leq 6,1632), \mu > 5.$$

$$= F_{\bar{X}}(6,1632), \mu > 5.$$

En relación al ejemplo anterior, tenemos que:

$$\beta = \beta(\mu) = F_z\left(\frac{\sqrt{20}(6,1632 - \mu)}{\sqrt{10}}\right), \mu > 5.$$

Note lo siguiente:

- Si μ sube, entonces $\beta(\mu)$ baja.
- $\beta(\infty) = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \beta(\mu) = \lim_{\mu \rightarrow \infty} F_z\left(\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{10}}\right)(6,163 - \mu) = 0$
- $\beta(5^+) = \lim_{\mu \rightarrow 5^+} \beta(\mu) = F_z\left(\frac{\sqrt{20}(6,1632-5)}{\sqrt{10}}\right) = F_z(1,645) = 0,95.$

Sea $\mu_1 < 5$ y considerando el contraste auxiliar:

$$H_0 : \mu = 5.$$

$$H_1 : \mu = \mu_1.$$

A este contraste se le aplica el Lema de Neyman-Pearson.

Se rechaza H_0 si:

$$\frac{L(\mu_1)}{L(5)} > c.$$

$$l(\mu_1) - l(5) > c.$$

$$\sum_{j=1}^{20} X_j < c.$$

Se rechaza H_0 si $\bar{X} < c$ donde c es tal que:

$$P(\text{Rechazar } H_0 \text{ siendo verdadera}) = 0,05.$$

$$P(\bar{x} < c, \mu = 5) = 0,05.$$

$$F_{\bar{X}}(c) = 0,05, \mu = 5.$$

Pero como:

$$Z = \frac{\sqrt{20}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{10}} \sim N(0, 1).$$

Resulta que:

$$F_z\left(\frac{\sqrt{20}(c - 5)}{\sqrt{10}}\right) = 0,05.$$

$$\frac{\sqrt{20}(c - 5)}{\sqrt{10}} = 1,645.$$

$$c = 3,8368.$$

Se rechaza H_0 si $\bar{X} < 3,8368$

Esta regla es la regla óptima (minimiza β) para el contraste auxiliar, que no depende de μ_1 , viene a ser la regla de decisión uniformemente más poderosa para el contraste de hipótesis regional.

3. Ejercicio

En el ejemplo anterior graficar β . Sea β tal que:

$$\beta = P(\text{Aceptar } H_0 \text{ siendo falsa.}).$$

$$= P(\bar{X} > 3,8368, \mu < 5).$$

$$\beta = \beta(\mu) = P(\bar{X} > 3,8368), \mu = 5.$$

$$= 1 - F_{\bar{X}}(3,8368), \mu = 5.$$

$$H_0 : \mu = 5.$$

$$H_1 : \mu < 5.$$

Estandarizando:

$$\beta = \beta(\mu) = 1 - F_z\left(\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{10}}(3,8368 - \mu)\right).$$

Observar que:

- Si μ sube, entonces $\beta(\mu)$ sube.
- $\beta(-\infty) = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \beta(\mu) = 1 - F_z(\infty) = 0$
- $\beta(5^-) = \lim_{\mu \rightarrow 5^-} \beta(\mu) = 1 - 0,05 = 0,95$

4. Ejemplo 3

$$X \sim N(\mu, 10), n = 20, \alpha = 0,05.$$

$$H_0 : \mu = 5.$$

$$H_1 : \mu \neq 5.$$

Sea $\mu \neq 5$ y consideramos el contraste de hipótesis auxiliar.