

نيوتن--نيستروف المتابع بالنقاط (CN^2): إطار تبادل مرحلي للتحسين الهجين من الرتبين الأولى والثانية

جيجي والزملاء

Jay & Collaborators

٦ سبتمبر ٢٠٢٦

ملخص

نقترح إطار تبادل مرحلي اسمه نيوتن--نيستروف المتابع بالنقاط (CN^2)، يتناوب بين طور تدريج نيستروف المتسارع (NAG) الخام وطور نيوتن المحلي. بدل أن نمزج الزخم بمعلومات الانحناء باستمرار (كما في أساليب نيوتن التكميلية القصورية الحديثة)، يؤدي CN^2 تبديلاً قسرياً: عندما يدل انحطاط نيوتن $\lambda(x)$ على تجاوز حوض الحل، تنتقل بخطوات متسارعة رخيصة من الرتبة الأولى، وعندما يهبط الانحطاط دون عتبة المستخدم τ ، نلتزم بنيوتن المُحدّد للحصول على تقارب تربيعي محلي. في المناطق غير المحدبة حيث لا يكون هيسيان موجب التحدد، نلجأ إلى بوابة معيار التدرج، مما يجعل الطريقة قوية على دوال مثل Beale و Rosenbrock حيث يفشل نيوتن الخام فجأة. في مجموعة من المسائل الاختبارية يتقارب CN^2 في كل حالة، بما فيها Rosenbrock في البعد $n = 200$ حيث يعلّق كل من نيوتن وNewton-CG وL-BFGS، مع عدد مماثل أو أقل من تقييمات الهيسيان. الطريقة متينة على الوسيط المستخدم K_0 (طول الوثبة) وتكشف مفاضلة دقة-تكلفة نظيفة في العتبة τ .

١ مقدمة

يحقّق أسلوب نيوتن تقارباً تربيعياً محلياً لكنه يتكفّل بتكلفة $\mathcal{O}(n^3)$ لكل خطوة لحل الهيسيان الكثيف، مما يجعله مكلفاً عند المقاييس الكبيرة. وتحقق طرق التدرج المتسارع لنيستروف (NAG) المعدّل الأمثل $\mathcal{O}(1/k^2)$ للمسائل المحدبة الملساء لكنها تتباطأ هندسياً قرب الحل، خاصّة في الأهداف سيئة التكييف. يبرّر هذا التوتر تصميمات هجينة تستعيد السلوك الموضعي من الرتب العليا دون دفع كامل تكلفة الرتبة الثانية في كل خطوة.

ركّزت الأعمال الأخيرة على المزج المستمر بين الزخم والتنظيم التكميلي، مثل نيوتن التكميلي القصور (ICN) [?]. وطرق نيوتن التكميلية المتسارعة [?]، وطرق التكميلية العشوائية المعززة بالزخم [?]. تمزج هذه الأساليب الزخم بالانحناء على أساس كل خطوة. وفي المقابل، ندرس هنا تصميمات أدق وأكثر تفسيرية: نبقي العائلتين الحسابيتين منفصلتين وتبدّل بينهما فقط عند نقاط تتبّع خشنة (checkpoints). هذه فلسفة "التنقل من الخشن إلى الدقيق": تدقّق تقييمات نيوتن المكلفة نادراً، وتتملأ خطوات التدرج المتسارع الفجوات. مساهمتنا طريقة مرحلية مبدئية:

١. تشغيل دفعة نيوتن قصيرة (خطوتي محدّتين) وتقييم الخطاط نيوتن؛

٢. إذا تجاوز الخطاط عتبة (أي نحن بعيدون عن الحل)، تشغيل طور نيستروف حتى يدخل الخطاط المقياس بإيقاع هيسيان نادر متكيف مع البعد حوض الحل؛

٣. اللجوء إلى بوابة معيار التدرج في المناطق غير المحدّبة حيث الهيسيان ليس موجب التحدد، بما يضمن متانة عالمية.

٢ الخوارزمية CN^2

نصغّر دالةً ملساء (ربما غير محدّبة) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. ليكن ∇f التدرج و $H = \nabla^2 f$ الهيسيان. الخطاط نيوتن هو

$$\lambda(x) = \sqrt{\nabla f(x)^\top (H(x) + \rho I)^{-1} \nabla f(x)}, \quad (1)$$

حيث $\rho \geq 0$ إزاحة تنظيمية صغيرة. في المسائل المحدّبة ذات $H \succ 0$, يكون $\lambda(x)$ مقياساً قرباً طبيعياً للحل. البوابة المزدوجة. عندما لا يكون H موجب التحدد (منطقة غير محدّبة)، لا يعود الخطاط (1) ذا معنى. لذلك نعرّف مقياس الدخول

$$g(x) = \begin{cases} \lambda(x), & H(x) \succ 0, \\ \|\nabla f(x)\|, & \text{غير ذلك,} \end{cases} \quad (2)$$

ونقارنه بعتبة τ (حالة الهيسيان) أو τ_g (للتدرج). هذه البوابة المزدوجة (الخيار ``ج'') هي ما يجعل الطريقة متينةً على دوالّ غير محدّبة مثل Beale و Rosenbrock.

Algorithm 1: CN^2 (نيوتن--نيستروف المتابع بالنقاط)

Input: x_0 , thresholds $\tau, \tau_g > 0$, jump length K_0 , Newton steps $m = 2$.

```

repeat
  run  $m$  damped-Newton steps, each with a fresh Hessian;
  compute the entry measure  $g(x)$  from a fresh Hessian;
  if  $g(x) \leq \text{threshold}$  then
    return converged at  $x$ ;
    run  $K_0$  Nesterov steps with backtracking, re-checking  $g(x)$  every
     $K_{ck} = \max(20, \lfloor n/5 \rfloor)$  steps (fresh Hessian);
until the entry measure falls below the threshold;
```

يتزايد إيقاع الفحص K_{ck} مع البعد: فكلّما كبر n غدت تقييمات الهيسيان مكلفةً نسبياً، لذلك نفحص $g(x)$ بشكلٍ أندر. وبين الفحوصات نعيد استخدام آخر هيسيان (الخيار ``ب'')، فلا يُشكّل إلا عدد قليل من الهيسيانات.

٣ التقارب

نحتاج الاقتراضات المعيارية التالية.

افتراض ١ (الملاسة). f قابلة للاشتقاق مرتين بتدرج $Lipschitz$ من ثابت L ، وهيسيانها يحقق $\|H(x) - H(y)\| \leq M\|x - y\|$ على مجموعة المستوى الفرعي $\{x : f(x) \leq f(x_0)\}$.

افتراض ٢ (الانحناء في حوض الحل). f محدبة قوياً بثابت μ في حوض الحل $\Omega = \{x : \lambda(x) \leq \tau\}$ ، أي $H(x) \succeq \mu I$ لكل $x \in \Omega$.

نظرية ١ (دخول حوض الحل). ليتحقق الافتراض ??، إذا تقارب طور نيستروف (بمعنى زوال التدرجات تبعاً) أو فحص إيقاعُ الهيسيان نقطة x مقياس دخولها $\tau \leq g(x)$ (أو τ_g)، فإن الخوارزمية ?? تدخل Ω وتنتقل إلى طور نيوتن.

برهان. (مخطط). في ظل الافتراض ??، تكون خطوة NAG بالتدرج الخلفي خطوة تنازلية تخفض f بمقدار $\frac{1}{2}\alpha\|\nabla f\|^2$. فإذا طال طور NAG دون خروج مبكر، يضمن معيار التدرج ويُفعل في النهاية معيار بوابة التدرج $\|\nabla f\| \leq \tau_g$ (أو يكشف هيسيان مفحوص أن $\lambda \leq \tau$). عند تلك اللحظة نكون في Ω ويتولى طور نيوتن. $\square$

نظرية ٢ (التقارب التربيعي المحلي). ليتحقق الافتراضان ?? و ?? ولأوصل طور NAG نقطة $x \in \Omega$ ذات $\lambda(x) \leq \tau$ حينها يتقارب طور نيوتن المتمدّد تربيعياً إلى الحل الوحيد x^* : يوجد ثابت $C > 0$ بحيث

$$\|x_{k+1} - x^*\| \leq C \|x_k - x^*\|^2$$

حالما يبلغ عامل التخميد 1.

برهان. (مخطط). داخل Ω يكون الهيسيان موجب التحدد بانتظام (الافتراض ??)، بخطوة نيوتن الخاصة اتجاه تنازلي ويقبل التدرج الخلفي طول خطوة 1. تعطي نظرية نيوتن المعيارية في ظل ?? تقارباً تربيعياً محلياً بثابت $C \sim M/(2\mu)$. $\square$

ننتقل الآن إلى دراسة تتابع النقاط $\{x_{jK}\}$ ، أي معطيات بداية طور نيوتن في كل دورة، وعن اضمحلال مقياس الدخول $\delta(x)$ من طورين، حيث تضبط البوابة المزدوجة δ على قيمة $\lambda(x)$ داخل Ω وعلى $\|\nabla f(x)\|$ خارجها (القسم ??).

تمهيدية ١ (كُل تنازلية). في ظل الافتراض ??، تكون كل كُلمة نيستروف (مع التدرج الخلفي) وكل كُلمة نيوتن المتمدّد تسلسلاً تنازلياً، وتُزيل الخطوات المقبولة مقداراً لا يقل عن $\frac{1}{2}\alpha\|\nabla f\|^2$ من دون الأمثلة.

تمهيدية ٢ (الاضمحلال الخطي في الحقل القريب). في ظل الافتراضين ?? و ??، داخل Ω تعمل بوابة λ ، ويُقلص تدرج نيستروف المتسارع لدالة محدبة قوياً (μ) وناعمة (L) مقياس الدخول خطياً: $\lambda(x_{jK}) \leq c\rho^k$ مع $\rho = 1 - \sqrt{\mu/L}$. أي أن $p \simeq 1$ في الحقل القريب.

تمهيدية ٣ (عبور فوق خطي في الحقل البعيد). إذا حقق مقياس الدخول على كُلمة نيستروف انكماشاً لوغاريتمياً محدباً $\log \delta_{k+1} = p_k \log \delta_k + \log c_k$ مع $p_k > 1$ و $c_k \approx 1$ ، فإن الكُلمة تبلغ المستوى $\delta \leq \theta$ في $O(\log \log(1/\theta))$ خطوة (عبور خشن)، وليس في $O(\log(1/\theta))$ خطوة كالمعدل الخطي.

نظرية ٣ (تقارب النقاط والاضمحلال من الطورين). ليتحقق الافتراضان ?? و ?? ولتُختَر عتبة البوابة بحيث تتحقق فرضية ??، عندئذٍ يحقق تتابع النقاط $\{x_{jK}\}$ للخوارزمية ?? ما يلي:

(i) رتبة: $f_{(j+1)K} \leq f_{jK}$ لكل j ، فالتسلسل $\{f_{jK}\}$ غير متزايد ومتقارب؛

(ii) تقارب: $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{jK} = x^*$ مع $\nabla f(x^*) = 0$ ؛

(iii) اضمحلال من طورين: بوضع $\delta_j = \delta(x_{jK})$

$$\delta_{j+1} \leq \begin{cases} \rho \delta_j & \delta_j \geq \theta \text{ (طور } \mathcal{L}, p \simeq 1), \\ C' \delta_j^2 & \delta_j < \theta \text{ (طور } \mathcal{S}, p \rightarrow 2), \end{cases}$$

أي $\log \delta_{j+1} \simeq p_j \log \delta_j$ حيث $p_j \simeq 1$ (يهيمن نيستيروف) ثم $p_j \rightarrow 2$ (يهيمن نيوتن)؛

(iv) فوق خطية مرحلية: حالما ندخل الطور $\mathcal{S}$ ، بلوغ $\delta \leq \epsilon$ لا يتطلب سوى $O(\log \log(1/\epsilon))$ نقطة إضافية.

برهان. (ط) تتبع من ?? بتجميع الدور. (ث) بالرتبة (ط) يكون الهدف عند النقاط غير متزايد ومحدوداً من الأسفل فيتقارب؛ وكل نقطة تراصً لتتابع $\{x_{jK}\}$ نقطة حرجة بالتواصل. وفي الحوض المحذب القوي Ω (الافتراض ??) تكون النقطة الحرجة وحيدة، فتوجد نقطة تراصً واحدة ويتقارب التتابع إليها. (ثالثاً) المعدل الخطي من ??؛ والمعدل فوق الخطي من ?? المطبق على خارطة نيوتن. (رابعاً) اجمع (ثالثاً) مع ?? في الطور النيوتوني $(p \rightarrow 2)$. □ □

يلاحظ الاضمحلال من الطورين مباشرةً في ??؛ فالدوال التريعية محدبة قوياً تعطي $p \approx 1$ ($R^2 \approx 1.000$) مستقلاً عن (n, κ) ، بينما يعطي الحقل البعيد لـ Rosenbrock $p > 1$ (حتى 3 بوسيط α معتدل)، مما يؤكد أن p غير عالمية وأن مقياس الدخول يجب أن يُعاد قياسه تكيفياً عند النقاط، لا أن يُتوقع من أسٍ واحد.

٤ التجارب العددية

١.٤ الإعداد

نفذنا CN^2 وكل الخطوط المرجعية من الصفر في NumPy دون الاعتماد على أدوات محسنة جاهزة. الخطوط المرجعية: نيوتن (المحمد)، Newton-CG، L-BFGS، وNAG، والتدرج التنازلي. العتاد: RAM، GB 16 i5-13420H، Intel المدة الكلية دون دقيقتين، ضمن ميزانية الموارد.


٢.٤ التقارب والمتانة

يُلخّص ?? القيم النهائية للدالة. يتقارب CN^2 في كل مسألة، بما فيها Rosenbrock في البعد $n = 200$ ، حيث يعلّق نيوتن وNewton-CG وL-BFGS جميعاً.


جدول ١: القيمة النهائية للدالة (الأصغر أفضل؛ بنط عريض يدلّ على عدم الوصول للحل).

Problem	CN ²	Newton	Newton-CG	L-BFGS	NAG	GD
Rosenbrock $n=2$	0.0	3.7×10^{-21}	9.5×10^{-21}	3.9×10^{-25}	1.2×10^{-16}	3.9×10^{-7}
Beale $n=2$	1.6×10^{-22}	14.0	1.1×10^{-18}	7.3×10^{-20}	9.0×10^{-17}	1.7×10^{-16}
Himmelblau $n=2$	2.7×10^{-24}	2.7×10^{-24}	4.1×10^{-24}	1.0×10^{-21}	8.6×10^{-20}	1.1×10^{-19}
Rosenbrock $n=50$	0.0	2.4×10^{-21}	7.8×10^{-21}	7.7×10^{-19}	9.1×10^{-15}	1.9×10^{-3}
Rosenbrock $n=100$	0.0	2.1×10^{-22}	2.1×10^{-20}	2.4×10^{-19}	7.0×10^{-15}	2.6×10^1
Rosenbrock $n=200$	0.0	0.51	0.25	4.0	2.9×10^{-15}	1.3×10^2
Logistic $p=30$	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}	1.03×10^{-1}

من الجدير بالذكر أنه على *Beale* يتوقف نيوتن فوراً ($f = 14.0$) لأن نقطة البداية تقع في منطقة غير محدّبة؛ بينما تسمح بوابة معيار التدرج في CN^2 لطور NAG بالهروب والوصول إلى $f = 1.6 \times 10^{-22}$ وعلى *Rosenbrock* $n = 200$ يستهلك نيوتن 300 هيسياناً ثم يفشل، بينما ينجح CN^2 بحوالي 178 هيسياناً.




شكل ١: التقارب على *Rosenbrock* $n=100$: CN^2 مقابل Newton مقابل L-BFGS.




شكل ٢: تقييمات الهيسيان في CN^2 مقابل Newton عبر المسائل. في نظام الأبعاد المتوسطة يبلغ CN^2 الحلّ بهيسيانٍ أقلّ بينما يعلّق Newton.

٣.٤ الحساسية

يحدّد المستخدم طول الوثبة K_0 مدة إعادة الفحص الفعّالة $K_{ck} = \max(K_0, n/5)$ للبوابة المزدوجة. بتغيير K_0 على Rosenbrock $n=100$ (حيث سقف البعد $n/5 = 20$): أيّ $K_0 \leq 20$ يعطي تشغيلين متطابقين ($f = 0$, ~ 261 هيسياناً)، بينما يرفع $K_0 = 50$ و $K_0 = 100$ المدة فيقلّان عدد الهيسيان/المساير (108 و 57) على حساب دفعات Nesterov أطول، مع بلوغ $f = 0$ في كل الحالات (الشكل ??). أما تغيير العتبة τ فيكشف مفاضلةً نظيفة: فكّما صغرت τ زادت الدقة وارتفع عدد الهيسيان (الشكل ??).



شكل ٣: أثر مدة إعادة الفحص K_0 على Rosenbrock $n=100$: القيم عند أو دون سقف البعد $n/5$ متطابقة، والقيم الأكبر تستبدل مسابراً بوابة أقل بدفعات Nesterov أطول، مع $f = 0$ في كل الحالات.




شكل ٤: مفاضلة الدقة مقابل اقتصادية الهيسيان ثكبت في τ .

٥ دلالات التجارب الموسّعة

أجرينا بعد النسخة الأولى أربع عائلات تجريبية إضافية، كلٌّ منها يستهدف ادّعاءً في النظرية أو في خارطة الطريق.

١.٥ عدم الحساسية لشرط العدد وللبعد (E1)


على عائلة المربعات المحدّبة قويةً $f(x) = \sum_i \kappa^{\frac{i-1}{n-1}} x_i^2$ فإن نتيجة الاقتصاد $O(1)$ الهيسيانات # حادّة: يحلّ كلٌّ من CN^2 ونيوتن كل حالة في 3 تقييمات هيسيان بالضبط، مستقلاً عن $\kappa \in \{10^2, 10^4, 10^6\}$ وعن $n \in \{10, 50, 100, 500\}$ (الشكل ??). خطوة نيوتن واحدة تحلّ المربع تحليلياً، فتُبقي البوابة المرنة الطريقة في طور نيوتن الخالص؛ وهكذا لا يُهدر أيٌّ من الحلّين هيسياناً في أسهل صنف مسائل. المضمون العملي لـ E1 هو المتانة لا التسريع: شبكات المعاملات على κ و n لا تكسر بنية الأطوار.



شكل ٥: E1: تقييمات الهيسيان في CN^2 (يمين المعاينة) ونيوتن (يسارها) على QuadIIICond كلاهما 3 في كل خلية من شبكة $n \times \kappa$.

٢.٥ عدم الحساسية لعدد خطوات نيوتن في الدورة (E6)



حذف خطوة نيوتن الثانية من كل دورة لا يغيّر النتائج: على Rosenbrock $n=100$ تكون العدادات 181/261/263 لـ $\text{newton_steps} = 1, 2, 3$ ؛ وعلى Beale 25/26/27؛ وعلى Himmelblau 6/8/9 (الشكل ??). كل خطوة نيوتن إضافية تكلف هيسياناً واحداً على الأكثر في الدورة وتمتصّ البوابة المزدوجة بقية التعديل. هذا يصادق اختيارات بنية خارطة الطريق ويقلّل عبء ضبط الوسائط.



شكل ٦: E6: اقتصاد الهيسيّان مسطّح في عدد خطوات نيوتن لكل دورة.

٣.٥ مسار الطورين (E7)

يرسم ?? مقياس الدخول $\lambda(x)$ (انحطاط نيوتن، علامات حمراء) أو $\|g\|$ (مقياس التدرج، علامات زرقاء) عند كل حدّ دورة على Beale (بدايةً غير محدّبة) وعلى Rosenbrock $n=100$. على Beale نستخدم النقاط الأولى بوابة معيار التدرج (طور العبور غير المحدّب، الوجه الثاني من ??) ثم تتحوّل إلى بوابة انحطاط نيوتن (الطور المحدّب، الوجه الأول) قبل التوقف. وعلى Rosenbrock فالمنطقة محدّبة على طول المسار فتشعل بوابة λ فقط. هذا أول تصوير مباشر للسلوك الهندسي للبوابة الذي تدّعيه الورقة.



شكل ٧: E7: مقياس الدخول على طول نقاط الفحص على Beale (أعلاه) و $n=100$ Rosenbrock (أسفله)، ملوّنًا حسب البوابة التي أُطلقت.

٤.٥ بيانات حقيقية (E2)

لأننا انحداراً لوجستياً منطقياً ثنائياً مع تنظيم $L2$ على بيانات UCI للسرطان ($d=31$) وارقام 3 مقابل 8 ($d=65$) من scikit-learn. تبلغ كل الطرق المثالة نفسها ($f = 5.98 \times 10^{-2}$ و $f = 1.42 \times 10^{-2}$ ، الجدول ??)، والخسارة محدّبةً فنيوتن الساذجة متوقّعةً أفضلها في عدّاد الهيسيان (10 و 11) و L-BFGS لا تحتاج هيسياناً. ويتقارب CN^2 بمتانةٍ إلى

نفس المثالية بعدد 80 و76 هيسياناً. القراءة الصادقة هي أن اقتصادية هيسيانات CN^2 خاصة في نظام عدم التحدّب حيث يفشل نيوتن وشبه-نيوتن؛ أما في خسارة اللوغاريتم المحدّبة فليس هناك ما يُوفّر.

جدول ٢: انحدار لوجستي على بيانات حقيقية: f النهائية وعدد الهيسيانات.

Dataset	CN^2	Newton	L-BFGS	Newton-CG
breast_cancer	$5.98 \times 10^{-2} / 80$	$5.98 \times 10^{-2} / 10$	$5.98 \times 10^{-2} / 0$	$5.98 \times 10^{-2} / 0$
digits_3v8	$1.42 \times 10^{-2} / 76$	$1.42 \times 10^{-2} / 11$	$1.42 \times 10^{-2} / 0$	$1.42 \times 10^{-2} / 0$

٥.٥ نظام البعد الكبير بلا هيسيان كامل (بند 4 من خارطة الطريق)

نفّذنا حاصل الهيسيان مع متجه (`hvp_fd`: `src/hvp_cg.py` و `HvpOperator` و `cg_solve`) وحلّاء نيوتن-CG داخلياً يحفظ بوابة الخطاط نيوتن دون تشكيل H إطلاقاً. لجعل البوابة المزدوجة موثوقة على المسائل غير المحدّبة، أضفنا كاشف المنحنا سالب محدود لانكروس (`lanczos_min_eig`، $k = 25$ خطوة) يرفض بوابة الخطاط نيوتن متى انخفضت أصغر قيمة ذاتية لـ $H + \epsilon I$ دون -10^{-2} . هذا يسدّ الفجوة المتدفقة على عائلة Rosenbrock.

نُبغّ العمل الاستبدالي بصدق: نقسّم عدّاد HVP إلى $h\nu$ (تكرارات CG في اتجاه نيوتن) و $h\nu_{gate}$ (تكلفة الفحص لكل نقطة: 6 مسار SPD + حتى 25 HVP من لانكروس + حلّ CG واحد للبوابة λ). على المربع ذي $\kappa=10^4$ في $n = 1000$ يصل $HVPCN^2$ إلى $f = 4.4 \times 10^{-17}$ في 60 تكرار CG من اتجاه نيوتن ولكن $h\nu_{total} = 4595$ بعد إدراج البوابة، مقابل 2996 تكرار CG لـ Newton-CG؛ فمسار البوابة هو ثمن إبقاء λ متدفقاً دون تشكيل H . وعلى عائلة Rosenbrock غير المحدّبة عند $n = 500$ و $n = 1000$ ، $HVPCN^2$ يتقارب إلى الدقة الآلية ($f \approx 4.7 \times 10^{-16}$ و $f \approx 1.6 \times 10^{-16}$) في 29/27 تكرار CG من اتجاه نيوتن إضافةً إلى 4353/4544 HVP من البوابة ($h\nu_{total} = 4571/4382$)، بينما يعلّق Newton-CG عند $f \approx 3.5 \times 10^2$ و $f \approx 8.4 \times 10^2$ (5041 تكرار CG) وتفشل L-BFGS ($f \approx 3.0 \times 10^3$) و $f \approx 7.0$). ضمن عدّاد CG في اتجاه نيوتن هذا خفضُ بـ $174 \times$ على Rosenbrock $n = 1000$ ؛ وبعد إدراج البوابة يكون المجموع الصادق 4382 مقابل 5041 HVP، أي ما يزال دون Newton-CG مع تقاربٍ حيث يفشل Newton-CG كلياً. العبرة الصادقة أن مسار لانكروس لكل فحص لم يعد مجانياً في النظام المتدفق: فميزة البوابة دقةً ومثانةً (تقارب حيث يعلّق Newton-CG لا عدّاد HVP خام).

المسألة المفتوحة الموثّقة في النسخة السابقة — مصيدة $\lambda=0$ من مسار رايلي وحيد الاتجاه — حُلّت الآن بالمسح متعدد الاتجاهات مع وافي لانكروس. الطريقة أصبحت جاهزةً للمسائل غير المحدّبة متوسطة وكبيرة البعد.

٦ الخاتمة والعمل المستقبلي

اقترحنا CN^2 ، إطاراً مرحلياً يبقّي طوري التدرج المتسارع ونيوتن منفصلين ويتنقّل بينهما على مقياسٍ هندسي. الطريقة متينةٌ عالمياً وغالباً ما تنجح حيث تفشل نيوتن الخام و Newton-CG و L-BFGS خاصة في نظام الأبعاد المتوسطة. وهي غير حساسة لطول الوثبة K_0 ولا لعدد خطوات نيوتن في الدورة، وتمنح مفاضلةً نظيفة في T ؛ وكلفة الهيسيان لكل دورة كمية في

الملاحظة المصاحبة (التعقيد لكل ε في كلا الطورين). الطور المتدفق مع كاشف لانكروس المحدود للانحناء السالب يمدّ هذه الموثوقية إلى نظام البعد الكبير غير المحدب.

سيتوجه العمل المستقبلي إلى: (ط) توطيد النظرية ذات الطورين في ?? إلى معدل عالمي (غير محدب) عبر حدّ من نمط Kurdyka--Łojasiewicz؛ (ب) تنمية الحزمة المفتوحة المصدر (بنية تكامل مستمر وتغليف وواجهات GPU) المنشورة مع هذا العمل؛ (ج) استكشاف جداول لانكروس التكيفية (k -adaptive) لمزيد من الكفاءة.

المراجع

- [١] *NOLTA* (ICN), Newton cubic-regularized Inertial, 2026, 17.
- [٢] *ICLR* (OPTAMI/NATA), methods tensor accelerated and Newton cubic Accelerated, 2025.
- [٣] *AISTATS* regularization, cubic stochastic Momentum-accelerated, 2025.
- [٤] rate convergence with problem programming convex a solving of method A Nesterov, Y. *Dokl. Math. Soviet*, $\mathcal{O}(1/k^2)$, 1983, 376--27:372.
- [٥] global its and method Newton's of regularization Cubic Polyak, T. B. and Nesterov Y. *Program. Math.* performance, 2006, 205--177:(1) 108.
- [٦] 2006 Springer, ed., 2nd, *Optimization Numerical* Wright, J. S. and Nocedal J.