

# 北京四中高中教学讲义 三角（全一册）

北京四中教学处 编

1994 年 11 月



# 出版说明

当前，中学教学改革已经深入到课程设计和教材改革领域。我校数学教材的改革，以发展学生的数学思维为目标，以不改变现行教学大纲规定的教学内容为前提，试图通过对知识结构及其展开方式的统盘考虑，实现整体优化。经多年反复探索、实验，编成了这套尝试融教材与教法、学法于一体的《北京四中高中数学讲义》。

这套讲义的产生可以上溯到 1982 年。从那时起，为了发展学生智能，提高数学素养，我校部分同志就开始对高中数学教学进行以教材改革为龙头，以学法教育为重点的“整体优化实验研究”。正是在这项研究的基础上，逐步形成了这套讲义编写的特色和风格。这就是：

1. 为形成学生良好的认知结构，讲义的知识结构力求脉络分明，使学生能从整体上理解教材。
2. 为了提高学生的数学素养，本讲义把数学思想的阐述放到了重要位置。数学思想既包含对数学知识点（概念、定理、公式、法则和方法）的本质认识，也包含对问题解决的数学基本观点。它是数学中的精华，对形成和发展学生的数学能力具有特别重要的意义。为此，讲义注重展现思维过程（概念、法则被概括的过程，教学关系被抽象的过程，解题思路探索形成的过程）。在过程中认识知识点的本质，在过程中总结思维规律，在过程中揭示数学思想的指导作用。力图使学生能深刻领悟教材。
3. “再创造，再发现”在数学学习中对培养创造维能力至关重要，为引导学生积极参与“发现”，讲义在设计上做了某些尝试。
4. 例题和习题的选配，力求典型、适量、成龙配套。习题分为 A 组（基本题）、B 组（提高题）和 C 组（研究题）。教师可根据学生不同的学习水平适当选用。

5. 教材是学生学习的依据。应有利于培养自学能力，本书注重启迪学法，并在书末附有全部习题的答案或提示，以供学习时参考。

这套讲义在研究、试教和成书的过程中，始终得到了北京市和西城区教育部门有关领导的关怀和帮助，得到了北京师范大学数学系钟善基教授、曹才翰教授的热情指导，清华附中的瞿宁远老师也积极参与了我们的实验研究，并对这套教材做出了贡献，在此一并致以诚挚的谢意。

在编写过程中，北京四中数学组的教师们积极参加研讨，对他们们的热情支持表示感谢。

这套讲义包括六册：高中代数第一、二、三册，三角、立体几何、解析几何各一册。

编写适应素质教育的教材，对我们来说是个尝试。由于水平所限，书中不当之处在所难免，诚恳希望专家、同行和同学们提出宝贵意见。


北京四中教学处

1994 年 11 月

# 目 录

出版说明	i
<b>第一章 三角函数</b>	<b>2</b>
1.1 弧度制	2
1.2 角的概念的推广	5
1.3 任意角三角函数的定义	13
1.4 由定义和三角函数线观察三角函数的某些性质	21
1.5 同角函数的基本关系	32
1.6 三角恒等式的证明	42
1.7 本章小结	50
<b>第二章 和角公式及其推论</b>	<b>54</b>
2.1 关于诱导公式的补充	54
2.2 和(差)角的正弦、余弦、正切	55
2.3 倍角的正弦、余弦、正切	67
2.4 半角的正弦、余弦、正切	71
2.5 三角函数式的积化和差与和差化积	79
2.6 附条件的三角等式的证明	92
2.7 本章小结	106
<b>第三章 三角函数的性质与图象</b>	<b>110</b>
3.1 关于三角函数定义域与值域的补充	110
3.2 三角函数的增减性	115
3.3 三角函数的奇偶性	122
3.4 三角函数的周期性	123
3.5 正弦函数与余弦函数的图象	129

3.6	用几何变换的方法作函数的图象 . . . . .	136
3.7	正切函数与余切函数的图象 . . . . .	146
3.8	本章小结 . . . . .	150
<b>第四章</b>	<b>反三角函数</b>	<b>158</b>
4.1	关于反函数知识的回顾 . . . . .	158
4.2	反正弦函数 . . . . .	160
4.3	反余弦函数 . . . . .	169
4.4	反正切函数与反余切函数 . . . . .	174
4.5	本章小结 . . . . .	179
<b>第五章</b>	<b>三角方程</b>	<b>184</b>
5.1	最简三角方程 . . . . .	185
5.2	简单三角方程 . . . . .	190
5.3	本章小结 . . . . .	201



# 第一章 三角函数

在初中，我们学习过三角函数的初步知识，重点研究的是用三角函数的定义解三角形（包括解直角三角形和解斜三角形）。

本书将主要研究三角函数的性质、图象、运算（又称**三角变换**）及其应用。这些知识对高中和大学的数学、物理的学习都是必备的基础。为了使同学们从整体上对上述内容的展开先有个粗略的了解，在下页我们画出了全书的理论结构框图。在学习过程中，经常翻阅它有助于了解所学知识点在整个知识体系中的地位、作用以及知识点之间的联系。

本章在扩充角的概念的基础上，首先建立任意角三角函数的定义，并对它的一些性质做初步的研究，最后讲一点应用。

## 1.1 弧度制

### 1.1.1 角的度量单位

三角函数的自变量是角。要从数量上刻画角的大小，首先碰到的问题是角的度量单位。同学们已经学过**角度制**。它的规定是：周角的  $\frac{1}{360}$  叫做 1 度角，记作  $1^\circ$ 。

于是，

$$\text{周角} \stackrel{\text{度量}}{=} 360^\circ, \quad \text{平角} \stackrel{\text{度量}}{=} 180^\circ \quad (1)$$

现在，学习科学技术使用更加广泛的是“弧度制”，它规定：等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做 **1 弧度角**。如图 1.1， $\widehat{AB}$  的长等于半径  $r$ ， $\widehat{AB}$  所对的圆心角  $\angle AOB$  就是 1 弧度角。在图 1.2 中， $\widehat{AC}$  的长  $\ell = 2r$ ， $\widehat{AC}$  所对的圆心角  $\angle AOC$  就是 2 弧度角。






图 1.1




图 1.2




图 1.3

一般地，若圆心角  $\alpha$  所对的弧长为  $\ell$ ，那么角  $\alpha$  的弧度数就是  $\frac{\ell}{r}$ ，即

$$\alpha = \frac{\ell}{r} \text{ 弧度} \quad (2)$$

特别地，当  $\ell = 2\pi r$  时（即弧长是一个整圆），此时的圆心角为周角，它的弧度数就是

$$\frac{\ell}{r} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ 弧度}$$

这就是说，

$$\text{周角} \stackrel{\text{度量}}{=} 2\pi \text{ 弧度}, \quad \text{平角} \stackrel{\text{度量}}{=} \pi \text{ 弧度} \quad (\text{图 1.3}) \quad (3)$$

至此，一个明显的问题产生了：对于同一个角，当分别用“弧度”和“度”为单位度量时，所得的量数一般是不同的。那么，怎样进行换算呢？比较 (1)(3) 可以看出：

$$\pi \text{ 弧度} = 180^\circ$$

这就是两种单位制之间的换算关系式。由此，

$$\begin{aligned} 1 \text{ 弧度} &= \left( \frac{180}{\pi} \right)^\circ \approx 57^\circ 18', \\ 1^\circ &= \frac{\pi}{180} \text{ 弧度} \approx 0.01745 \text{ 弧度}. \end{aligned}$$

**例 1.1** 把  $67^\circ 30'$  化成弧度。

解：

$$67^\circ 30' = \left( 67\frac{1}{2} \right)^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 弧度} \times 67\frac{1}{2} = \frac{3}{8}\pi \text{ 弧度}$$

**例 1.2** 把  $\frac{3}{5}\pi$  弧度化成度。

解：

$$\frac{3}{5}\pi \text{ 弧度} = \frac{3}{5}(\pi \text{ 弧度}) = \frac{3}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$$

**说明：**今后用弧度表示角的时候，“弧度”二字通常略去不写，而只写这个角的弧度数。例如，角  $\alpha = 2$  就表示  $\alpha$  是 2 弧度的角， $\frac{\pi}{4}$  弧度的角  $\alpha$  就写成  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 。在这种约定下， $\sin \frac{\pi}{3}$  与  $\cos \frac{\pi}{2}$  分别表示  $\frac{\pi}{3}$  弧度的正弦与  $\frac{\pi}{2}$  弧度的余弦。

### 练习

请填出下列特殊角的弧度数。

度	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
弧度					$\pi$		

## 习题一

### A

1. (口答) 下列弧度各是多少度?

- |                     |                      |                      |                        |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| (1) $\pi$           | (4) $\frac{\pi}{3}$  | (7) $\frac{3\pi}{4}$ | (10) $\frac{5\pi}{6}$  |
| (2) $2\pi$          | (5) $\frac{2\pi}{3}$ | (8) $\frac{7\pi}{4}$ | (11) $\frac{7\pi}{6}$  |
| (3) $\frac{\pi}{2}$ | (6) $\frac{\pi}{4}$  | (9) $\frac{\pi}{6}$  | (12) $\frac{11\pi}{6}$ |

2. 把下列各度化成弧度 (写成多少  $\pi$  的形式):

- |                |                 |                    |
|----------------|-----------------|--------------------|
| (1) $12^\circ$ | (3) $210^\circ$ | (5) $300^\circ$    |
| (2) $75^\circ$ | (4) $135^\circ$ | (6) $22^\circ 30'$ |

3. 把下列各弧度化成度。

- |                       |                      |                     |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| (1) $\frac{\pi}{12}$  | (3) $\frac{\pi}{5}$  | (5) $\frac{\pi}{8}$ |
| (2) $\frac{3\pi}{10}$ | (4) $\frac{4\pi}{3}$ | (6) 3               |

4. 求下列各三角函数的值:

(1)  $\sin \frac{2\pi}{3}$

(2)  $\tan \frac{\pi}{6}$

(3)  $\cos \frac{3}{4}\pi$

(4)  $\sin 1$

5. 填写下表中各个三角函数的值：

	正弦	余弦	正切	余切
$\frac{\pi}{6}$				
$\frac{\pi}{4}$				
$\frac{\pi}{3}$				

6. 填写下表中各个三角函数的值：

	正弦	余弦	正切	余切
$\frac{\pi}{2}$				
$\frac{2\pi}{3}$				
$\frac{3\pi}{4}$				
$\frac{5\pi}{6}$				

1.2 角的概念的推广

在初中，我们所学过的角都是限制在  $[0^\circ, 360^\circ]$  之中。本节将把角的概念加以推广。

角可看作是由一条射线绕它的端点旋转而成的。如图 1.4，平面上射线  $OA$  绕它的端点  $O$  旋转到  $OB$  处便形成了角  $\alpha$ 。射线  $OA$  叫做角  $\alpha$  的**始边**，射线  $OB$  叫做角  $\alpha$  的**终边**，射线的端点  $O$  叫做角的**顶点**。在始边逆时针旋转第一圈的过程中便形成了  $0^\circ \sim 360^\circ$ （即  $0 \sim 2\pi$ ）的所有角；继续旋转第二圈的过程中又形成了  $360^\circ \sim 720^\circ$  的所有角（图 1.5）；继续旋转下去可以形成任意大的角。




图 1.4




图 1.5

在实际生活中,角的形成有两种相反的旋转方向。除了上述逆时针方向外,按顺时针方向旋转也可以形成角。为了区别这两种旋转方向,我们把按逆时针旋转形成的角叫做**正角**。把按顺时针方向旋转形成的角叫做**负角**。如图 1.6 中,以  $OA$  为始边的角  $\alpha = 240^\circ$ ,  $\beta = -120^\circ$ ,  $\gamma = -585^\circ$ 。特别地,当射线  $OA$  没有做任何旋转时,我们也认为这时形成了一个角,并把这个角叫做**零角**。当射线逆时针旋转不足一圈时所形成的角叫做**周内角**。显然周内角的取值范围是  $[0, 2\pi)$ 。角的概念经这样推广后,它包括任意大小的正角、负角和零角。




图 1.6

在用弧度制度量角时,正角的弧度数为正数,负角的弧度数是负数,零角的弧度数是零。即**角的弧度数集合与实数集合  $\mathbb{R}$  可以建立一一对应的关系**:每一个角的弧度数对应唯一确定的实数,反之,每一个实数对应唯一确定的角的弧度数。

今后,我们经常在直角坐标系中研究角。使角的顶点与坐标原点重合,始边  $OA$  与  $x$  轴正半轴重合(图 1.7),让  $OA$  逆时针或顺时针旋转就可以得到任意大小的角。如果角的终边落在第几象限,就说这个角是第几象限的角(或说这个角属于第几象限)。如图 1.7 (1) 中的角  $30^\circ$ ,  $390^\circ$ ,  $-330^\circ$  都是第一象限的角;图 1.7 (2) 中的  $300^\circ$ ,  $-60^\circ$  的角都是第四象限的角; $585^\circ$  的角是第三象限的角。如果角的终边落在坐标轴上,就认为这个角不属于任何象限(称这类角为轴上角)。

在图 1.7 (1) 中我们发现:  $390^\circ$  的角与  $-330^\circ$  的角都与  $30^\circ$  的角终边相同。




图 1.7

## 问 1

试把与  $30^\circ$  的角终边相同的一切角的值表示出来。

很明显, 当且仅当  $30^\circ$  加上“周角”的整数倍时, 所得到的角

$$30^\circ + 360^\circ \cdot k \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (1)$$

的终边必定与  $30^\circ$  的角的终边相同。

当  $k = 0$  时, 它表示  $30^\circ$  的角; 当  $k = 1$  时, 它表示  $390^\circ$  的角; 当  $k = -1$  时, 它表示  $-330^\circ$  的角, 等等。把这一结果写成一般形式有

## 定理

角  $\beta$  与角  $\alpha$  终边相同的充要条件是

$$\beta = \alpha + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

特别地, 当  $\alpha$  是一个周内角时, 上述结论仍然成立。

**例 1.3** 把下列各角写成周内角加上周角的整数倍的形式:

(1)  $855^\circ$

(2)  $\frac{19\pi}{2}$

(3)  $-\frac{16\pi}{3}$

(4)  $-1410^\circ$

解:

(1)  $855^\circ = 135^\circ + 360^\circ \times 2$

$$(2) \frac{19\pi}{2} = \frac{16\pi + 3\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} + 2\pi \times 4$$

$$(3) -\frac{16\pi}{3} = \frac{-18\pi + 2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi \times (-3)$$

$$(4) -1410^\circ = -1440^\circ + 30^\circ = 30^\circ + 360^\circ \times (-4)$$

## 习题二

### A

1. 把下列度化成弧度:

$$(1) 18^\circ$$

$$(3) 735^\circ$$

$$(5) 10^\circ$$

$$(7) 19^\circ 48'$$

$$(2) -120^\circ$$

$$(4) -12.5^\circ$$

$$(6) -1080^\circ$$

$$(8) -9^\circ 20'$$

2. 把下列弧度化成度。

$$(1) -\frac{7\pi}{6}$$

$$(3) \frac{5\pi}{8}$$

$$(5) -5$$

$$(7) -12\pi$$

$$(2) \frac{\pi}{15}$$

$$(4) -\frac{8\pi}{3}$$

$$(6) 1.4$$

$$(8) -100\pi$$

3. 把下列角化成“周内角 + 周角的整数倍”的形式。

$$(1) -315^\circ$$

$$(3) -720^\circ$$

$$(5) \frac{39\pi}{2}$$

$$(7) -\frac{76}{3}\pi$$

$$(2) 1200^\circ$$

$$(4) -3500^\circ$$

$$(6) -\frac{7\pi}{5}$$

$$(8) -\frac{397}{4}\pi$$

4. 下列各组中的两个角的终边是否相同 (要简述理由)?

$$(1) 3570^\circ \text{ 与 } 2130^\circ$$

$$(3) \frac{285\pi}{7} \text{ 与 } \frac{397\pi}{7}$$

$$(2) -875^\circ \text{ 与 } 565^\circ$$

$$(4) -\frac{11\pi}{4} \text{ 与 } \frac{25\pi}{4}$$

### B

5. 求证:  $\alpha$  与  $\beta$  的终边相同  $\iff \beta = \alpha + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )




图 1.8

现在，我们研究轴上角和象限中的角的一般形式。

从图 1.8 可以看出，终边在轴上的周内角由小到大依次是

$$0, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}$$

将这些角各加上  $2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 就得到了轴上的所有的角。由此可见：

- 终边在  $x$  轴正半轴上的一切角可以写成  $0 + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ );
- 终边在  $x$  轴负半轴上的一切角可以写成  $\pi + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ );
- 终边在  $y$  轴正半轴上的一切角可以写成  $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ );
- 终边在  $y$  轴负半轴上的一切角可以写成  $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

进而

- 终边在  $x$  轴上的一切角可写成  $k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ );
- 终边在  $y$  轴上的一切角可写成  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

再进一步，

- 所有的轴上角可写成  $\frac{\pi}{2} \cdot k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

## 思考题

终边在  $y$  轴负半轴上的一切角写成  $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 对吗?

如果以  $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$  分别表示第一、二、三、四象限中的角, 那么它们的取值范围是

$$\begin{aligned} 0 + 2k\pi < \theta_1 < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \frac{\pi}{2} + 2k\pi < \theta_2 < \pi + 2k\pi \\ \pi + 2k\pi < \theta_3 < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \\ \frac{3\pi}{2} + 2k\pi < \theta_4 < 2\pi + 2k\pi \end{aligned}$$

其中:  $k \in \mathbb{Z}$ .

**说明:** 为直观, 各象限中的角在写法上通常以周内角为基础, 再加上周角的整数倍。

**例 1.4** 第二象限中的角的一半是第几象限中的角?

**解:**

$\therefore$  第二象限中的角  $\theta_2$  满足

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi < \theta_2 < \pi + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore \frac{\pi}{4} + k\pi < \frac{\theta_2}{2} < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

由此式可知:

- 当  $k$  为偶数时,  $\frac{\theta_2}{2}$  是第一象限中的角;
- 当  $k$  为奇数时,  $\frac{\theta_2}{2}$  是第三象限中的角 (图 1.9)。

$\therefore$  第一象限中的角的半角是第一或第三象限的角。

**评述:** 这类问题的思考方法是先求出  $\frac{\theta}{2}$  应满足的关系, 再结合图形对整数  $k$  进行讨论。

在实际问题中, 有时需要计算弧长和扇形的面积。

设圆的半径为  $R$  (图 1.10),  $\widehat{AB}$  所对的圆心角为  $n^\circ$  ( $n > 0$ ), 则:




图 1.9



- $\widehat{AB}$  的长

$$\ell = \frac{n}{360} \cdot 2\pi R$$

- 扇形  $\widehat{AOB}$  面积

$$S = \frac{n}{360} \cdot \pi R^2$$

- 若圆心角为  $\alpha$  弧度 ( $\alpha > 0$ ), 则:  $\widehat{AB}$  的长

$$\ell = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot 2\pi R = \alpha R$$

(或由公式  $\alpha = \ell/R$  直接得出)

- 扇形  $\widehat{AOB}$  的面积

$$S = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \pi R^2 = \frac{1}{2} \alpha R \cdot R = \frac{1}{2} \ell \cdot R$$




图 1.10




图 1.11

**例 1.5** 如图 1.11, 求公路弯道部分  $\widehat{AB}$  的长 (精确到 1 米, 图中的长度是米)

解:  $\because \alpha = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$

$\therefore \ell = \alpha R = \frac{\pi}{3} \cdot 45 = 3.14 \times 15 \approx 47(\text{米})$

答: 弯道部分  $\widehat{AB}$  的长约 47 米.

## 习题三

### A

1. 把下列各角化成“周内角 + 周角的整数倍”的形式, 并判定它们各是第几象限中的角或是在哪个坐标轴上的角:

- (1)  $\frac{155\pi}{4}$       (3)  $\frac{749\pi}{6}$       (5)  $-\frac{59\pi}{2}$       (7)  $-3900^\circ$   
 (2)  $101\pi$       (4)  $-\frac{338\pi}{3}$       (6)  $-\frac{148\pi}{5}$       (8)  $-265^\circ$

2. 与  $-\frac{26}{3}\pi$  的角终边相同的角的一般形式是\_\_\_\_, 其中最小的正角是\_\_\_\_, 最大的负角等于\_\_\_\_.

3. 第四象限中的角的一半是第几象限角?

4. 填表:

角 $\theta$ 所属象限	I	II	III	IV
角 $\frac{\theta}{2}$ 应属的象限				

5. 已知  $(4k+1)\pi < \alpha < (4k+1)\pi + \frac{\pi}{6}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), 则  $\alpha$ ,  $\frac{\alpha}{2}$ ,  $2\alpha$  各属第几象限?

6. (口答)

(1) 第二象限的角一定是钝角吗?

(2)  $y$  轴正半轴上的角一定是直角吗?

7. 直径是 20cm 的轮子, 每秒钟旋转 45 弧度, 求轮子上一定点经过 5 秒钟所转过的弧长。

8. 航海罗盘将圆周分成 32 等份, 把一份所对的圆心角的大小分别用度与弧度表示出来。

9. 某种蒸汽机上的飞轮直径为 1.2m, 每分钟按逆时针方向转 300 转, 求:

(1) 飞轮每秒钟转过的弧度数;

(2) 轮周上的一点每秒钟经过的弧长。

10. 要在半径  $OA = 100\text{cm}$  的圆形金属板上, 截取一块  $\widehat{AB}$  的长为 112cm 的扇形板, 应截取的圆心角  $AOB$  的度数是多少 (精确到  $1^\circ$ )?


11. 已知  $1^\circ$  的圆心角所对的弧长为 1m, 这个圆的半径是多少?

12. 已知长 50cm 的弧所对的圆心角为  $200^\circ$ , 求该弧所在圆的半径 (精确到 1cm)。

13. 回忆三角函数的定义，并口述  $30^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $60^\circ$  各三角函数的值。

### B

14. 写出与  $-\frac{5\pi}{3}$  终边相同的角的集合  $S$ ，并求出其中属于  $[-100\pi, 100\pi)$  的角共有多少个？
15. 如图所示：动点  $P$ 、 $Q$  同时从点  $A(r, 0)$  出发沿圆周运动。点  $P$  按逆时针方向每秒钟转  $\frac{\pi}{3}$  弧度，点  $Q$  按顺时针方向每秒钟转  $\frac{\pi}{6}$  弧度，试求点  $P, Q$  第一次相遇时所用的时间，所在的位置及各自走过的弧长。



(第 15 题)

## 1.3 任意角三角函数的定义

### 1.3.1 三角函数的定义

在初中，大家学过的三角函数是这样定义的：设  $P(x, y)$  是角  $\alpha$  ( $0 \leq \alpha < 2\pi$ ) 的终边  $OB$  上异于原点的任一点（图 1.12），记  $|OP| = r$  ( $r > 0$ )，则比值  $\frac{y}{r}$ ,  $\frac{x}{r}$ ,  $\frac{y}{x}$ ,  $\frac{x}{y}$  都是  $\alpha$  的函数，依次记为

$$\sin \alpha = \frac{y}{r}, \quad \cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x}, \quad \cot \alpha = \frac{x}{y}$$




图 1.12




图 1.13

在这个定义中, 角  $\alpha$  的取值范围是  $[0, 2\pi)$ 。为今后的需要, 现在把它推广到任意角的情况。同时为了研究三角函数的性质更加简便, 我们把点  $P(x, y)$  取在角  $\alpha$  的终边  $OB$  与单位圆 (以原点为圆心, 半径为 1 的圆) 的交点处 (图 1.13)。应注意, 点  $P$  选在此处不会影响上述四个比值的大小。为叙述方便, 今后我们把这个交点叫做角  $\alpha$  在单位圆上的对应点。于是得到

#### 定义

设  $\alpha$  是一个任意角, 它的终边  $OP$  与单位圆相交于点  $P(x, y)$ , 称

- $y$  为  $\alpha$  的正弦, 记为  $\sin \alpha = y$ ;
- $x$  为  $\alpha$  的余弦, 记为  $\cos \alpha = x$ ;
- $\frac{y}{x}$  为  $\alpha$  的正切, 记为  $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ ;
- $\frac{x}{y}$  为  $\alpha$  的余切, 记为  $\cot \alpha = \frac{x}{y}$ ;
- $\frac{1}{x}$  为  $\alpha$  的正割, 记为  $\sec \alpha = \frac{1}{x}$ ;
- $\frac{1}{y}$  为  $\alpha$  的余割, 记为  $\csc \alpha = \frac{1}{y}$ 。

**说明:** 当角  $\alpha$  给定以后,  $x$ 、 $y$  都被唯一确定, 从而上述六个代数式  $y$ ,  $x$ ,  $\frac{y}{x}$ ,  $\frac{x}{y}$ ,  $\frac{1}{x}$ ,  $\frac{1}{y}$  的值除去有时分母为零以外都是唯一确定的。所以, 它们都是  $\alpha$  的函数。这些函数统称三角函数。

**例 1.6** 求下列各角  $\alpha$  的六个三角函数值:

- (1) 0                      (2)  $\frac{\pi}{2}$                       (3)  $\pi$                       (4)  $\frac{3\pi}{2}$

解：作单位圆，标出这些角对应的点（图 1.14）




图 1.14

- (1)  $\alpha = 0$  对应的点为  $A(1, 0)$ ，即  $x = 1, y = 0$

$\therefore \sin 0 = 0, \cos 0 = 1, \tan 0 = 0, \cot 0$  不存在,  $\sec 0 = 1, \csc 0$  不存在

- (2)  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  对应的点为  $B(0, 1)$ ，即  $x = 0, y = 1$

$\therefore \sin \frac{\pi}{2} = 1, \cos \frac{\pi}{2} = 0, \tan \frac{\pi}{2}$  不存在,  $\cot \frac{\pi}{2} = 0,$

$\sec \frac{\pi}{2}$  不存在,  $\csc \frac{\pi}{2} = 1$

- (3)  $\alpha = \pi$  对应的点为  $C(-1, 0)$ ，即  $x = -1, y = 0$

$\therefore \sin \pi = 0, \cos \pi = -1, \tan \pi = 0, \cot \pi$  不存在,  $\sec \pi = -1, \csc \pi$  不存在

- (4)  $\alpha = \frac{3\pi}{2}$  对应的点为  $D(0, -1)$ ，即  $x = 0, y = -1$

$\therefore \sin \frac{3\pi}{2} = -1, \cos \frac{3\pi}{2} = 0, \tan \frac{3\pi}{2}$  不存在,  $\cot \frac{3\pi}{2} = 0,$

$\sec \frac{3\pi}{2}$  不存在,  $\csc \frac{3\pi}{2} = -1$

例 1.7 求下列各角的六个三角函数的值：

- (1)  $\frac{\pi}{3}$                       (2)  $\frac{3\pi}{4}$                       (3)  $\frac{5\pi}{4}$                       (4)  $\frac{5\pi}{3}$

解：作单位圆，标出这些角对应的点（图 1.15）




图 1.15

(1)  $\frac{\pi}{3}$  对应的点为  $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ,

$$\therefore \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, \quad \cot \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sec \frac{\pi}{3} = 2, \quad \csc \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\sqrt{3}$$

(2)  $\frac{3\pi}{4}$  对应的点为  $Q\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ,

$$\therefore \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan \frac{3\pi}{4} = -1, \quad \cot \frac{3\pi}{4} = -1$$

$$\sec \frac{3\pi}{4} = -\sqrt{2}, \quad \csc \frac{3\pi}{4} = \sqrt{2}$$

(3)  $\frac{5\pi}{4}$  对应的点为  $R\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ,

$$\therefore \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan \frac{5\pi}{4} = 1, \quad \cot \frac{5\pi}{4} = 1$$

$$\sec \frac{5\pi}{4} = -\sqrt{2}, \quad \csc \frac{5\pi}{4} = -\sqrt{2}$$

(4)  $\frac{5\pi}{3}$  对应的点为  $S\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ,

$$\therefore \sin \frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \tan \frac{5\pi}{3} = -\sqrt{3}, \quad \cot \frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sec \frac{5\pi}{3} = 2, \quad \csc \frac{5\pi}{3} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

## 1.3.2 三角函数值的几何表示——三角函数线

先简介有向线段的概念。

我们知道，坐标轴是规定了方向的直线。线段也可以规定方向。如图 1.16 中，在  $x$  轴上的线段  $AB$  就可以规定两种相反的方向：以  $A$  为始点以  $B$  为终点（记为  $\overrightarrow{AB}$ ），或者以  $B$  为始点以  $A$  为终点（记为  $\overrightarrow{BA}$ ）。同样，与  $y$  轴平行的线段  $CD$  也可以规定两种方向：以  $C$  为始点以  $D$  为终点（记为  $\overrightarrow{CD}$ ），或者以  $D$  为始点以  $C$  为终点（记为  $\overrightarrow{DC}$ ）。如果这条线段的方向与坐标轴的正方向相一致，我们规定用一个正数来表示它，否则就用一个负数来表示它。如上述有向线段可以分别表示成  $\overrightarrow{AB} = +3$ ,  $\overrightarrow{BA} = -3$ ,  $\overrightarrow{CD} = -4$ ,  $\overrightarrow{DC} = +4$  等。象这样规定了方向的线段，称为有向线段。

现在，我们用有向线段来表示三角函数的值。




图 1.16




图 1.17

设角  $\alpha$  的终边与单位圆相交于  $P(x, y)$ 。过点  $P$  分别作  $PM \perp y$  轴于点  $M$ ,  $PN \perp x$  轴于点  $N$  (图 1.17)。则有向线段

$$\overrightarrow{OM} = y, \quad \overrightarrow{ON} = x$$

因此，可以把  $\overrightarrow{OM}$  和  $\overrightarrow{ON}$  分别看作是  $\sin \alpha = y$  和  $\cos \alpha = x$  的几何形式。今后把  $\overrightarrow{OM}$  叫做角  $\alpha$  的正弦线，把正弦线所在的直径  $\overrightarrow{DC}$  叫做正弦轴。同样，把  $\overrightarrow{ON}$  叫做角  $\alpha$  的余弦线，把余弦线所在直径  $BA$  叫做余弦轴。

## 思考题 1

你能画出角  $\alpha$  的具有代表性的各种情况下的正弦线和余弦线吗？（提示：各有八种情况）

## 思考题 2

当角  $\alpha$  从 0 增加到  $2\pi$  时, 试根据正弦线  $\overrightarrow{OM}$  (余弦线  $\overrightarrow{ON}$ ) 变化的规律, 说出正弦值 (余弦值) 增、减变化的规律。

现在研究正切值的几何形式。

角  $\alpha$  的正切  $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ , 欲用一条有向线段表示比值  $\frac{y}{x}$  是困难的。为此, 先作变形:

$$\tan \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\bar{y}}{1} \quad (*)$$

从图 1.18 可以想到, 只要能把  $\bar{y}$  表示出来, 目标就达到了。由比例式 (\*) 可以看出, 过点 A 作圆的切线  $GG'$ , 连  $OP$  并延长与  $GG'$  交于  $T$ , 有

$$\frac{y}{x} = \frac{\overrightarrow{AT}}{\overrightarrow{OA}} = \frac{\overrightarrow{AT}}{1} = \overrightarrow{AT}$$

由此, 可以把  $\overrightarrow{AT}$  叫做角  $\alpha$  的**正切线**,  $\overrightarrow{AT}$  所在的圆的切线  $GG'$  叫做**正切轴**, 其方向与  $y$  轴相同。应该注意的是  $\overrightarrow{AT}$  的始点是点 A。终点  $T$  是  $OP$  或其反向延长线与正切轴  $G'G$  的交点。




图 1.18

## 思考题 3

你能画出在各种情况下的具有代表性的正切线吗? (也有八种情况)



## 思考题 4

当角  $\alpha$  从 0 增加到  $2\pi$  时, 试根据  $\overrightarrow{AT}$  的变化规律说出正切值增、减变化的规律。

## 问 1

类比正切线的探寻过程, 你能找到余切值的几何形式——余切线吗?

事实上由

$$\cot \alpha = \frac{x}{y} = \frac{\bar{x}}{1}$$

由此想到过点  $B$  作圆的切线  $C'C$ , 连  $OP$  并延长交  $C'C$  于  $Q$ , 过  $Q$  作  $QD \perp Ox$  轴 (图 1.19), 则  $\overrightarrow{OD} = \bar{x}$ , 从而

$$\frac{x}{y} = \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{BQ}$$

我们把  $\overrightarrow{BQ}$  叫做角  $\alpha$  的余切线,  $\overrightarrow{BQ}$  所在的圆的切线叫做余切轴, 它的方向与  $x$  轴同向。应该注意, 余切线的始点为  $B$ , 终点  $Q$  则是半径  $OP$  或其反向延长线与余切轴  $CC'$  的交点。




图 1.19

## 思考题 5

请画出在各种情况下具有代表性的余切线, 并根据当角  $\alpha$  从 0 增加到  $2\pi$  时, 余切线变化的规律说出余切值增、减变化的规律。

以上, 对  $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ 、 $\cot \alpha$  分别定义了它们的函数线。应明确: 每种三角函数的定义及其相应的函数线之间的对应都是数与形的对应。如对  $\sin \alpha = y$

来说， $y$  是它的代数形式，正弦线  $\overrightarrow{OM}$  是它的几何形式。两种形式各具特色，各有所用，代数形式便于运算，几何形式形象直观。

习题四

A

1. 填表：

$\alpha$	单位圆上 对应点的坐标是	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$	$\sec \alpha$	$\csc \alpha$
$\frac{3\pi}{4}$	$P_1( \quad )$						
$\frac{5\pi}{4}$	$P_2( \quad )$						
$\frac{7\pi}{4}$	$P_3( \quad )$						
$\frac{2\pi}{3}$	$P_4( \quad )$						
$\frac{4\pi}{3}$	$P_5( \quad )$						
$\frac{5\pi}{6}$	$P_6( \quad )$						
$\frac{7\pi}{8}$	$P_7( \quad )$						

2. 分别作出下列各角的正弦线、余弦线、正切线、余切线：

(1)  $\frac{\pi}{3}$

(2)  $\frac{5\pi}{6}$

(3)  $-\frac{2\pi}{3}$

(4)  $-\frac{13\pi}{6}$

3. 以 2cm 为“单位长”作单位圆，再分别作出角  $\alpha$  等于  $\frac{\pi}{6}$ 、 $\frac{5\pi}{4}$ 、 $\frac{11\pi}{6}$  的正弦线、余弦线、正切线、余切线，量出它们的长度，据此长度把相应的正弦值、余弦值、正切值和余切值（精确到 0.1）填入下表之中：

角 $\alpha$	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$
$\frac{\pi}{6}$				
$\frac{5\pi}{4}$				
$\frac{11\pi}{6}$				

## B

4. 仍以 2cm 为“单位长”作单位圆, 再作出  $\alpha = 230^\circ$  的正弦线、余弦线、正切线、余切线, 量出其长, 据此写出  $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ 、 $\cot \alpha$  的值。由此, 你能悟出什么道理?

## 1.4 由定义和三角函数线观察三角函数的某些性质

为了进行三角函数值的计算, 本节对三角函数的某些性质先从直观上作初步的探究。

### 1.4.1 定义域

根据三角函数的定义 (图 1.20)

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= y, & \cos \alpha &= x \\ \tan \alpha &= \frac{y}{x}, & \cot \alpha &= \frac{x}{y} \\ \sec \alpha &= \frac{1}{x}, & \csc \alpha &= \frac{1}{y}\end{aligned}$$

可以看出:

对于正 (余) 弦, 不论  $\alpha$  为何实数, 整式  $y$ 、 $x$  都有意义,

$\therefore \sin \alpha, \cos \alpha$  的定义域为  $\alpha \in \mathbb{R}$ ;

对于正切与正割, 除去  $y$  轴上的点以外, 分式  $\frac{y}{x}, \frac{1}{x}$  都有意义,

$\therefore \tan \alpha$  的定义域为  $\alpha \in \mathbb{R}$  且  $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ,

对于余切与余割, 除去  $x$  轴上的点以外, 分式  $\frac{x}{y}, \frac{1}{y}$  都有意义,

$\therefore \cot \alpha, \csc \alpha$  的定义域为  $\alpha \in \mathbb{R}$ , 且  $\alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。




图 1.20

### 1.4.2 函数值的符号和取值范围 (函数的值域)

从三角函数线的变化规律以及正 (余) 割的定义可以看出, 当角  $\alpha$  在各自定义域上变化时, 其函数值的取值范围如下表所示, 其函数值在四个象限中的符号如图 1.21 所示。

函数名称	定义式	定义域	值域
$\sin \alpha$	$y$	$\alpha \in \mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos \alpha$	$x$	$\alpha \in \mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan \alpha$	$\frac{y}{x}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$	$(-\infty, +\infty)$
$\cot \alpha$	$\frac{x}{y}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$	$(-\infty, +\infty)$
$\sec \alpha$	$\frac{1}{x}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
$\csc \alpha$	$\frac{1}{y}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ 且 $\alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$




图 1.21

1.4.3 诱导公式

$f(\alpha + 2k\pi)$  与  $f(\alpha)$  之间的关系

为叙述方便，以下统一用  $f(\alpha)$  表示角  $\alpha$  的六个三角函数。欲求  $f(\alpha + 2k\pi)$  与  $f(\alpha)$  之关系，只要弄清楚角  $\alpha$  与  $\alpha + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$  的对应点在单位圆上的位置关系就行了。据 1.2 节的定理，这两个对应点在单位圆上重合，即它们的直角坐标完全相同。

$$\therefore f(\alpha + 2k\pi) = f(\alpha)$$

这样，就得到了

## 公式 (一)

$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin \alpha \quad \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos \alpha$$

$$\tan(\alpha + 2k\pi) = \tan \alpha \quad \cot(\alpha + 2k\pi) = \cot \alpha$$

$$\sec(\alpha + 2k\pi) = \sec \alpha \quad \csc(\alpha + 2k\pi) = \csc \alpha$$

其中,  $k \in \mathbb{Z}$ .

由于“ $2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )”是周角的整数倍, 这组公式表明: 在计算三角函数值的时候, 周角的整数倍可以“去掉”。特别地, 当  $\alpha$  是周内角时, 这组公式的功能在于: 能把周外角的函数化为周内角的函数, 从而能简化函数性质的研究和计算。

 $f(-\alpha)$  与  $f(\alpha)$  之间的关系

$\because$  角  $\alpha$  与  $(-\alpha)$  的对应点  $P(x, y)$  与  $P'(x', y')$  关于  $x$  轴对称 (图 1.22)

$\therefore x = x', \quad y = -y'$

从而, 得到:

## 公式 (二)

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(-\alpha) = +\cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha \quad \cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$

$$\sec(-\alpha) = +\sec \alpha \quad \csc(-\alpha) = -\csc \alpha$$

这组公式的功能在于: 能把负角的函数化为正角的函数, 从而能简化函数性质的研究和计算。




图 1.22




图 1.23

$f(\pi + \alpha)$  与  $f(\alpha)$  之间的关系

$\because$  角  $\alpha$  与  $(\pi + \alpha)$  的对应点  $P(x, y)$  与  $P'(x', y')$  关于原点对称 (图 1.23)

$$\therefore x = -x', \quad y = -y'$$

从而得到:

## 公式 (三)

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi + \alpha) = +\tan \alpha \quad \cot(\pi + \alpha) = +\cot \alpha$$

$$\sec(\pi + \alpha) = -\sec \alpha \quad \csc(\pi + \alpha) = -\csc \alpha$$

这组公式的功能: 能把  $(\pi + \alpha)$  的函数化为  $\alpha$  的函数, 特别, 当  $\alpha$  为锐角时, 运用它能把第 III 象限的角  $(\pi + \alpha)$  的函数一举化成锐角的函数, 从而能把函数简化。要记忆这组公式, 关键是记住公式右边的符号——它是视  $\alpha$  为锐角时原来函数  $f(\pi + \alpha)$  的值的符号。

 $f(\pi - \alpha)$  与  $f(\alpha)$  之间的关系

$\because$  角  $\alpha$  与  $(-\alpha)$  的对应点 P 与 Q 关于 x 轴对称, 而  $(-\alpha)$  与  $(-\alpha + \pi)$  的对应点 Q 与  $P'$  关于原点对称, 从而  $\alpha$  与  $(-\alpha + \pi)$  的对应点  $P(x, y)$  与  $P'(x', y')$  关于 y 轴对称 (图 1.24)

$$\therefore x = -x', \quad y = y'$$

这样, 就得到:

## 公式 (四)

$$\sin(\pi - \alpha) = +\sin \alpha \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha \quad \cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

$$\sec(\pi - \alpha) = -\sec \alpha \quad \csc(\pi - \alpha) = +\csc \alpha$$

## 思考题 1

你能指出公式 (四) 的功能以及记忆它的方法吗?

**思考题 2**

在公式(三)中, 以  $(-\alpha)$  代替  $\alpha$ , 再用公式(二)也能导出公式(四), 试试看, 这种做法合理吗?




图 1.24




图 1.25

 **$f(2\pi - \alpha)$  与  $f(\alpha)$  之间的关系**

$\because$  角  $(2\pi - \alpha)$  与  $(-\alpha)$  的对应点重合,  $(-\alpha)$  与  $\alpha$  的对应点关于  $x$  轴对称, 从而  $(2\pi - \alpha)$  与  $\alpha$  的对应点  $P'(x', y')$  与  $P(x, y)$  关于  $x$  轴对称 (图 1.25)

$$\therefore x = x', \quad y = -y'$$

由此就得到了:

**公式(五)**

$$\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(2\pi - \alpha) = +\cos \alpha$$

$$\tan(2\pi - \alpha) = -\tan \alpha \quad \cot(2\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

$$\sec(2\pi - \alpha) = +\sec \alpha \quad \csc(2\pi - \alpha) = -\csc \alpha$$

对于公式(五), 请做出类似于公式(三)的解释。

**思考题**

用公式(一)、(二)能推出公式(五)吗? 试试。

对于上述五组公式概括如下:

1. 从等号两边式子的结构上看, 两边角不同, 函数名称相同, 符号多数不同, 即公式给出了  $2k\pi + \alpha$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )、 $-\alpha$ 、 $\pi \pm \alpha$  和  $2\pi - \alpha$  的三角函数的值等于  $\alpha$  的同名三角函数值, 前面放上把  $\alpha$  视为锐角时原来函数值的符号;

2. 公式推导的基本方法是利用动点  $P(x, y)$  与  $P'(x', y')$  的对称性。从推导过程可见, 这些公式在各自函数的定义域上都是恒等式;
3. 联合使用这五组公式, 可以把任意角  $\alpha$  的三角函数的计算通过“去负”(把负角的函数化成正角的函数)、“去周”(把周角的整数倍去掉, 化成周内角的函数)、“化锐角”(把  $\pi \pm \alpha$ 、 $2\pi - \alpha$  的函数化为锐角  $\alpha$  的函数)的方法, 最终诱导到锐角范围加以解决。因此, 这五组公式统称**诱导公式**。

**例 1.8** 确定下列函数值的符号:

$$(1) \sin\left(-7\frac{1}{3}\pi\right) \quad (2) \cot\frac{29\pi}{3} \quad (3) \sec\left(-\frac{781}{4}\pi\right)$$

解:

$$(1) \sin\left(-7\frac{1}{3}\pi\right) = -\sin\left(7\frac{1}{3}\pi\right) = -\sin\left(2\pi \cdot 3 + \frac{4}{3}\pi\right) = -\sin\frac{4\pi}{3} > 0$$

$$\text{另解: } \sin\left(-7\frac{1}{3}\pi\right) = \sin\left(-7\frac{1}{3}\pi + 8\pi\right) = \sin\frac{2\pi}{3} > 0$$

这个解法表明, 对于负角的三角函数值的计算“从右往左”使用公式(一)有时会更加简捷。

$$(2) \cot\frac{29\pi}{3} = \cot\left(8\pi + \frac{5\pi}{3}\right) = \cot\frac{5\pi}{3} < 0$$

$$(3) \sec\left(-\frac{781}{4}\pi\right) = \sec\left(194\pi + \frac{5\pi}{4}\right) = \sec\frac{5\pi}{4} < 0$$

**例 1.9** 给角求函数值:

$$(1) \tan\left(-\frac{251\pi}{6}\right) \quad (2) \cos\left(-\frac{52\pi}{3}\right) \quad (3) \csc\left(-\frac{71\pi}{4}\right)$$

解:

$$(1) \tan\left(-\frac{251\pi}{6}\right) = \tan\left(-41\frac{5}{4}\pi\right) = \tan\left(-41\frac{5}{6}\pi + 42\pi\right) = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$(2) \cos\left(-\frac{52\pi}{3}\right) = \cos\frac{52\pi}{3} = \cos\left(16\pi + \pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$(3) \csc\left(-\frac{71\pi}{4}\right) = \csc\left(-17\frac{3}{4}\pi + 18\pi\right) = \csc\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sin\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}$$



## 习题五

## A

1. 确定下列函数值的符号:

$$(1) \cos \frac{16}{5}\pi$$

$$(3) \sin \left( -\frac{4\pi}{3} \right)$$

$$(2) \cot \left( -\frac{17\pi}{8} \right)$$

$$(4) \sin \left( -\frac{67\pi}{12} \right)$$

2. 求下列各三角函数的值:

$$(1) \tan \frac{19\pi}{3}$$

$$(3) \tan \left( -\frac{15\pi}{4} \right)$$

$$(5) \csc \left( -\frac{25\pi}{3} \right)$$

$$(2) \cot \left( -\frac{29\pi}{4} \right)$$

$$(4) \sec \left( -\frac{11\pi}{3} \right)$$

3. 计算:

$$(1) \cos \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{4} + \frac{3}{4} \tan^2 \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{6} + \sin \frac{3\pi}{2}$$

$$(2) \sin^4 \frac{\pi}{4} - \cos^2 \frac{\pi}{2} + 6 \tan^2 \frac{3\pi}{4}$$

$$(3) 7 \cos 270^\circ + 12 \sin 0^\circ + 2 \cot 90^\circ - 8 \sec 180^\circ$$

4. 化简:

$$(1) a^2 \cos 2\pi - b^2 \sin \frac{3\pi}{2} + ab \cos \pi - ab \csc \frac{\pi}{2}$$

$$(2) m \tan 0 + n \cos \frac{\pi}{2} - p \sin \pi - q \cos \frac{3\pi}{2} - r \sin 2\pi$$

$$(3) -p^2 \sec 180^\circ + q^2 \sin 90^\circ - 2pq \cos 0^\circ$$

5. 根据已知条件计算下式的值:

$$\sin \left( t + \frac{\pi}{4} \right) + 2 \sin \left( t - \frac{\pi}{4} \right) - 4 \cos 2t + 3 \cos \left( t + \frac{3}{4}\pi \right)$$

$$(1) t = \frac{\pi}{4}$$

$$(2) t = \frac{3\pi}{4}$$

6. 确定下列各函数值的符号:

- |                             |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| (1) $\sin 7.6\pi$           | (4) $\tan\left(-\frac{23\pi}{4}\right)$  | (7) $\cos 3$  |
| (2) $\cos 101.2\pi$         | (5) $\cos\left(-\frac{59}{17}\pi\right)$ | (8) $\tan 4$  |
| (3) $\tan 88\frac{1}{5}\pi$ | (6) $\sin 2$                             | (9) $\cot 5$  |
|                             |  | (10) $\csc 6$ |

7. 确定下列各式的符号:

- (1)  $\sin \frac{5\pi}{4} \cdot \cos \frac{4\pi}{5} \cdot \tan \frac{11\pi}{6}$
- (2)  $\frac{\sec \frac{5}{6}\pi \cdot \tan \frac{11}{6}\pi}{\csc \frac{2}{3}\pi}$

例 1.10 判断角  $\alpha$  的对应点  $P$  所在的象限:

- (1)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha > 0$
- (2)  $\frac{\tan \alpha}{\sec \alpha} < 0$

解:

- (1)  $\because \sin \alpha \cdot \cos \alpha > 0$

$\therefore \sin \alpha$  与  $\cos \alpha$  同号. 由图 1.26 知  $\alpha$  对应的点在第 I 或第 III 象限.




图 1.26




图 1.27

- (2)  $\because \frac{\tan \alpha}{\sec \alpha} < 0$

$\therefore \tan \alpha$  与  $\sec \alpha$  异号, 由图 1.27 知  $\alpha$  对应的点在第 III 或第 IV 象限.

例 1.11 已知角的范围和角的函数值, 求角:

(1)  $\alpha$  为周内角, 且  $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ,

(4)  $\alpha$  为周内角, 且  $\cot \alpha = -\sqrt{3}$ ,

(2)  $\alpha$  为周内角, 且  $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ ,

(5)  $\alpha$  为第 II 象限角, 且  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

(3)  $\alpha$  为周内角, 且  $\tan \alpha = -\sqrt{3}$ ,

解:

(1) 据  $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ,

(2) 据  $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ ,

作正弦线  $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}$  (图 1.28)

作余弦线  $\overrightarrow{ON} = -\frac{1}{2}$  (图 1.29)

$\therefore \alpha$  是周内角,

$\therefore \alpha$  是周内角,

$\therefore \alpha_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \alpha_2 = \frac{5\pi}{6}$ .

$\therefore \alpha_1 = \frac{2\pi}{3}, \quad \alpha_2 = \frac{4\pi}{3}$ .




图 1.28




图 1.29




图 1.30




图 1.31

(3) 据  $\tan \alpha = -\sqrt{3}$ ,作正切线  $\overrightarrow{AT} = -\sqrt{3}$  (图 1.30) $\therefore \alpha$  是周内角,

$$\therefore \alpha_1 = \frac{2\pi}{3}, \quad \alpha_2 = \frac{5\pi}{3}.$$

(4) 据  $\cot \alpha = -\sqrt{3}$ ,作余切线  $\overrightarrow{BG} = -\sqrt{3}$  (图 1.31) $\therefore \alpha$  是周内角,

$$\therefore \alpha_1 = \frac{5}{6}\pi, \quad \alpha_2 = \frac{11}{6}\pi.$$

(5) 据  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,作余弦线  $\overrightarrow{ON} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  (图 1.32) $\therefore \alpha$  为第 II 象限角, 可先求出周内角  $\alpha_1 = \frac{5}{6}\pi$ , 从而

$$\alpha = \frac{5}{6}\pi + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$




图 1.32

**评述:** 这类问题的解题步骤概括为:

1. 据函数值, 先画出相应的函数线;
2. 据函数线, 定出相应角的对应点 (一般有两个);
3. 据对应点写出相应的周内角 (角的特解);
4. 由“特解  $+2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )”得到角的通解。

## 习题六

### A

1. 根据下列条件, 确定  $\alpha$  属于哪个象限内的角?

(1)  $\sin \alpha < 0$  且  $\cos \alpha > 0$

(4)  $\cos \alpha \cdot \tan \alpha < 0$

(2)  $\sec \alpha < 0$  且  $\cot \alpha < 0$

(5)  $\frac{\sin \alpha}{\cot \alpha} > 0$

(3)  $\sin \alpha \cdot \tan \alpha > 0$

(6)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha > 0$

2. 指出下列情况下,  $\alpha$  的对应点  $P$  的位置:

(1)  $|\sin \alpha| = \sin \alpha$

(3)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = 0$

(2)  $|\cos \alpha| = -\cos \alpha$

3. 求适合下列条件的周内角：

(1)  $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

(3)  $\tan \alpha = -1$

(2)  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

(4)  $\cot \alpha = \sqrt{3}$

4. 求满足下列条件的角：

(1)  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 且  $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$

(3)  $\cot \alpha = 1$ , 且  $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

(2)  $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$ , 且  $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

(4)  $\tan \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ , 且  $-2\pi < \alpha < 2\pi$

5. 求满足下列条件的角  $\alpha$  的集合

(1)  $\cot \alpha + \sqrt{3} = 0$

(3)  $2 \sin^2 \alpha = 1$

(2)  $\cos(\pi - \alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

## B

6. 把圆心角为下列弧度的对应点标在单位圆上：

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = 2, \quad \alpha_3 = 3, \quad \alpha_4 = 4, \quad \alpha_5 = 5$$

7. 根据下列条件作出相应的函数线，再用量角器量出相应的周内角  $\alpha$ ：

(1)  $\tan \alpha = -2$

(2)  $\cos \alpha = -0.4$

(3)  $\cot \alpha = -4$

## 1.5 同角函数的基本关系

### 问 1

根据任意角三角函数的定义

$$\begin{aligned} \sin \alpha = y, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x}, \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \\ \cos \alpha = x, \quad \cot \alpha = \frac{x}{y}, \quad \csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \end{aligned}$$

参照图 1.33, 你能发现同一个角  $\alpha$  的六个三角函数之间的关系吗?

从六个定义的表达式可以看出:

(1) 三个倒数关系

$$\begin{cases} \sin \alpha \cdot \csc \alpha = 1 \\ \cos \alpha \cdot \sec \alpha = 1 \\ \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \end{cases}$$

(2) 三个平方关系

$$\begin{cases} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \\ 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha \\ 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha \end{cases}$$

(3) 六个乘积关系

$$\begin{cases} \sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha \xrightarrow{\text{商关系}} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \\ \cos \alpha = \cot \alpha \cdot \sin \alpha \xrightarrow{\text{商关系}} \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \\ \tan \alpha = \sin \alpha \cdot \sec \alpha \\ \cot \alpha = \cos \alpha \cdot \csc \alpha \\ \sec \alpha = \tan \alpha \cdot \csc \alpha \\ \csc \alpha = \cot \alpha \cdot \sec \alpha \end{cases}$$




图 1.33

说明:

1. 公式的发现及证明

根据三角函数定义的表达式容易发现并证明这些公式;

## 2. 公式适用的条件

每个公式都是其定义域上的恒等式，即只要角  $\alpha$  使等号两边的函数都有意义，等式就成立。今后凡说到“恒等式”都是指这个意思；

## 3. 公式的实质及功能

三组公式反映了同一个角  $\alpha$  的六个三角函数之间的关系，通常称作**同角函数的基本公式**。在三角函数式的恒等变形（又称三角变换）中有着广泛的应用。这里要注意：“同角”应作广义的理解，如  $3\alpha$  与  $3\alpha$  是同角， $\left(5\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$  与  $\left(5\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$  也是同角；

## 4. 公式的简记法

利用图 1.34 可以巧妙地记住这些公式（“形象记忆法”）




图 1.34

- 倒数关系  $\xleftrightarrow{\text{对应}}$  三条对角线（每条对角线两端的函数成倒数关系）；
- 平方关系  $\xleftrightarrow{\text{对应}}$  三个倒三角形（阴影所示）（倒三角形中，上边两顶点的函数的平方和等于下边顶点上函数的平方）；
- 乘积关系  $\xleftrightarrow{\text{对应}}$  相邻三顶点（每个顶点上的函数等于相邻两顶点上函数的乘积）。

**例 1.12** 已知  $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ， $\alpha$  是第 II 象限角，求  $\alpha$  的其余三角函数值。

**分析：**图 1.34 是基本公式的总汇，利用它解这类题是很方便的。

**解：**由  $\sin \alpha = \frac{4}{5} \Rightarrow \csc \alpha = \frac{5}{4}$ （图 1.35）（以下出路在于抓住一个“倒三角形”，

由  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ， $\alpha \in \text{II 象限} \Rightarrow \cos \alpha < 0$

$$\therefore \cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\frac{3}{5} \Rightarrow \sec \alpha = -\frac{5}{3}$$

（以下利用乘积关系）

$$\tan \alpha = \sin \alpha \cdot \sec \alpha = \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{4}{3} \Rightarrow \cot \alpha = -\frac{3}{4}$$




图 1.35




图 1.36

**例 1.13** 已知  $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$ , 求  $\alpha$  的其余三角函数值.

**分析:**  $\alpha$  未加限制, 由题知  $\alpha \in \text{II}$  或  $\text{III}$  象限. 可以先做  $\alpha \in \text{II}$  象限的情况, 然后适当改变正、负号就能得出后一种情况.

**解:**

(1) 当  $\alpha \in \text{II}$  象限时 (图 1.36), 由  $\cos \alpha = -\frac{8}{17} \Rightarrow \sec \alpha = -\frac{17}{8}$ . 利用  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ , 得:

$$\sin \alpha = +\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(-\frac{8}{17}\right)^2} = \frac{15}{17} \Rightarrow \csc \alpha = \frac{17}{15}$$

$$\tan \alpha = \sin \alpha \cdot \sec \alpha = \frac{15}{17} \left(-\frac{17}{8}\right) = -\frac{15}{8} \Rightarrow \cot \alpha = -\frac{8}{15}$$

(2) 当  $\alpha \in \text{III}$  象限时,

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= -\frac{15}{17}, & \cos \alpha &= -\frac{17}{8}, & \tan \alpha &= \frac{15}{8} \\ \cot \alpha &= \frac{8}{15}, & \sec \alpha &= -\frac{17}{8}, & \csc \alpha &= -\frac{17}{15} \end{aligned}$$

**例 1.14** 已知  $\cot \alpha = m$  ( $m \neq 0$ ), 求  $\cos \alpha$ .

**分析:**

(1) 从图 1.37 可见:

$$\text{思路 1: } \cot \alpha = m \xrightarrow{\text{平方关系}} \csc \alpha \xrightarrow{\text{乘积关系}} \cos \alpha$$

$$\text{思路 2: } \cot \alpha = m \xrightarrow{\text{平方关系}} \csc \alpha \xrightarrow{\text{倒数关系}} \sin \alpha \xrightarrow{\text{乘积关系}} \cos \alpha$$

$$\text{思路 3: } \cot \alpha = m \xrightarrow{\text{倒数关系}} \tan \alpha \xrightarrow{\text{平方关系}} \sec \alpha \xrightarrow{\text{倒数关系}} \cos \alpha$$

相比之下, 思路 1 较简捷。






图 1.37

- (2) 利用平方关系求  $\csc \alpha$  时, 开平方涉及取正、负号. 我们把  $\csc \alpha$  符号相同的象限分作一组 (即分 I、II 象限与 III、IV 两种情况, 这样在表达上较简明.)

解:  $\because \cot \alpha = m \neq 0$

$\therefore \alpha$  的对应点不在坐标轴上。

- (1) 当  $\alpha \in \text{I、II 象限时}$ ,  $\csc \alpha = +\sqrt{1 + \cot^2 \alpha} = \sqrt{1 + m^2}$

利用乘积  $\cot \alpha = \cos \alpha \cdot \csc \alpha$  可得

$$\cos \alpha = \frac{\cot \alpha}{\csc \alpha} = \frac{m}{\sqrt{1 + m^2}} = \frac{m\sqrt{m^2 + 1}}{m^2 + 1}$$

- (2)  $\alpha \in \text{III、IV 象限时}$ ,  $\csc \alpha = -\sqrt{1 + \cot^2 \alpha} = -\sqrt{1 + m^2}$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{\cot \alpha}{\csc \alpha} = \frac{m}{-\sqrt{1 + m^2}} = \frac{-m\sqrt{1 + m^2}}{1 + m^2}$$

评述:

1. 此例的实质是用  $\cot \alpha (\neq 0)$  去表示  $\cos \alpha$ , 也就是用  $\alpha$  的某种函数去表示  $\alpha$  的其余函数。这种表示主要是出于计算上的需要。应该明确, 根据同角函数的基本关系, 这种表示总是可以实现的。
2. 以上三例中, 思路探寻都是借助图 1.34 进行的。这个“神奇的正六边形”不仅囊括了同角函数的全套公式, 而且形象地展示了它们之间的联系。这就为使用这些公式提供了极大的方便。
3. 开平方时要先判断  $\alpha$  的取值范围, 把取“+”号的分作一组, 把取“-”号的分作另一组。这可使表达简单明了。

例 1.15 用  $\csc \alpha$  表示  $\sec \alpha$ .




图 1.38

分析: 从图 1.38 可以看出

$$\text{思路 1: } \csc \alpha \xrightarrow{\text{平方关系}} \cot \alpha \xrightarrow{\text{倒数关系}} \tan \alpha \xrightarrow{\text{乘积关系}} \sec \alpha$$

$$\text{思路 2: } \csc \alpha \xrightarrow{\text{倒数关系}} \sin \alpha \xrightarrow{\text{平方关系}} \cos \alpha \xrightarrow{\text{倒数关系}} \sec \alpha$$

解: 要使  $\csc \alpha$  与  $\sec \alpha$  有意义, 知  $\alpha$  不是轴上的角。为表达简单, 记  $\csc \alpha = m$  ( $m \neq \pm 1$ )

利用  $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$ , 开平方 (分两种情况):

(1) 当  $\alpha \in \text{I, III 象限时}$ ,

$$\cot \alpha = \sqrt{\csc^2 \alpha - 1} = \sqrt{m^2 - 1} \neq 0 \Rightarrow \tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{m^2 - 1}}$$

$$\therefore \sec \alpha = \tan \alpha \cdot \csc \alpha = \frac{m}{\sqrt{m^2 - 1}} = \frac{m\sqrt{m^2 - 1}}{m^2 - 1}$$

(2) 当  $\alpha \in \text{II, IV 象限时}$ ,

$$\cot \alpha = -\sqrt{-\csc^2 \alpha - 1} = -\sqrt{m^2 - 1} \neq 0 \Rightarrow \tan \alpha = \frac{-1}{\sqrt{m^2 - 1}}$$

$$\therefore \sec \alpha = \tan \alpha \cdot \csc \alpha = \frac{-m}{\sqrt{m^2 - 1}} = \frac{-m\sqrt{m^2 - 1}}{m^2 - 1}.$$

## 习题七

1. 确定下列函数值的符号:

(1)  $\sin 4$

(2)  $\cos 5$

(3)  $\tan 8$

(4)  $\cot(-3)$

2. 根据下列条件, 求  $\alpha$  的其余函数值:

$$(1) \sin \alpha = \frac{1}{2}, \text{ 且 } \alpha \in \text{I 象限} \quad (3) \cot \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$(2) \cos \alpha = -\frac{4}{5}, \text{ 且 } \alpha \in \text{III 象限} \quad (4) \tan \alpha = \frac{1}{2}$$

$$3. (1) \text{ 已知 } \cos \theta = \frac{12}{13}, \text{ 且 } \theta \in \text{IV 象限}, \text{ 求 } \sec \theta, \tan \theta$$

$$(2) \text{ 已知 } \sin \alpha = -\frac{1}{3}, \text{ 求 } \cos \alpha, \tan \alpha$$

$$4. (1) \text{ 已知 } \tan \alpha = \sqrt{3}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}, \text{ 求 } \cos \alpha - \sin \alpha.$$

$$(2) \text{ 已知 } \cos \alpha = \frac{4}{5}, \text{ 求 } \sec^2 \alpha + \csc^2 \alpha.$$

$$5. \text{ 已知 } \sin x = 2 \cos x, \text{ 求角 } x \text{ 的六个函数值.}$$

$$6. (1) \text{ 已知 } \cos \theta \neq 0, \text{ 且 } \cos \theta \neq \pm 1, \text{ 用 } \cos \theta \text{ 表示 } \theta \text{ 的其余函数值;}$$

$$(2) \text{ 已知 } \tan \alpha \neq 0, \text{ 用 } \tan \alpha \text{ 表示 } \sin \alpha.$$

## B

$$7. \text{ 已知 } \csc \alpha = t, \text{ 求 } \cos \alpha.$$

$$8. \text{ 已知 } \alpha \in (0, 2\pi), \text{ 利用三角函数线证明: } |\sin \alpha| + |\cos \alpha| \text{ 不可能小于 } 1.$$

$$9. \text{ 已知 } \alpha \text{ 是锐角, 利用三角函数线证明 } \sin \alpha < \tan \alpha.$$

现在集中讲三角函数式的化简。

力求简捷是数学的特征。对一个三角函数式来说，当然希望它的结果要尽量简单：所包含的角应尽量统一成同角，函数种类和运算种类都要尽量少，字母的次数要尽量低，能求值的应求出值，出现根式要化简，这就是对三角函数式“化简”的一般要求。

此外，当涉及到算术平方根的时候，在过程的表达上首先应把

$$\sqrt{a^2} \xrightarrow{\text{写成}} |a|$$

然后，再视情况进一步把

$$|a| \xrightarrow{\text{写成}} \begin{cases} a, & \text{当 } a \geq 0 \\ -a, & \text{当 } a < 0 \end{cases}$$

这种规范的要求，对减少失误是有益的。

**例 1.16** 化简：

$$(1) \frac{\sin \alpha + \cot \alpha}{\tan \alpha + \csc \alpha}$$

$$(2) \frac{\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$$

解:

(1)

$$\begin{aligned} & \frac{\sin \alpha + \cot \alpha}{\tan \alpha + \csc \alpha} && \text{(分析: 函数种类多, 化为正余弦)} \\ &= \frac{\sin \alpha + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}}{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{1}{\sin \alpha}} && \text{(分子、分母同乘以 } \sin \alpha \cos \alpha \text{)} \\ &= \frac{\sin^2 \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos \alpha} = \frac{\cos \alpha (\sin^2 \alpha + \cos \alpha)}{\sin^2 \alpha + \cos \alpha} = \cos \alpha \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \frac{\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} &= \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)}{\sin \alpha + \cos \alpha} \\ &= \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)(\sin \alpha - \cos \alpha)}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \sin \alpha - \cos \alpha \end{aligned}$$

例 1.17 化简:

$$(1) \sqrt{1 - \sin^2 100^\circ}$$

$$(4) \sqrt{\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}} - \sqrt{\frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha}}$$

( $\alpha \in \text{II 象限}$ )

$$(2) \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}$$

$$(3) \frac{\sec \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} + \frac{2 \tan \alpha}{\sqrt{\sec^2 \alpha - 1}}$$

解:

$$(1) \sqrt{1 - \sin^2 100^\circ} = \sqrt{1 - \sin^2 80^\circ} = \sqrt{\cos^2 80^\circ} = |\cos 80^\circ| = \cos 80^\circ$$

$$(2) \sqrt{\sec^2 \alpha - 1} = \sqrt{\tan^2 \alpha} = |\tan \alpha|$$

(3)

$$\begin{aligned}
 & \frac{\sec \alpha}{\sqrt{1+\tan^2 \alpha}} + \frac{2 \tan \alpha}{\sqrt{\sec^2 \alpha - 1}} \quad (\text{可以看出: } \alpha \text{ 是象限中的角}) \\
 &= \frac{\sec \alpha}{\sqrt{\sec^2 \alpha}} + \frac{2 \tan \alpha}{\sqrt{\tan^2 \alpha}} \\
 &= \frac{\sec \alpha}{|\sec \alpha|} + \frac{2 \tan \alpha}{|\tan \alpha|} = \begin{cases} 3, & \text{当 } \alpha \in \text{I 象限} \\ -3, & \text{当 } \alpha \in \text{II 象限} \\ 1, & \text{当 } \alpha \in \text{III 象限} \\ -1, & \text{当 } \alpha \in \text{IV 象限} \end{cases}
 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 & \sqrt{\frac{1+\sin \alpha}{1-\sin \alpha}} - \sqrt{\frac{1-\sin \alpha}{1+\sin \alpha}} \quad (\alpha \in \text{II 象限}) \\
 &= \sqrt{\frac{(1+\sin \alpha)^2}{1-\sin^2 \alpha}} - \sqrt{\frac{(1-\sin \alpha)^2}{1-\sin^2 \alpha}} \\
 & \quad (\text{这一步至关重要! 目的是把被开方式变成完全平方}) \\
 &= \sqrt{\frac{(1+\sin \alpha)^2}{\cos^2 \alpha}} - \sqrt{\frac{(1-\sin \alpha)^2}{\cos^2 \alpha}} \\
 &= \frac{1+\sin \alpha}{|\cos \alpha|} - \frac{1-\sin \alpha}{|\cos \alpha|} \\
 & \quad (\text{由于 } \alpha \in \text{II 象限, 所以 } \sin \alpha \in (0, 1) \Rightarrow 1 \pm \sin \alpha > 0) \\
 &= \frac{2 \sin \alpha}{|\cos \alpha|} = \frac{2 \sin \alpha}{-\cos \alpha} = -2 \tan \alpha
 \end{aligned}$$

**例 1.18** 化简:  $\frac{\sin(2\pi - \alpha) \tan(\pi + \alpha) \cot(-\alpha - 5\pi)}{\cos(\pi - \alpha) \tan(13\pi - \alpha)}$

**分析:** 不用角多而杂, 应统一化作  $\alpha$ .

**解:**

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \frac{-\sin \alpha \cdot \tan \alpha \cdot \cot(-6\pi + \pi - \alpha)}{-\cos \alpha \cdot \tan(12\pi + \pi - \alpha)} \\
 &= \frac{-\sin \alpha \cdot \tan \alpha \cdot \cot(\pi - \alpha)}{-\cos \alpha \cdot \tan(\pi - \alpha)} = \frac{\tan^2 \alpha (-\cot \alpha)}{-\tan \alpha} \\
 &= \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1
 \end{aligned}$$

**例 1.19** 已知  $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$ , 求下列各式的值:

$$(1) f(\alpha) = \frac{2 \sin^2 \alpha + 3 \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha} \quad 5 \cos^2 \alpha$$

$$(2) g(\alpha) = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha - \quad (3) h(\alpha) = 3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha$$

**分析：**知  $\alpha$  的一个函数值，求  $\alpha$  的三角函数式的值的问题，就实质而言，乃是用  $\alpha$  的这个函数值去表示所求三角函数式的问题，寻找这种表示应是解题的关键。

由于  $\cot \alpha = -3$ ， $\alpha$  是一象限中的角，而所求各式都是  $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$  的“齐次式”，抓住这一结构特征，问题就不难解决了。

(1) 分子、分母同除以  $\sin^2 \alpha$ ，得

$$f(\alpha) = \frac{2 + 3 \cot^2 \alpha}{1 + \cot \alpha} = \frac{2 + 3(-3)^2}{1 + (-3)} = \frac{29}{-2} = -14\frac{1}{2}$$

$$(2) g(\alpha) = \frac{\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha - 5 \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} \quad (\text{以下略})$$

(3) 可以先算  $h^2(\alpha)$ ，再开平方（注意选取“+”、“-”号）。

**评述：**这里三个小题的变形技巧都是从  $f(\alpha)$ 、 $g(\alpha)$  和  $h(\alpha)$  是  $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$  的“齐次式”想到的。这些技巧是处理这类齐次式的通法。

## 习题八

### A

1. 口答下列各式的化简结果：

$$(1) \cos \theta \cdot \tan \theta$$

$$(2) (1 + \tan^2 \theta) \cos^2 \alpha$$

$$(3) \sin^2 190^\circ \cdot \csc^2 190^\circ$$

$$(4) \csc^2 \theta - \tan \theta \cdot \cot \theta$$

$$(5) \sec^2 A - \tan^2 A - \sin^2 A$$

$$(6) \frac{1}{\sec^2 \alpha} + \frac{1}{\csc^2 \alpha}$$

$$(7) \csc \alpha \cdot \tan \alpha \cdot \sec \alpha \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \cot \alpha$$

$$(8) \cos^2 \alpha \cdot \csc^2 \alpha + \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$$

2. 化简：

$$\begin{array}{ll}
 (1) \frac{\tan \alpha + \cot \alpha}{\sec \alpha \cdot \csc \alpha} & (4) \frac{1 - \cos^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} + \cos \alpha \cdot \sec \alpha \\
 (2) \frac{\sin A + \cos A}{\sec A + \csc A} & (5) (\tan \beta + \cot \beta)^2 - (\tan \beta - \cot \beta)^2 \\
 (3) \frac{2 \cos^2 \alpha - 1}{1 - 2 \sin^2 \alpha} & (6) \cos^2 \alpha \cdot \csc^2 \alpha + \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha
 \end{array}$$

3. 化简:

$$\begin{array}{l}
 (1) \sec \theta \cdot \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \quad (\text{其中 } \theta \in \text{II 象限}) \\
 (2) \sec \alpha \cdot \sqrt{1 + \tan^2 \alpha} + \tan \alpha \cdot \sqrt{\csc^2 \alpha - 1} \quad (\text{其中 } \alpha \in \text{IV 象限}) \\
 (3) \sqrt{\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}} - \sqrt{\frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha}} \quad (\text{其中 } \alpha \in \text{III 象限}) \\
 (4) \frac{1}{\cos \alpha \sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} + \frac{2 \tan \alpha}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1}} \\
 (5) \frac{\sqrt{1 - 2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ}}{\cos 10^\circ - \sqrt{1 - \cos^2 170^\circ}} \\
 (6) \sqrt{\sec^2 \alpha - 2 \tan \alpha}, \quad \left(0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}\right) \\
 (7) \sqrt{\frac{\sec \alpha - 1}{\sec \alpha + 1}} + \sqrt{\frac{\sec \alpha + 1}{\sec \alpha - 1}} \quad (\text{其中 } \alpha \in \text{III 象限})
 \end{array}$$

4. 填空: 若  $\frac{\cos \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} + \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 + \cot^2 \alpha}} = -1$ , 则  $\theta$  是第\_\_\_\_象限角.

5. (1) 用  $\sec \alpha$  表示  $\frac{\sin^4 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha} + (1 + \tan^2 \alpha) \cos \alpha$

(2) 用  $\cot \alpha$  表示  $\frac{1 + \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{1 - \cos^2 \alpha} + \frac{1}{\sec^2 \alpha - 1}$

6. 已知  $\tan \alpha = 2$ , 计算:

$$\begin{array}{ll}
 (1) \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} & (3) \frac{1}{\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha} \\
 (2) \frac{1 - 2 \sin^2 \alpha}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} & (4) 2 \sin^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cdot \cos \alpha - 9 \cos^2 \alpha \\
 & (5) 4 \cos \alpha - 3 \sin \alpha
 \end{array}$$

7. 化简:

$$(1) \frac{\sin(180^\circ - \alpha) \cdot \cos(360^\circ + \alpha)}{\cot(-\alpha - 180^\circ) \cdot \sin(-180^\circ + \alpha)}$$

$$(2) \frac{\cos(\alpha - \pi) \cdot \tan(\alpha - 6\pi)}{\sin(9\pi - \alpha) \cdot \cot(20\pi - \alpha)}$$

$$(3) m \sin \frac{11\pi}{2} + n \cos(-7\pi) + p \tan 5\pi + q \cot \frac{5\pi}{2}$$

## B

8. 当  $n \in \mathbb{N}$  时, 化简:

$$(1) \sin(n\pi + \alpha) \cdot \cos(n\pi + \alpha) \cdot \tan(n\pi + \alpha)$$

$$(2) \cos\left(\frac{4n+1}{4}\pi + \alpha\right) + \cos\left(\frac{4n-1}{4}\pi - \alpha\right)$$

9. 化简:  $\frac{\cot \alpha}{\sqrt{1 + \cot^2 \alpha}} + \frac{\sqrt{\csc^2 \alpha - 1}}{\csc \alpha}$

## 1.6 三角恒等式的证明

本节学习证明三角恒等式的基本思考方法.

为使同学们能主动地探寻思路, 对这个课题先从整体上做个概述.

1. 观察以下三个等式:

$$(1) \frac{\cos t}{1 - \sin t} = \frac{1 + \sin t}{\cos t}$$

$$(2) \sin^2 \alpha \cdot \tan \alpha + \cos^2 \alpha \cdot \cot \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \tan \alpha + \cot \alpha$$

$$(3) \frac{\cos^2 \alpha}{\cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{4} \sin 2\alpha$$

可以看出: 等号两边式子的结构(自变量、函数种类、运算)有某些差异.

以(3)为例,

(i) 两边的角不同(左边是  $\alpha$ 、 $\frac{\alpha}{2}$ , 右边是  $2\alpha$ );

(ii) 两边的函数种类不同(左边是余弦、正切、余切, 右边是正弦);

(iii) 两边的运算也不同(左边是积、差、商, 右边是积).

一个三角函数等式, 若是恒等式, 则对两边实施一系列恒等变形必能达到结构全同. 因此, 证明三角恒等式就实质而言乃是实施恒等变形, 逐步消除等号两边结构差异的过程.

2. 消除差异的具体方式通常是“化繁为简”, 即从结构繁的一边推得结构简的一边, 也可以是左、右两边都推得一个相同的结果. 这里应明确, 不论哪种推法, 其理论根据都是“等式的传递性”, 即若  $A = B$ ,  $B = C$ , 则  $A = C$ .



3. 有时改证原等式的等价命题, 会收到化难为易的良好效果。如, 为证  $A = B$ , 可证  $A - B = 0$ , 或证  $\frac{A}{B} = 1$  (当  $B \neq 0$  时); 又如, 为证  $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ , 可先证  $A \cdot D = B \cdot C$  ( $BD \neq 0$ )。这些证法的依据仍然是等式的基本性质。

总之, 三角恒等式的证明自始至终要从式子的结构特征入手, “除差异, 促转化, 求同一”<sup>①</sup>。这里既要遵循一般等式论证的共性, 又要注重三角函数等式论证的个性, 巧妙的证法产生于共性与个性的完美统一。

**例 1.20** 求证  $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha}$  (1)

**分析:** 两边函数同, 运算异, 消除运算差异是这个题的突破口, 因此, 从运算入手。

**证明:** **证法 1:** (左  $\Rightarrow$  右, 先消除分母上的差异)

$$\begin{aligned} \text{左} &= \frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{\cos \alpha \cdot (1 + \sin \alpha)}{(1 - \sin \alpha) \cdot (1 + \sin \alpha)} \\ &= \frac{\cos \alpha (1 + \sin \alpha)}{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{\cos \alpha (1 + \sin \alpha)}{\cos^2 \alpha} \\ &= \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \text{右} \end{aligned}$$

$\therefore$  (1) 成立。

**证法 2:** (左、右都推得相同的结果, 为此先使分母相同)

$$\begin{aligned} \text{左} &= \frac{\cos \alpha \cdot \cos \alpha}{(1 - \sin \alpha) \cos \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha}{(1 - \sin \alpha) \cos \alpha} \\ \text{右} &= \frac{(1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha)}{\cos \alpha (1 - \sin \alpha)} = \frac{1 - \sin^2 \alpha}{\cos \alpha (1 - \sin \alpha)} = \frac{\cos^2 \alpha}{\cos \alpha (1 - \sin \alpha)} \end{aligned}$$

$\therefore$  左 = 右。

**证法 3:** 据 1.5 节的约定, (1) 式成立的前提是分母不为零, 在这个约定下, 欲证 (1), 只要证“内项乘积等于外项乘积”, 即证

$$\cos \alpha \cdot \cos \alpha = (1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha) \quad (2)$$

即

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

此式显然成立, 所以 (1) 成立。

**例 1.21** 求证:  $\sin^2 \alpha \tan \alpha + \cos^2 \alpha \cot \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \tan \alpha + \cot \alpha$

<sup>①</sup>见《三角等式证题法》冯宝琦, 丁学登编著, 黑龙江人民出版社 1982 年版。

**分析：**两边函数、运算都有差异，可以先从消除一种差异入手.

**证明：**证法 1: (从函数入手，两边同时化切为弦)

$$\begin{aligned}\text{左} &= \sin^2 \alpha \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \cos^2 \alpha \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ &= \frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\cos \alpha \sin \alpha} = \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2}{\sin \alpha \cos \alpha} \\ &= \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha} \\ \text{右} &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\cos \alpha \sin \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}\end{aligned}$$

$\therefore$  左 = 右.

**证法 2:** (从函数入手，从左  $\Rightarrow$  右)

$$\text{左} = \tan \alpha (1 - \cos^2 \alpha) + \cot \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

(这一步为的是从左边变出  $\tan \alpha$  与  $\cot \alpha$ . 这种针对目标的变形在证恒等式的过程中是经常使用的策略)

$$\begin{aligned}&= \tan \alpha + \cot \alpha - \tan \alpha \cos^2 \alpha - \cot \alpha \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ &= \tan \alpha + \cot \alpha - \sin \alpha \cos \alpha - \cos \alpha \sin \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ &= \tan \alpha + \cot \alpha.\end{aligned}$$

$\therefore$  左 = 右.

### 思考题

去证原命题的等价命题行吗? 试试看。

## 习题九

### A

1. 求证下列恒等式:

$$(1) \cot^2 \alpha (\tan^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \sin^2 \alpha$$

$$(2) \sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$$

$$(3) \sin^4 \alpha + \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$(4) (1 - \sin^2 \alpha) (\sec^2 \alpha - 1) = \sin^2 \alpha (\csc^2 \alpha - \cot^2 \alpha)$$

$$(5) \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{1}{\sec^2 \theta \cdot \csc^2 \theta}$$

$$(6) \frac{\sin \alpha + \cot \alpha}{\tan \alpha + \csc \alpha} = \cos \alpha$$

2. 求证下列恒等式:

$$(1) \sin(-\alpha) \cdot \sin(\pi - \alpha) - \tan(-\alpha) \cdot \cot(\alpha - \pi) - 2\cos^2(-\alpha) + 1 = \sin^2 \alpha$$

$$(2) \frac{\cos(\alpha - \pi) \cdot \cot(5\pi - \alpha)}{\tan(2\pi - \alpha) \sin(-2\pi - \alpha)} = \cot^3 \alpha$$

3. 证明下列等式:

$$(1) (\cos t - 1)^2 + \sin^2 t = 2 - 2\cos t$$

$$(2) (\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2 = 2 - 2(\cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta)$$

$$(3) \sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cdot \cos^2 x$$

$$(4) \sin^3 \theta (1 + \cot \theta) + \cos^3 \theta (1 + \tan \theta) = \sin \theta + \cos \theta$$

$$(5) \tan \alpha (1 - \cot^2 \alpha) + \cot \alpha (1 - \tan^2 \alpha) = 0$$

## B

4. 用两种方法证明:  $\tan \theta \cdot \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos \theta} = \cot \theta \cdot \frac{1 - \cos \theta}{1 + \sin \theta}$

**例 1.22** 求证:  $2(\sin^6 \theta + \cos^6 \theta) - 3(\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) = -1$  (1)

**分析:** 函数、运算上都有差异: 左边是正、余弦的高次多项式, 右边是常数项。因此, 对左边消元、降次, 化繁为简应是解此题的基本途径。

**证明:** **证法 1:** (对高次项因式分解, 以图降次)

$$\begin{aligned} \text{左边} &= 2[(\sin^2 \theta)^3 + (\cos^2 \theta)^3] - 3(\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) \\ &= 2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)[\sin^4 \theta - \sin^2 \theta \cos^2 \theta + \cos^4 \theta] - 3(\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) \\ &= 2\sin^4 \theta - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta + 2\cos^4 \theta - 3\sin^4 \theta - 3\cos^4 \theta \\ &= -(\sin^4 \theta + 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta + \cos^4 \theta) \\ &= -(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 = -1 \end{aligned}$$

$\therefore$  左 = 右

**证法 2:** (由  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ , 先算出  $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$  与  $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$ )

$$\begin{aligned} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 &= \sin^4 \theta + 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta + \cos^4 \theta = 1 \\ \Rightarrow \sin^4 \theta + \cos^4 \theta &= 1 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^3 &= \sin^6 \theta + 3 \sin^4 \theta \cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta \cos^4 \theta + \cos^6 \theta = 1 \\
 \Rightarrow \sin^6 \theta + \cos^6 \theta &= 1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta
 \end{aligned} \tag{3}$$

把 (2)、(3) 代入 (1) 之左边, 得

$$\begin{aligned}
 &2(\sin^6 \theta + \cos^6 \theta) - 3(\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) \\
 &= 2(1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta) - 3(1 - 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta) \\
 &= 2 - 6 \sin^2 \theta \cos^2 \theta - 3 + 6 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = -1
 \end{aligned}$$

$\therefore$  左 = 右.

**评述:** 本例中, 为降低  $\sin \theta, \cos \theta$  的次数, 我们反复使用了平方关系  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$  (两种证法都是怎样使用平方关系的? 哪种方法使用的范围可能更广泛?). 由此还应能联想到: 若反向使用该公式还能起到“升次”的作用, 如本章习题八题 6 就需这样使用。而且, 其余两个平方关系, 也都具有这两种功能, 请看下例中的证法 1。

**例 1.23** 求证:  $\frac{1 + \csc \alpha + \cot \alpha}{1 + \csc \alpha - \cot \alpha} = \csc \alpha + \cot \alpha$  (1)

**分析:** 两边函数同, 运算异, 从运算入手。

**证明:** **证法 1:** (从运算上看左边是分式, 右边是整式, 要化繁为简, 应对左边“约分”, 为此设法对分子、分母进行因式分解)

$$\begin{aligned}
 &\text{利用 } 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha \\
 \Rightarrow 1 &= \csc^2 \alpha - \cot^2 \alpha = (\csc \alpha + \cot \alpha)(\csc \alpha - \cot \alpha)
 \end{aligned} \tag{2}$$

将 (2) 代入 (1) 之左边, 得:

$$\begin{aligned}
 \text{左} &= \frac{(\csc \alpha + \cot \alpha)(\csc \alpha - \cot \alpha) + (\csc \alpha + \cot \alpha)}{1 + \csc \alpha - \cot \alpha} \\
 &= \frac{(\csc \alpha + \cot \alpha)(\csc \alpha - \cot \alpha + 1)}{1 + \csc \alpha - \cot \alpha} = \csc \alpha + \cot \alpha
 \end{aligned}$$

$\therefore$  左 = 右

**证法 2:** 利用 (2), 还可以巧妙地作如下变形:

$\because$  (2) 之左边  $\neq 0$ , 因此有

$$\csc \alpha + \cot \alpha = \frac{1}{\csc \alpha - \cot \alpha}$$

再由等比定理, 得

$$\csc \alpha + \cot \alpha = \frac{1}{\csc \alpha - \cot \alpha} \xrightarrow{\text{等比}} \frac{\csc \alpha + \cot \alpha + 1}{1 + \csc \alpha - \cot \alpha}$$

$\therefore$  (1) 成立.

**证法 3:** 去证 (1) 的等价命题, 请读者完成。

例 1.24 求证:  $\frac{2(\cos \alpha - \sin \alpha)}{1 + \sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} - \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$

分析: 两边函数同, 运算异, 从运算入手。应先把右边合成一个分式。

为书写简便, 记  $a = \sin \alpha$ ,  $b = \cos \alpha$ ,  $a^2 + b^2 = 1$ , 有

$$\text{右} = \frac{b}{1+a} - \frac{a}{1+b} = \frac{b^2 + b - a^2 - a}{(1+a)(1+b)} = \frac{(b-a)(b+a+1)}{(1+a)(1+b)}$$

它与原式左边相比, 发现两边分子都含有因式  $(b-a)$ ,

若  $b-a=0$ , 则原式成立,

若  $b-a \neq 0$ , 要证原式, 只要证

$$\frac{2}{1+a+b} = \frac{b+a+1}{(1+a)(1+b)}$$

而这个等式可通过证明“内项积等于外项积”完成。(证明留给读者)

## 习题十

### A

1. 求证下列恒等式:

$$(1) (\sin x + \cos x)(\tan x + \cot x) = \sec x + \csc x$$

$$(2) 2(1 - \sin x)(1 + \cos x) = (1 - \sin x + \cos x)^2$$

$$(3) \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - \sin^2 \alpha \cdot \sin^2 \beta + \cos^2 \alpha \cdot \cos^2 \beta = 1$$

$$(4) (1 - \tan^2 A)^2 = (\sec^2 A - 2 \tan A)(\sec^2 A + 2 \tan A)$$

$$(5) \frac{1 - 2 \sin^2 \alpha}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} = \cot \alpha - \tan \alpha$$

$$(6) \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} + \frac{1}{1 + \cot^2 \alpha} = \frac{1}{1 + \sin^2 \alpha} + \frac{1}{1 + \csc^2 \alpha}$$

2. 求证下列恒等式:

$$(1) 1 - (\cos^6 x + \sin^6 x) = 3 \sin^2 x \cdot \cos^2 x$$

$$(2) \frac{1 - \sin^6 x - \cos^6 x}{1 - \sin^4 x - \cos^4 x} = \frac{3}{2}$$

3. 若  $\tan \theta = -\frac{1}{3}$ , 求下列各式的值:

$$(1) \frac{1}{\sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta}$$

$$(3) \sin^2 \theta - 7 \cos^2 \theta + 3 \sin \theta \cos \theta$$

$$(2) \frac{3 - 5 \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta - \cos \theta \sin \theta}$$

$$(4) \frac{1 + \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{1 - \cos^2 \theta}$$

$$4. \text{ 求证: } \frac{1 - \csc \theta + \cot \theta}{1 + \csc \theta - \cot \theta} = \frac{\csc \theta + \cot \theta - 1}{\csc \theta + \cot \theta + 1}$$

### B

5. 求证:

$$(1) \frac{\sin^2 x}{\sin x - \cos x} - \frac{\sin x + \cos x}{\tan^2 x - 1} = \sin x + \cos x$$

$$(2) \frac{\tan \alpha + \sec \alpha + 1}{\tan \alpha + \sec \alpha - 1} = \frac{\tan \alpha}{\sec \alpha - 1}$$

$$\text{例 1.25 当 } \alpha \text{ 为何值时, } \sqrt{\frac{\tan \alpha - \sin \alpha}{\tan \alpha + \sin \alpha}} = \csc \alpha - \cot \alpha \quad (1)$$

分析:  $\alpha$  必须满足:

(1) (1) 式两边的三角函数都有意义;

(2) (1) 式两边的值相等。

解: 为了使 (1) 两边的三角函数都有意义, 须

$$\alpha \neq \frac{k\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (2)$$

为了使 (1) 两边等值, 对两边先化简再判断:

$$\text{左边} = \sqrt{\frac{\tan \alpha - \sin \alpha}{\tan \alpha + \sin \alpha}} = \sqrt{\frac{(1 - \cos \alpha)^2}{\sin^2 \alpha}} = \left| \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \right|$$

$$\text{右边} = \csc \alpha - \cot \alpha = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

欲使 (1) 两边相等, 须  $\left| \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \right| = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ , 即

$$\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \geq 0 \quad (3)$$

$$\text{对于 (3), 由 (2) 知: } 1 - \cos \alpha > 0, \text{ 从而 } \sin \alpha > 0 \quad (4)$$

联立 (2)、(4), 得  $\alpha \in \text{I 或 II 象限}$ .

例 1.26 已知  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ ,  $\alpha \in (0, \pi)$ , 求  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$ .

解: 把  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$  两边平方, 得

$$\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{1}{25}.$$

利用  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ , 可得

$$\sin \alpha \cos \alpha = \frac{-12}{25}.$$

则  $\sin \alpha, \cos \alpha$  是  $y^2 - \frac{1}{5}y - \frac{12}{25} = 0$  的两个实根. 解之

$$y_1 = \frac{4}{5}, \quad y_2 = \frac{-3}{5}.$$

$$\begin{aligned} \because \sin \alpha \cos \alpha &= -\frac{12}{25}, \quad \alpha \in (0, \pi), \\ \therefore \alpha &\in \text{II 象限}, \quad \sin \alpha > 0, \cos \alpha < 0. \\ \therefore \sin \alpha &= \frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = -\frac{3}{5}. \end{aligned}$$

### 思考题

在本题条件下:

- (1) 不通过求  $\sin \alpha, \cos \alpha$ , 能推求出  $\sin^5 \alpha \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^5 \alpha$  或  $\sin \alpha - \cos \alpha$  的值吗? 进而, 请对可求值的解析式的类型做一概括。
- (2) 不通过演算, 能看出  $\alpha$  是属于  $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$  中的角吗?

## 习题十一

### A

1. 证明下列恒等式:

$$(1) \frac{1 - 2 \sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$$

$$(2) \tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \cdot \sin^2 \theta$$

$$(3) (\sin A - \csc A)(\cos A - \sec A) = \frac{1}{\tan A + \cot A}$$

$$(4) \frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} = \left( \frac{1 - \tan A}{1 - \cot A} \right)^2$$

- (5)  $\frac{\tan^2 A - \cot^2 A}{\sin^2 A - \cos^2 A} = \sec^2 A + \csc^2 A$
- (6)  $\frac{\tan \alpha \cdot \sin \alpha}{\tan \alpha - \sin \alpha} = \frac{\tan \alpha + \sin \alpha}{\tan \alpha \cdot \sin \alpha}$
- (7)  $(\sin A + \sec A)^2 + (\cos A + \csc A)^2 = (1 + \sec A \csc A)^2$
- (8)  $\frac{\tan A - \tan B}{\cot B - \cot A} = \frac{\tan B}{\cot A}$

2. 已知  $\alpha \in \text{I 象限}$ , 求证:

$$\sqrt{\csc^2 \alpha - 1} - \frac{1}{\sqrt{\sec^2 \alpha - 1}} = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} - \tan \alpha \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

3.  $\alpha$  为何值时,  $\sqrt{\tan^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \tan \alpha \sin \alpha$ ?

4.  $\alpha$  为何值时,  $\sqrt{\frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha}} = \tan \alpha - \sec \alpha$ ?

5. 已知  $\sin x + \cos x = \alpha$  ( $|\alpha| \leq \sqrt{2}$ ), 求下列各式的值:

(1)  $\sin^3 x + \cos^3 x$

(3)  $\sin x - \cos x$

(2)  $\sin^4 x + \cos^4 x$

(4)  $\tan x + \cot x$

6. 已知  $\tan \alpha + \cot \alpha = m$  ( $m \geq 2$ ), 求下列各式的值:

(1)  $\tan^2 \alpha - \cot^2 \alpha$

(2)  $\tan^3 \alpha + \cot^3 \alpha$

(3)  $\tan^4 \alpha + \cot^4 \alpha$

7. 已知  $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = p$ ,  $\tan^4 \alpha + \cot^4 \alpha = q$ , 求  $p, q$  之间的关系.

## 1.7 本章小结

### 1.7.1 知识结构分析

本章知识结构见本书第 2 页上的结构图。

### 1.7.2 几点说明

1. 角度制与弧度制是“度量”角的两种常见单位制。它们之间的互换关系是  $\pi = 180^\circ$ .
2. 角的概念推广后, 角 (用弧度表示) 的集合与实数集  $\mathbb{R}$  能建立一一对应的关系。这里应特别注意: 任一个角都能化成“周内角 + 周角的整数倍”的形式, 这一关系与诱导公式联系起来是很有用的。



- 任意角三角函数的定义是全书的中心概念,是三角函数的性质和所有三角公式的基础。这一点从结构图上它所占据的中枢地位看得很清楚。三角函数与三角函数线之间的对应是数与形的对应:前者是代数形式,后者是几何形式,各有所用,相互补充,可以互化。
- “从单位圆上看三角函数的性质”一节直观地研究了三角函数的定义域、值域、在各象限中的符号,以及五组诱导公式。这些性质反映的是单位圆上动点成轴(中心)对称时三角函数之间的内在联系。
- 同角三角函数的三组基本关系反映了同角六个三角函数之间的内在联系,是进行三角变换的重要基础。在三角函数式的化简、求值(知 $\alpha$ 的一种函数值,可求 $\alpha$ 的其余五种函数值)和证三角恒等式等方面都是非常有用的。
- 证明三角恒等式是三角变换的重要内容,其基本思考方法是对等号两边“除差异,促转化,求同一”。

## 复习题一

### A

- 指出下列概念的区别:

“第 I 象限中的角”;

“ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  内的角”;

“锐角”;

“小于  $90^\circ$  的角”。

- 在  $(-4\pi, 4\pi)$  中,找出终边与下列各角相同的所有角:

(1)  $\alpha = \frac{44\pi}{3}$

(2)  $\beta = -\frac{68\pi}{5}$

(3)  $\gamma = -1760^\circ$

- 化简:

(1)  $\frac{\cos(\alpha - \pi) \cdot \cot(7\pi - \alpha)}{\tan(8\pi - \alpha) \cdot \sin(-\alpha - 2\pi)}$

(2)  $\sin \frac{n\pi}{2} \quad (n \in \mathbb{Z})$

(3)  $\tan^2 \left( \frac{2n+1}{2}\pi + \alpha \right) - \tan^2 \left( \frac{2n+1}{2}\pi - \alpha \right)$ , 其中  $n \in \mathbb{Z}$ .

4. 化简:

$$(1) \sin^2(-\alpha) - \tan(360^\circ - \alpha) \cot(-\alpha) - \sin(180^\circ - \alpha) \cos(360^\circ - \alpha) \cot(180^\circ + \alpha)$$

$$(2) \sin \frac{25\pi}{6} + \cos \frac{25\pi}{3} + \tan \left( -\frac{25\pi}{4} \right)$$

$$(3) \sin 420^\circ \cos 750^\circ + \sin(-330^\circ) \cos(-660^\circ)$$

$$(4) \tan 675^\circ + \cot 765^\circ - \tan(-300^\circ) + \cot(-690^\circ)$$

5. (选择题)

$$(1) \text{ 已知 } \alpha \in \text{II 象限}, \text{ 且 } \cos \alpha = -\frac{3}{5}, \text{ 则 } 2\alpha \in ( \quad )$$

(A) I 象限      (B) II 象限      (C) III 象限      (D) IV 象限

$$(2) \text{ 若把 (1) 中的 } \cos \alpha \text{ 值改为 } -\frac{4}{5}, \text{ 重作此题, 则 } 2\alpha \in ( \quad )$$

$$6. \text{ (选择题) 已知 } \sin(\pi + \theta) = \frac{1}{2}, \text{ 则 } \cos(2\pi - \theta) \text{ 的值是 } ( \quad )$$

$$(A) \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (B) -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (C) \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (D) \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$7. (1) \text{ 计算 } \cot \frac{-296\pi}{3} \text{ 与 } \cos \frac{-296\pi}{3} \text{ 的值;}$$

$$(2) \text{ 已知 } \tan x = -\sqrt{3},$$

当  $x \in \mathbb{R}$  时, 写出  $x$  的集合;

当  $x \in [-2\pi, 2\pi]$  时, 写出  $x$  的集合;

当  $x$  是周内弧时, 写出  $x$  的集合;

当  $x \in \text{IV 象限}$  时, 写出  $x$  的集合。

$$(3) \text{ 已知 } \sec x = -\frac{5}{4},$$

当  $x \in \mathbb{R}$  时, 求  $\tan x$  的值;

当  $x \in \text{III 象限}$  时, 求  $\sin x$  的值;

当  $x \in (0, \pi)$  时, 求  $\csc x$  的值。

$$(4) \text{ 已知 } \sec x = -\frac{5}{3}, \text{ 求 } \frac{\sin x + \cot x}{\tan x + \csc x} \text{ 的值.}$$

$$8. \text{ 判断 } \frac{\sin \alpha + \tan \alpha}{\cos \alpha + \cot \alpha} \left( \alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right) \text{ 的符号.}$$

$$9. \text{ (选择题) 已知 } 0 \leq x \leq 2\pi, \text{ 那么使等式 } \sqrt{1 - \sin^2 x} = \cos x \text{ 成立的 } x \text{ 的范围是 } ( \quad )$$

(A)  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

(C)  $\frac{\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{2}$

(B)  $\frac{3\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{2}$

(D)  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  或  $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi$

**B**10. (1) 已知  $\tan(\pi - \alpha) = a^2$ , 且  $|\cos(\pi - \alpha)| = \cos \alpha$ , 求  $\sec(\pi + \alpha)$  的值;(2) 已知  $\cot(\pi + \beta) = b^2$  ( $b \neq 0$ ), 且  $|\sin(\pi + \beta)| = \sin(\pi + \beta)$ . 求  $\csc(\pi + \beta)$  的值.11. (选择题)  $\alpha \in \text{IV 象限}$ , 化简  $\cos \alpha \sqrt{\frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha}} + \sin \alpha \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$  所得的结果是 ( )

(A)  $\sin \alpha + \cos \alpha$

(C)  $\cos \alpha - \sin \alpha$

(B)  $\sin \alpha - \cos \alpha$

(D)  $2 - \sin \alpha - \cos \alpha$

12. 用  $\tan \alpha$  表示  $\frac{1}{\cos^2 \alpha \cdot \sin^2 \alpha}$ .13. 已知  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ ,  $\pi < \alpha < 2\pi$ , 则  $\tan \alpha$  的值为 ( )

(A)  $-\frac{4}{3}$


(B)  $-\frac{4}{3}$  或  $-\frac{3}{4}$

(C)  $-\frac{3}{4}$

(D)  $\frac{4}{3}$

**C**14. 根据三角函数线的定义, 利用面积不等关系证明: 当  $\alpha$  为锐角时, 下式成立:

$$\sin \alpha < \alpha < \tan \alpha$$



(第 14 题)

## 第二章 和角公式及其推论

在研究三角函数式的变形或计算时，经常会提出这样的问题：能否用  $\alpha$ 、 $\beta$  的三角函数去表示  $(\alpha + \beta)$  的三角函数？为了解决这类问题，本章将首先推出和（差）角公式  $[(\alpha \pm \beta)$  的正弦、余弦、正切公式]，作为推论，进而得出倍角公式、半角公式以及积化和差与和差化积公式（逻辑线索请参看第 2 页上的逻辑结构图）。这些公式是进行三角变换的重要基础，有着广泛的应用。

### 2.1 关于诱导公式的补充

在 1.4 节，我们已学过五组诱导公式。本节研究  $f\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right)$  与  $f(\alpha)$  的关系。

先看  $f\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$  与  $f(\alpha)$  之关系。为此，只要弄清楚角  $\alpha$  与角  $\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$  对应的点  $p(x, y)$  与  $p'(x', y')$  坐标之间的关系就行了。




图 2.1

图 2.1 中的单位圆上，画出了角  $\alpha$  与  $\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$  的对应点坐标之关系。从中不难看出，不论  $\alpha$  是轴上角还是某个象限中的角，下表中坐标之间的关系都是成立的：

任意角	$\alpha$	$\alpha + \frac{\pi}{2}$
对应点	$p(x, y)$	$p'(x', y')$
坐标之间的关系	$\begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases}$	

由此，立刻可以得到：

#### 公式（六）

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= y' = x = \cos \alpha & \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= x' = -y = -\sin \alpha \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \frac{y'}{x'} = -\cot \alpha & \cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \frac{x'}{y'} = -\tan \alpha \end{aligned}$$

其中： $\alpha \in \mathbb{R}$

再以  $(-\alpha)$  代换  $\alpha$ ，又可得到：

#### 公式（七）

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \cos(-\alpha) = \cos \alpha & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= -\sin(-\alpha) = \sin \alpha \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= -\cot(-\alpha) = \cot \alpha & \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= -\tan(-\alpha) = \tan \alpha \end{aligned}$$

其中： $\alpha \in \mathbb{R}$

#### 思考题

利用图 2.1，通过  $\alpha$  与  $\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right)$  的对应点  $p(x, y)$  与  $p''(x'', y'')$  的坐标之间的关系，你能推出  $f\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right)$  与  $f(\alpha)$  的关系吗？

## 2.2 和（差）角的正弦、余弦、正切

本节首先研究  $\cos(\alpha + \beta)$ ,  $\sin(\alpha + \beta)$  能否用  $\alpha$ 、 $\beta$  的三角函数表示？怎样表示？

#### 问 1

是否有  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha + \cos \beta$ ？

下面, 我们借助两点间距离公式, 推求  $\cos(\alpha + \beta)$  用单角  $\alpha$ 、 $\beta$  的三角函数表达的公式.

在图 2.2 的单位圆中, 以  $\overrightarrow{Ox}$  轴为始边分别作角  $\alpha$ 、 $(\alpha + \beta)$  与  $(-\beta)$ , 其终边依次交单位圆于  $P_2$ 、 $P_3$ 、 $P_4$  这时  $P_1$ 、 $P_2$ 、 $P_3$ 、 $P_4$  的坐标分别是

$$P_1(1, 0); \quad P_2(\cos \alpha, \sin \alpha); \quad P_3(\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta)); \quad P_4(\cos(-\beta), \sin(-\beta))$$




图 2.2

$\therefore |P_1P_3| = |P_2P_4|$ , 由两点间距离公式得

$$[\cos(\alpha + \beta) - 1]^2 + \sin^2(\alpha + \beta) = [\cos \alpha - \cos(-\beta)]^2 + [\sin \alpha - \sin(-\beta)]^2$$

展开, 整理得:

$$2 - 2\cos(\alpha + \beta) = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta)$$

$$\therefore \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad (1)$$

这个公式对任意角  $\alpha, \beta$  都成立, 再用  $(-\beta)$  代替  $\beta$ , 就有

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos(-\beta) - \sin \alpha \sin(-\beta)$$

即

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad (2)$$

利用 (1)(2) 和诱导公式 (七) 可以推求  $\sin(\alpha + \beta)$  的表达式.

$$\therefore \sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right]$$

而

$$\begin{aligned}\cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] &= \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right] \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\cos\beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\sin\beta \\ &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta\end{aligned}$$

$$\therefore \sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \quad (3)$$

再以  $(-\beta)$  代替  $\beta$ , 又有

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos(-\beta) + \cos\alpha\sin(-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$

即

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta \quad (4)$$

当  $\cos(\alpha + \beta) \neq 0$  时, 利用 (1)(3) 又得:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta}$$

当  $\cos\alpha\cos\beta \neq 0$  时, 上式右边分子、分母同除以  $\cos\alpha\cos\beta$ , 得:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} \quad (5)$$

在 (5) 中, 再以  $(-\beta)$  代替  $\beta$ , 又有

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta} \quad (6)$$

公式 (1)、(3)、(5) 实现了用单角  $\alpha$ 、 $\beta$  的三角函数表示和角  $(\alpha + \beta)$  的三角函数的可能性, 统称为**和角公式**。它不仅在计算上非常重要, 而且是后续一系列三角公式推导的基础, 因此, 在理论上也十分重要。这组公式有的书又称为**三角函数的加法定理**。对它说明如下:

#### 1. 公式成立的条件:

从推导过程可见, (1)、(3) 对任意的  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  都成立, (5) 对任意的  $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in \mathbb{R}$ , 且  $\neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 都成立, 它们都是各自定义域上的恒等式。

#### 2. 公式的功能:

“从左往右”用, 能把  $(\alpha + \beta)$  的函数, 表成  $\alpha$ 、 $\beta$  的函数; “从右往左”用, 能把右边结构复杂的式子表示成  $(\alpha + \beta)$  的一个函数。

## 3. 公式的结构特征与记忆:

- 公式 (3) 的右边是“正、余加余、正，角序是  $\alpha, \beta$ ”;
- 公式 (1) 的右边是“余、余减正、正，角序也是  $\alpha, \beta$ ”，
- 公式 (5) 是用  $\tan \alpha$  与  $\tan \beta$  的和与积表出了  $\tan(\alpha + \beta)$ .

抓住了以上特征，就抓住了记忆和使用这些公式的线索。

对于差角公式 (2)、(4)、(6) 可做类似地说明。

有了和（差）角公式，借助过去已经熟悉的特殊角  $30^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $60^\circ$  的三角函数值，能求出由这三个角组成的各种和角或差角的函数值。

**例 2.1** 不查表，求  $15^\circ$ 、 $75^\circ$  的正弦、余弦、正切值。

解：

$$\begin{aligned}\sin 15^\circ &= \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan 15^\circ &= \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \cdot \frac{4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} = 2 - \sqrt{3}\end{aligned}$$

利用诱导公式，得

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \\ \cos 75^\circ &= \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \\ \tan 75^\circ &= \cot 15^\circ = \frac{1}{\tan 15^\circ} = \frac{1}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}\end{aligned}$$

**例 2.2** 已知  $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ ,  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ,  $\cos \beta = -\frac{3}{4}$ ,  $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$

求  $\sin(\alpha + \beta)$ 、 $\cos(\alpha - \beta)$  和  $\tan(\alpha + \beta)$



**分析:** 由于  $\sin(\alpha + \beta)$ 、 $\cos(\alpha - \beta)$  的展开式中有  $\cos \alpha$ 、 $\sin \beta$ , 为此应先算出  $\cos \alpha$ 、 $\sin \beta$ .

**解:** 由  $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ ,  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 得

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = -\frac{\sqrt{5}}{3}$$

又由于  $\cos \beta = -\frac{3}{4}$ ,  $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ , 得

$$\sin \beta = -\sqrt{1 - \cos^2 \beta} = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = -\frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\therefore \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$= \frac{2}{3} \left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \left(-\frac{\sqrt{7}}{4}\right) = \frac{-6 + \sqrt{35}}{12}$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$= \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{2}{3} \left(-\frac{\sqrt{7}}{4}\right) = \frac{3\sqrt{5} - 2\sqrt{7}}{12}$$

$$\text{又 } \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{3\sqrt{5} + 2\sqrt{7}}{12}$$

$$\begin{aligned} \therefore \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\frac{-6 + \sqrt{35}}{12}}{\frac{3\sqrt{5} + 2\sqrt{7}}{12}} \\ &= \frac{-6 + \sqrt{35}}{3\sqrt{5} + 2\sqrt{7}} = \frac{-32\sqrt{5} + 27\sqrt{7}}{17} \end{aligned}$$

### 思考题

- (1) 在此例中, 你还能想出算  $\tan(\alpha + \beta)$  的办法吗?
- (2) 若知道  $\alpha$ 、 $\beta$  的各自任何一种角函数值, 那么  $(\alpha \pm \beta)$  的任何一种角函数值是否都能用上述方法求得? 说明理由。

## 习题一

## A

1. 不查表, 求下列各式的值。

(1)  $105^\circ$  的正弦、余弦、正切

(3)  $\sin\left(-\frac{5}{12}\pi\right)$

(2)  $\cos 165^\circ$

(4)  $\sin\left(-\frac{65\pi}{12}\right)$

2. 已知  $\sin \alpha = \frac{15}{17}$ ,  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 求  $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right)$  及  $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$ .

3. 已知  $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ ,  $\theta \in \left(\pi, \frac{3}{2}\pi\right)$ , 求  $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$  及  $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$ .

4.  $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ ,  $\cos \beta = -\frac{3}{4}$ , 且  $\alpha$ 、 $\beta$  都是第 I 象限角, 求  $\sin(\alpha - \beta)$  及  $\cos(\alpha - \beta)$

5. (1) 已知  $\tan x = \frac{1}{4}$ ,  $\tan y = -3$ , 求  $\tan(x + y)$ ;

(2) 已知  $\tan \alpha = 2k + 1$ ,  $\tan \beta = 2k - 1$ , 求  $\cot(\alpha - \beta)$ .

6. 已知  $\cos \theta = -\frac{12}{13}$ ,  $\theta \in \left(\pi, \frac{3}{2}\pi\right)$ , 求  $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$ ,  $\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$  和  $\tan\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$ .

7. 化简:

(1)  $\sin 58^\circ \cos 37^\circ - \cos 58^\circ \sin 37^\circ$       (3)  $\cos 12^\circ \cos 28^\circ + \sin 12^\circ \sin 28^\circ$

(2)  $\cos 24^\circ \cos 69^\circ - \sin 24^\circ \sin 69^\circ$       (4)  $\sin 70^\circ \cos 25^\circ - \sin 20^\circ \sin 25^\circ$

## B


8. 参照下图, 当  $\alpha$ 、 $\beta$  都为正锐角时, 利用三角形的面积公式推出  $\sin(\alpha + \beta)$  的公式

9. 已知  $\tan \alpha = \frac{1}{3}$ ,  $\tan \beta = -2$ ,

(1) 求  $\cot(\alpha - \beta)$

(2) 求  $\tan(\alpha + \beta)$

(3) 求  $\sin^2(\alpha + \beta) - \sin(\alpha + \beta) \cos(\alpha + \beta) - \cos^2(\alpha + \beta)$



(第 8 题)

10. 设  $\tan \alpha, \tan \beta$  是一元二次方程  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $b \neq 0$ ) 的两个根, 求  $\cot(\alpha + \beta)$  的值.

例 2.3 利用和角公式证明以下两组诱导公式:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(八)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cos \alpha \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha \\ \tan\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha \\ \cot\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = -\tan \alpha \end{array} \right. & \text{(九)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha \\ \cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha \\ \tan\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha \\ \cot\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha \end{array} \right.
 \end{array}$$

(请读者完成)

现在对诱导公式 (六)、(七)、(八)、(九) 做一些说明:

1. 公式左边的角为  $\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right)$  和  $\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right)$ , 其中  $\frac{\pi}{2}$  与  $\frac{3\pi}{2}$  都可以写成  $\frac{\pi}{2} \cdot n$  ( $n = 1, 3$ ), 是直角的奇数倍, 其终边都落在  $y$  轴上. 这与 1.4 节中的角  $(\pi \pm \alpha)$ 、 $(2\pi - \alpha)$ 、 $-\alpha$ 、 $2k\pi + \alpha$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 不同, 那里的  $\pi$ 、 $2\pi$ 、 $0$ 、 $2k\pi$  都可以写成  $\frac{\pi}{2} \cdot n$  ( $n = 0, 2, 4, \dots$ ) 是直角的偶数倍, 其终边都落在  $x$  轴上.
2. 公式右边的函数都是左边函数的余名函数. 这也与 1.4 节的情况不同, 那里左、右两边是同名函数.
3. 公式右边的符号与  $\alpha$  为锐角时左边函数值的符号一致, 这一点与 1.4 节的情况相同. 因此, 也可以说成是“符号看象限”.

基于上述分析,前后九组诱导公式的左边可以统一写成  $f\left(\frac{\pi}{2} \cdot n \pm \alpha\right)$ , 当  $n$  为奇数时,右边变为余名函数;当  $n$  为偶数时,右边仍为同名函数,符号一律取  $\alpha$  为锐角时,左边函数值的符号,为便于记忆,这可简述为“奇变偶不变,符号看象限”。

诱导公式的主要功能是化简。能把一个任意角的函数,通过“去负”、“去周”、“化锐角”的方法,最后化成锐角的三角函数。这对函数的研究与计算无疑会带来很大的方便。但是诱导公式的其他功能也不容忽视,如当  $n$  为奇数时,“从右往左”用它,可以把一个函数变为余名函数。例如,

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), & \cos \alpha &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \\ \tan \alpha &= \cot \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), & \cot \alpha &= \tan \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\end{aligned}$$

这种改变函数名称的方法无论在计算上还是在函数性质的研究上,都是有用的。

**例 2.4** 把  $\cos \frac{4\pi}{5}$  化为:

(1) 锐角的同名函数;

(2) 锐角的余名函数。

解:

$$(1) \cos \frac{4\pi}{5} = \cos \left(\pi - \frac{\pi}{5}\right) = -\cos \frac{\pi}{5}$$

(图 2.3)

$$(2) \cos \frac{4\pi}{5} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{4\pi}{5}\right) = -\sin \frac{3\pi}{10}$$

或

$$\cos \frac{4\pi}{5} = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{10}\right) = -\sin \frac{3\pi}{10}$$




图 2.3

**例 2.5** 不查表,求  $\sin 113^\circ \cos 22^\circ + \sin 203^\circ \sin 155^\circ$  的值。

**分析:** 由所给式子的结构,容易想到应“从右往左”用和(差)角公式。但形式上  $\alpha$ 、 $\beta$  及函数名称都不规范,须用诱导公式对后一项进行适当变形。

**解:**

$$\because \sin 203^\circ = \sin(90^\circ + 113^\circ) = \cos 113^\circ$$

$$\sin 158^\circ = \sin(180^\circ - 22^\circ) = \sin 22^\circ$$

$$\therefore \text{原式} = \sin 113^\circ \cos 22^\circ + \cos 113^\circ \sin 22^\circ = \sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

例 2.6 化简下列各式:

$$(1) \frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x$$

$$(2) \sqrt{3} \sin x + \cos x$$

$$(3) \sin x - \cos x$$

解:

$$(1) \text{ 原式} = \sin \frac{\pi}{6} \cos x - \cos \frac{\pi}{6} \sin x = \sin \left( \frac{\pi}{6} - x \right)$$

$$(2) \text{ 原式} = 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) = 2 \left( \sin x \cos \frac{\pi}{6} + \cos x \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$(3) \text{ 原式} = \sqrt{2} \left( \sin x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \cos x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} \left( \sin x \cdot \cos \frac{\pi}{4} - \cos x \cdot \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \sin \left( x - \frac{\pi}{4} \right)$$

例 2.7 计算  $\frac{1 + \tan 15^\circ}{1 - \cot 75^\circ}$

分析: 利用  $1 = \tan 45^\circ$ , 可把原式改写成  $\frac{\tan 45^\circ + \tan 15^\circ}{1 - \tan 45^\circ \cdot \cot 75^\circ}$ , 从而, 可以“从右往左”运用和角公式.

解:  $\because 1 = \tan 45^\circ, \cot 75^\circ = \tan 15^\circ$

$$\therefore \text{原式} = \frac{\tan 45^\circ + \tan 15^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 15^\circ} = \tan(45^\circ + 15^\circ) = \sqrt{3}$$

## 习题二

### A

1. 把  $\sin \frac{11\pi}{8}$  化为

- (1) 锐角的同名函数;      (3)  $0 \sim \frac{\pi}{4}$  的三角函数.  
 (2) 锐角的余名函数;

2. 化简:

$$(1) \cos 80^\circ \cos 20^\circ + \sin 80^\circ \sin 20^\circ$$

$$(2) \cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ$$

$$(3) \sin 14^\circ \cos 16^\circ + \sin 76^\circ \cos 74^\circ$$

$$(4) \sin 21^\circ \cos 81^\circ - \sin 69^\circ \cos 9^\circ$$

$$(5) \sin(\alpha - \beta) \cos \beta + \cos(\alpha - \beta) \sin \beta$$

$$(6) \cos(\alpha + \beta) \cos \beta + \sin(\alpha + \beta) \sin \beta$$

$$(7) \cos(36^\circ + x) \cos(54^\circ - x) - \sin(36^\circ + x) \sin(54^\circ - x)$$

$$(8) \sin(70^\circ + \alpha) \cos(10^\circ + \alpha) - \cos(70^\circ + \alpha) \sin(170^\circ - \alpha)$$

3. 化简:

$$(1) \sin 347^\circ \cos 148^\circ + \sin 77^\circ \cos 58^\circ$$

$$(2) \sin 164^\circ \sin 224^\circ + \sin 254^\circ \sin 314^\circ$$

$$(3) \cos(\alpha - \beta) \cos(\beta - \gamma) - \sin(\alpha - \beta) \sin(\beta - \gamma)$$

$$(4) \cos(\theta - \varphi) \cos \varphi + \sin(\theta - \varphi) \sin \varphi$$

4. 化简:

$$(1) \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{3}{2} \sin x$$

$$(2) \sqrt{2}(\sin x - \cos x)$$

$$(3) \sqrt{3} \sin x + \cos x$$

5. 在  $\triangle ABC$  中:

$$(1) \text{ 已知 } \cos A = \frac{4}{5}, \cos B = \frac{12}{13}, \text{ 求 } \cos C$$

$$(2) \text{ 已知 } \sin A = \frac{3}{5}, \cos B = \frac{5}{13}, \text{ 求 } \cos C$$

(提示: 应能看出  $B$  都是锐角, 那么  $A$  能是钝角吗?)

6. 化简:

$$(1) \frac{\tan 53^\circ - \tan 23^\circ}{1 + \tan 53^\circ \cot 67^\circ}$$

$$(3) \frac{1 + \tan 15^\circ}{1 + \cot 75^\circ}$$

$$(2) \frac{\tan 2\theta - \tan \theta}{1 + \tan 2\theta \tan \theta}$$

$$(4) \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta}$$

7. 求证:

$$(1) \tan(x + y) \cdot \tan(x - y) = \frac{\tan^2 x - \tan^2 y}{1 - \tan^2 x \tan^2 y}$$

$$(2) \cot\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right) = \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta}$$

$$(3) \frac{\tan x + \tan y}{\tan x - \tan y} = \frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)}$$

**B**

8. 用  $\cot \alpha$ 、 $\cot \beta$  表示  $\cot(\alpha \pm \beta)$ , 并求  $\frac{1 - \cot 15^\circ}{1 + \cot 15^\circ}$  的值.

9. 已知  $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{4}{5}$ ,  $\cos(\alpha + \beta) = \frac{4}{5}$ , 且  $(\alpha - \beta) \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ,  $(\alpha + \beta) \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$

求  $\cos 2\alpha$ 、 $\cos 2\beta$  [提示:  $2\alpha = (\alpha - \beta) + (\alpha + \beta)$ ]

10. 已知  $\cos \alpha = \frac{1}{7}$ ,  $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{14}$ , 且  $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ , 求  $\cos \beta$ .

11. 已知  $\alpha, \beta$  为锐角,  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ,  $\tan(\alpha - \beta) = -\frac{1}{3}$ , 求  $\cos \beta$ .

12. 已知  $\sin \alpha - \sin \beta = -\frac{1}{3}$ ,  $\cos \alpha - \cos \beta = \frac{1}{2}$ , 求  $\cos(\alpha - \beta)$  的值.

[提示: 思考  $\cos(\alpha - \beta)$  展开式的结构怎样由已知直接得到]

**C**

13. 推求以单角  $\alpha, \beta, \gamma$  的函数表达  $\sin(\alpha + \beta + \gamma)$  与  $\cos(\alpha + \beta + \gamma)$  的公式.

现在进一步谈谈灵活使用公式  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$  的问题. 前面讲过, 这个公式的结构特征是用  $\tan \alpha$ 、 $\tan \beta$  的**和与积**表示出了  $\tan(\alpha + \beta)$ . 因此, 所给问题中, 若出现了  $\tan \alpha$ 、 $\tan \beta$  的和与积, 你就应“联想”这个公式.

**例 2.8** 求证:  $\tan 20^\circ + \tan 40^\circ + \sqrt{3} \tan 20^\circ \cdot \tan 40^\circ = \sqrt{3}$

**解:** 由  $\frac{\tan 20^\circ + \tan 40^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 40^\circ} = \tan(20^\circ + 40^\circ) = \sqrt{3}$ , 得

$$\tan 20^\circ + \tan 40^\circ = \sqrt{3}(1 - \tan 20^\circ \tan 40^\circ)$$

$$\therefore \tan 20^\circ + \tan 40^\circ + \sqrt{3} \tan 20^\circ \tan 40^\circ = \sqrt{3}$$

**例 2.9** 若  $A + B = 225^\circ$ , 求证:

$$\frac{\cot A}{1 + \cot A} \cdot \frac{\cot B}{1 + \cot B} = \frac{1}{2} \quad (1)$$

证明:

$$\begin{aligned}\text{左} &= \frac{1}{1 + \tan A} \cdot \frac{1}{1 + \tan B} \\ &= \frac{1}{\tan A \tan B + (\tan A + \tan B) + 1}\end{aligned}\quad (2)$$

(注意, 这里出现了“正切的和与积”!)

由  $\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \tan(A + B) = \tan 225^\circ = 1$ , 得

$$\tan A + \tan B = 1 + \tan A \tan B \quad (3)$$

(3) 代入 (2), 得

$$\text{左边} = \frac{1}{\tan A \tan B + (1 - \tan A \tan B) + 1} = \frac{1}{2} \Rightarrow (1) \text{成立}$$

### 习题三

#### B

1. 求证:  $\tan 95^\circ - \tan 35^\circ - \sqrt{3} = \sqrt{3} \tan 95^\circ \cdot \tan 35^\circ$ ,

2. 已知  $\tan \alpha$ 、 $\tan \beta$  是方程  $x^2 + 6x + 7 = 0$  的两个根,

(1) 求证:  $\sin(\alpha + \beta) = \cos(\alpha + \beta)$

(2) 求  $\sin(\alpha + \beta) \cos(\alpha + \beta) + 8 \cos^2(\alpha + \beta)$  的值

3. 若  $\alpha + \beta + \gamma = n\pi$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ), 求证:

$$\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma$$

4. 求证:

$$\tan(x - y) + \tan(y - z) + \tan(z - x) = \tan(x - y) \tan(y - z) \tan(z - x)$$

5.  $\theta = 15^\circ$ , 求  $\tan \frac{\theta}{2} + \tan \frac{\theta}{2} \tan \frac{5\theta}{2} + \tan \frac{5\theta}{2}$  的值。

#### C

6. 化简:

$$\tan 2A \tan(30^\circ - A) + \tan 2A \tan(60^\circ - A) + \tan(60^\circ - A) \tan(30^\circ - A)$$



## 2.3 倍角的正弦、余弦、正切

在和角公式中, 以  $\alpha$  代替  $\beta$ , 得到二倍角公式:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha \quad (\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha)$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

在 2.2 节中关于和角公式的说明, 这里也完全适用。

**例 2.10** 已知  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ ,  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 求  $\sin 2\alpha$ ,  $\cos 2\alpha$ ,  $\tan 2\alpha$ .

**解:** 由  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ ,  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 得:

$$\cos 2\alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2} = -\frac{12}{13}$$

$$\therefore \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{5}{13} \times \left(-\frac{12}{13}\right) = -\frac{120}{169}$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 1 - 2 \times \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{119}{169}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{-\frac{120}{169}}{\frac{119}{169}} = -\frac{120}{119}$$

**例 2.11** (1) 用  $\sin \theta$  表示  $\sin 3\theta$ ;

(2) 用  $\cos \theta$  表示  $\cos 3\theta$ .

**解:**

$$\begin{aligned} (1) \quad \sin 3\theta &= \sin(2\theta + \theta) = \sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta \\ &= 2 \sin \theta \cos^2 \theta + (1 - 2 \sin^2 \theta) \sin \theta \\ &= 2 \sin \theta (1 - \sin^2 \theta) + \sin \theta - 2 \sin^3 \theta \\ &= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta \end{aligned}$$

$$\therefore \sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta \quad (1)$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \cos 3\theta &= \cos(2\theta + \theta) = \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta \\ &= (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta \cos\theta \\ &= 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2(1 - \cos^2\theta)\cos\theta \\ &= 4\cos^3\theta - 3\cos\theta \end{aligned}$$

$$\therefore \cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta \quad (2)$$

注意：(1)(2) 也可写成降幂形式：

$$\begin{aligned} 4\sin^3\theta &= 3\sin\theta - \sin 3\theta \\ 4\cos^3\theta &= 3\cos\theta + \cos 3\theta \end{aligned}$$

例 2.12 求证：

$$[\sin\theta(1 + \sin\theta) + \cos\theta(1 + \cos\theta)] \times [\sin\theta(1 - \sin\theta) + \cos\theta(1 - \cos\theta)] = \sin 2\theta$$

分析：差异主要在运算上，应从左到右，由繁化简。

证明：

$$\begin{aligned} \text{左边} &= (\sin\theta + \sin^2\theta + \cos\theta + \cos^2\theta)(\sin\theta - \sin^2\theta + \cos\theta - \cos^2\theta) \\ &= (\sin\theta + \cos\theta + 1)(\sin\theta + \cos\theta - 1) \\ &= (\sin\theta + \cos\theta)^2 - 1 = 2\sin\theta\cos\theta + 1 - 1 = \sin 2\theta \end{aligned}$$

$\therefore$  原式成立。

例 2.13 化简： $\sin 50^\circ (1 + \sqrt{3}\tan 10^\circ)$

分析：从角入手，用和（差）角公式，很繁。考虑到特殊值  $\sqrt{3}$ ，有下面两种方法。

解：解法 1：

$$\begin{aligned} 1 + \sqrt{3}\tan 10^\circ &= 1 + \frac{\sqrt{3}\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ} = \frac{\cos 10^\circ + \sqrt{3}\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ} \\ &= \frac{2\left(\frac{1}{2}\cos 10^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 10^\circ\right)}{\cos 10^\circ} \\ &= \frac{2(\sin 30^\circ \cos 10^\circ + \cos 30^\circ \sin 10^\circ)}{\cos 10^\circ} = \frac{2\sin 40^\circ}{\cos 10^\circ} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{原式} = \sin 50^\circ \cdot \frac{2 \sin 40^\circ}{\cos 10^\circ} = \frac{2 \sin 40^\circ \cos 10^\circ}{\cos 10^\circ} = \frac{\sin 80^\circ}{\cos 10^\circ} = \frac{\cos 10^\circ}{\cos 10^\circ} = 1$$

**解法 2:**

$$1 + \sqrt{3} \tan 10^\circ = 1 + \tan 60^\circ \tan 10^\circ = \frac{\tan 60^\circ - \tan 10^\circ}{\tan 50^\circ}$$

(以下留给读者完成)

应该明确: 对于“二倍角”应该有广义的理解, 如  $8\alpha$  是  $4\alpha$  的二倍角, 因此有:

$$\sin 8\alpha = 2 \sin 4\alpha \cos 4\alpha, \dots$$

$$\text{又如, } a = 2 \cdot \frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{2} = 2 \cdot \frac{\alpha}{4}, \dots, \frac{\alpha}{2^n} = 2 \cdot \frac{\alpha}{2^{n+1}}$$

$$\therefore \sin \frac{\alpha}{2^n} = 2 \sin \frac{\alpha}{2^{n+1}} \cos \frac{\alpha}{2^{n+1}} \quad \cos \frac{\alpha}{2^n} = \cos^2 \frac{\alpha}{2^{n+1}} - \sin^2 \frac{\alpha}{2^{n+1}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2^n} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2^{n+1}}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2^{n+1}}} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

此外, 二倍角公式的下列变形<sup>①</sup>, 今后也是有用的:

二倍角公式	变形
$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$	$\cos \alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2 \sin \alpha}$
$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$	$\cos 2\alpha = (\cos \alpha + \sin \alpha)(\cos \alpha - \sin \alpha)$
$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$	$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad (1)$
$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$	$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad (2)$
$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$	$\tan^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \quad (3)$

## 习题四

### A

1. 不查表, 求下列各式的值。

<sup>①</sup>要注意分析这些公式中等号两边式子的结构特征(角、函数、运算). 这对何时使用它们是很有用的. 公式(1)、(2)、(3)称为降幂式.

(1)  $2 \sin 67^\circ 30' \cos 67^\circ 30'$

(2)  $\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8}$

(3)  $2 \cos^2 \frac{\pi}{12} - 1$

(4)  $1 - 2 \sin^2 75^\circ$

(5)  $\frac{2 \tan 22.5^\circ}{1 - \tan^2 22.5^\circ}$

(6)  $\sin 15^\circ \cos 15^\circ$

(7)  $1 - 2 \sin^2 750^\circ$

(8)  $\frac{2 \tan 150^\circ}{1 - \tan^2 150^\circ}$

(9)  $\sin^2 \frac{\pi}{16} - \cos^2 \frac{\pi}{16}$

(10)  $\frac{\tan \frac{5\pi}{24}}{1 - \tan^2 \frac{5\pi}{24}}$

2. 化简:

(1)  $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2$

(2)  $\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$

(3)  $\cos^4 \varphi - \sin^4 \varphi$

(4)  $\frac{1}{1 - \tan \theta} - \frac{1}{1 + \tan \theta}$

3. 已知  $\sin \alpha = 0.3$ ,  $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ , 求  $\sin 2\alpha$ ,  $\cos 2\alpha$ .4. 已知  $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$ ,  $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 求  $\cos 2\alpha$ ,  $\sin 2\alpha$ ,  $\tan 2\alpha$ ,  $\cot 2\alpha$ .5. 已知  $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ , 求  $\tan 2\alpha$ ,  $\cot 2\alpha$ .6. 推出由  $\tan \alpha$  表示  $\tan 3\alpha$  的公式.

7. 化简:

(1)  $\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ}$

(2)  $\frac{\sqrt{3}}{4 \sin 20^\circ} - \frac{1}{4 \sin 70^\circ}$

(3)  $\frac{1}{\cos^2 280^\circ} - \frac{3}{\sin^2 280^\circ}$

8. 已知  $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ , 求  $\sin 2\alpha$ ,  $\cos 2\alpha$  (注意与题 4 对比).

9. 求证:  $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} = 2 \sec 2x$

**B**

10. 化简:  $\frac{2 \cos^2 \alpha - 1}{2 \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) \cdot \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)}$  (注意: 分母上的角互余)

11. 求证:  $\tan 70^\circ - \frac{1}{\cos 10^\circ} = \sqrt{3}$

12. 不查表, 利用  $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$ , 求  $\tan 7.5^\circ$  的值.

## 2.4 半角的正弦、余弦、正切

在上节的降幂式中, 以  $\frac{\alpha}{2}$  代替  $\alpha$ , 得

$$\begin{cases} \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} \\ \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2} \\ \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha} \end{cases} \xrightarrow{\text{开平方}} \begin{cases} \sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} & (1) \\ \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} & (2) \\ \tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} & (3) \end{cases}$$

(1)、(2)、(3) 称为**半角公式**. 这三个公式中, 右边根号前的符号, 由  $\frac{\alpha}{2}$  所在的象限确定. 因此, 在使用半角公式时, 判断  $\frac{\alpha}{2}$  所在的象限是首要的步骤.

$\tan \frac{\alpha}{2}$  还可以用不带根号的式子表示:

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

或

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

即

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \quad (4)$$

(4) 称为“**有理**”半角公式. 它没有根号, 也没有双重符号, 与 (3) 相比较用起来更加方便, 是恒等变形中的重要公式.

### 练习

当  $\alpha$  为锐角时, 在单位圆中 (图 2.4), 试用几何方法推证公式 (4)

(这个证明, 有助于形象地记忆公式 (4)).




图 2.4

**例 2.14** 已知  $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ , 求  $\sin \frac{\alpha}{2}$ ,  $\cos \frac{\alpha}{2}$ ,  $\tan \frac{\alpha}{2}$ .

分析: 因为  $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ , 对  $\alpha$  未加其他限制条件, 所以  $\alpha$  既可能是 I 象限角 (此时  $\frac{\alpha}{2} \in \text{I 象限或 III 象限}$ ), 又可能是 IV 象限角 (此时  $\frac{\alpha}{2} \in \text{II 象限或 IV 象限}$ ). 因此  $\frac{\alpha}{2}$  可能出现在 I、II、III、IV 各个象限中, 因而在使用半角公式时, 根号应保持正负两个符号.

解:

$$\begin{aligned}\sin \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \pm \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2}}{2}} = \pm \frac{1}{2} \\ \cos \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = \pm \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2}}{2}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \pm \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}\end{aligned}$$

### 思考题

当  $\cos \alpha < 0$  时, 若对  $\alpha$  不加其他限制条件,  $\frac{\alpha}{2}$  是否也可能出现在四个象限之中?

例 2.15 已知  $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ , 并且  $180^\circ < \theta < 270^\circ$ , 求  $\tan \frac{\theta}{2}$

解: 解法 1: 由  $180^\circ < \theta < 270^\circ \Rightarrow 90^\circ < \frac{\theta}{2} < 135^\circ$

$$\therefore \tan \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = -\sqrt{\frac{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)}{1 + \left(-\frac{3}{5}\right)}} = -2$$

解法 2: 由  $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ,

$$\therefore \sin \theta = -\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = -\frac{4}{5}$$

从而

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)}{-\frac{4}{5}} = -2$$

或

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{-\frac{4}{5}}{1 + \left(-\frac{3}{5}\right)} = -2$$

例 2.16 用  $\tan \frac{\alpha}{2}$  表示  $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ .

解:

$$\sin \alpha = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad (5)$$

$$\cos \alpha = \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad (6)$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} \quad (7)$$

公式 (5)、(6)、(7) 提供了用角之半的正切表示该角任何三角函数的可能性。因而，这组公式通常叫做**万能公式**。若记  $\tan \frac{\alpha}{2} = t$ ，则

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2} \quad (*)$$

这样， $\alpha$  的各种三角函数就都可以通过 (\*) 化成以  $t$  为变元的一元有理函数，这往往会使问题得到简化。

**说明：**利用图 2.5 上的四个直角三角形之间的联系，可以形象地记忆万能公式。

### 思考题

用万能公式能解决下列几个问题吗？试试看。

- (1) 化简  $\frac{1+3 \tan x}{2 \cos 2x + \sin 2x - 1} - \frac{3+5 \tan x}{\cos 2x - 4 \sin 2x - 4}$
- (2) 求证  $\frac{\sin \alpha + 1}{1 + \sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{1}{2} \tan \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2}$
- (3) 若  $\tan A = \frac{\sqrt{6}}{12}$ ， $\tan B = \frac{1}{3}$ ，求证  $\cos^2 A = \sin 4B$
- (4) 若  $\cot \left( \frac{9\pi}{2} - \frac{x}{4} \right) = \frac{1}{3}$ ，求  $\sin x$  的值。




图 2.5

## 习题五

## A

1. 已知  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ , 求  $\sin \frac{\alpha}{2}$ ,  $\cos \frac{\alpha}{2}$ ,  $\tan \frac{\alpha}{2}$
2. 已知  $\sin \alpha = -\frac{2}{3}$ , 且  $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ , 分别用半角公式 (3)(4) 计算  $\tan \frac{\alpha}{2}$
3. 已知  $\cos \varphi = \frac{1}{3}$ , 且  $270^\circ < \varphi < 360^\circ$ , 求  $\sin \frac{\varphi}{2}$ ,  $\cos \frac{\varphi}{2}$ ,  $\tan \frac{\varphi}{2}$
4. 已知  $2\alpha + \beta = 90^\circ$ , 且  $\alpha$  是锐角, 求证:

$$\sin \alpha = \sqrt{\frac{1 - \sin \beta}{2}}, \quad \cos \alpha = \sqrt{\frac{1 + \sin \beta}{2}}$$

5. 已知等腰三角形的顶角的余弦等于  $\frac{7}{25}$ , 求这个三角形一个底角的正弦、余弦、正切 (做题时, 应画出草图) .
6. 已知圆心角的正弦等于  $\frac{3}{5}$ , 求这个圆心角所对弧上的圆周角的正弦、余弦、正切.
7. 求证:

$$(1) \sin \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

$$(2) \cos \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

$$(3) \tan 67^\circ 30' = \sqrt{2} + 1$$



8. 设  $\sin \alpha$  与  $\sin \frac{\alpha}{2}$  的比为  $8:5$ , 求  $\cos \alpha, \cot \frac{\alpha}{4}$ .

9. (1) 已知  $\tan \alpha = 2$ , 求  $\sin 2\alpha, \cos 2\alpha, \tan 2\alpha$

(2) 已知  $\tan \theta = \frac{b}{a}$ , 求证  $a \cos 2\theta + b \sin 2\theta = a$

(3) 已知  $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{m}{n}$ , 求  $m \cos \alpha + n \sin \alpha$  的值.

10. 化简:

$$(1) \left( \cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2} \right) \left( 1 + \tan \alpha \tan \frac{\alpha}{2} \right) - 2 \csc \alpha$$

$$(2) \frac{\cos A}{\cot \frac{A}{2} - \tan \frac{A}{2}} - \frac{1}{2} \sin A$$

$$(3) [(1 + \sin^2 \theta)^2 - \cos^4 \theta][(1 + \cos^2 \theta)^2 - \sin^4 \theta]$$

11. 求证:

$$(1) \frac{3 \sin 2\alpha - 4 \cos 2\alpha}{2 \tan \alpha - 1} = \sin 2\alpha + 4 \cos^2 \alpha$$

$$(2) \frac{4 \sin \alpha (1 - \tan^2 \alpha)}{\sec \alpha (1 + \tan^2 \alpha)} = \sin 4\alpha$$

$$(3) \tan \theta - \cot \theta = -2 \cot 2\theta$$

$$(4) \frac{15 \cos \theta - 8 \sin \theta}{3 - 5 \tan \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{2} (3 \sin \theta + 5 \cos \theta + 5)$$

## B

12. 用异于书上的方法, 证明万能公式.

13. 设  $\frac{3}{4}\pi < \theta < \frac{5}{4}\pi$ , 化简

$$\frac{\sqrt{\cos \frac{\pi}{4} \sin \left( \frac{3\pi}{4} - \theta \right) \left[ \sin(\pi - \theta) - \sin \left( \theta - \frac{\pi}{2} \right) \right]}}{\sin \left( \theta + \frac{\pi}{4} \right)}$$

以下, 我们再次研究三角恒等式的证明。

**例 2.17** 求证:  $\frac{\cos^2 \alpha}{\cot \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{4} \sin 2\alpha$

**分析:** 等号两边的差异如下:

	左边	右边
角	$\alpha, \frac{\alpha}{2}$	$2\alpha$
函数	$\cos, \cot, \tan$	$\sin$
运算	积、差、商	积

从不同的差异入手, 设计不同的“消除差异”程序, 就会得到不同的证题方法。

**证明:** 证法 1: 从角入手, 统一变为  $\alpha$ :

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \frac{\cos^2 \alpha}{\frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} - \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}} = \frac{\cos^2 \alpha}{\frac{2 \cos \alpha}{\sin \alpha}} = \frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha \\ \text{右边} &= \frac{1}{4} \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha\end{aligned}$$

$\therefore$  左边 = 右边

证法 2: 从函数入手, 化切为弦:

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \frac{\cos^2 \alpha}{\frac{\cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} - \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}} = \frac{\cos^2 \alpha}{\frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}} = \frac{\cos^2 \alpha}{\frac{1}{2} \sin \alpha} = \frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha \\ \text{右边} &= \frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha\end{aligned}$$

$\therefore$  左边 = 右边

证法 3: 从函数入手, 化弦为切: 记  $\tan \frac{\alpha}{2} = t$ , 则

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \frac{\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2}{\frac{1}{t} - t} = \frac{t \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2}{1-t^2} = \frac{t(1-t^2)}{(1+t^2)^2} \\ \text{右边} &= \frac{1}{4} \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{2t}{1+t^2} \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{t(1-t^2)}{(1+t^2)^2}\end{aligned}$$

$\therefore$  左边 = 右边

**评述:** 此例列出多种证法, 为的是向你展示认清式子的结构特征, 从不同的差异入手都可能找到消除差异的途径。由此看来, 只要仔细观察, 肯动脑筋, 多解并不神秘。

**例 2.18** 求证:  $2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta = 1 + \cos 2\alpha \cos 2\beta$  (\*)

**分析:** 该等式的主要差异在运算的次数上, 左边是四次, 右边是二次。于是, 除差异的途径是

$$\text{左边} \xrightleftharpoons[\text{升幂}]{\text{降幂}} \text{右边}$$

证明: 证法 1: (从左  $\Rightarrow$  右):

$$\begin{aligned}\text{左边} &= 2 \cdot \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \cdot \frac{1 - \cos 2\beta}{2} + 2 \cdot \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2\beta}{2} \\ &= \frac{1 - \cos 2\alpha - \cos 2\beta + \cos 2\alpha \cos 2\beta}{2} + \frac{1 + \cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\alpha \cos 2\beta}{2} \\ &= \frac{2 + 2 \cos 2\alpha \cos 2\beta}{2} = 1 + \cos 2\alpha \cos 2\beta\end{aligned}$$

$\therefore$  左边 = 右边.

证法 2: (从右  $\Rightarrow$  左):

$$\begin{aligned}\text{右边} &= 1 + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)(\cos^2 \beta - \sin^2 \beta) \\ &= 1 + \cos^2 \alpha \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta - \sin^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \\ &= \cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \beta + \cos^2 \alpha - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta \\ &= \cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha (1 - \cos^2 \beta) + \cos^2 \alpha (1 - \sin^2 \beta) \\ &= \cos^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + \cos^2 \alpha \cos^2 \beta \\ &= 2 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta + 2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta\end{aligned}$$

$\therefore$  左边 = 右边.

### 思考题

从证 (\*) 的等价命题考虑, 你还能找到新的证法吗?

例 2.19 求证:  $2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \cos 2\alpha$

分析: 若用和(差)角公式把左边两个函数展开是一条思路; 若从“整体入手”, 看出左边的两个角“互余”则更佳(“一个角的正弦等于其余角的余弦”, 因此, 在三角变换中若能看出角间的互余关系, 往往会给解题带来很大的方便).

证明: 左  $= 2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\alpha\right) = \cos 2\alpha =$  右

例 2.20 求证:  $\frac{\sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{1 + \cos \alpha} = \tan \frac{\alpha}{2}$

分析:

$$\text{左边} \xrightleftharpoons[\text{以切化弦}]{\text{以弦化切}} \text{右边}$$

证明: 左  $= \frac{\sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \cdot \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \tan \alpha \cdot \tan \frac{\alpha}{2} \cdot \cot \alpha = \tan \frac{\alpha}{2}$   
 $\therefore$  左 = 右

## 思考题

你还能想出其他证法吗？试试看。

**评述：**观察认清式子的结构特征是解题的非常重要的基本功（这就是“模式识别”）。具体到此题，左边第一个分式是熟悉的半角正切结构，而第二个却不熟悉。为实现化弦为切，构造出  $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$ ，问题便迎刃而解了。

## 习题六

## A

1. 各用两种方法证明：

$$(1) \cos 4\theta - 4\cos 2\theta + 3 = 8\sin^4 \theta$$

$$(2) \frac{1 + 2\sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha}$$

$$(3) \tan \theta = \frac{1 + \sin 2\theta - \cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta + \cos 2\theta}$$

$$(4) \frac{1 + \sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{\cos \varphi}{1 - \sin \varphi} = \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right)$$

2. 化简：

$$(1) \cos^2 A + \cos^2(120^\circ - A) + \cos^2(120^\circ + A)$$

$$(2) \sin^2 A + \sin^2(120^\circ - A) + \sin^2(120^\circ + A)$$

3. 证明下列恒等式：

$$(1) \frac{2\sin \alpha - \sin 2\alpha}{2\sin \alpha + \sin 2\alpha} = \tan^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$(2) \cos \alpha (\cos \alpha - \cos \beta) + \sin \alpha (\sin \alpha - \sin \beta) = 2\sin^2 \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$(3) \frac{\cos A}{\cot \frac{A}{2} - \tan \frac{A}{2}} = \frac{1}{2} \sin A$$

$$(4) \frac{\csc^2 \alpha - 2}{\csc^2 \alpha} = \cos 2\alpha$$

$$(5) \frac{\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)}{\sin^2 \alpha \cos^2 \beta} = 1 + \cot^2 \alpha \tan^2 \beta$$

$$(6) \frac{\cos \alpha}{\sec \frac{\alpha}{2} + \csc \frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{2} \sin \alpha \left( \cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \right)$$

**B**

4. 证明:

$$(1) \sin^4 \alpha \cdot \cos^2 \alpha = \frac{1}{32}(2 - \cos 2\alpha - 2 \cos 4\alpha + \cos 6\alpha)$$

$$(2) \sin^8 \alpha - \cos^8 \alpha + \frac{1}{4} \sin 2\alpha \cos 4\alpha = \cos 2\alpha$$

$$(3) \frac{\sec 8\beta - 1}{\sec 4\beta - 1} = \frac{\tan 8\beta}{\tan 2\beta}$$

$$(4) \sin(n\pi + \theta) \cos(n\pi - \theta) = \frac{1}{2} \sin 2\theta \quad (n \in \mathbb{Z})$$

5. 求证:  $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta \geq 0$ .**C**6.  $\alpha \in (0, \pi)$ , 求证  $2 \sin 2\alpha \leq \cot \frac{\alpha}{2}$ , 并指出等号何时成立.

7. 求证:

$$(2 \cos \theta - 1)(2 \cos 2\theta - 1)(2 \cos 2^2\theta - 1) \cdots (2 \cos 2^{n-1}\theta - 1) = \frac{2 \cos 2^n \theta + 1}{2 \cos \theta + 1}$$

**2.5 三角函数式的积化和差与和差化积**

在三角变换中, 三角函数的积的形式与和 (差) 的形式有时需要互化。现在, 研究这种互化。

**2.5.1 积化和差**

由和角公式与差角公式

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad (1)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad (2)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad (3)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad (4)$$

(1) + (2), (1) - (2), (3) + (4), (3) - (4), 得

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) = -2 \sin \alpha \sin \beta$$

即

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] \quad (5)$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \quad (6)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] \quad (7)$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)] \quad (8)$$

公式 (5)、(6)、(7)、(8) 叫做**积化和差公式**. 它的名称体现了它的功能和结构特征. 它的左边是  $\alpha$ 、 $\beta$  的正、余弦函数的乘积, 右边则是  $(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$  的正弦的和差或余弦的和差 (注意! 是同名函数的和差). 这组公式的记忆比较困难, 但是, 若能抓住每个公式的由来或结构, 也就化难为易了.

下面通过例题说明这组公式的应用.

**例 2.21** 用积化和差的方法, 求下列各式的值:

$$(1) \sin \frac{5\pi}{12} \cdot \cos \frac{\pi}{12}$$

$$(3) \cos \frac{\pi}{12} \cdot \sin \frac{13\pi}{12}$$

$$(2) \sin \frac{\pi}{8} \cdot \sin \frac{7\pi}{8}$$

$$(4) \cos 97^\circ 30' \cdot \cos 37^\circ 30'$$

解:

(1)

$$\begin{aligned} \sin \frac{5\pi}{12} \cdot \cos \frac{\pi}{12} &= \frac{1}{2} \left[ \sin \left( \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{12} \right) + \sin \left( \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left( \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{3} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{8} \cdot \sin \frac{7\pi}{8} &= -\frac{1}{2} \left[ \cos \left( \frac{\pi}{8} + \frac{7\pi}{8} \right) - \cos \left( \frac{\pi}{8} - \frac{7\pi}{8} \right) \right] \\ &= -\frac{1}{2} \left[ \cos \pi - \cos \left( -\frac{6\pi}{8} \right) \right] = -\frac{1}{2} \left( -1 - \cos \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\sqrt{2} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{12} \cdot \sin \frac{13\pi}{12} &= \frac{1}{2} \left[ \sin \left( \frac{\pi}{12} + \frac{13\pi}{12} \right) - \sin \left( \frac{\pi}{12} - \frac{13\pi}{12} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \sin \frac{7\pi}{6} - \sin(-\pi) \right] = \frac{1}{2} \sin \left( \pi + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

思考：若用诱导公式处理以上各题是否更简单？

(4)

$$\begin{aligned}\cos 97^{\circ}30' \cdot \cos 37^{\circ}30' &= \frac{1}{2} [\cos(97^{\circ}30' + 37^{\circ}30') + \cos(97^{\circ}30' - 37^{\circ}30')] \\ &= \frac{1}{2} [\cos 135^{\circ} + \cos 60^{\circ}] = \frac{1}{2} \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{2}\end{aligned}$$

**例 2.22** 把下列各式化为和差的形式，然后查表求值：

(1)  $2 \cos 31^{\circ} \sin 14^{\circ}$

(2)  $\cos \frac{2\pi}{15} \cos \frac{\pi}{5}$

解：

(1)

$$\begin{aligned}2 \cos 31^{\circ} \sin 14^{\circ} &= \sin(31^{\circ} + 14^{\circ}) - \sin(31^{\circ} - 14^{\circ}) = \sin 45^{\circ} - \sin 17^{\circ} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - 0.2924 \approx 0.7071 - 0.2924 = 0.4147\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\cos \frac{2\pi}{15} \cos \frac{\pi}{5} &= \frac{1}{2} \left[ \cos \left( \frac{2\pi}{15} + \frac{\pi}{5} \right) + \cos \left( \frac{2\pi}{15} - \frac{\pi}{5} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left( \cos \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{15} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \cos 12^{\circ} \right) \\ &\approx 0.2500 + 0.4891 = 0.7391\end{aligned}$$

**例 2.23** 求  $\cos 10^{\circ} \cos 30^{\circ} \cos 50^{\circ} \cos 70^{\circ}$

解:

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \cos 10^\circ \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} [\cos(50^\circ + 70^\circ) + \cos(50^\circ - 70^\circ)] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 10^\circ \left( -\frac{1}{2} + \cos 20^\circ \right) = -\frac{\sqrt{3}}{8} \cos 10^\circ + \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 10^\circ \cos 20^\circ \\
 &= -\frac{\sqrt{3}}{8} \cos 10^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} (\cos 30^\circ + \cos 10^\circ) \\
 &= -\frac{\sqrt{3}}{8} \cos 10^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{8} \cos 10^\circ = \frac{3}{16}
 \end{aligned}$$

### 思考题

类比此例（或以此例为原型）你能编出新的证明题吗？

**例 2.24** 化简： $\cos(\alpha+\beta) \cos(\alpha-\beta) - \cos(\beta+\gamma) \cos(\beta-\gamma) + \cos(\alpha+\gamma) \cos(\alpha-\gamma)$

**分析：**若用和（差）角公式展开比较繁，改用积化和差做。

**解：**

$$\begin{aligned}
 \cos(\alpha+\beta) \cos(\alpha-\beta) &= \frac{1}{2} (\cos 2\alpha + \cos 2\beta) \\
 -\cos(\beta+\gamma) \cos(\beta-\gamma) &= -\frac{1}{2} (\cos 2\beta + \cos 2\gamma) \\
 +) \quad \cos(\alpha+\gamma) \cos(\alpha-\gamma) &= \frac{1}{2} (\cos 2\alpha + \cos 2\gamma) \\
 \hline
 \text{原式} &= \frac{1}{2} (2 \cos 2\alpha) = \cos 2\alpha
 \end{aligned}$$

**例 2.25** 求证：

$$\cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha + \cdots + \cos n\alpha = \frac{\sin \left( n\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \left( \alpha - \frac{\alpha}{2} \right)}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$$

**分析：**欲证原式，变换命题，可先证

$$2 \sin \frac{\alpha}{2} (\cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha + \cdots + \cos n\alpha) = \sin \left( n\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \left( \alpha - \frac{\alpha}{2} \right) \quad (*)$$

（左边是  $n$  个乘积的和，右边是两项的差，左边有可能裂项相消得出右边，从而考虑左边先积化和差。）

**证明：**



$$\begin{aligned}
 2 \cos \alpha \sin \frac{\alpha}{2} &= \sin \left( \alpha + \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \left( \alpha - \frac{\alpha}{2} \right) \\
 2 \cos 2\alpha \sin \frac{\alpha}{2} &= \sin \left( 2\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \left( 2\alpha - \frac{\alpha}{2} \right) \\
 2 \cos 3\alpha \sin \frac{\alpha}{2} &= \sin \left( 3\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \left( 3\alpha - \frac{\alpha}{2} \right) \\
 &\dots\dots\dots \\
 +) \quad 2 \cos n\alpha \sin \frac{\alpha}{2} &= \sin \left( n\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \left( n\alpha - \frac{\alpha}{2} \right) \\
 \hline
 \text{左边} &= \sin \left( n\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) - \sin \left( \alpha - \frac{\alpha}{2} \right)
 \end{aligned}$$

$\therefore$  (\*) 成立, 两边同除以  $2 \sin \frac{\alpha}{2}$ , 得原式。

### 思考题

类比例 2.25, 试编两个求和题, 并求和。

## 习题七

### A

1. 不查表, 求下列各式的值:

(1)  $\sin 105^\circ \cos 75^\circ$

(5)  $\cos \frac{\pi}{8} \sin \frac{13\pi}{8}$

(2)  $2 \cos 37.5^\circ \cos 22.5^\circ$

(6)  $\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12}$

(3)  $\sin 67.5^\circ \sin 52.5^\circ$

(7)  $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \cos 20^\circ \sin 70^\circ$

(4)  $\cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{13\pi}{12}$

(8)  $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$

2. 把下列各式化为和差的形式, 然后查表求值:

(1)  $2 \sin 70^\circ \cos 20^\circ$

(3)  $\cos 68^\circ \cos 52^\circ$

(2)  $\cos 75^\circ \sin 15^\circ$

(4)  $\sin 121^\circ \sin 59^\circ$

3. 证明下列恒等式:

(1)  $2 \sin \left( \frac{\pi}{3} + \alpha \right) \cdot \sin \left( \frac{\pi}{6} - \alpha \right) = 2 \sin \left( \frac{2\pi}{3} + 2\alpha \right)$

$$(2) 2 \sin(60^\circ + \alpha) \cdot \cos(60^\circ - \alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin 2\alpha$$

$$(3) \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 5\alpha \sin 2\alpha = \cos 4\alpha \cos 3\alpha$$

$$(4) \cos 4x \cos 2x - \cos^2 3x = -\sin^2 x$$

4. 化简:

$$(1) \sin(x+y) \sin(x-y) + \sin(y+z) \sin(y-z) + \sin(z+x) \sin(z-x)$$

$$(2) \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)}{\sin^4 x - \cos^4 x}$$

5. 把下列乘积化为和差的形式:

$$(1) \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) \quad (2) \cos\left(\frac{3\pi}{4} + 2\varphi\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} - \varphi\right)$$

$$6. \text{ 求证: } \cos 12^\circ \cos 24^\circ \cos 48^\circ \cos 96^\circ = \frac{1}{2^4}$$

7. 求值:

$$(1) \sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ \quad (2) \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{2\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{4\pi}{9}$$

## B

$$8. \text{ 求证: } \sin 3\alpha \sin^3 \alpha + \cos 3\alpha \cos^3 \alpha = \cos^3 2\alpha$$

9. 求证:

$$(1) \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} = \frac{1}{2}$$

$$(2) \cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \cdots + \cos(2n-1)\alpha = \frac{\sin 2n\alpha}{2 \sin \alpha}$$

### 2.5.2 和差化积

积化和差公式 (5)、(6)、(7)、(8), 如果“从右往左”用, 实质上就是和差化积。但是, 形式上为了使用更加方便, 在这组公式中, 令

$$\begin{cases} \alpha + \beta = x \\ \alpha - \beta = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{x+y}{2} \\ \beta = \frac{x-y}{2} \end{cases}$$

则有

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad (5')$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \quad (6')$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} \quad (7')$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \quad (8')$$

公式 (5')、(6')、(7')、(8') 称为**和差化积公式**。它的名称也体现了它的功能和结构特征。它的左边是角  $x$ 、 $y$  的正弦的和(差)或余弦的和(差) [注意! 是同名弦函数的和(差)]; 右边则是  $\frac{x+y}{2}$ 、 $\frac{x-y}{2}$  的正、余弦乘积的二倍。记忆这组公式的方法可以联系它的由来和结构特征。

**例 2.26** 证明公式  $\tan \alpha \pm \tan \beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$

证明:

$$\text{左边} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \pm \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \frac{\sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$\therefore$  原式成立 (这个公式可看作是**正切函数的和差化积**) .

**例 2.27** 把下列各式化为积的形式:

$$(1) \sin 104^\circ + \sin 16^\circ$$

$$(3) \sin \frac{11\pi}{24} - \sin \frac{5\pi}{24}$$

$$(2) \cos \left( \alpha + \frac{\pi}{4} \right) + \cos \left( \alpha - \frac{\pi}{4} \right)$$

解:

(1)

$$\begin{aligned} \sin 104^\circ + \sin 16^\circ &= 2 \sin \frac{104^\circ + 16^\circ}{2} \cos \frac{104^\circ - 16^\circ}{2} \\ &= 2 \sin 60^\circ \cos 44^\circ = \sqrt{3} \cos 44^\circ \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} &\cos \left( \alpha + \frac{\pi}{4} \right) + \cos \left( \alpha - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= 2 \cos \frac{\left( \alpha + \frac{\pi}{4} \right) + \left( \alpha - \frac{\pi}{4} \right)}{2} \cdot \cos \frac{\left( \alpha + \frac{\pi}{4} \right) - \left( \alpha - \frac{\pi}{4} \right)}{2} \\ &= 2 \cos \alpha \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cos \alpha \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 \sin \frac{11\pi}{24} - \sin \frac{5\pi}{24} &= 2 \cos \frac{\frac{11\pi}{24} + \frac{5\pi}{24}}{2} \sin \frac{\frac{11\pi}{24} - \frac{5\pi}{24}}{2} \\
 &= 2 \cos \frac{\pi}{3} \cdot \sin \frac{\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{8} \\
 &= \sqrt{\frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

评述：作为结果，特殊角应求出其值。

例 2.28 把下列各式化为积的形式：

$$(1) \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(2) \sin x + \cos y$$

解：

(1)

$$\begin{aligned}
 \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} &= \cos x - \cos \frac{\pi}{6} && \text{(先变为同名函数)} \\
 &= -2 \sin \frac{x + \frac{\pi}{6}}{2} \sin \frac{x - \frac{\pi}{6}}{2} \\
 &= -2 \sin \left( \frac{x}{2} + \frac{\pi}{12} \right) \sin \left( \frac{x}{2} - \frac{\pi}{12} \right)
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 \sin x + \cos y &= \sin x + \sin \left( \frac{\pi}{2} - y \right) && \text{(先变为同名函数)} \\
 &= 2 \sin \frac{x + \frac{\pi}{2} - y}{2} \cos \frac{x - \frac{\pi}{2} + y}{2} \\
 &= 2 \sin \left( \frac{x - y}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \cos \left( \frac{x + y}{2} - \frac{\pi}{4} \right)
 \end{aligned}$$

例 2.29 求  $\sin 10^\circ \sin 50^\circ - \sin 50^\circ \sin 70^\circ - \sin 70^\circ \sin 10^\circ$  的值。

解：解法 1：各项积化和差：

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= -\frac{1}{2}(\cos 60^\circ - \cos 40^\circ) + \frac{1}{2}(\cos 120^\circ - \cos 20^\circ) + \frac{1}{2}(\cos 80^\circ - \cos 60^\circ) \\
 &= -\frac{3}{4} + \frac{1}{2}(\cos 40^\circ + \cos 80^\circ - \cos 20^\circ) \\
 &= -\frac{3}{4} + \frac{1}{2}(2 \cos 60^\circ \cos 20^\circ - \cos 20^\circ) = -\frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

**解法 2:** 前两项先提公因式:

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \sin 50^\circ (\sin 10^\circ - \sin 70^\circ) - \sin 70^\circ \sin 10^\circ \\
 &= \sin 50^\circ \cdot 2 \cos 40^\circ \sin(-30^\circ) - \sin 70^\circ \sin 10^\circ \\
 &= -\sin 50^\circ \cos 40^\circ - \sin 70^\circ \sin 10^\circ \\
 &= -\frac{1}{2}(\sin 90^\circ + \sin 10^\circ) + \frac{1}{2}(\cos 80^\circ - \cos 60^\circ) \\
 &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin 10^\circ + \frac{1}{2} \sin 10^\circ - \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

**例 2.30** 求证:  $\frac{\sin(2\alpha + \beta)}{\sin \alpha} - 2 \cos(\alpha + \beta) = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$  (1)

**分析:** 从运算上看, 有两个同分母的分式, 因此, 先证其等价命题

$$\frac{\sin(2\alpha + \beta)}{\sin \alpha} - \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = 2 \cos(\alpha + \beta) \quad (2)$$

可能简捷, 以下留给读者完成。

**例 2.31** 求证:

$$\sin(x+y-z) + \sin(x-y+z) + \sin(-x+y+z) = \sin(x+y+z) + 4 \sin x \sin y \sin z \quad (1)$$

**分析:** 从角入手比较繁琐。从运算上看, 先证其等价命题:

$$\sin(x+y-z) + \sin(x-y+z) + \sin(-x+y+z) - \sin(x+y+z) = 4 \sin x \sin y \sin z \quad (2)$$

可能简捷。

**证明:** 为证 (1), 先证 (2). 对左边和差化积, 得

$$\begin{aligned}
 \text{左边} &= 2 \sin x \cos(y-z) + 2 \cos(y+z) \sin(-x) \\
 &= 2 \sin x [\cos(y-z) - \cos(y+z)] \\
 &= 2 \sin x [-2 \sin y \cdot \sin(-z)] = 4 \sin x \sin y \sin z
 \end{aligned}$$

$\therefore$  (2) 成立  $\Rightarrow$  (1) 成立.

**评述:** 从以上两例可以看出: 和差化积在证等式的过程中的作用是着眼于运算, 把和差转化为乘积。

**例 2.32** 求:  $\sin^2 10^\circ + \cos^2 40^\circ + \sin 10^\circ \cos 40^\circ$  的值。

**分析:**

1. (从运算入手) 前两项降幂后化积, 第三项积化和差, 都能出现特殊角。
2. (从角入手) 利用  $40^\circ = 30^\circ + 10^\circ$  也能出现特殊角。

为开阔眼界, 我们再从式子的结构特征入手做一些分析:

3. 原式的结构特征和余弦定理的结构有些相似, 可构造  $\triangle ABC$ , 其中  $A = 10^\circ$ ,  $B = 50^\circ$ ,  $C = 120^\circ$ ,  $2R = 1$ , 则  $a = \sin 10^\circ$ ,  $b = \sin 50^\circ$ ,  $c = \sin 120^\circ$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \sin^2 10^\circ + \sin^2 50^\circ - 2 \sin 10^\circ \cdot \sin 50^\circ \cdot \cos 120^\circ \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos 120^\circ = c^2 = (\sin 120^\circ)^2 \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

4. 利用  $x^2 + y^2 + xy = (x + y)^2 - xy$  也可以。

**评述:** 这里前两种方法是基本的, 也是最重要的, 须熟练掌握。

现在转向研究  $\sin x \pm b \cos x$  ( $ab \neq 0$ ) 的化积问题。

在 2.2 节例 2.6 我们曾就具体的  $a$ 、 $b$  做过这类题, 其基本想法是“从右往左”使用和(差)角公式。关键步骤是引入辅助角  $\varphi$ , 把  $a$ 、 $b$  表成正、余弦函数。现在, 对系数  $a$ 、 $b$  做一般研究:

$$\begin{aligned}a \sin x \pm b \cos x &= \sqrt{a^2 + b^2} \left( \sin x \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \pm \cos x \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ \therefore \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left( \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 &= 1 \\ \therefore \text{可令 } \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} &= \cos \varphi, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin \varphi, \text{ (其中, } \varphi \text{ 为满足 } \tan \varphi = \frac{b}{a} \text{ 的某个角, 它的终边位置由 } a, b \text{ 决定) 则}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a \sin x \pm b \cos x &= \sqrt{a^2 + b^2} (\sin x \cos \varphi \pm \cos x \sin \varphi) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x \pm \varphi)\end{aligned}$$

**例 2.33** 化下列两式成  $A \sin(\alpha \pm \varphi)$  的形式:

(1)  $2 \sin x - 3 \cos x$

(2)  $3 \cos x - 4 \sin x$

**解:**

(1)

$$\begin{aligned}
 2\sin x - 3\cos x &= \sqrt{13} \left( \sin x \cdot \frac{2}{\sqrt{13}} - \cos x \cdot \frac{3}{\sqrt{13}} \right) \\
 &= \sqrt{13}(\sin x \cos \varphi - \cos x \sin \varphi) = \sqrt{13} \sin(x - \varphi)
 \end{aligned}$$

其中:  $\tan \varphi = \frac{3}{2}$ ,  $\varphi$  为锐角 (这里  $a > 0, b > 0$ ) .

(2)

$$\begin{aligned}
 3\cos x - 4\sin x &= 5 \left( \frac{3}{5} \cos x - \frac{4}{5} \sin x \right) \\
 &= 5(\sin \varphi \cos x - \cos \varphi \sin x) = 5 \sin(\varphi - x)
 \end{aligned}$$

其中:  $\tan \varphi = \frac{3}{4}$ ,  $\varphi$  为锐角 (这里  $a > 0, b > 0$ ) .

在三角变换中, 经常会遇到“和差化积”问题。除了使用上述诸化积公式外, 还经常使用乘法公式和下面的

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} \\ 1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \\ 1 \pm \sin \alpha = \left( \sin \frac{\alpha}{2} \pm \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2 \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} 1 \pm \sin \alpha = \sin 90^\circ \pm \sin \alpha = \dots \\ 1 \pm \cos \alpha = \cos 0^\circ \pm \cos \alpha = \dots \\ 1 \pm \tan \alpha = \tan 45^\circ \pm \tan \alpha = \dots \end{array} \right.$$

**例 2.34** 把  $1 - \sin \alpha - \cos \alpha$  化为乘积.

**解: 解法 1:**

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (1 - \cos \alpha) - \sin \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} - 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \\
 &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \left( \sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} \right) \\
 &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sqrt{2} \sin \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \\
 &= 2\sqrt{2} \sin \frac{\alpha}{2} \sin \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{4} \right)
 \end{aligned}$$

**解法 2:**

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= (1 - \sin \alpha) - \cos \alpha = \left( \sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2 - \left( \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) \\
 &= \left( \sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} \right) \left( \sin \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} \right) \\
 &= \sqrt{2} \sin \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \cdot 2 \sin \frac{\alpha}{2} \\
 &= 2\sqrt{2} \sin \frac{\alpha}{2} \sin \left( \frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{4} \right)
 \end{aligned}$$

## 习题八

## A

1. 把下列各式化为积的形式:

(1)  $\sin 24^\circ + \sin 21^\circ$

(3)  $\cos 3x + \cos 2x$

(2)  $\sin(15^\circ + \alpha) - \sin(15^\circ - \alpha)$

(4)  $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} - \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

2. 求下列各式的值:

(1)  $\frac{\sin 20^\circ - \cos 50^\circ}{\cos 20^\circ - \cos 40^\circ}$

(2)  $\sin 20^\circ + \sin 40^\circ - \sin 80^\circ$

(3)  $\cos 157^\circ 30' \sin 22^\circ 30'$

3. 求下列各式的值:

(1)  $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$

(3)  $\tan 10^\circ \tan 50^\circ \tan 70^\circ$

(2)  $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ$

4. 求证:

(1)  $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha - \sin \beta} = \tan \frac{\alpha + \beta}{2} \cot \frac{\alpha - \beta}{2}$

(2)  $\frac{\sin x + \sin y}{\cos x - \cos y} = \cot \frac{y - x}{2}$

(3)  $\tan \frac{3x}{2} - \tan \frac{x}{2} = \frac{2 \sin x}{\cos x + \cos 2x}$

5. 把下列各式化为积的形式:

(1)  $\sin 28^\circ + \cos 17^\circ$

(6)  $1 + \sin 2A$

(2)  $\cos 54^\circ - \sin 54^\circ$

(7)  $1 + \sqrt{3} \tan \alpha$

(3)  $\cos \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \cos \left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

(8)  $3 - 4 \sin^2 \alpha$

(4)  $\cos \left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) + \cos \left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right)$

(9)  $\sin^2 \theta - \sin^2 \varphi$

(5)  $\frac{\sqrt{2}}{2} + \cos \alpha$

(10)  $\cos^2 x - \cos^2 y$

6. 证明下列各恒等式:



- (1)  $\frac{\sin A + \sin 3A + \sin 5A}{\sin 3A + \sin 5A + \sin 7A} = \frac{\sin 3A}{\sin 5A}$
- (2)  $\frac{3 - 4 \cos 2A + \cos 4A}{3 + 4 \cos^2 A + \cos 4A} = \tan^4 A$
- (3)  $\frac{\cos 2\alpha + \cos 2\beta}{1 + \cos 2(\alpha + \beta)} = \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}$
- (4)  $\sec\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sec\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = 2 \sec 2\alpha$
- (5)  $\sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{7\alpha}{2} + \sin \frac{3\alpha}{2} \sin \frac{11\alpha}{2} = \sin 2\alpha \sin 5\alpha$
- (6)  $(\cos x + \sin x)(\cos 2x + \sin 2x) = \cos x + \sin 3x$
- (7)  $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 4 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\beta + \gamma}{2} \cos \frac{\gamma + \alpha}{2} - \cos(\alpha + \beta + \gamma)$

7. 将下列各式化为  $A \sin(x \pm \varphi)$  的形式:

- (1)  $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x$
- (2)  $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \varphi - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \varphi$
- (3)  $\sqrt{2} \cos x - \sqrt{2} \sin x$
- (4)  $\cos \theta - \sqrt{3} \sin \theta$
- (5)  $3 \sin x - 4 \cos x$
- (6)  $5 \cos x - 2 \sin x$

8. 求下列各式的值:

- (1)  $\cos^2 A + \cos^2(60^\circ - A) + \cos^2(60^\circ + A)$
- (2)  $\cos^2(\alpha + \beta) + \cos^2(\alpha - \beta) - \cos 2\alpha \cos 2\beta$
- (3)  $2 \cos \frac{9\pi}{13} \cos \frac{\pi}{13} + \cos \frac{5\pi}{13} + \cos \frac{3\pi}{13}$
- (4)  $\cos 5^\circ + \cos 77^\circ + \cos 149^\circ + \cos 221^\circ + \cos 293^\circ$

9. 将下列各式化为乘积的形式:

- (1)  $1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha$
- (2)  $1 + \sin \alpha - \cos \alpha - \tan \alpha$
- (3)  $1 + \cos \alpha + \cos \beta + \cos(\alpha + \beta)$

10. 已知:  $\sin \alpha + \sin \beta = \frac{1}{4}$ ,  $\cos \alpha + \cos \beta = \frac{1}{3}$ , 求  $\tan(\alpha + \beta)$

11. 求值:

- (1)  $\cos 36^\circ + \cos 108^\circ$
- (2)  $\cos \frac{2\pi}{7} \cdot \cos \frac{4\pi}{7} \cdot \cos \frac{6\pi}{7}$

(3)  $\sin 18^\circ \cos 36^\circ$

(4)  $\cos \alpha \cos 2\alpha \cos 2^2\alpha \cdots \cos 2^n\alpha \quad (n \in \mathbb{N})$

(5)  $\cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2^2} \cos \frac{\alpha}{2^3} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n} \quad (n \in \mathbb{N})$

12. 求证:  $\sin \frac{\pi}{10} \cdot \sin \frac{13\pi}{10} = -\frac{1}{4}$

13. 用两种方法求下式的值:

$$(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ)(1 + \tan 3^\circ) \cdots (1 + \tan 44^\circ)$$

14. 求值:

(1)  $\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ$

(2)  $\sin 69^\circ - \sin 3^\circ + \sin 39^\circ - \sin 33^\circ$

15. 证明下式的值与  $\theta$  无关:

$$\cos^2(\alpha - \theta) + \cos^2(\beta - \theta) - 2\cos(\alpha - \beta)\cos(\alpha - \theta)\cos(\beta - \theta)$$

16. 求证:

(1)  $\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} = \tan^2 \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)$  (至少用两种方法)

(2)  $\sin^2(n+1)\alpha - 2\sin^2 n\alpha + \sin^2(n-1)\alpha = 2\sin^2 \alpha \cos 2n\alpha$

17. 把  $\frac{3}{2} - 2\cos 2\alpha + \cos 4\alpha$  化为乘积形式.

## B

18. 把  $1 - \frac{1}{4}\sin^2 2\alpha - \sin^2 \beta - \cos^4 \alpha$  化为乘积形式.

19. 已知  $\tan x = a$ , 求  $\frac{3\sin x + \sin 3x}{3\cos x + \cos 3x}$  的值.

20. 已知  $\tan 3A = 7\cot A$ , 求  $\frac{2\sin^2 A - \cos 4A - 1}{2\cos^2 A - \cos 4A - 1}$  的值.

## 2.6 附条件的三角等式的证明

这类等式除了具备一般三角等式的共性外, 其特点就是附加了使等式成立的条件. 因此, 如何使用附加条件就成了这类等式证明上的关键. 一般来说, 使

用条件有两种方式：一是把条件代入求证式，再证其两边相等，这就把问题化成了前面已经研究过的三角等式的证明题（下简称**代入法**）；二是从条件式出发，作以求证式为目标变形，逐步推出求证式（下简称**推出法**）。但是，不论使用哪种方法，都必须认清条件式与所求式的结构特征。

**例 2.35** 已知  $\tan^2 \alpha = 2 \tan^2 \beta + 1$ （这是条件式），

求证  $\cos 2\alpha + \sin^2 \beta = 0$ （这是求证式） (1)

**分析：**能否使用代入法呢？这需要找出条件式与求证式之间的联系。容易看出，两者之间  $\alpha$  的函数通过万能公式联系着，这就为使用代入法找到了突破口。

**证明：**证法 1：欲证 (1)，只须证

$$\frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} + \sin^2 \beta = 0 \quad (2)$$

把条件代入，只须证

$$\frac{1 - (2 \tan^2 \beta + 1)}{1 + (2 \tan^2 \beta + 1)} + \sin^2 \beta = 0$$

即须证

$$\frac{-\tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} + \sin^2 \beta = 0 \quad (3)$$

（这时，问题化为条件等式的证明题）

由  $\sin^2 \beta = \tan^2 \beta \cos^2 \beta = \tan^2 \beta \cdot \frac{1}{\sec^2 \beta} = \tan^2 \beta \cdot \frac{1}{1 + \tan^2 \beta}$ ，代入 (3) 式

$$\text{左边} = \frac{-\tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} + \frac{\tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} = \frac{0}{1 + \tan^2 \beta} = 0$$

$\therefore$  (3) 成立，从而 (1) 成立。

**分析：**能否使用推出法呢？由于条件式与求证式之间函数种类差异很大，我们从消除函数差异入手，考虑到  $\tan \alpha$ 、 $\tan \beta$  都是二次幂，这就启示我们使用平方关系，或者化切为弦。

**证明：**证法 2：由条件式两边同加 1，得

$$\begin{aligned} 1 + \tan^2 \alpha &= 2(1 + \tan^2 \beta) \Rightarrow \sec^2 \alpha = 2 \sec^2 \beta \\ &\Rightarrow \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \frac{2}{\cos^2 \beta} \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1}{2} \cos^2 \beta \end{aligned}$$

（进一步作以求证式为目标变形）

$$\Rightarrow \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} - \frac{1}{2}(1 - \sin^2 \beta) = 0 \Rightarrow \cos 2\alpha + \sin^2 \beta = 0$$

**证法 3：**（由条件式化切为弦：留给读者完成）。

**例 2.36** 已知  $\sin \beta = m \sin(2\alpha + \beta)$ , 且  $\alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ),  $\alpha \neq \frac{\pi}{2} \cdot k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ),  $m \neq 1$

$$\text{求证: } \tan(\alpha + \beta) = \frac{1+m}{1-m} \tan \alpha$$

**分析:** 由于在条件式中  $m$  容易解出, 所以可以运用代入法.

**证明:** **证法 1:** (从运算入手) 由已知解出  $m = \frac{\sin \beta}{\sin(2\alpha + \beta)}$

[注意, 由已知用反证法可以证明  $\sin(2\alpha + \beta) \neq 0$ ]

$$\because m \neq 1, \alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}), \quad \alpha \neq \frac{\pi}{2} \cdot k \ (k \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore \frac{1+m}{1-m} = \frac{\sin(2\alpha + \beta) + \sin \beta}{\sin(2\alpha + \beta) - \sin \beta} = \frac{2 \sin(\alpha + \beta) \cos \alpha}{2 \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha} = \tan(\alpha + \beta) \cot \alpha$$

$$\therefore \tan(\alpha + \beta) = \frac{1+m}{1-m} \tan \alpha$$

**分析:** (从角入手) 由于条件式中的角都可以用求证式中的角表示, 即

$$2\alpha + \beta = (\alpha + \beta) + \alpha, \quad \beta = (\alpha + \beta) - \alpha \quad (*)$$

因而, 可以消除角的差异.

**证明:** **证法 2:** 把 (\*) 代入已知, 展开整理可得:

$$\sin[(\alpha + \beta) - \alpha] = m \sin[(\alpha + \beta) + \alpha]$$

$$\sin(\alpha + \beta) \cos \alpha - \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha = m[\sin(\alpha + \beta) \cos \alpha + \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha]$$

$$(1-m) \sin(\alpha + \beta) \cos \alpha = (1+m) \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha$$

$\because m \neq 1, \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ),  $\alpha \neq \frac{\pi}{2} \cdot k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), 上式两边同除以  $(1-m) \cos(\alpha + \beta) \cos \alpha \neq 0$ , 得

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{1+m}{1-m} \tan \alpha$$

**分析:** (从函数入手) 欲证所求, 只要证

$$\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{(1+m) \sin \alpha}{(1-m) \cos \alpha} \quad (1)$$

(这样, 函数差异就消除了), 为此, 须设法从条件式构造出  $\sin(\alpha + \beta)$  与  $\cos(\alpha + \beta)$ .

**证明:** **证法 3:** 由条件式两边同加  $m \sin \beta$ , 得

$$\begin{aligned} m[\sin(2\alpha + \beta) + \sin \beta] &= (1+m) \sin \beta \\ m \cdot 2 \sin(\alpha + \beta) \cos \alpha &= (1+m) \sin \beta \end{aligned} \quad (2)$$

再由条件式两边同减  $m \sin \beta$ , 得

$$\begin{aligned} m[\sin(2\alpha + \beta) - \sin \beta] &= (1 - m) \sin \beta \\ m \cdot 2 \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha &= (1 - m) \sin \beta \end{aligned} \quad (3)$$

由于  $\alpha + \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ),  $\alpha \neq \frac{\pi}{2} \cdot k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ),  $m \neq 1$ , 且  $m \neq 0$  (否则  $\sin \beta = 0$ ,  $\beta = k\pi$ , 与已知矛盾), 使 (2), (3) 两边分别相除, 得

$$\frac{\sin(\alpha + \beta) \cos \alpha}{\cos(\alpha + \beta) \sin \alpha} = \frac{1 + m}{1 - m}$$

即

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{1 + m}{1 - m} \tan \alpha$$

## 习题九

### A

1. 已知  $\sin^2 \theta = \sin \alpha \cos \alpha$ , 求证:  $\cos 2\theta = 2 \sin(45^\circ - \alpha) \cos(45^\circ + \alpha)$
2. 已知  $\tan A = 2 \tan B$ , 求证:  $\sin(A + B) = 3 \sin(A - B)$
3. 已知  $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{4}$ ,  $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$ ,  $0 < \beta < \frac{\pi}{4}$ ,  $\sin\left(\frac{3\pi}{4} + \beta\right) = \frac{5}{13}$ , 求  $\sin(\alpha + \beta)$  的值.
4. 已知  $\sin 2(A + C) = n \sin 2B$ , 其中  $n \neq 1$ ,  $A + B + C \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ),  $A - B + C \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )  
求证:  $\tan(A + B + C) = \frac{n + 1}{n - 1} \tan(A - B + C)$

### B

5. 已知  $\tan \beta = \frac{n \sin \alpha \cos \alpha}{1 - n \sin^2 \alpha}$ ,  $\alpha \neq \frac{k\pi}{2}$ ,  $\alpha - \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )  
求证:  $(1 - n) \tan \alpha = \tan(\alpha - \beta)$ .

**例 2.37** 已知  $2 \sec \varphi = \sec(\varphi + \theta) + \sec(\varphi - \theta)$ , 其中  $\varphi$  是锐角,  $\theta$  是钝角, 求证:  $\cos \varphi = \sqrt{2} \cos \frac{\theta}{2}$

**分析:** 条件式复杂, 求证式简单, 所以推证的总趋势应是化简. 又由于求证式中,  $\cos \varphi$  处于被解出的位置, 这就启示我们, 条件式若能改写成以  $\cos \varphi$  为“元”的方程, 解出即可.

**证明:** 由已知有

$$\frac{2}{\cos \varphi} = \frac{1}{\cos(\varphi + \theta)} + \frac{1}{\cos(\varphi - \theta)} = \frac{\cos(\varphi - \theta) + \cos(\varphi + \theta)}{\cos(\varphi + \theta) \cdot \cos(\varphi - \theta)}$$

(左边已改写完毕, 右边欲分离出“ $\cos \varphi$ ”, 应实行和积互化)

$$\frac{2}{\cos \varphi} = \frac{2 \cos \varphi \cos \theta}{\frac{1}{2}(\cos 2\varphi + \cos 2\theta)} = \frac{4 \cos \varphi \cos \theta}{2 \cos^2 \varphi - 1 + 2 \cos^2 \theta - 1}$$

令  $\cos \varphi = x$ ,  $\cos \theta = y$ , 由已知,  $x \in (0, 1)$ ,  $y \in (-1, 0)$ , 则有

$$\frac{2}{x} = \frac{4xy}{2x^2 + 2y^2 - 2}$$

$$x^2 y = x^2 + y^2 - 1$$

$$x^2(y - 1) = y^2 - 1$$

由于  $y - 1 \neq 0$ , 因此:  $x^2 = y + 1$ .

由于  $x > 0$ , 开平方, 得  $x = \sqrt{y + 1}$ , 即

$$\cos \varphi = \sqrt{\cos \theta + 1} = \sqrt{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = \sqrt{2} \cos \frac{\theta}{2} \quad \left( \because \cos \frac{\theta}{2} > 0 \right)$$

$$\therefore \cos \varphi = \sqrt{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

**评述:** 在分离出“ $\cos \varphi$ ”之后, 令  $\cos \varphi = x$ , 目标是解出  $x$ , 如此换元使计算与表达都更加简明.

**例 2.38** 已知  $\alpha, \beta$  为方程  $a \sin x + b \cos x = c$  的两个不同的解, 且  $\alpha, \beta \in (0, \pi)$ ,  $c \neq 0$ ,

$$\text{求证: } \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{c^2}{a^2 + b^2} \quad (1)$$

**证明:** 由已知, 得

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = c \quad (2)$$

$$a \sin \beta + b \cos \beta = c \quad (3)$$

把 (2)(3) 看作是关于  $a, b$  的方程组, 解之得:

$$\begin{cases} a = \frac{c(\cos \alpha - \cos \beta)}{\sin(\beta - \alpha)} \\ b = \frac{c(\sin \beta - \sin \alpha)}{\sin(\beta - \alpha)} \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{aligned}
 \therefore a^2 + b^2 &= \frac{c^2[(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \beta - \sin \alpha)^2]}{\sin^2(\beta - \alpha)} \\
 &= \frac{c^2[2 - 2\cos(\alpha - \beta)]}{\sin^2(\beta - \alpha)} \\
 &= \frac{c^2 \cdot 2\sin^2 \frac{\beta - \alpha}{2}}{4\sin^2 \frac{\beta - \alpha}{2} \cos^2 \frac{\beta - \alpha}{2}} = \frac{c^2}{\cos^2 \frac{\beta - \alpha}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\because c \neq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \neq 0$$

$$\therefore \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{c^2}{a^2 + b^2}$$

**评述：**用解方程（例 2.37）或解方程组（例 2.38）的方法，处理三角条件等式的证明，思路简明清晰，是个好方法。

### 思考题

如果条件式是对称形式的（像 (2)、(3) 这样），这种证明题或求值题，尚有多种方法求解，你能想出新的方法吗？

## 习题十

### A

1. 已知  $\sin^2 \alpha \csc^2 \beta + \cos^2 \alpha \cos^2 \gamma = 1$ ，求证： $\sin^2 \gamma = \tan^2 \alpha \cot^2 \beta$
2. 用解方程的思想重证例 2.35.
3. 已知  $a \sin(\theta + \alpha) = b \sin(\theta + \beta)$ ，且  $\cos \theta \neq 0$ ， $a \cos \alpha - b \cos \beta \neq 0$   
求证： $\tan \theta = \frac{b \sin \beta - a \sin \alpha}{a \cos \alpha - b \cos \beta}$ .
4. 已知  $\frac{\tan(A - B)}{\tan A} + \frac{\sin^2 C}{\sin^2 A} = 1$ ，求证： $\tan^2 C = \tan A \cdot \tan B$
5. 已知  $\tan \theta = \frac{x \sin \varphi}{1 - x \cos \varphi}$ ， $\tan \varphi = \frac{y \sin \theta}{1 - y \cos \theta}$ ， $\varphi \neq k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )，求证：  
 $\frac{x}{y} = \frac{\sin \theta}{\sin \varphi}$ .

### B

6. 已知  $\left(\frac{\tan \alpha}{\sin x} - \frac{\tan \beta}{\tan x}\right)^2 = \tan^2 \alpha - \tan^2 \beta$ ,  $\alpha \neq k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )

求证:  $\cos x = \frac{\tan \beta}{\tan \alpha}$

### C

7. 研究例 2.38 的多种证法, 并指出例 2.38 与下述命题的关系:

若  $\alpha, \beta$  是方程  $a \sin x + \cos x = c$  的两个解, 且  $\alpha - \beta \neq k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), 求证:

$$\frac{a}{\sin \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{b}{\cos \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{c}{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}$$

例 2.39 已知两个不相等的锐角  $\alpha, \beta$  满足

$$\sin \alpha = a \sin \beta \quad (1)$$

$$\tan \alpha = b \tan \beta \quad (2)$$

求证:  $\cos \alpha = \sqrt{\frac{a^2 - 1}{b^2 - 1}}$

**分析:** 条件式与所求式之间结构上的突出的差异是条件式中有  $\beta$ , 而在求证式中  $\beta$  消失了。这就启发我们应该先由条件式消去  $\beta$ , 然后再设法解出  $\cos \alpha$ 。

**证明:** 由  $\alpha, \beta$  都是锐角, 因此:  $\tan \alpha > 0$ ,  $\tan \beta > 0$ ,  $b \neq 0$ , (1)、(2) 式两边分别相除, 得

$$\cos \alpha = \frac{a}{b} \cos \beta \Rightarrow b \cos \alpha = a \cos \beta \quad (3)$$

(1)<sup>2</sup> + (2)<sup>2</sup>, 得

$$\begin{array}{r} a^2 \sin^2 \beta = \sin^2 \alpha \\ +) \quad a^2 \cos^2 \beta = b^2 \cos^2 \alpha \\ \hline a^2 = \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha \end{array}$$

$$\text{因此: } (b^2 - 1) \cos^2 \alpha = a^2 - 1 \quad (4)$$

由于  $\alpha, \beta$  是不等锐角, 由 (2) 得:  $b \neq \pm 1$ ; 由 (4) 得:

$$\cos^2 \alpha = \frac{a^2 - 1}{b^2 - 1} \Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{\frac{a^2 - 1}{b^2 - 1}}$$

**评述:** 此例中, 我们利用  $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$ , 从 (1)、(3) 消去了  $\beta$ 。在三角变换中, 利用某些三角公式 (如三个平方关系, 三个倒数关系等), 消去某个“角”的方法称为三角消元法, 它是一类很有用的方法。



例 2.40 已知: 
$$\begin{cases} \sin \theta + \sin \varphi = a & (1) \\ \cos \theta + \cos \varphi = b & (2) \\ \cos(\theta - \varphi) = c & (3) \end{cases}$$

求证:  $a^2 + b^2 = 2c + 2$ .

分析: 解题的方向当然是消元法, 由条件式的三个方程可消去两个元  $\theta$ 、 $\varphi$ , 从而得出  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的关系。

证明:  $(1)^2 + (2)^2$  得

$$\begin{array}{r} \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \sin \varphi + \sin^2 \varphi = a^2 \\ +) \quad \cos^2 \theta + 2 \cos \theta \cos \varphi + \cos^2 \varphi = b^2 \\ \hline 1 + 2 \cos(\theta - \varphi) + 1 = a^2 + b^2 \end{array}$$

把 (3) 代入此式, 得:  $a^2 + b^2 = 2c + 2$

#### 思考题

此题中, 想出  $(1)^2 + (2)^2$  是关键, 它是根据什么想出来的呢?

## 习题十一

### A

- 已知  $\begin{cases} \sin \theta = a \neq 0 \\ \tan \theta = b \end{cases}$  求证:  $b^2 = a^2(1 + b^2)$
- 已知  $\begin{cases} a \sec \theta + x \tan \theta = y \\ b \sec \theta - y \tan \theta = x \end{cases}$  求证:  $a^2 + b^2 = x^2 + y^2$
- 已知  $\begin{cases} \tan(\alpha + \varphi) = m \\ \tan(\alpha - \varphi) = n \end{cases}$  求证:  $\tan 2\alpha = \frac{m + n}{1 - mn}$
- 已知  $\begin{cases} x = 3 \cos \alpha + \cos 3\alpha \\ y = 3 \sin \alpha - \sin 3\alpha \end{cases}$  求证:  $\left(\frac{x}{4}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{4}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$
- 已知  $\begin{cases} a \sin \alpha + b \cos \alpha = 0 & (ab \neq 0) \\ m \sin 2\alpha + n \cos 2\alpha = p \end{cases}$   
求证:  $2abm - (a^2 - b^2)n + (a^2 + b^2)p = 0$

6. 已知 
$$\begin{cases} a \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha = 1 & (a \neq 1) \\ a \cos^2 \beta + b \sin^2 \beta = 1 & (b \neq 1) \end{cases}$$
 求证:  $a + b = 2ab$

$$a^2 \tan^2 \alpha = b^2 \tan^2 \beta$$

7. 已知 
$$\begin{cases} \cos x - \cos y = \frac{1}{2} \\ \sin x - \sin y = -\frac{1}{3} \end{cases}$$
 求:  $\cos(x - y)$ 、 $\sin(x + y)$ .

**B**

8. 若  $\frac{\sin \theta}{a^2 - 1} = \frac{\cos \theta}{2a \sin 2\varphi} = \frac{1}{1 + 2a \cos 2\varphi + a^2}$ , 求证:  $\sin \theta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1}$

9. 已知 
$$\begin{cases} \sin A + \sin 3A + \sin 5A = a \\ \cos A + \cos 3A + \cos 5A = b \end{cases}$$

求证:

(1) 当  $b \neq 0$  时,  $\tan 3A = \frac{a}{b}$

(2)  $(1 + 2 \cos 2A)^2 = a^2 + b^2$

**C**

10. 已知 
$$\begin{cases} (a + b) \tan(\theta - \varphi) = (a - b) \tan(\theta + \varphi) \\ a \cos 2\varphi + b \cos 2\theta = 0 \end{cases}$$

求证:  $\cos 2\varphi = \frac{a^2 - b^2 + c^2}{2ac}$

以下, 研究三角形上边角关系的等式证明. 在初中, 我们已经知道, 在  $\triangle ABC$  中有:

(1) **边的关系:**  $a + b > c$ ;  $a - b < c$ .

(2) **角的关系:**  $A + B + C = \pi$ , 从而有

$$\frac{A}{2} + \frac{B}{2} + \frac{C}{2} = \frac{\pi}{2}, \quad 2A + 2B + 2C = 2\pi$$

于是可得

$$\begin{cases} \sin(A+B) = \sin C \\ \cos(A+B) = -\cos C \\ \tan(A+B) = -\tan C \\ \cot(A+B) = -\cot C \end{cases} \quad \begin{cases} \sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2} \\ \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2} \\ \tan \frac{A+B}{2} = \cot \frac{C}{2} \\ \cot \frac{A+B}{2} = \tan \frac{C}{2} \end{cases}$$

等多组三角函数变换关系式。

### (3) 边角关系:

正弦定理:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

余弦定理:

$$\begin{cases} \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \end{cases}$$

### (4) 面积公式:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot \text{底} \times \text{高} = \frac{1}{2} ab \sin C = pr = \frac{abc}{4R} \\ &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \end{aligned}$$

其中,  $a$ 、 $b$ 、 $c$  分别是角  $A$ 、 $B$ 、 $C$  的对边的长,  $R$ 、 $r$  分别是外接圆和内切圆的半径的长,  $p$  是周长之半。

**例 2.41** 在  $\triangle ABC$  中, 求证

$$\sin A + \sin B + \sin C = 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$$

**分析:** 左边是和, 右边是积, 可用和差化积或积化和差来做。

**证明:** **证法 1:** (和差化积) 因为  $A+B+C=\pi$

$$\begin{aligned} \text{左边} &= 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + \sin C = 2 \cos \frac{C}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2} \\ &= 2 \cos \frac{C}{2} \left( \cos \frac{A-B}{2} + \sin \frac{C}{2} \right) = 2 \cos \frac{C}{2} \left( \cos \frac{A-B}{2} + \cos \frac{A+B}{2} \right) \\ &= 2 \cos \frac{C}{2} \cdot 2 \cos \frac{A}{2} \cos \left( \frac{-B}{2} \right) = 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} \end{aligned}$$

∴ 左边 = 右边

**证法 2:** (积化和差) 因为  $A + B + C = \pi$ , 得

$$\begin{aligned}\text{右边} &= 2 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cdot 2 \cos \frac{C}{2} = \left( \cos \frac{A+B}{2} + \cos \frac{A-B}{2} \right) \cdot 2 \cos \frac{C}{2} \\ &= 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2} + 2 \cos \frac{A-B}{2} \cos \frac{C}{2} = \sin C + 2 \cos \frac{A-B}{2} \sin \frac{A+B}{2} \\ &= \sin C + \sin A + \sin B = \sin A + \sin B + \sin C\end{aligned}$$

∴ 右边 = 左边

**评述:** “目标导航”是解数学题的通用策略。此例中每一步变形都是在这策略的指引下想出来的。

**例 2.42** 在  $\triangle ABC$  中, 求证  $\frac{\tan B}{\tan C} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{a^2 - b^2 + c^2}$

**分析:** 化角为边或是化边为角都是可行的.

**证明:** **证法 1:** (化角为边)

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \frac{\sin B \cos C}{\sin C \cos B} = \frac{\frac{b}{2R} \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}}{\frac{c}{2R} \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{a^2 - b^2 + c^2} = \text{右边}\end{aligned}$$

**证法 2:** (化边为角——用正弦定理)

$$\begin{aligned}\text{右边} &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{a^2 - b^2 + c^2} = \frac{(2R \sin A)^2 + (2R \sin B)^2 - (2R \sin C)^2}{(2R \sin A)^2 - (2R \sin B)^2 + (2R \sin C)^2} \\ &= \frac{\sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C}{\sin^2 A - \sin^2 B + \sin^2 C} = \frac{\sin^2 B + (\sin A + \sin C)(\sin A - \sin C)}{\sin^2 C + (\sin A + \sin B)(\sin A - \sin B)} \\ &= \frac{\sin^2 B + \sin(A+C) \sin(A-C)}{\sin^2 C + \sin(A+B) \sin(A-B)} = \frac{\sin B[\sin B + \sin(A-C)]}{\sin C[\sin C + \sin(A-B)]} \\ &= \frac{\sin B[\sin(A+C) + \sin(A-C)]}{\sin C[\sin(A+B) + \sin(A-B)]} = \frac{\sin B \cdot 2 \sin A \cos C}{\sin C \cdot 2 \sin A \cos B} \\ &= \frac{\sin B \cos C}{\sin C \cos B} = \frac{\tan B}{\tan C}\end{aligned}$$

∴ 原式成立.

**证法 3:** (化边为角——用余弦定理)

$$\begin{aligned}\text{右边} &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{a^2 - b^2 + c^2} = \frac{\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \cdot 2ab}{\frac{a^2 - b^2 + c^2}{2ac} \cdot 2ac} \\ &= \frac{\cos C \cdot b}{\cos B \cdot c} = \frac{\cos C \cdot 2R \sin B}{\cos B \cdot 2R \sin C} = \frac{\tan B}{\tan C}\end{aligned}$$

∴ 原式成立.

**评述:** 比较三种证法可见, 由于求证式右边的分子、分母的结构特征与余弦定理相近, 从而使用余弦定理对求证式进行变换就来得格外简捷. 因此, 变换中认清式子的结构特征, 对于方法的选择至关重要.

**例 2.43** 在  $\triangle ABC$  中, 求证:  $\frac{\cos 2A}{a^2} - \frac{\cos 2B}{b^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$

**分析:** 由于  $\cos 2A$ 、 $\cos 2B$  与边无直接关系, 所以应变为单角的正、余弦.

**证明:** **证法 1:** (化角为边)

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \frac{1 - 2\sin^2 A}{a^2} - \frac{1 - 2\sin^2 B}{b^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} - \frac{2\left(\frac{a}{2R}\right)^2}{a^2} + \frac{2\left(\frac{b}{2R}\right)^2}{b^2} \\ &= \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} - \frac{1}{2R^2} + \frac{1}{2R^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\end{aligned}$$

∴ 等式成立.

**证法 2:** (从运算上入手, 考虑到求证式分母的特点)

欲证原式, 只须证

$$\frac{\cos 2A - 1}{a^2} - \frac{\cos 2B - 1}{b^2} = 0 \quad (1)$$

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \frac{-2\sin^2 A}{a^2} + \frac{2\sin^2 B}{b^2} \\ &= \frac{-2\sin^2 A}{(2R\sin A)^2} + \frac{2\sin^2 B}{(2R\sin B)^2} = \frac{-1}{2R^2} + \frac{1}{2R^2} = 0\end{aligned}$$

∴ (1)式成立  $\Rightarrow$  原式成立

**例 2.44** 在  $\triangle ABC$  中, 若  $\sin \frac{B}{2} = \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2}$  (1)

求证:

$$(1) \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = \frac{1}{2}$$

$$(2) a + c = 3b$$

**分析:**

(1) 应消去 B.

(2) 条件式是角关系, 求证式是边关系. 由于条件式不易化为边关系, 所以把求证式左边的  $a + c$  先化成角关系, 以便利用条件式.

**证明:**

(1) 把  $\sin \frac{B}{2} = \cos \frac{A+C}{2} = \cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2} - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2}$  代入条件式, 得

$$\cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2} - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2} = \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2}$$

$$\therefore \cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2} = 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2} \quad (2)$$

$$\because 0^\circ < \frac{A}{2} < 180^\circ, \quad 0^\circ < \frac{C}{2} < 90^\circ$$

$$\therefore \cos \frac{A}{2} \neq 0, \quad \cos \frac{C}{2} \neq 0$$

$$(2) \text{ 式两边同除 } 2 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2}, \text{ 得 } \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = \frac{1}{2}$$

(2)

$$\begin{aligned} a+c &= 2R(\sin A + \sin C) \\ &= 2R \cdot 2 \sin \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} \quad (\text{目标是化出 } 3b) \\ &= 4R \cos \frac{B}{2} \left( \cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2} \right) \\ &= 4R \cdot \cos \frac{B}{2} \left( \cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{B}{2} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

利用 (2) 与 (1), 得

$$\cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2} = 2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2}$$

代入 (3), 得

$$\begin{aligned} a+c &= 4R \cos \frac{B}{2} \left( 2 \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{B}{2} \right) \\ &= 3 \cdot 2R \cdot 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} = 3 \cdot 2R \sin B = 3b \end{aligned}$$

## 习题十二

### A

1. 在  $\triangle ABC$  中, 求证

$$(1) \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2 \cos A \cos B \cos C + 2$$

$$(2) \cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

$$(3) \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$$

$$(4) \cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = -1 - 4 \cos A \cos B \cos C$$

$$(5) \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$$

2. 在  $\triangle ABC$  中, 求证:

$$(1) (a-b)^2 \cos^2 \frac{C}{2} + (a+b)^2 \sin^2 \frac{C}{2} = c^2$$

$$(2) a \cos A + b \cos B + c \cos C = 4R \sin A \sin B \sin C$$

3. 在  $\triangle ABC$  中, 若  $2b = a + c$ , 求证:

$$(1) \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2}$$

$$(3) \cos A + \cos C = 4 \sin^2 \frac{B}{2}$$

$$(4) \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = \frac{1}{3}$$

$$(2) a \cos^2 \frac{C}{2} + c \cos^2 \frac{A}{2} = \frac{3}{2}b$$

$$(5) B \leq 60^\circ$$

4. 根据下列条件, 判断三角形  $ABC$  的形状.

$$(1) \sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$$

$$(2) 2 \cos B \sin C = \sin A$$

$$(3) a \tan A + b \tan B = (a+b) \tan \frac{A+B}{2}$$

### B

5. 在  $\triangle ABC$  中, 求证

$$\sin^2 B - 2 \sin B \sin C \cos A + \sin^2 C = \sin^2 A$$

6. 据下列条件, 判断  $\triangle ABC$  的形状:

$$(1) \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1$$

$$(2) A + C = 2B, \text{ 且 } \tan A \tan C = 3$$

$$(3) \cos A + \cos B = \sin C$$

$$(4) (a^2 + b^2) \sin(A-B) = (a^2 - b^2) \sin(A+B)$$

$$(5) \tan A \tan B > 1$$

7. 在  $\triangle ABC$  中, 求证有一内角为  $60^\circ$  的充要条件是

$$\sin 3A + \sin 3B + \sin 3C = 0$$

## 2.7 本章小结

### 2.7.1 知识结构分析

本章理论发展的逻辑结构请见本书第二页上的总图。

### 2.7.2 几点说明

1. 和（差）角公式是本章理论的核心，其余公式都是它的推论。这一点从结构图上一目了然。  
对于和（差）角公式，推导方法要清楚，在 2.2 节所做的说明要掌握。
2. 对于结构图上的其余公式的推导，按照图上给出的线索，必须能够独立完成。这些公式，都是各自定义域上的恒等式，是三角变换中最重要的一些公式。它们在中学和大学的数学、物理以及工程技术上都有非常广泛的应用。因此，必须熟记每个公式的结构特征、双向功能及其变形。
3. 九组诱导公式虽然图上没有列出，但十分重要，2.2 节所做的说明与概括必须掌握。
4. 证明三角等式，应分析题目的结构特征，特别要重视角的特征。
5. 要证明附条件的三角等式，应从认清条件式与求证式的结构特征入手，只有在这个基础上才能灵活地使用代入法或推出法。

## 复习题二

### A

1. (1) 已知  $\cos 2\theta = \frac{3}{4}$ ，求  $\sin^4 \theta - \cos^4 \theta$  与  $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta$  的值  
(2) 已知  $\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3}$ ，求  $\sin 2\theta$  的值  
(3) 已知  $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta = \frac{2}{3}$ ，求  $\sin 2\theta$  的值  
(4) 已知  $\sin \varphi \cos \varphi = \frac{60}{169}$ ，且  $\frac{\pi}{4} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ，求  $\sin \varphi$ 、 $\cos \varphi$  的值  
(5) 已知  $\tan \theta = 2$ ，求  $\frac{1}{4} \sin^2 \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta$  的值  
(6) 已知  $\sin \alpha + \sin \beta = a$ ， $\cos \alpha + \cos \beta = b$ ，求  $\cos(\alpha + \beta)$ 、 $\tan(\alpha + \beta)$  和  $\cos(\alpha - \beta)$  的值
2. 化简：



$$\begin{aligned}
 (1) & 2 \sin \left( \frac{\pi}{4} - x \right) \sin \left( \frac{\pi}{4} + x \right) & (3) & \frac{\sin 40^\circ (1 + 2 \cos 40^\circ)}{2 \cos^2 40^\circ + \cos 40^\circ - 1} \\
 (2) & \frac{\cos 20^\circ}{\cos 35^\circ \sqrt{1 - \sin 20^\circ}}
 \end{aligned}$$

3. 化下列各式为积的形式:

$$\begin{aligned}
 (1) & 1 + \sin 2x - \cos 2x & (3) & \sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha \\
 (2) & 1 + \cos \theta + \cos \frac{\theta}{2} & (4) & 1 - \frac{1}{4} \sin^2 2\alpha - \sin^2 \beta - \cos^4 \alpha
 \end{aligned}$$

4. 化简:

$$\begin{aligned}
 (1) & \cos 52^\circ 30' \cos 7^\circ 30' \\
 (2) & \frac{\sin 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{1 + \cos \alpha} \\
 (3) & \tan 67^\circ 30' - \tan 22^\circ 30' \\
 (4) & \cos 20^\circ - \sin 10^\circ - \sin 50^\circ \\
 (5) & \sin(x + 60^\circ) + 2 \sin(x - 60^\circ) - \sqrt{3} \cos(120^\circ - x) \\
 (6) & \cos \alpha \cdot \csc \alpha \cdot \sqrt{\sec^2 \alpha - 1} \quad \left( \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi \right)
 \end{aligned}$$

5. 证明下列各式:

$$\begin{aligned}
 (1) & \sin x \left( 1 + \tan x \tan \frac{x}{2} \right) = \tan x \\
 (2) & \sec \theta = \sqrt{\frac{\sec^4 \theta - \tan^4 \theta}{2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta}} \quad \left( 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right) \\
 (3) & \sec \alpha - \tan \alpha = \tan \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right) \\
 (4) & \frac{1 + \cos A + \cos 2A + \cos 3A}{2 \cos^2 A + \cos A - 1} = 2 \cos A \\
 (5) & \tan 3\theta - \tan 2\theta - \tan \theta = \tan 3\theta \cdot \tan 2\theta \cdot \tan \theta \\
 (6) & (\cos \alpha + \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2 = 4 \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2}
 \end{aligned}$$

6. 若  $\tan 2\alpha = t$ , 用  $t$  的有理式表示  $\frac{1 + \sin 4\alpha}{\sin 4\alpha(1 + \cos 4\alpha)}$

7. (1) 设  $\sin \alpha, \sin \beta$  是方程  $x^2 - (\sqrt{2} \cos 20^\circ)x + \left( \cos^2 20^\circ - \frac{1}{2} \right) = 0$  的两个根, 求  $\alpha, \beta$ , 其中  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, 0 < \beta < \frac{\pi}{2}$

(2) 若方程  $x^2 + px + q = 0$  的两根分别是  $\tan \varphi$  与  $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \varphi\right)$ , 而且两根的比是  $\frac{3}{2}$ , 求  $p, q$  的值.

8. 发电厂发出的电是三相交流电, 它的三根导线上的电流强度分别是时间  $t$  的函数, 即

$$I_A = I \sin \omega t, \quad I_B = I \sin(\omega t + 120^\circ), \quad I_C = I \sin(\omega t + 240^\circ)$$

求证:  $I_A + I_B + I_C = 0$

9. 已知电流强度  $i = I_m \sin \omega t$ , 电压  $U = V_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

求证: 电功率  $p = iU = \frac{1}{2} V_m I_m \sin 2\omega t$

10. 已知三角形的最小内角为  $30^\circ$ , 它的对边的长为 2cm, 另外两个内角的差为  $60^\circ$ , 求最大边的长 (准确值)。

11. 设  $A, B, C$  是三角形的三个内角, 且  $\lg \sin A + \lg \cos B - \lg \sin C = \lg 2$ , 求证这个三角形是等腰三角形。

12. 已知正  $n$  边形的边长为  $a$ , 内切圆半径为  $r$ , 外接圆半径为  $R$ ,

求证:  $R + r = \frac{1}{2} a \cdot \cot \frac{\pi}{2n}$ .

13. 半径分别为  $R, r$  ( $R > r$ ) 的两圆相外切, 它们的两条外公切线的夹角为  $\theta$

求证:  $\sin \theta = \frac{4(R-r)\sqrt{Rr}}{(R+r)^2}$

## B

14. 若  $\alpha, \beta$  为锐角, 且 
$$\begin{cases} 3 \sin^2 \alpha + 2 \sin^2 \beta = 1 \\ 3 \sin 2\alpha - 2 \sin 2\beta = 0 \end{cases}$$

求证:  $\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{2}$ .

15. 把下列各式化成积的形式。

(1)  $\sqrt{1 - \cos \alpha} + \sqrt{1 + \cos \alpha}$  ( $\alpha \in \text{IV 象限}$ ),

(2)  $\sqrt{\tan x + \sin x} + \sqrt{\tan x - \sin x}$   $\left(\pi < x < \frac{3\pi}{2}\right)$

16. 在  $\triangle ABC$  中, 求证:


$$\frac{\cos A}{\sin B \sin C} + \frac{\cos B}{\sin C \sin A} + \frac{\cos C}{\sin A \sin B} = 2$$

17.  $\triangle ABC$  的三个内角  $A$ 、 $B$ 、 $C$  的对边分别为  $a$ 、 $b$ 、 $c$ , 若  $a^2 = b(b+c)$ , 求证:  $A = 2B$ .

18. 如图, 在直角  $\triangle ABC$  中,  $c$  为斜边,  $r$  为内切圆半径, 求证:

$$(1) \quad r = \frac{c}{\cot \frac{A}{2} + \cot \left( 45^\circ - \frac{A}{2} \right)}$$

$$(2) \quad r \leq \frac{c}{2} (\sqrt{2} - 1)$$



(第 18 题)

19. 在  $\triangle ABC$  中, 若  $\sin C = \frac{\sin A + \sin B}{\cos A + \cos B}$ , 则这个三角形是直角三角形.

20. 求值:

$$(1) \quad \tan 20^\circ + 4 \sin 20^\circ$$

$$(2) \quad \frac{\sin 7^\circ + \sin 8^\circ \cos 15^\circ}{\cos 7^\circ - \sin 8^\circ \sin 15^\circ}$$

21. 求证:

$$(1) \quad \sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{n+1}{2}x \sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \quad (2) \quad \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\cos \frac{n+1}{2}x \sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}$$

### C

22. 已知  $\cos \left( \frac{\pi}{4} + x \right) = \frac{3}{5}$ ,  $\frac{17\pi}{12} < x < \frac{7\pi}{4}$ , 求  $\frac{\sin 2x + 2 \sin^2 x}{1 - \tan x}$  的值.

23. 已知  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2}{3}$ ,  $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$ , 求  $\frac{\tan \alpha}{\tan \beta}$  的值.

## 第三章 三角函数的性质与图象

在展开本章具体内容之前，首先应明确两点：（1）研究函数性质的依据是函数的定义。对于三角函数来讲，它的每种函数的定义与其相应的三角函数线的定义是彼此等价的（一种是代数形式，一种是几何形式、代数形式便于计算，几何形式形象直观）。因此，研究中根据我们需要我们可以灵活地选用任何一种形式；（2）在中学阶段，研究函数的初等性质主要限于以下五个方面：

1. 定义域（我们用  $D$  表示它）；
2. 值域（对  $D$  而言，是整体性质）；
3. 增减性（对  $D$  的某个子区间而言，是局部性质），
4. 奇偶性（对  $D$  而言，是整体性质）；
5. 周期性（对  $D$  而言，是整体性质）。

在 1.4 节，我们曾经利用单位圆，对三角函数的某些性质（定义域、值域、五组诱导公式）做过初步的探究。本章将在此基础上完成对三角函数初等性质的全面研究，并画出各种三角函数的图象。

### 3.1 关于三角函数定义域与值域的补充

练习：根据三角函数（或三角函数线）的定义填表：

函数	$\sin \alpha = y$	$\cos \alpha = x$	$\tan \alpha = \frac{y}{x}$	$\cot \alpha = \frac{x}{y}$	$\sec \alpha = \frac{1}{x}$	$\csc \alpha = \frac{1}{y}$
定义域						
值域						

**例 3.1** 求下列函数的定义域。

$$(1) f(\alpha) = \sqrt{\cot \alpha \cdot \csc \alpha}$$

$$(2) f(\beta) = \sqrt{\sin \beta + \lg(2 \cos \beta + 1)}$$

$$(3) f(x) = \frac{\sin x \cdot \tan \left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{2 \cos x - 1}$$

解:

- (1) 要使  $f(\alpha)$  有意义, 须  $\cot \alpha \cdot \csc \alpha \geq 0$ , 即  $\cot \alpha$  与  $\csc \alpha$  同号或积为零. 在图 3.1 中我们分别标出这两个函数值的符号. “可见动点应落在实线画出的弧上 (注意: 点  $B$ 、 $C$  在内, 点  $A$  除外),

$$\therefore \alpha \in \left(0 + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$




图 3.1




图 3.2

- (2) 要使  $f(\beta)$  有意义, 须

$$\sin \beta \geq 0 \quad (1)$$

$$2 \cos \beta + 1 > 0 \iff \cos \beta > -\frac{1}{2} \quad (2)$$

在单位圆上 (图 3.2) 画出余弦线  $\overrightarrow{ON} = -\frac{1}{2}$ , 过  $N$  作  $PQ \parallel y$  轴, 则满足 (2) 的动点应落在  $\widehat{QAP}$  上, 满足 (1) 的动点应落在  $x$  轴 (含  $x$  轴) 上方的弧上. 从而, 满足不等式 (1)(2) 的动点应落在  $\widehat{AP}$  上.

$$\therefore \beta \in \left[0 + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

- (3) 要使  $f(x)$  有意义, 须

$$\begin{cases} x - \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \iff x \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi & (k \in \mathbb{Z}) \\ \cos x \neq \frac{1}{2} \end{cases}$$

在单位圆上, 满足不等式组的  $x$  的对应点应落在图 3.3 中实线画出的弧上, 即  $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi$ ,  $x \neq \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ,  $x \neq \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), 或者表示成

$$x \in \left( \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \right) \cup \left( \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right) \\ \cup \left( \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, \frac{7\pi}{4} + 2k\pi \right) \cup \left( -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$




图 3.3




图 3.4

例 3.2 解不等式组:

$$\sin x > -\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$|\cos x| \geq \frac{1}{2} \quad (2)$$

解: 在单位圆上分别作出正弦线  $\overrightarrow{OM} = -\frac{1}{2}$ , 余弦线  $\overrightarrow{ON_1} = -\frac{1}{2}$ ,  $\overrightarrow{ON_2} = \frac{1}{2}$ , 过点  $M$ 、 $N_1$ 、 $N_2$  分别作  $x$  轴和  $y$  轴的平行线 (图 3.4)。可知满足不等式组的动点应落在实线画出的弧上, 从而有

$$x \in \left[ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \right) \cup \left( -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right], \quad k \in \mathbb{Z}$$

### 思考题

上式中后一个区间写成下面的形式, 错在哪里?

$$\left( \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

例 3.3 写出使下列不等式成立的  $x$  的集合:

(1)  $\sqrt{3} + \tan x \leq 0$

(2)  $\cot x - 2 \geq 0$

解:

(1) 由原式, 得  $\tan x \leq -\sqrt{3}$ ,

$$\therefore x \in \left( \frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{2\pi}{3} + k\pi \right], k \in \mathbb{Z} \text{ (图 3.5)}.$$




图 3.5




图 3.6

(2) 由原式, 得  $\cot x \geq 2$ , 对于  $x$  的边界值  $x'$  来说,  $\cot x' = 2$  不是特殊角, 我们可以用量角器量出  $x'$  的值 (在精度要求不高的情况下, 这样做是可行的), 从而  $x \in (0 + k\pi, x' + k\pi]$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  (图 3.6)。

**评述:** 求三角函数式的定义域, 归结为解三角不等式 (或不等式组)。可以先在周内角范围内运用三角函数线进行研究, 然后再考虑一般情况。

### 思考题

你能说出下列三角函数的值域吗?

(1)  $y = \sin x + 3$

(2)  $y = 2 \cos x$

(3)  $y = -3 \sin x + 1$

**例 3.4** 试求函数  $f(x) = \sin x + \cos x$  的值域。

### 问 1

由  $-1 \leq \sin x \leq 1$ ,  $-1 \leq \cos x \leq 1$ ,  $f(x)$  的值域是否为  $[-2, 2]$  呢?

**分析:**  $f(x)$  的值域不是  $[-2, 2]$ 。这是因为当  $\sin x$  取得最小值  $-1$  时,  $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ , ( $k \in \mathbb{Z}$ ), 此时  $\cos x$  并不能取得最小值  $-1$ . 对于  $\sin x$  取最大值的情况也是类似的。因此, 欲求  $f(x)$  的值域, 应先化简  $f(x)$ 。

**解:** 根据  $a \sin x + b \cos x$  的化积公式, 有

$$f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\begin{aligned} \because -1 &\leq \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1 \\ \therefore -\sqrt{2} &\leq \sqrt{2} \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right) \leq \sqrt{2} \\ \text{即, } f(x) &\text{ 的值域为 } [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]. \end{aligned}$$

## 习题一

### A

1. (口答) 求下列函数的定义域:

$$(1) f(x) = \frac{1}{1 + \sin x}$$

$$(3) f(x) = \sqrt{\cos x}$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{1 - \cos x}$$

$$(4) f(x) = \sqrt{-2 \sin x}$$

2. 求下列函数的定义域:

$$(1) y = -\tan \left( x + \frac{\pi}{6} \right) + 2$$

$$(4) y = 2 \cot \left( 2x - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$(2) y = \cot \left( x + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$(5) y = \frac{1}{1 - \tan x}$$

$$(3) y = \tan \frac{x}{2}$$

$$(6) y = \frac{\cot x}{\cos x - \frac{1}{2}}$$

3. 求下列函数的定义域:

$$(1) f(t) = \tan t \cdot \cot t$$

$$(3) f(t) = \sqrt{-\cos t} - \lg \sin t$$

$$(2) f(t) = \cos t \cdot \sec t$$

4. 解不等式:



(1)  $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

(2)  $\sqrt{2} + 2\cos x \geq 0$

(3)  $1 + \tan x \geq 0$

(4)  $\cot x - \sqrt{3} \geq 0$

(5)  $\tan x - 3 \leq 0$

(6)  $2\cot x + 3 \geq 0$

5. 下列各式能不能成立? 为什么?

(1)  $\cos^2 x = \frac{3}{2}$

(2)  $\sin^3 x = -\frac{\pi}{4}$

(3)  $\sin x + \cos x = 2$

(4)  $\tan x + \cot x = 2$

6. 试求下列函数的值域:

(1)  $y = 5\sin x$

(2)  $y = \cos x - 4$

(3)  $y = -2\sin x + 6$

(4)  $y = \cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$

(5)  $y = \sin x - \cos x$

(6)  $y = a\sin x + b\cos x$

(7)  $y = \sin^2 x - \sin x + \frac{\pi}{4}$

(8)  $y = \cos^2 x + 6\cos x + 10$

### B

7. 求函数  $f(t)$  的定义域:

$$f(t) = \sqrt{-4\sin^2 t + 2(1 + \sqrt{3})\sin t - \sqrt{3}}$$

### C

8. 当  $a$  为何实数值时, 下列函数的定义域是  $\mathbb{R}$ ?

$$f(x) = \sqrt{\sin^6 x + \cos^6 x + a\sin x \cos x}$$

## 3.2 三角函数的增减性

利用三角函数线, 研究三角函数值的增、减变化的规律是形象、简捷的。

### 3.2.1 $f(\alpha) = \sin \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$

从图 3.7 可见, 当动点  $P$  从点  $B_1$  逆时针转动到点  $B$  时, 正弦值从  $-1$  逐渐增加到  $+1$ ; 当动点  $P$  从  $B$  逆时针转动到  $B_1$  时, 正弦值又从  $+1$  逐渐减少到  $-1$ . 由此, 正弦函数的

- 增区间为  $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$ ;
- 减区间为  $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$ .




图 3.7




图 3.8

### 3.2.2 $f(\alpha) = \cos \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$

从图 3.8 可见, 当动点  $P$  从  $A_1$  逆时针转动到点  $A$  时, 余弦值从  $-1$  逐渐增加到  $+1$ ; 当动点  $P$  从  $A$  逆时针转动到  $A_1$  点时, 余弦值又从  $+1$  逐渐减少到  $-1$ . 由此, 余弦函数的

- 增区间为  $[\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$ ;
- 减区间为  $[0 + 2k\pi, \pi + 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$ .

### 3.2.3 $f(\alpha) = \tan \alpha, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$

从图 3.9 可见, 当动点  $P$  从  $B_1$  逆时针转动到点  $B$  时, 正切值从  $-\infty$  逐渐增加到  $+\infty$ ; 当动点  $P$  从  $B$  逆时针转动到  $B_1$  点时, 正切值又从  $-\infty$  逐渐增加到  $+\infty$ . 由此, 正切函数的增区间为  $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$ ; 它没有减区间。

## 思考题

能说  $\tan \alpha$  是其定义域上的增函数吗?




图 3.9




图 3.10

### 3.2.4 $f(\alpha) = \cot \alpha$ , $\alpha \in \mathbb{R}$ , 且 $\alpha \neq k\pi$ ( $k \in \mathbb{Z}$ )

从图 3.10 可见, 当动点  $P$  从点  $A$  逆时针转动到  $A_1$  时, 余切值从  $+\infty$  逐渐减少到  $-\infty$ ; 当点  $P$  从  $A_1$  逆时针转到  $A$  时, 余切值从  $+\infty$  逐渐减少到  $-\infty$ . 由此余切函数无增区间, 它的减区间是  $(0 + k\pi, \pi + k\pi)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

## 思考题

能说  $\cot \alpha$  是其定义域上的减函数吗?

例 3.5 比大小:

(1)  $\sin \frac{23\pi}{5}$  与  $\sin \left( -\frac{23\pi}{7} \right)$

(2)  $\cot \frac{91\pi}{10}$  与  $\cot \left( -\frac{67\pi}{8} \right)$

分析: 异角同名函数比大小, 若能化到同一个单调区间, 或能断定其为一正, 一负 (中间值法) 或零, 问题就解决了.

解:

$$1. \sin \frac{23\pi}{5} = \sin \left( 4\pi + \frac{3\pi}{5} \right) = \sin \frac{3\pi}{5}$$

$$\sin \left( -\frac{23\pi}{7} \right) = \sin \left( -4\pi + \frac{5\pi}{7} \right) = \sin \frac{5\pi}{7}$$

$\therefore \frac{\pi}{2} < \frac{3\pi}{5} < \frac{5\pi}{7} < \pi$ , 且  $\sin \alpha$  在  $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$  上是减函数

$$\therefore \sin \frac{3\pi}{5} > \sin \frac{5\pi}{7} \Rightarrow \sin \frac{23\pi}{5} > \sin \left(-\frac{23\pi}{7}\right)$$

$$2. \cot \frac{91\pi}{10} = \cot \left(8\pi + \frac{11\pi}{10}\right) = \cot \frac{11\pi}{10} > 0$$

$$\cot \left(-\frac{67\pi}{8}\right) = \cot \left(-10\pi + \frac{13\pi}{8}\right) = \cot \frac{13\pi}{8} < 0$$

$$\therefore \cot \frac{11\pi}{10} > \cot \frac{31\pi}{8} \Rightarrow \cot \frac{91\pi}{10} > \cot \left(-\frac{67\pi}{8}\right)$$

**另解:** 要比较两式  $a$  与  $b$  的大小, 也可以先研究  $a$ 、 $b$  是大于零, 等于零, 还是小于零? 以题 (1) 为例。

$$\sin \frac{23\pi}{5} - \sin \frac{-23\pi}{7} = \sin \frac{3\pi}{5} - \sin \frac{5\pi}{7} = 2 \cos \frac{23\pi}{35} \sin \frac{-2\pi}{35} > 0$$

$$\therefore \sin \frac{23\pi}{5} > \sin \left(-\frac{23\pi}{7}\right).$$

**例 3.6** 当  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ , 判断  $\frac{\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) - \cos \alpha}{\tan 1 - \tan 2}$  的符号.

**解:** 由  $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) \in \left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)$

$\therefore 0 < \alpha < \left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) < \pi$ , 且在  $(0, \pi)$  上  $\cos x$  是减函数, 从而

$$\cos \alpha > \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) - \cos \alpha < 0$$

若分子和差化积, 再判断更简便:

$$\text{分子} = -2 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{12}\right) \sin \frac{\pi}{12} < 0$$

对于分母来说, 由于  $0 < 1 < \frac{\pi}{2} < 2 < \pi$ ,

$\therefore \tan 1 > 0, \tan 2 < 0 \Rightarrow \tan 1 - \tan 2 > 0$ , 故原式符号为负.

**例 3.7** 不通过求值, 指出下式是大于零, 等于零, 还是小于零?

$$\tan \left(-\frac{13\pi}{4}\right) - \tan \left(-\frac{17\pi}{5}\right)$$

**解: 解法 1:**

$$\begin{aligned} \tan \left(-\frac{13\pi}{4}\right) - \tan \left(-\frac{17\pi}{5}\right) &= \tan \left(-4\pi + \frac{3\pi}{4}\right) - \tan \left(-4\pi + \frac{3\pi}{5}\right) \\ &= \tan \frac{3\pi}{4} - \tan \frac{3\pi}{5} > 0 \end{aligned}$$

$\because \frac{\pi}{2} < \frac{3\pi}{5} < \frac{3\pi}{4} < \pi$ , 而  $\tan x$  在  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$  上是增函数.

**解法 2:** 先和差化积, 再判断

$$\begin{aligned}\tan\left(-\frac{13\pi}{4}\right) - \tan\left(-\frac{17\pi}{5}\right) &= \frac{\sin\left(-\frac{13\pi}{4} + \frac{17\pi}{5}\right)}{\cos\left(-\frac{13\pi}{4}\right)\cos\left(-\frac{17\pi}{5}\right)} \\ &= \frac{\sin\frac{3\pi}{20}}{\cos\frac{3\pi}{4}\cos\frac{3\pi}{5}} > 0\end{aligned}$$

$\because \sin\frac{3\pi}{20} > 0, \cos\frac{3\pi}{4} < 0, \cos\frac{3\pi}{5} < 0$

**例 3.8** 求下列函数的单调增区间:

(1)  $f_1(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

(2)  $f_2(x) = 2\sin\left(-2x + \frac{\pi}{3}\right)$

**分析:** 它们都是复合函数, 应运用复合函数求单调区间的思考方法处理.

**解:**

(1) 内层函数  $t = 2x - \frac{\pi}{3}$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 是增函数, 要使  $f_1(x)$  为增函数, 应使  $\cos t$  为增函数,

$$\therefore \pi + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq 2\pi + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \text{ 由此}$$

$$\frac{2\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore f_1(x) \text{ 的单调增区间为 } \left[\frac{2\pi}{3} + k\pi, \frac{7\pi}{6} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$$

(2) **解法 1:** 内层函数  $t = -2x + \frac{\pi}{3}$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 是减函数, 要使  $f_2(x)$  为增函数, 应使  $2\sin t$  为减函数

$$\therefore \frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq -2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \text{ 由此}$$

$$-\frac{7\pi}{12} - k\pi \leq x \leq -\frac{\pi}{12} - k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (*)$$

$$\therefore f_2(x) \text{ 的单调增区间为 } \left[-\frac{7\pi}{12} - k\pi, -\frac{\pi}{12} - k\pi\right], k \in \mathbb{Z}.$$

**解法 2:** 先将  $f_2(x)$  变形

$$f_2(x) = -2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$$

$\because t = 2x - \frac{\pi}{3}$  为增函数, 要使  $f_2(x)$  为增函数, 应使  $-2\sin t$  为增函数, 也就是使  $\sin t$  为减函数,

$\therefore \frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ , 由此

$$\frac{5\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{11\pi}{12} + k\pi (k \in \mathbb{Z}) \quad (**)$$

$\therefore f_2(x)$  的单调增区间为  $\left[\frac{5\pi}{12} - k\pi, \frac{11\pi}{12} - k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$ .

应注意: 两种解法所得到的结果 (\*) 与 (\*\*) 实质上是相同的。

### 思考题

对于  $f_2(x)$ , 已经求出它的单增区间, 由此能直接说出它的单调减区间吗?

**例 3.9** 用单调函数的定义证明  $f(x) = \sin x$  在  $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$  上是减函数.

**证明:** 任取  $x_1, x_2 \in \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$  且  $x_1 < x_2$ .

$$\text{作差 } f(x_2) - f(x_1) = \sin x_2 - \sin x_1 = 2 \cos \frac{x_2 + x_1}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2}$$

$\because x_1, x_2 \in \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$ , 且  $x_1 < x_2$

$\therefore \frac{\pi}{2} + 2k\pi < \frac{x_2 + x_1}{2} < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ , 且  $0 < \frac{x_2 - x_1}{2} < \frac{\pi}{2}$

由此,  $\cos \frac{x_2 + x_1}{2} < 0, \sin \frac{x_2 - x_1}{2} > 0$ , 从而

$$f(x_2) - f(x_1) < 0 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

$\therefore f(x) = \sin x$  在  $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$  上的减函数.

## 习题二

### A

1. 不求值, 比较下列各组中两个三角函数值的大小:

(1)  $\sin 250^\circ, \sin 260^\circ$

(3)  $\cos 515^\circ, \cos 530^\circ$

(2)  $\cos \frac{15}{8}\pi, \cos \frac{14}{9}\pi$

(4)  $\sin\left(-\frac{7}{54}\pi\right), \sin\left(-\frac{63}{8}\pi\right)$

2. 不求值, 确定下列各题的运算结果哪些大于 (小于) 零:

(1)  $\tan 138^\circ - \tan 143^\circ$

(3)  $\cot 281^\circ - \cot 305^\circ$

(2)  $\tan\left(-\frac{28\pi}{3}\right) - \tan\left(-\frac{27\pi}{4}\right)$

(4)  $\cot\left(-\frac{55\pi}{12}\right) - \cot\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$

3. 不求值, 比较下列各组中两个三角函数值的大小:

(1)  $\tan\left(-\frac{1}{5}\pi\right), \tan\left(-\frac{3}{7}\pi\right)$

(3)  $\tan \frac{75}{11}\pi, \tan\left(-\frac{58}{11}\pi\right)$

(2)  $\cot 1519^\circ, \cot 1493^\circ$

(4)  $\tan \frac{7\pi}{8}, \tan \frac{\pi}{16}$

4. 由小到大, 为下列各数排序:

$$\sin 1, \tan \pi, \cos 2, \cos 1, \cos 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

5. 比较下列各组数的大小:

(1)  $\sin \frac{6\pi}{7}, \sin \frac{\pi}{5}$

(3)  $\tan \frac{\pi}{5}, \tan \frac{7\pi}{5}$

(2)  $\cos \frac{2\pi}{5}, \cos\left(-\frac{2\pi}{7}\right)$

(4)  $\cot \frac{4\pi}{5}, \cot \frac{8\pi}{7}$

6. 求下列函数的单调减区间:

(1)  $y_1 = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

(3)  $y_3 = -2\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

(2)  $y_2 = 2\sin\left(-2x + \frac{\pi}{3}\right)$

7. 用单调函数的定义证明  $f(x) = \cos x$  在  $[2\pi, 3\pi]$  上是减函数。

### B

8. 用单调函数的定义证明  $f(x) = \tan x$  在  $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$  上是增函数。

### C

9. 当  $x$  为锐角时, 求证  $\tan x > x > \sin x$ .

### 3.3 三角函数的奇偶性

#### 问 1

叙述奇（偶）函数的定义.

根据奇（偶）函数的定义，利用 1.4 节公式（二）

$$\begin{aligned}\sin(-x) &= -\sin x, & \cot(-x) &= -\cot x \\ \cos(-x) &= \cos x, & \sec(-x) &= \sec x \\ \tan(-x) &= -\tan x, & \csc(-x) &= -\csc x\end{aligned}$$

可以看出：

- $\cos x, \sec x$  是其定义域上的偶函数；
- $\sin x, \tan x, \cot x, \csc x$  是其定义域上的奇函数。

#### 思考题

“ $f(x) = \cos x (x > 0)$  是偶函数”这个论断错在哪里？

**例 3.10** 用偶函数的定义，证明  $f(x) = \sin^2 x (x \in \mathbb{R})$  是偶函数。

**证明：**任取  $x \in \mathbb{R}$ ，考察

$$f(-x) = \sin^2(-x) = [\sin(-x)]^2 = [-\sin x]^2 = \sin^2 x, \quad f(x) = \sin^2 x$$

从而， $f(-x) = f(x)$  对一切  $x \in \mathbb{R}$  都成立，

$\therefore f(x) = \sin^2 x (x \in \mathbb{R})$  是偶函数。

### 习题三

#### A

1. 在下列函数中，哪些是奇函数？哪些是偶函数？哪些既不是奇函数也不是偶函数？并说明理由。

(1)  $y = -\sin x$

(3)  $y = |\sin x| - 2$

(2)  $y = |\sin x|$

(4)  $y = 3 \cos x + 1$



(5)  $y = \tan^2 x$

(7)  $y = \sin 3x + 2$

(6)  $y = x^2 + \sin^2 x$

(8)  $y = x^2 - \sin 2x$

2. 用奇函数的定义, 证明  $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$  是奇函数.

**B**

3. 判断函数  $f(x) = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$  的奇偶性. (注意: 判断题应有基本解题过程)

4. 判断函数  $f(x) = A \sin\left(\frac{15}{2}\pi + \frac{2}{3}x\right)$  ( $A \neq 0$ ) 的奇偶性.

5. 判断函数  $f(x) = \lg \frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}$  的奇偶性.

**C**

6. 研究  $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$  ( $A \neq 0, \omega > 0$ ), 当  $\varphi$  为何值时是:

(1) 奇函数;

(2) 偶函数。

### 3.4 三角函数的周期性

作为预备知识, 我们先学习什么是周期函数。

周期现象是自然界和科学技术中最基本的现象之一。从星辰的运行到地球上季节的变化, 从弹性体的振动到发电机发出交流电, 无不包含着周期现象。正是为了定量地描述周期现象, 数学上引入了周期函数的概念。

**问 1**

观察由图象给出的下列函数 (图 3.11), 其性质上的共同特征是什么?


(1)  $y = f_1(x), \quad x \in \mathbb{R}$

(2)  $y = f_2(x), \quad x \in \mathbb{R}$


(3)  $y = f_3(x), \quad x \in [-3, +\infty)$

细致地分析三个图象, 可以发现:


每个图象都可以“平分”成大小、形状完全相同的无数段。用  $y$  随  $x$  变化的规律可以描述成: 在定义域  $D$  中, 对任何一个自变量  $x$ , 当它增加一个固定的



(1)



(2)



(3)

图 3.11

常数  $T$  [如对  $f_1(x)$ ,  $T_1 = 4$ ; 对  $f_2(x)$ ,  $T_2 = 2\pi$ ; 对  $f_3(x)$ ,  $T_3 = 1$ ] 以后, 函数值都重复出现 (周而复始)。

把这种共同特征, 用符号语言给予精确化就有

#### 定义

对于函数  $y = f(x)$ ,  $x \in D$ , 若存在常数  $T \neq 0$ , 使任取  $x \in D$ , 都有

$$f(x) = f(x + T) \quad (*)$$

称  $y = f(x)$ ,  $x \in D$  为**周期函数**,  $T$  称为它的**周期**。

#### 说明:

1. 定义中: 不为零的常数  $T$  满足的条件是: “任取  $x \in D$ , 都有  $f(x) = f(x + T)$ ”。

应注意所谓“任取  $x \in D$ ”就是可以取遍  $D$  中的每一个  $x$ 。由此可以看出, “周期性”是函数在  $D$  上的整体性质。由 (\*) 还可以看出,  $D$  不能是有限区间 (至少在一个方向是无限的)。

2. 定义的实质: (\*) 表明, 对于常数  $T \neq 0$ , 定义域  $D$  中的任何一个自变量  $x$  与  $x + T$  对应的函数值都相等。这正是函数值周而复始的根源。由此可见, 只要弄清了  $f(x)$  在一个周期内的性质, 那么,  $f(x)$  在其他周期内的性质由 (\*) 式可以直接推断出来。这将给函数性质的研究带来极大的方便。
3. 欲判断一个函数是否为周期函数, 在于是否存在如上的常数  $T$ 。若存在, 就是周期函数; 若不存在, 就不是周期函数。根据这个定义可以得出: 问 1 给出的三个函数都是周期函数, 且它们的周期依次是  $4, 2\pi, 1$ 。
4. 对于不同的周期函数,  $T$  的值可能不等 [如上述的  $f_1(x)$  的  $T_1 = 1$ ,  $f_2(x)$  的  $T_2 = 2\pi \cdots \cdots$ ], 即使对于同一个周期函数,  $T$  的值也不唯一。事实上, 若  $T$  是  $f(x)$  的周期, 则  $2T, 3T, \dots, kT$  ( $k \in \mathbb{N}$ ) 都是  $f(x)$  的周期 (这一点从  $T$  满足的性质可以推得。从上述三个函数的图象也可以直观地看出来)。

#### 思考题

$y = \sin x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 是周期函数吗? 试述理由。

现在, 研究三角函数的周期性。

### 3.4.1 $\sin x$ 、 $\cos x$

$\therefore \sin(x + 2k\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos x \quad (x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z}, \text{ 且 } k \neq 0) .$

$\therefore \sin x$ 、 $\cos x$  都是周期函数，它们的周期

$$T = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}, \quad k \neq 0).$$

### 3.4.2 $\tan x$ 、 $\cot x$

$\therefore \tan(x + k\pi) = \tan x, \quad (x \in \mathbb{R}, \text{ 且 } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z})$

$\cot(x + k\pi) = \cot x, \quad (x \in \mathbb{R}, \text{ 且 } x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z})$

$\therefore \tan x, \cot x$  也都是周期函数，其周期  $T = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}, \quad k \neq 0)$ .

由上可见，对  $y = \sin x$  来说，它的周期有  $\pm 2\pi, \pm 4\pi, \pm 6\pi, \dots$  其中，具有代表性的（也是最常用的）是  $2\pi$ 。它是  $\sin x$  的所有正的周期中最小的一个，称为**最小正周期**，记为  $T_{\text{最小正}} = 2\pi$ 。今后，求一个周期函数的周期，只要写出它的最小正周期即可。

**例 3.11** 证明： $2\pi$  是  $f(x) = \sin x$  的最小正周期。

**分析：**由于  $\pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$  都是  $\sin x$  的周期（上面已经证明），以下只须证任何小于  $2\pi$  的正数都不是  $\sin x$  的周期。用反证法。

**证明：**设  $\ell$  是  $\sin x$  的周期，且  $0 < \ell < 2\pi$ ，则任取  $x \in \mathbb{R}$ ，都有  $\sin(x + \ell) = \sin x$ 。

由此， $2 \cos\left(x + \frac{\ell}{2}\right) \sin \frac{\ell}{2} = 0$  对一切  $x \in \mathbb{R}$  都成立。

又  $\therefore \cos\left(x + \frac{\ell}{2}\right) \neq 0$

$\therefore \sin \frac{\ell}{2} = 0$

但由于  $0 < \ell < 2\pi$ ，所以  $\sin \frac{\ell}{2} \neq 0$ ，矛盾。

$\therefore$  题设不真，从而  $\sin x$  的最小正周期为  $2\pi$ 。

类似地可以证明： $\cos x$  的最小正周期也是  $2\pi$ ， $\tan x$ 、 $\cot x$  的最小正周期是  $\pi$ 。

**例 3.12** 用定义判断下列函数是否是周期函数？

(1)  $f_1(x) = 5$

(2)  $f_2(x) = 2^x$

(3)  $f_3(x) = \sin 2x$

**解：**

(1) 设  $T \neq 0$ ,  $f_1(x) = 5$ ,  $f_1(x+T) = 5$

欲使  $T$  为  $f_1(x)$  的周期, 应有  $f(x+T) = f(x)$  对一切  $x \in \mathbb{R}$  都成立. 即  $5 = 5$  对一切  $x$  都成立, 这是显然的。

$\therefore f_1(x) = 5$  是周期函数 (周期为任意非零实数)。

(2) 设  $T \neq 0$ ,  $f_2(x) = 2^x$ ,  $f_2(x+T) = 2^{x+T}$ 。

欲使  $T$  为  $f_2(x)$  的周期, 应有  $2^{x+T} = 2^x$  对一切  $x \in \mathbb{R}$  都成立。  $\Rightarrow 2^T = 1 \Rightarrow T = 0$ , 矛盾。

$\therefore f_2(x) = 2^x$  不是周期函数。

(3) 设  $T \neq 0$ ,  $f_3(x) = \sin 2x$ ,  $f_3(x+T) = \sin 2(x+T)$ 。

欲使  $T$  为  $f_3(x)$  的周期, 应使  $\sin 2(x+T) = \sin 2x$  对一切  $x \in \mathbb{R}$  都成立,

由于  $\sin(2x+2T) = \sin 2x$  等价于

$$\sin(2x+2T) - \sin 2x = 2 \cos(2x+T) \sin T = 0$$

而  $\cos(2x+T) \neq 0$ , 要使上式对一切  $x \in \mathbb{R}$  成立, 应使  $\sin T = 0$ , 这只要取  $T = \pi$  即可。

$\therefore f_3(x) = \sin 2x$  是周期函数 (周期是  $2\pi$ )。

**说明:** 用这里的方法可以证明:  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ,  $y = A \cos(\omega x + \varphi)$ ,  $y = A \tan(\omega x + \varphi)$ ,  $y = A \cot(\omega x + \varphi)$  (其中  $A \neq 0$ ,  $\omega > 0$ ) 都是周期函数。

**例 3.13** 求下列周期函数的周期:

$$(1) f(x) = 2 \sin \left( \frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} \right)$$

$$(2) f(x) = \tan \left( 2x + \frac{\pi}{3} \right)$$

**解:**

(1)  $f(x) = 2 \sin \left( \frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} \right)$ , 设实数  $T > 0$ , 有

$$f(x+T) = 2 \sin \left[ \frac{1}{2}(x+T) - \frac{\pi}{6} \right] = 2 \sin \left( \frac{x}{2} + \frac{T}{2} - \frac{\pi}{6} \right)$$

欲使  $T$  为  $f(x)$  的周期, 须对于任意的  $x \in D$ , 都有

$$\begin{aligned} 2 \sin \left( \frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} \right) &= 2 \sin \left( \frac{x}{2} + \frac{T}{2} - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= 2 \sin \left( \frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{T}{2} \right) \end{aligned} \quad (*)$$

利用  $\sin x$  的周期为  $2\pi$ , 得  $\frac{T}{2} = 2\pi \Rightarrow T = 4\pi$ .

$\therefore f(x) = 2\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$  的周期为  $4\pi$ .

(2)  $f(x) = \tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ , 设实数  $T > 0$ , 有

$$f(x+T) = \tan\left[2(x+T) + \frac{\pi}{3}\right] = \tan\left(2x + \frac{\pi}{3} + 2T\right)$$

欲使  $T$  为  $f(x)$  的周期, 须对任意的  $x \in D$ , 都有

$$\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \tan\left(2x + \frac{\pi}{3} + 2T\right)$$

利用  $\tan x$  的周期为  $\pi$ , 得  $2T = \pi \Rightarrow T = \frac{\pi}{2}$

$\therefore f(x) = \tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$  的周期为  $\frac{\pi}{2}$ .

**例 3.14** 试求  $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$  的周期 ( $A \neq 0, \omega \neq 0$ ).

**解:** 设实数  $T > 0$ , 有  $f(x+T) = A\sin(\omega x + \varphi + \omega T)$ . 欲使  $T$  为  $f(x)$  的周期, 须对任意的  $x \in D$ , 都有

$$A\sin(\omega x + \varphi) = A\sin(\omega x + \varphi + \omega T)$$

由于  $A \neq 0$ ,  $\sin x$  的周期为  $2\pi$ ,

• 当  $\omega > 0$  时, 取  $\omega T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$ ,

• 当  $\omega < 0$  时, 取  $-\omega T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{-\omega}$ ,

$$\therefore T = \frac{2\pi}{|\omega|}.$$

## 习题四

### A

1. (1) 等式  $\sin(30^\circ + 120^\circ) = \sin 30^\circ$  是否成立? 若此式成立, 能否说  $120^\circ$  是正弦函数  $y = \sin x$  的周期? 为什么?

(2) 等式  $\sin(x - 4\pi) = \sin x$  是否对一切  $x \in \mathbb{R}$  都成立? 若此式成立, 能否说  $-4\pi$  是  $\sin x$  的周期? 为什么?

(3) 对于问 1 中的  $f_3(x)$ , 求  $f_3(100)$ 、 $f_3\left(10\frac{1}{2}\right)$ .

2. 证明: 常数函数  $y = C$  是以任意非零实数为周期的周期函数。

3. 利用基本三角函数的周期, 求下列复合三角函数的周期:

(1)  $y = \sin 3x$

(2)  $y = \cos \frac{x}{3}$

(3)  $y = 3 \sin \frac{x}{4}$

(4)  $y = \sin \left( x + \frac{\pi}{10} \right)$

(5)  $y = \cos \left( 2x + \frac{\pi}{3} \right)$

(6)  $y = \sqrt{3} \sin \left( \frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$

(7)  $y = \tan 2x$

## B

4. 同上题:

(1)  $y = \cot \left( x + \frac{\pi}{3} \right)$

(2)  $y = 5 \tan \frac{x}{2}$

(3)  $y = \tan(\omega x + \varphi) \quad (\omega \neq 0)$

## C

5. 证明  $y = \cos \sqrt{x}$  不是周期函数.

## 3.5 正弦函数与余弦函数的图象

利用三角函数线容易作出正弦函数与余弦函数的图象.

在  $xOy$  坐标系中, 取  $x$  轴上任一点  $O_1$  为圆心作单位圆 (图 3.12 上半部分), 从此圆与  $x$  轴的交点  $A$  起, 把圆分成 12 等份 (等份越多, 作出的图象越精确), 分点  $A, P_1, P_2, P_3, \dots, P_{11}, P_{12}$  依次对应的角为  $0, \frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{6}, \frac{3\pi}{6}, \dots, \frac{11\pi}{6}, 2\pi$ . 过诸分点分别作  $y$  轴和  $x$  轴的垂线, 就可得到上述各角对应的正弦线和余弦线 (例如  $\overrightarrow{O_1P_3}$  就是角  $\frac{\pi}{2}$  的正弦线). 相应地, 把  $x$  轴上从 0 到  $2\pi$  这一段 ( $2\pi \approx 6.2828$ ) 分成 12 等份 (例如, 从原点起向右第四个点, 就对应角为  $\frac{\pi}{2}$  的点). 再把角  $x$  对应的正弦线向右平移到起点与  $x$  轴上的  $x$  点重合的位置 (例如, 把正弦线  $\overrightarrow{O_1P_3}$  平移到起点为  $Ox$  轴上  $\frac{\pi}{2}$  点处), 最后用光滑曲线把这些正弦线的终点连接起来, 就得到正弦函数  $y = \sin x, x \in [0, 2\pi]$  的图象.

为了作出余弦函数  $y = \cos x, x \in [0, 2\pi]$  的图象, 我们把坐标系向下平移 (图 3.12 的下半部分), 过点  $O_1$  作与  $x$  轴成角  $\frac{\pi}{4}$  的直线  $\ell$ , 又过余弦线  $\overrightarrow{O_1A}$  的终点  $A$  作  $x$  轴的垂线与  $\ell$  相交于  $A'$ , 这样得到的与  $\overrightarrow{O_1A}$  同向, 且长度为  $|\overrightarrow{O_1A}|$  的有向线段  $\overrightarrow{AA'}$ , 相当于把余弦线  $\overrightarrow{O_1A}$  “竖立”起来了. 同样的方法, 将其余的余弦线都“竖立”起来. 再将它们向右平移, 使角  $x$  对应的余弦线的起点与  $x$  轴上的点  $x$  重合, 最后用光滑曲线把这些竖立起来的有向线段的终点连接起来, 就得到余弦函数  $y = \cos x, x \in [0, 2\pi]$  的图象.




图 3.12

因为正弦函数和余弦函数的周期都是  $2\pi$ ，所以，图 3.12 中实际上画出了它们一个周期内的图象。这时，只要分别向左、右一个周期一个周期地延展出去，就可以得出  $y = \sin x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 及  $y = \cos x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 的图象（图 3.13）。

正弦函数  $y = \sin x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 和余弦函数  $y = \cos x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 的图象分别叫做**正弦曲线**和**余弦曲线**。

观察正弦曲线与余弦曲线（图 3.13），可以看出它们体现出了前面研究过**正弦与余弦函数的性质**。

- (1) 定义域： $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$  的定义域都是  $\mathbb{R}$ 。
- (2) 值域： $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$  的值域都是  $[-1, 1]$ 。
- (3) 周期性： $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$  都是周期函数， $2\pi$  是它们的最小正周期。
- (4) 单调性：

- 对于  $y = \sin x$  ( $x \in \mathbb{R}$ )，增区间是  $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ，减区间是  $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$ ,  $k \in \mathbb{Z}$
- 对于  $y = \cos x$  ( $x \in \mathbb{R}$ )，增区间是  $[\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ，减区间是  $[0 + 2k\pi, \pi + 2k\pi]$ ,  $k \in \mathbb{Z}$



(5) 奇偶性:

- $y = \sin x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 是奇函数 (图象关于原点对称)
- $y = \cos x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 是偶函数 (图象关于  $y$  轴对称)




图 3.13

上面介绍的用三角函数线作图象的方法基本上是几何方法。我们还可以用描点法 (代数方法) 来作图象。特别, 当精度要求不太高时, 选择图象上的几个特殊点 (关键点) 来描迹是简单易行而且经常使用的。

对  $y = \sin x$ ,  $x \in [0, 2\pi]$  而言, 下列五个点:

$$(0, 0), \quad \left(\frac{\pi}{2}, 1\right), \quad (\pi, 0), \quad \left(\frac{3\pi}{2}, -1\right), \quad (2\pi, 0)$$

无论对函数性质的研究, 还是对正确作图象, 都起着关键的作用。事实上, 这五个点中有三个是函数的零点 (函数值为零的点), 一个是最大值点 (函数值在该点取到最大值), 一个是最小值点 (图 3.13)。在一个周期内, 若这五个点的位置确定了, 那么, 整个图象就基本确定了。因此, 作图时, 常常先描出这五个点, 然后再用光滑曲线把它们连结起来, 就得到了这个周期内的正弦函数的简图。这种用上述五个关键点描绘正弦函数简图的方法通常称为“五点法”。

对  $y = \cos x$ ,  $x \in [0, 2\pi]$ , 通常也用“五点法”作简图。五个关键点选择为:

$$(0, 1), \quad \left(\frac{\pi}{2}, 0\right), \quad (\pi, -1), \quad \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right), \quad (2\pi, 1)$$

其中, 有两个零点, 两个最大值点, 一个最小值点 (图 3.13)。

**例 3.15** 用“五点法”作下列函数的简图:

(1)  $y = 1 + \sin x$ ,  $x \in [0, 2\pi]$

(2)  $y = -\cos x, \quad x \in [0, 2\pi]$

解:

(1) 列表: (先填第一、二行, 再填第三行)

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$\sin x$	0	1	0	-1	0
$y = 1 + \sin x$	1	2	1	0	1

在  $xOy$  坐标系中, 描点, 作图 (图 3.14) .




图 3.14

(2) 列表:

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$\cos x$	1	0	-1	0	1
$y = -\cos x$	-1	0	1	0	-1

在  $xOy$  坐标系中, 描点, 作图 (图 3.15) .

**例 3.16** 用“五点法”作下列函数在一个周期内的简图:

(1)  $y = \sin 2x$

(2)  $y = 3 \sin \left( 2x + \frac{\pi}{4} \right)$

解:

(1) 在  $y = \sin 2x$  中, 设  $t = 2x$  (1)

则有

$$y = \sin t \quad (2)$$




图 3.15

(2) 是基本的三角函数, 因而, 可用“五点法”的思想取出它的五个关键点 (这只要设  $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$  即可)。然后, 据 (1), 再使,  $(t, y)$  变换成  $(x, y)$ . 列表如下:

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$x = \frac{t}{2}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\pi$
$y = \sin t$	0	1	0	-1	0

(注: 这个表, 先填第一、三行, 后填第二行)

在  $xOy$  坐标系中, 描点, 作图 (图 3.16) .

(2) 在  $y = 3 \sin \left( 2x + \frac{\pi}{4} \right)$  中, 设  $t = 2x + \frac{\pi}{4}$  (1)

则有

$$y = 3 \sin t \tag{2}$$

列表: (先填第一、三行, 后填第二行)

$t$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$x = \frac{t - \frac{\pi}{4}}{2}$	$-\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{8}$
$y = 3 \sin t$	0	3	0	-3	0

在  $xOy$  坐标系中, 描点, 作图 (图 3.17) .




图 3.16




图 3.17

## 思考题

用五点法如何作  $y = \sin 2x$ ,  $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$  的简图?

**例 3.17** 求下列函数的最大值与最小值, 并指出当  $x$  为何值时, 函数取到最大(小)值:

(1)  $f_1(x) = \cos x + 2$

(3)  $f_3(x) = A \sin x \quad (A \neq 0)$

(2)  $f_2(x) = \sin 2x$

解:

(1) 当  $\cos x$  取最大值时,  $f_1(x)$  的值为最大,

$\therefore$  当  $x \in \{x \mid x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  时,  $f_1(x)$  的最大值为  $1 + 2 = 3$ ;

当  $\cos x$  取最小值时,  $f_1(x)$  的值为最小,

$\therefore$  当  $x \in \{x \mid x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  时,  $f_1(x)$  的最小值为  $-1 + 2 = 1$ .

(2) 当  $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时,  $f_2(x)$  的值最大,

$\therefore x \in \left\{x \mid x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$  时,  $f_2(x)$  取最大值 1,

当  $2x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时,  $f_2(x)$  的值最小,

$\therefore$  当  $x \in \left\{x \mid x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$  时,  $f_2(x)$  取最小值 -1.

(3) 若  $A > 0$  时,

- 当  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时,  $f_3(x)$  取最大值  $A$ ;
- 当  $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时,  $f_3(x)$  取最小值  $-A$ .

若  $A < 0$  时,

- 当  $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时,  $f_3(x)$  取最大值  $-A$ ;
- 当  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时,  $f_3(x)$  取最小值  $A$ .

**例 3.18** 若  $\cos x = \frac{a}{a-2}$ , 求  $a$  的取值范围.

**分析:** 这是涉及余弦函数值域的问题.

**解:**  $\because \cos x \in [-1, 1]$ , 要使原式有意义, 必须

$$\therefore -1 \leq \frac{a}{a-2} \leq 1 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{a-2} + 1 \geq 0 \\ \frac{a}{a-2} - 1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2a-2}{a-2} \geq 0 \\ \frac{a}{a-2} \leq 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2(a-1)(a-2) > 0 \text{ 或 } a=1 \\ a-2 < 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a < 1 \text{ 或 } a > 2 & a=1 \\ a < 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a \leq 1$$

## 习题五

### A

1. 用五点法作出下列函数在一个周期内的简图:

$$(1) y = \sin 4x$$

$$(4) y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$(2) y = 2 \sin \frac{1}{3}x$$

$$(5) y = 5 \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$(3) y = 4 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

$$(6) y = \frac{1}{2} \sin\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$$

2. 用五点法作函数  $y = 3 \sin \left( 3x - \frac{\pi}{3} \right)$ ,  $x \in [0, \pi]$  的简图, 并根据简图写出它的减区间。

3. 当  $x$  为哪些值时, 下列函数取得最大(小)值, 并指出最大(小)值是多少:

$$(1) y = 2 \sin x$$

$$(5) y = 3 \sin \left( x + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$(2) y = 2 - \cos \frac{x}{3}$$

$$(6) y = \frac{1}{2} \sin \left( \frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$(3) y = -5 \sin x$$

$$(4) y = 1 - \frac{1}{2} \cos x$$

4. 求下列函数的定义域与值域:

$$(1) y = 4 + \cos x$$

$$(3) y = \sqrt{\sin x}$$

$$(2) y = 2 \cos \frac{x}{3}$$

$$(4) y = \sqrt{1 - \cos^2 x}$$

## B

5. 要使下式有意义, 求  $a$  的取值范围:

$$\sec x = \frac{3a + 2}{2 - 3a}$$

## 3.6 用几何变换的方法作函数的图象

本节是对已学知识的复习与补充。课题是: 根据已知函数

$$y = f(x) \quad (*)$$

的图象, 用几何变换的方法, 作与  $f(x)$  密切相关的下列一些新函数的图象。

### 3.6.1 $y = f(x) + m$

欲作函数  $y = f(x) + m$  的图象, 只须把  $y = f(x)$  的图象作纵向平移(上移  $m$  个单位, 见图 3.18), 即使  $y = f(x)$  图象上的每个点  $(x, y) \rightarrow (x, y + m)$ 。




图 3.18

### 3.6.2 $y = f(x + m)$

欲作  $y = f(x + m)$  的图象, 只须把  $y = f(x)$  的图象作**横向平移** (左移  $m$  个单位, 见图 3.19), 即使  $y = f(x)$  图象上的每个点  $(x, y) \rightarrow (x - m, y)$

变换的推导过程: 设  $P(a, b) \in$  曲线  $y = f(x)$ , 则  $b = f(a)$ . 对于  $y = f(x + m)$ , 当  $x + m = a$  时,  $y = b \Rightarrow x = a - m$ ,  $y = b$ , 由此可得  $(a - m, b) \in$  曲线  $y = f(x + m)$ , 从而  $(x, y) \rightarrow (x - m, y)$ .




图 3.19

### 3.6.3 $y = -f(x)$

欲作  $y = -f(x)$  的图象, 只须把 (\*) 的图象作  **$x$  轴的对称变换** (图 3.20), 即使 (\*) 上的每个点  $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ .




图 3.20




图 3.21

### 3.6.4 $y = f(-x)$

欲作  $y = f(-x)$  的图象, 只须把 (\*) 的图象作  $y$  轴的对称变换 (图 3.21), 即使 (\*) 上的每个点  $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ .

### 3.6.5 $y = Af(x)$ ( $A > 0$ )

欲作  $y = Af(x)$  的图象, 只须把 (\*) 的图象作纵向伸缩变换 (上、下都压向  $x$  轴, 图 3.22), 即使 (\*) 上的每个点  $(x, y) \rightarrow (x, Ay)$ .




图 3.22



3.6.6  $y = f(Ax)$  ( $A > 0$ )

欲作  $y = f(Ax)$  的图象, 只须把 (\*) 的图象作**横向伸缩变换** (左、右都压向  $y$  轴, 图 3.23), 即使 (\*) 上的每一个点  $(x, y) \rightarrow (\frac{x}{A}, y)$ .

## 思考题

若  $A < 0$  又如何呢?




图 3.23

3.6.7  $y = |f(x)|$ 

欲作  $y = |f(x)|$  的图象, 只须把 (\*) 的图象上纵坐标  $y$  为负值的点作出关于  $x$  轴的对称点 (图 3.24), 即使 (\*) 上的每个点  $(x, y) \rightarrow (x, |y|)$ .




图 3.24

3.6.8  $y = f(|x|)$ 

很明显,  $y = f(|x|)$  是个偶函数, 其图象关于  $y$  轴对称. 其次, 由于

$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ f(-x), & x < 0 \end{cases}$$

可见,  $y = f(|x|)$  在  $x \geq 0$  的区间上图象与 (\*) 完全相同. 由此, 欲作  $y = f(|x|)$  的图象, 可以分两步: 第一步,  $x \geq 0$  部分同 (\*); 第二步, 把 (\*) 上  $x > 0$  部分作关于  $y$  轴的对称图形就可得到  $x < 0$  部分的图象 (图 3.25).




图 3.25

### 3.6.9 $y = \frac{1}{f(x)}$

欲作  $y = \frac{1}{f(x)}$  的图象, 只须把 (\*) 的图象上的每一个点  $(x, y) \rightarrow \left(x, \frac{1}{y}\right)$  (图 3.26).




图 3.26

以上, 讲了九种图象的几何变换, 它们对今后的学习都很重要. 应弄清原理, 掌握作法.

**例 3.19** 用几何变换的方法作函数  $y = \sin(-x)$  的图象.

**解:** **方法 1:** 作  $y = \sin x$  关于  $y$  轴的对称曲线就是  $y = \sin(-x)$  的图象 (图 3.27).




图 3.27

## 思考题

对此例, 你还能想到别的变换方法吗?

**例 3.20** 用几何变换的方法, 由  $y = \sin x$  的图象作  $y = \sin \frac{x}{2}$  的图象。

**解:** 根据  $y = \sin x$  的图象, 作横向伸缩变换  $(x, y) \rightarrow \left(\frac{x}{\frac{1}{2}}, y\right)$ , 即  $(2x, y)$  (图 3.28)。




图 3.28

**例 3.21** 函数  $y = 3 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$  的图象, 可看作  $y = \sin x$  的图象经过哪些几何变换得到的?

**分析:** 既有纵向和横向的压缩变换, 又有横向平移。还有一个变换的顺序问题。

**解: 解法 1:** (先压后移, 见图 3.29)

我们先把  $y = 3 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$  写成  $y = 3 \sin 2 \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ , 则

$$\begin{aligned}
 y = \sin x &\xrightarrow[(x, y) \rightarrow (x, 3y)]{\text{纵压}} y = 3 \sin x \xrightarrow[(x, y) \rightarrow (\frac{x}{2}, y)]{\text{横压}} y = 3 \sin 2x \\
 &\xrightarrow[(x, y) \rightarrow (x - \frac{\pi}{6}, y)]{\text{左移 } \frac{\pi}{6}} y = 3 \sin 2 \left(x + \frac{\pi}{6}\right)
 \end{aligned}$$




图 3.29

**解法 2:** (先移后压, 见图 3.30):

$$\begin{aligned}
 y = \sin x & \xrightarrow[\substack{(x,y) \rightarrow (x-\frac{\pi}{3}, y)}]{\substack{\text{左移 } \frac{\pi}{3}}} y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \xrightarrow[\substack{(x,y) \rightarrow (\frac{x}{2}, y)}]{\substack{\text{横压}}} y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \\
 & \xrightarrow[\substack{(x,y) \rightarrow (x, 3y)}]{\substack{\text{纵压}}} y = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

**评述:** 对于函数  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$  的作图上面讲了两种方法: 一是描点法 (特别是用“五点法”作简图), 二是几何图形的变换法。在实际作简图时, 主要用五点法。讲几何变换法主要是弄清简单函数与复合函数图象之间的联系, 为今后的研究提供方便。

在物理学中, 我们常常用函数

$$y = A \sin(\omega x + \varphi), \quad A > 0, \omega > 0, x \in [0, +\infty) \quad (1)$$

表示一个振动量 (如交流电的电流强度或电压; 弹性体振动时, 质点离开平衡位置的距离; ……因此, (1) 又称为**振动函数**。(要特别注意: 对振动函数而言, 条件  $A > 0, \omega > 0, x \in [0, +\infty)$  是非常必要的。它们都有明显的物理意义)。此时,  $A$  表示振动量离开平衡位置的最大距离, 通常称为这个振动的**振幅**; 往复振动一次所需的时间  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ , 叫做振动的**周期**; 单位时间内往复振动的次数  $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ , 叫做振动的**频率**;  $\omega x + \varphi$  叫做**相位**,  $\varphi$  叫做**初相** (即为  $x = 0$




图 3.30

时的相位)。

**例 3.22** 当  $y = 2 \sin\left(-2x + \frac{\pi}{3}\right)$  描写振动时, 求它的振幅、周期、频率、相位和初相。

**分析:** 这里,  $x$  的系数小于零, 不合振动函数的要求. 因此, 先要把函数式变形。

**解:** 利用  $\sin x = \sin(\pi - x)$ , 得

$$y = 2 \sin\left(-2x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(\pi + 2x - \frac{\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$\therefore A = 2, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\pi},$  相位是  $2x + \frac{2\pi}{3}$ , 初相是  $\frac{2\pi}{3}$ 。

**例 3.23** 当  $y = -3 \sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$  描写振动时, 求其振幅、周期、频率、相位和初相。

**分析:** 这里, 正弦函数的系数小于零, 不合振动函数的要求, 需要把函数式先变形。

解: 利用  $-\sin x = \sin(-x)$ , 得

$$\begin{aligned} y &= -3 \sin \left( 4x + \frac{\pi}{6} \right) = 3 \sin \left( -4x - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= 3 \sin \left( \pi + 4x + \frac{\pi}{6} \right) = 3 \sin \left( 4x + \frac{7\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

$\therefore A = 3, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}, \quad f = \frac{1}{T} = \frac{2}{\pi},$  相位是  $4x + \frac{7\pi}{6}$ , 初相是  $\frac{7\pi}{6}$ .

## 习题六

### A

1. 下列函数的图象, 可看作由  $y = x^2$  的图象经过哪些几何变换得来的 (不必画图):

(1)  $y = 3(x - 2)^2 + 1$

(2)  $y = -2x^2 - 12x - 20$

2. 下列函数的图象, 可看作由  $y = \sin x$  的图象经过哪些几何变换得来的 (不必画图)? 同时说出每个函数的周期:

(1)  $y = \sin \frac{3}{2}x$

(3)  $y = \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right)$

(2)  $y = -3 \sin x$

(4)  $y = 2 \sin \left( 3x + \frac{\pi}{3} \right)$

3. 下列函数的图象, 可看作由  $y = \cos x$  的图象经过哪些几何变换得来的 (不必画图)? 同时说出每个函数的周期:

(1)  $y = -\cos x + 2$

(3)  $y = \cos \left( x - \frac{\pi}{3} \right)$

(2)  $y = 2 \cos 4x$

(4)  $y = 2 - 3 \cos \left( 2x - \frac{\pi}{4} \right)$

4. 当下列函数描写振动时, 写出它的振幅、周期、频率、相位和初相 (“写出”题, 不必有过程):

(1)  $y = 2 \sin \left( 5x + \frac{\pi}{3} \right)$

(2)  $y = 3 \cos \left( 2x + \frac{\pi}{3} \right)$

5. (1)  $y = |\sin x|$  的最小正周期是\_\_\_\_\_;(2)  $y = 2 \left| \sin \left( 4x - \frac{\pi}{3} \right) \right|$  的最小正周期是\_\_\_\_\_.6. 电流强度  $I$  随时间  $t$  变化的函数关系是  $I = A \sin \omega t$ . 设  $\omega = 100\pi$  (弧度/秒),  $A = 5$  (安培),(1) 求电流强度  $I$  变化的周期与频率;(2) 当  $t = 0, \frac{1}{100}, \frac{1}{50}$  (秒) 时, 求相应的  $I$ ;(3) 画出  $I$  随  $t$  变化的图象 (以 0.5cm 表示 1 安培; 以 1cm 表示  $\frac{1}{100}$  秒)。**B**

7. 当下列函数描写振动时, 求出它的振幅、周期、频率、相位和初相:

(1)  $y = 6 \sin \left( -3x + \frac{\pi}{4} \right)$

(2)  $y = -2 \sin \left( 4x - \frac{\pi}{5} \right)$

8. 弹簧挂着的小球作上下振动, 它在  $t$  秒钟时相对于平衡位置 (就是静止时的位置) 的高度  $h$  厘米由下列关系决定。

$$h = 2 \sin \left( t + \frac{\pi}{4} \right)$$

以  $t$  为横坐标,  $h$  为纵坐标, 作出这个函数在一个周期内的图象, 并回答下列问题:(1) 小球在开始振动时 (即  $t = 0$  时) 的位置在哪里?

(2) 小球的最高点和最低点与平衡位置的距离分别是多少?

(3) 经过多少时间, 小球往复振动一次 (周期)?

(4) 每秒钟小球能往复振动多少次 (频率)?

9. 一根长  $\ell$  厘米的线, 一端固定, 另一端悬挂一个小球。小球摆动时, 离开平衡位置的位移  $S$  (厘米) 和时间  $t$  (秒) 的函数关系是:

$$S = 3 \cos \left( \sqrt{\frac{g}{\ell}} t + \frac{\pi}{3} \right)$$

(1) 求小球摆动的周期;

(2) 已知  $g = 980$  厘米/秒<sup>2</sup>, 要使小球摆动的周期是 1 秒, 线的长度  $\ell$  应当是多少厘米 (精确到 0.1 厘米,  $\pi$  取 3.14) ?

### 3.7 正切函数与余切函数的图象

利用三角函数线作正切函数与余切函数的图象也是很容易的。

因为  $y = \tan x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  且  $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 的周期 (最小正周期) 是  $\pi$ , 因而, 可以先画它的一个周期  $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  的图象 (图 3.31)。然后, 根据正切函数的周期性, 再把图象向左、右延展, 得出  $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  上的图象 (图 3.32), 它称为**正切曲线**。可以看出, 它是由相互平行且等距的直线隔开的无穷多支全同的曲线构成的。




图 3.31

正切曲线体现了前面研究过的正切函数的性质:

- (1) 定义域为  $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) [结合图 3.32, 应该理解: 函数  $y = \tan x$  在  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 上无定义];
- (2) 值域为  $(-\infty, +\infty)$  [从图上看得很清楚: 在区间  $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 的两个端点内侧, 当  $x$  无限地接近  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时, 函数值可以大过任何正数, 我们把这种情况记为  $\tan x \rightarrow +\infty$  (读作趋向正无穷大); 当  $x$  无限地接近  $-\frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时, 函数值和上述情况恰好相反, 记为



$\tan x \rightarrow -\infty$  (读作趋向负无穷大)。这就是说,  $x$  可以取任意实数值, 但没有最大值和最小值, 因此值域是  $(-\infty, +\infty)$ , 或说成值域为  $\mathbb{R}$ ];

- (3) 周期性: 是定义域上的周期函数, 周期为  $\pi$ ;
- (4) 增减性:  $\tan x$  在每个开区间  $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 内都是增函数 (但不能说, 在它的整个定义域上是增函数, 这一点从图 3.32 看得很清楚);
- (5) 奇偶性: 由于任取  $x \in D$ , 都有  $\tan(-x) = -\tan x$ , 知道  $y = \tan x$  是奇函数 (从图象上也看得很清楚, 图象关于原点对称)。




图 3.32

与作余弦曲线相类似的方法, 可以作出余切函数  $y = \cot x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 的图象 (图 3.33), 称为余切曲线, 它体现了余切函数的性质:

- (1) 定义域为  $x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ );
- (2) 值域为  $(-\infty, +\infty)$ ;
- (3) 周期性: 是定义域上的周期函数, 周期为  $\pi$ ;
- (4) 增减性:  $\cot x$  在每个开区间  $(0 + k\pi, \pi + k\pi)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  内, 都是减函数 (但不能说, 是整个定义域上的减函数);
- (5) 奇偶性:  $\cot x$  是奇函数。

**例 3.24** 求函数  $y = \cot\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$  的定义域、周期和单调区间。




图 3.33

解: 欲使  $y = \cot\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$  有意义, 须  $x \in \mathbb{R}$ , 且  $3x - \frac{\pi}{4} \neq k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), 即

$$x \in \mathbb{R}, \text{ 且 } x \neq \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{12} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$  函数的定义域为  $\left\{x \mid x \in \mathbb{R}, \text{ 且 } x \neq \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{12}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

设常数  $T > 0$ , 则  $f(x) = \cot\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ ,

$$f(x+T) = \cot\left(3x - \frac{\pi}{4} + 3T\right)$$

欲使  $T$  为  $f(x)$  的周期, 须任取  $x \in D$ , 都有

$$\cot\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \cot\left(3x - \frac{\pi}{4} + 3T\right)$$

利用  $y = \cot x$  的周期为  $\pi$ , 得  $3T = \pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )  $\Rightarrow T = \frac{\pi}{3}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ),

$$\therefore T_{\text{最小正}} = \frac{\pi}{3}.$$

当  $0 + k\pi < 3x - \frac{\pi}{4} < \pi + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时函数为减函数即

$$\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$  单调减区间为  $\left(\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}, \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}\right)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , 没有单调增区间。

**例 3.25** 求  $f(x) = \tan x - \cot x$  的定义域、周期、值域。

解: 要使  $f(x)$  有意义, 须  $\tan x, \cot x$  都有意义,

$\therefore$  定义域为  $\left\{x \mid x \in \mathbb{R}, \text{ 且 } x \neq \frac{\pi}{2} \cdot k, k \in \mathbb{Z}\right\}$

欲求  $f(x)$  的周期、值域, 应将  $f(x)$  化成一个三角函数.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin x \cos x} \\ &= -2 \cdot \frac{\cos 2x}{\sin 2x} = -2 \cot 2x \end{aligned}$$

$\therefore T = \frac{\pi}{2}$ , 值域为  $\mathbb{R}$ .

## 习题七

### A

1. 求下列函数的定义域与值域

$$(1) y = \cot \left( 2x - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$(3) y = \frac{1}{\tan x - \cot x}$$

$$(2) y = \tan x + \cot x$$

$$(4) y = \frac{1}{1 + \cot x}$$

2. 写出下列函数的周期:

$$(1) y = \tan 3x$$

$$(3) y = \tan \left( x + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$(2) y = \cot \frac{\pi}{2}$$

$$(4) y = \cot \left( 2x - \frac{\pi}{4} \right)$$

3. 下列函数中, 哪些是奇函数? 偶函数? 非奇又非偶函数?

$$(1) y = 2 \tan 4x$$

$$(3) y = -\tan x$$

$$(2) y = 1 + \cot x$$

$$(4) y = -|\cot x|$$

4. 比较下列各组数中的大小, 并说明理由。

$$(1) \tan \left( -\frac{\pi}{5} \right) \text{ 与 } \tan \left( \frac{4\pi}{7} \right)$$

$$(2) \tan \frac{7\pi}{8} \text{ 与 } \tan \frac{\pi}{16}$$

### B

5. 函数  $y = \sqrt{\tan x - 1}$  的定义域是\_\_\_\_, 值域是\_\_\_\_.

6. 函数  $y = \frac{\sqrt{x(6-x)}}{\tan x - \cot x}$  的定义域是\_\_\_\_\_.

7. 设  $\alpha, \beta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ , 且  $\tan \alpha < \cot \beta$ , 那么必有 ( )

(A)  $\alpha < \beta$

(C)  $\alpha + \beta < \frac{3\pi}{2}$

(B)  $\alpha > \beta$

(D)  $\alpha + \beta > \frac{3\pi}{2}$

## 3.8 本章小结

### 3.8.1 知识结构分析

本章以三角函数的定义和三角函数线为依据, 全面研究了四个三角函数的性质和图象。

三角函数的图象如图 3.34, 结合图象可以进一步认识三角函数的性质。




图 3.34

### 3.8.2 几点说明

1. 定义域是自变量  $x$  的取值范围, 应特别注意  $\tan x, \cot x$  的无定义点 (间断点)。
2. 值域是函数值的取值范围。弦函数的值域是  $[-1, 1]$ . 应该理解:  $-1$  是它们的最小值,  $1$  是它们的最大值, 函数能取到  $[-1, 1]$  中的任何值。切函

数的值域是  $(-\infty, +\infty)$ , 因而, 它们无最小值也无最大值, 它们能取到任何实数值。

3. 表中列出的周期, 指的都是最小正周期. 今后无需说明, 求函数的周期都是求最小正周期 (如果最小正周期存在的话)。若要判断某函数是否是周期函数, 根本的是使用定义.

要结合三角函数, 正确理解“周期函数”的定义和本质. 会用“周期”的概念简化函数性质的研究。

4. 函数的奇偶性, 是其定义域上的整体性质, 这一点必须清楚 [如  $y = \cos x$  ( $x \geq 0$ ) 就不是偶函数]。当然, 判断一个函数是否是奇 (偶) 函数, 最根本的是使用奇 (偶) 函数的定义.

5. 函数的单调性, 是对其定义域上的子区间而言的。应特别注意, 虽然在  $\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$  或  $\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right)$ , 其中  $k \in \mathbb{Z}$  上  $\tan x$  都是增函数, 但不能说它在其定义域是增函数。

6. 对于函数  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ , 其中  $A \neq 0$ , 应会讨论它的各种性质, 会用五点法画它的简图。知道它的图象可由  $y = \sin x$  的图象, 经过怎样的几何变换得出来。

7. 对于  $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\tan x$ 、 $\cot x$ , 都要会用“五点法”画简图。

### 3.8.3 综合运用举例

例 3.26 求下列函数的周期和值域:

(1)  $y = \sin^2 x$

(2)  $y = \cos^2 x - 3 \sin x \cos x$

分析: 研究三角函数式的性质 (周期、值域、最值、单调性) 常用方法是先把函数式化成一个三角函数, 再根据三角函数的性质加以解决。

解:

$$(1) y = \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x,$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{2} = \pi. \text{ 值域是 } [0, 1].$$

(2)

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{1 + \cos 2x}{2} - 3 \cdot \frac{1}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\cos 2x - 3 \sin 2x) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{10}}{2} \left( \frac{1}{\sqrt{10}} \cos 2x - \frac{3}{\sqrt{10}} \sin 2x \right) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{10}}{2} - (\sin \varphi \cos 2x - \cos \varphi \sin 2x) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{10}}{2} \sin(\varphi - 2x) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{10}}{2} \sin(2x - \varphi)
 \end{aligned}$$

$$\text{其中: } \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{10}}, \quad \cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\therefore T = \frac{2\pi}{2} = \pi, \text{ 值域为 } \left[ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{10}}{2} \right]$$

**例 3.27** 求  $y = \sin x + \cos x + \sin x \cos x$  的最大值与最小值。

**分析:** 显然函数  $y$  难以化成一个三角函数。但是,  $\sin x + \cos x$  与  $\sin x \cos x$  可以互化。

**解:** 令  $u = \sin x + \cos x$ , 则  $-\sqrt{2} \leq u \leq \sqrt{2}$ ,

$$u^2 = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x$$

$$\therefore \sin x \cos x = \frac{u^2 - 1}{2}$$

从而

$$\begin{aligned}
 y &= f(u) = u + \frac{u^2 - 1}{2} = \frac{1}{2}u^2 + u - \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2}(u+1)^2 - 1 \quad (-\sqrt{2} \leq u \leq \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

$$\therefore y_{\max} = f(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}(\sqrt{2}+1)^2 - 1 = \frac{1}{2} + \sqrt{2}$$

$$y_{\min} = f(-1) = \frac{1}{2}(-1+1)^2 - 1 = -1$$

**评述:** 当三角式难以化成一个三角函数时, 为求它的最值, 实行换元, 化成一元有理整函数常常能使问题迎刃而解。

**例 3.28** 函数  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$  一个周期内的图象如图 3.35, 试确定它的解析式。




图 3.35

分析：要确定函数的解析式，需求出常数  $A$ 、 $\omega$ 、 $\varphi$ 。

解：由图 3.35， $A = 2$ ， $T = \frac{5\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \pi$ ，

由  $T = 2\pi$ ，知  $\omega = 2$ ，从而，函数式可写成

$$y = 2 \sin(2x + \varphi), \quad x \in \mathbb{R} \quad (*)$$

把  $M\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$  代入上式，得

$$0 = 2 \sin \left[ 2 \left( -\frac{\pi}{6} \right) + \varphi \right]$$

结合图知：





$$-\frac{\pi}{3} + \varphi = 2k\pi \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

取  $\varphi$  的最小正值为  $\frac{\pi}{3}$ 。

$\therefore$  解析式为  $y = 2 \sin \left( 2x + \frac{\pi}{3} \right)$ ， $x \in \mathbb{R}$ 。

#### 思考题

得到 (\*) 后，若以  $C\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$  代入，定出的  $\varphi$  是否也为  $\frac{\pi}{3}$ ？

	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$	$y = \cot x$
				
定义域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \in \mathbb{R}$ , 且 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$	$x \in \mathbb{R}$ , 且 $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$(-\infty, +\infty)$	$(-\infty, +\infty)$
周期性	周期为 $2\pi$	周期为 $2\pi$	周期为 $\pi$	周期为 $\pi$
奇偶性	奇函数	偶函数	奇函数	奇函数
单调性	增区间是 $\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 减区间是 $\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$ 其中 $k \in \mathbb{Z}$	增区间是 $[\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]$ 减区间是 $[0 + 2k\pi, \pi + 2k\pi]$ 其中 $k \in \mathbb{Z}$	增区间是 $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 无减区间	减区间是 $(0 + k\pi, \pi + k\pi)$ 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 无增区间



## 复习题三

## A

1. 求下列函数的定义域:

$$(1) y = \frac{\cot x}{\lg(2 \cos x - \sqrt{3})}$$

$$(2) y = \sqrt{\sin x - \cos x}$$

2.  $\alpha$  为不等边三角形的最小角, 且  $\cos \alpha = \frac{m+1}{m-1}$ , 求  $m$  的取值范围。

3. 试证明  $f(x) = \cos 2x + 3 \sin x$  的值域为  $\left[-4, 2\frac{1}{8}\right]$ .

4. 要使下式有意义, 求  $a$  的取值范围:  $\sin x = \frac{a}{a-3}$ .

5. 说出下列函数的周期 ( $a \neq 0, b < 0$ ):

$$(1) y = a \sin(bx + c) + m$$

$$(2) y = a \cot(bx + n)$$

6. 求出下列函数的周期:

$$(1) y = \sin x \cos x$$

$$(3) y = (\sin x + \cos x)^2$$

$$(2) y = \tan \frac{x}{2} + \cot \frac{x}{2}$$

$$(4) y = \sin x + \cos x$$

7. 求函数  $f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x$  的周期。

8. 下列函数中, 哪些是奇函数? 哪些是偶函数?

$$(1) x^2 + \sec x$$

$$(4) \tan^2 x$$

$$(7) \sin x + \cos x$$

$$(2) \csc x$$

$$(5) x^2 \sin x$$

$$(3) \tan x^2$$

$$(6) \sin x + \cot x$$

$$(8) x \tan 2x + x^3$$

9.  $\varphi$  为何值时, 能使

$$(1) \sin(x + \varphi) \text{ 为偶函数;}$$

$$(2) \cos(x + \varphi) \text{ 为奇函数.}$$

10. 求下列函数的单调减区间:

(1)  $y = -\sin x$

(3)  $y = \cos \pi x$

(2)  $y = -\cos x$

(4)  $y = 3 \cos \left( -2x + \frac{\pi}{3} \right)$

11. 试求下列函数的最大值和最小值, 并求函数取得最大(小)值时  $x$  的集合:

(1)  $y = \frac{2}{1 + \cot^2 x}$

(2)  $y = 3 - \frac{2}{3} \cos \left( \frac{3}{2}x + \frac{\pi}{4} \right)$

12. 若函数  $y = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x - \cos^2 x$ , 求它的振幅、周期、最大值, 并画简图。

13. 若  $0 < a < 1$ , 求  $f(x) = 2 \sin^2 x + 4a \cos x - a^2$  的最大值与最小值。

14. 求  $f(x) = \sin \left( x - \frac{\pi}{6} \right) \cos x$ ,  $x \in \left[ 0, \frac{\pi}{2} \right]$  的最大值与最小值。

15. 若  $-\pi \leq x \leq \pi$ , 求  $f(x) = 1 + \sin x + \cos x + \sin x \cos x$  的最大值和最小值。

16. 选择题: 要得到  $y = 2 \sin 2x$  的图象, 只需把  $y = 4 \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right) \cos \left( x + \frac{\pi}{6} \right)$  的图象

(A) 向右平移  $\frac{\pi}{3}$

(C) 向右平移  $\frac{\pi}{6}$

(B) 向左平移  $\frac{\pi}{3}$

(D) 向左平移  $\frac{\pi}{6}$

17. 选择题: 函数  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$  在同一个周期内, 当  $x = \frac{\pi}{12}$  时,  $y$  取最大值 3, 当  $x = \frac{7}{12}\pi$  时,  $y$  取最小值 -3, 则函数  $y$  的解析式是( )

(A)  $y = \frac{1}{3} \sin \left( x + \frac{\pi}{3} \right)$

(C)  $y = 3 \sin \left( 2x + \frac{\pi}{3} \right)$

(B)  $y = 3 \sin \left( 2x + \frac{\pi}{6} \right)$

(D)  $y = 3 \sin \left( \frac{x}{2} - \frac{\pi}{6} \right)$

### B

18. 若  $\alpha$ 、 $\beta$  为锐角, 试比较  $\sin \alpha - \sin \beta$  与  $\sin(\alpha - \beta)$  的大小。

19. 填空: 比较下列两个三角函数式的大小。

(1)  $\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{4}$  时,  $\tan 2\alpha$  \_\_\_\_  $2 \tan \alpha$ ;

(2)  $\tan 61^\circ + \tan 29^\circ$  \_\_\_\_  $4 \cot 60^\circ$ 。

20. 研究下列函数的性质 (从五个方面去考虑):

(1)  $f(x) = \sin |x|$

(2)  $f(x) = |\cos x|$

21. 求  $y = \frac{\sec^2 x - \tan x}{\sec^2 x + \tan x}$  的值域。

22. 求证:  $f(x) = \frac{\cot 3x}{\cot x}$  的值域是  $\left(\frac{1}{3}, 3\right)$  的补集。

23. 确定函数  $y = \sqrt{\sin^2 x - 2|\sin x| + 1}$  的周期, 并画出  $x \in [0, 2\pi]$  时函数的图象。

24. 已知  $y = \sin x \sqrt{1 - \cos^2 x} - \cos x \sqrt{1 - \sin^2 x}$   $x \in [0, 2\pi]$ ,

(1) 作出函数的大致图象;

(2) 当  $x$  为何值时,  $y = \frac{1}{2}$ 。

### C

25. 在三角函数  $f(x) = \sin\left(\frac{k}{5}x + \frac{\pi}{3}\right)$  中,  $k \neq 0$

(1) 写出  $f(x)$  的最大值  $M$ 、最小值  $m$  与最小正周期  $T$ ;

(2) 试求最小的正整数  $k$ , 使得当自变量  $x$  在任意两个整数间 (包括整数本身) 变化时, 函数  $f(x)$  至少有一个值是  $M$ , 一个值是  $m$ 。

26. 已知函数  $f(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , 若对任意的  $x \in \mathbb{R}$  都有  $f(x) = f(x-1) + f(x+1)$ , 求证  $f(x)$  是以 6 为周期的周期函数。

27. 设  $a$  为常数,  $x \in \mathbb{R}$ , 且  $f(x+a) = \frac{f(x)-1}{f(x)+1}$ , 问  $f(x)$  是否是周期函数? 若是, 求出它的一个周期, 若不是说明理由。

## 第四章 反三角函数

本章将在反函数理论的指导下，研究正弦、余弦、正切、余切存在反函数的条件，并在这些条件之下逐一地建立它们的反函数，进而研究这些反函数的性质、计算和应用。

### 4.1 关于反函数知识的回顾

例 4.1 已知函数  $f(x) = x^2$  ( $x < 0$ )

- (1)  $f(x)$  是否存在反函数？说明理由；
- (2) 若存在，试求之，并画出反函数的图象。

解：

- (1)  $f(x) = x^2$  ( $x < 0$ ) 是从集合  $A = (-\infty, 0)$  到集合  $B = (0, +\infty)$  上的一一映射所确定的函数（图 4.1 中虚线给出的函数）。所以， $f(x)$  存在反函数。
- (2) 由  $y = x^2$ ,  $x < 0$ ,  $y > 0$ ，解出

$$x = -\sqrt{y}, \quad y > 0$$

改用习惯字母后，得

$$y = -\sqrt{x}, \quad x > 0$$

$$\therefore f^{-1}(x) = -\sqrt{x}, \quad x > 0.$$

利用  $f^{-1}(x)$  与  $f(x)$  的图象关于直线  $y = x$  对称，由  $f(x)$  的图象画出  $f^{-1}(x)$  的图象（图 4.1）。

**注意：**本例所体现出来的下列三点都属于反函数理论的重要组成部分：

- (1) 函数  $f(x)$  存在反函数的条件： $f$  是从  $A$  到  $B$  上的一一映射；

(2) 求反函数的步骤: 先求出  $x = f^{-1}(y)$ ,  $y \in B$ , 再写成  $y = f^{-1}(x)$ ,  $x \in B$ ;

(3) 画反函数图象的方法: 根据  $y = f(x)$  与  $y = f^{-1}(x)$  图象关于直线  $y = x$  的对称性, 利用  $y = f(x)$  的图象直接作出  $y = f^{-1}(x)$  的图象。




图 4.1




图 4.2

### 问 1

函数  $F(x) = x^2$ ,  $x \in \mathbb{R}$  存在反函数吗?

分析:  $F(x)$  是从  $A = (-\infty, +\infty)$  到  $B = [0, +\infty)$  上的映射 (图 4.2), 但不是一一映射 (为什么?), 所以  $F(x)$  不存在反函数。

### 问 2

对于上述  $F(x)$ , 能否构造一个新的函数  $f(x)$ , 使得

1.  $f(x)$  的定义域  $A'$  是  $A$  的子集;
2.  $f(x)$  的对应法则与  $F(x)$  相同, 即  $f(x) = x^2$ ,  $x \in A'$ ;
3.  $f(x)$  的值域仍为  $B = [0, +\infty)$ ;
4.  $f(x)$  存在反函数。

分析: 从图 4.2 可以看出, 只要取  $A' = (-\infty, 0]$  或  $A' = [0, +\infty)$  都可以得到满足上述要求的新函数  $f(x)$ 。

下面研究三角函数的反函数问题。根据一般函数的反函数的理论, 自然会提出下面一些课题:

(1) 如何定义三角函数的反函数?

- (2) 三角函数的反函数的图象问题。
- (3) 三角函数的反函数有些什么性质?
- (4) 研究三角函数的反函数的基本方法。

## 4.2 反正弦函数

### 4.2.1 反正弦函数

#### 问 1

$F(x): y = \sin x (x \in \mathbb{R})$  存在反函数吗? 简述理由。

#### 问 2

对于函数  $F(x)$ , 能否找到  $\mathbb{R}$  的一个子集  $A$ , 使得在  $A$  上得到的新函数  $f(x): y = \sin x, x \in A$ , 其值域仍为  $[-1, 1]$ , 且  $f(x)$  存在反函数?

分析: 从正弦函数  $y = \sin x (x \in \mathbb{R})$  显见, 满足条件的子集  $A$  是很多的, 如

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right], \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right], \dots$$

总之, 每一个  $\left[-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$  都可以选作  $A$ 。

在实际中, 我们总是希望如上得到的  $A$  比较简单, 而且包含所有锐角的值。这样选择  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] = A$  比较理想, 即

$$f(x): y = \sin x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

#### 思考题

为什么说函数  $f(x)$  有反函数?

#### 定义 1

函数  $f(x): y = \sin x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  的反函数称为**反正弦函数**<sup>a</sup>, 记为

$$f^{-1}(y): x = \arcsin y, \quad y \in [-1, 1], x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

<sup>a</sup>在英语中, “arc”一词表示弧, 有的书上把反正弦函数写作  $y = \sin^{-1} x$ 。同样, 后面讲到的反余弦函数、反正切函数、反余切函数也可写作  $\cos^{-1} x, \tan^{-1} x, \cot^{-1} x$ 。

习惯上用字母  $x$  表示自变量, 用  $y$  表示函数, 所以要把  $f^{-1}(y)$  改写成

$$f^{-1}(x): y = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1], y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

很明显,  $f^{-1}$  是从  $B = [-1, 1]$  到  $A = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的一一映射, 它是  $f: A \rightarrow B$  的逆映射. 因此, 对于  $[-1, 1]$  中的每一个  $x$  值,  $\arcsin x$  表示唯一确定的角, 这个角属于  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , 这个角的正弦恰好等于  $x$ . 理解这一点, 对研究反正弦函数的性质和运算至关重要.

**例 4.2** 求下列反正弦函数的值:

(1)  $\arcsin \frac{1}{2}$

(4)  $\arcsin \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(2)  $\arcsin \left(-\frac{1}{2}\right)$

(5)  $\arcsin(-1)$

(3)  $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$

(6)  $\arcsin 2$

**分析:** 这是已知正弦值, 求在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的角的问题.

**解:**

(1) 因为在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上,  $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ , 所以

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

同理可得

(2)  $\arcsin \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$

(3)  $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$

(4)  $\arcsin \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}$

(5)  $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$

(6) 由于  $2 \notin [-1, 1]$ , 所以  $\arcsin 2$  无意义.

**评述:** 解这类求值题, 联想正弦线的方向和大小是很有帮助的 (图 4.3). 也可结合反正弦函数的图象进行思考. 下面研究反正弦函数的图象.




图 4.3

## 4.2.2 反正弦函数图象

根据互为反函数的图象的性质,很自然想到,作函数  $y = \sin x$  ( $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ) 的图象关于直线  $y = x$  的对称图形,便得到反正弦函数的图象(图 4.4)。




图 4.4

## 思考题

试观察反正弦函数的图象(图 4.4),指出  $y = \arcsin x$  的定义域、值域,并研究其性质。

**例 4.3** 求下列函数的定义域和值域:

$$(1) y = 1 - 2 \arcsin \frac{x}{3}$$

$$(2) y = \frac{1}{2} \arcsin(1 - 2x)$$

**分析:** 用换元思想把所给问题转化为反正弦函数的问题加以解决,这是数学的基本方法。

**解:**

$$(1) -1 \leq \frac{x}{3} \leq 1 \iff -3 \leq x \leq 3$$

$$\therefore 2 \arcsin \frac{x}{3} = 1 - y, \quad \arcsin \frac{x}{3} = \frac{1}{2}(1 - y)$$

$$\therefore -\frac{\pi}{2} \leq \frac{1}{2}(1 - y) \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore -\pi - 1 \leq -y \leq \pi - 1, \quad 1 - \pi \leq y \leq 1 + \pi$$



函数  $y = 1 - 2 \arcsin \frac{x}{3}$  的定义域是  $[-3, 3]$ , 值域是  $[1 - \pi, 1 + \pi]$ .

$$(2) -1 \leq 1 - 2x \leq 1 \iff -2 \leq -2x \leq 0 \iff 0 \leq x \leq 1$$

$$\therefore -\frac{\pi}{2} \leq \arcsin(1 - 2x) \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore -\frac{\pi}{4} \leq \frac{1}{2} \arcsin(1 - 2x) \leq \frac{\pi}{4}, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$$

函数  $y = \frac{1}{2} \arcsin(1 - 2x)$  的定义域是  $[0, 1]$ , 值域是  $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ .

### 4.2.3 反正弦函数的性质

由于  $\arcsin x$  是  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的角, 所以除特殊值外, 可以求其三角函数值。于是有下列问题:

$$\sin(\arcsin x) = ? \quad \cos(\arcsin x) = ?$$

$$\tan(\arcsin x) = ? \quad \cot(\arcsin x) = ?$$

同样, 由于对任一  $x \in [-1, 1]$ ,  $\arcsin x$  都有唯一确定的值与之对应, 那么, 当用  $\sin \alpha$  替换  $\arcsin x$  中的  $x$ , 自然产生下面的问题:

$$\arcsin(\sin \alpha) = ? \quad \arcsin(\cos \alpha) = ?$$

$$\arcsin(\tan \alpha) = ? \quad \arcsin(\cot \alpha) = ?$$

$$(\tan \alpha \in [-1, 1]) \quad (\cot \alpha \in [-1, 1])$$

根据反正弦函数的定义, 参看图 4.4 或图 4.3, 不难得到关于**对应法则的基本公式**:

(1) 当  $x \in [-1, 1]$  时,  $\sin(\arcsin x) = x$ ; 当  $x \notin [-1, 1]$  时,  $\sin(\arcsin x)$  无意义.

(2) 当  $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $\arcsin(\sin \alpha) = \alpha$ ; 当  $\alpha \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $\arcsin(\sin \alpha) \neq \alpha$

这里, 当  $\alpha \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $\arcsin(\sin \alpha) \neq \alpha$  是显而易见的. 例如, 当  $\alpha = \frac{5\pi}{6}$  时,  $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$ , 而

$$\arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right) = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \neq \frac{5\pi}{6}$$

从  $\arcsin(\sin \alpha) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  也能判断  $\arcsin\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right) \neq \frac{5\pi}{6}$ .

## 思考题

$\alpha \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $\arcsin(\sin \alpha) = ?$

从图 4.3 或图 4.4 可以看出:

(1) 单调性: 反正弦函数  $y = \arcsin x$  是  $[-1, 1]$  上的增函数。

(2) 奇偶性: 反正弦函数  $y = \arcsin x$  是奇函数, 即

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x, \quad x \in [-1, 1]$$

例 4.4 求下列各式的值:

$$(1) \sin\left(\arcsin \frac{2}{3}\right)$$

$$(2) \sin\left[\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$$

解:

$$(1) \because \left|\frac{2}{3}\right| \leq 1 \quad (\text{此步判断, 十分必要})$$

$$\therefore \sin\left(\arcsin \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

$$(2) \because \left|-\frac{1}{2}\right| \leq 1$$

$$\therefore \sin\left[\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = -\frac{1}{2}$$

例 4.5 求下列各式的值:

$$(1) \tan\left(\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$(4) \tan\left[\frac{1}{2} \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)\right]$$

$$(2) \cos\left[\arcsin\left(-\frac{2}{3}\right)\right]$$

$$(5) \cos\left(\arcsin \frac{1}{2} + \arcsin \frac{1}{3}\right)$$

$$(3) \cos(\arcsin x)$$

$$(6) \tan\left(\arcsin \frac{2}{3} + \arcsin \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$$

分析: 这是反正弦的三角运算。利用反正弦函数的定义或公式 (1), 是进行反正弦函数三角运算的基本方法。

解:

$$(1) \tan\left(\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$(2) \text{ 设 } t = \arcsin\left(-\frac{2}{3}\right), \text{ 则 } \sin t = -\frac{2}{3}, t \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

$$\text{原式} = \cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

(3) 当  $|x| > 1$  时, 此式无意义.

当  $|x| \leq 1$  时, 设  $t = \arcsin x$ , 则  $\sin t = x$ ,  $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\text{原式} = \cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - x^2}$$

$$(4) \text{ 设 } t = \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right), \text{ 则}$$

$$\sin t = -\frac{1}{3}, \quad t \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$$

$$\cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{原式} = \tan \frac{t}{2} = \frac{1 - \cos t}{\sin t} = \frac{1 - \frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}} = 2\sqrt{2} - 3$$

$$(5) \text{ 设 } \alpha = \arcsin \frac{1}{2}, \beta = \arcsin \frac{1}{3}, \text{ 则}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{6}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{2}, \quad \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \beta = \frac{1}{3}, \quad \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \quad \cos \beta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{原式} = \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{2\sqrt{6} - 1}{6}$$

$$(6) \text{ 设 } \alpha = \arcsin \frac{2}{3}, \beta = \arcsin \frac{\sqrt{5}}{3}, \text{ 则}$$

$$\sin \alpha = \frac{2}{3}, \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \quad \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\sin \beta = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \quad \tan \beta = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{原式} = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\therefore 1 - \tan \alpha \tan \beta = 1 - \frac{2}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{2} = 0$$

$\therefore$  原式无意义.

**例 4.6** 求证: 函数  $y = \arcsin x$  是  $[-1, 1]$  上的增函数.

**分析:** 联想研究互为反函数的方法, 此题利用公式 (1), 借助于函数  $y = \sin x$  ( $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ) 的单调性证明.

**证明:** 任取  $x_1, x_2 \in [-1, 1]$ , 且  $x_1 < x_2$ ,

设  $y_1 = \arcsin x_1, y_2 = \arcsin x_2$ , 则  $x_1 = \sin y_1, x_2 = \sin y_2$ , 且  $y_1, y_2 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\therefore$  在  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  上正弦函数是增函数, 假设  $y_1 \geq y_2$ , 则  $x_1 \geq x_2$ , 与  $x_1 < x_2$  矛盾,

$$\therefore y_1 < y_2,$$

$\therefore$  函数  $y = \arcsin x$  是  $[-1, 1]$  上的增函数.

#### 思考题

试证  $\arcsin(-x) = -\arcsin x, x \in [-1, 1]$

**例 4.7** 求下列各式的值:

$$(1) \arcsin\left(\sin \frac{\pi}{5}\right)$$

$$(3) \arcsin\left[\sin\left(\frac{-338\pi}{3}\right)\right]$$

$$(2) \arcsin\left(\sin \frac{4\pi}{7}\right)$$

$$(4) \arcsin(\sin 8)$$

**分析:** 这是正弦的反正弦运算, 利用公式 (2) 计算. 此时, 特别要判断角是否属于  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

**解:**

$$(1) \because \frac{\pi}{5} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\therefore \arcsin\left(\sin \frac{\pi}{5}\right) = \frac{\pi}{5}$$

$$(2) \frac{4\pi}{7} \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\therefore \sin \frac{4\pi}{7} = \sin \frac{3\pi}{7}, \quad \frac{3\pi}{7} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\therefore \arcsin\left(\sin \frac{4\pi}{7}\right) = \arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{7}\right) = \frac{3\pi}{7}$$

$$(3) -\frac{338\pi}{3} \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\therefore \sin \frac{-338\pi}{3} = \sin\left(112\pi - \frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\therefore \arcsin\left(\sin \frac{-338\pi}{3}\right) = \arcsin\left(\sin \frac{-\pi}{3}\right) = -\frac{\pi}{3}$$

$$\text{或} \therefore \sin \frac{-338\pi}{3} = \sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin \frac{2\pi}{3} = -\sin \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \arcsin\left(\sin \frac{-338\pi}{3}\right) = \arcsin\left(-\sin \frac{\pi}{3}\right) = -\arcsin\left(\sin \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\pi}{3}$$

$$(4) \therefore 8 \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \frac{5\pi}{2} < 8 < 3\pi$$

$$\therefore \sin 8 = \sin(3\pi - 8), \quad 3\pi - 8 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\therefore \arcsin(\sin 8) = 3\pi - 8$$

### 思考题

试求下面各式的值并探索一般方法:

$$(1) \arcsin\left(\cos \frac{4\pi}{5}\right)$$

$$(2) \arcsin\left[\tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)\right]$$

## 习题一

### A

1. (1) “ $y = \arcsin x$  的反函数是  $y = \sin x$ ”这种说法对吗? 为什么?

(2)  $\arcsin(-\pi)$  有意义吗? 为什么?

(3)  $\sin\left(\arcsin \frac{\pi}{5}\right) = \frac{\pi}{5}$  能成立吗? 为什么?

2. 求下列各式的值 (可查表):

$$(1) \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(2) \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$(3) \arcsin 0$$

(4)  $\arcsin 1$

(5)  $\arcsin \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

(6)  $\arcsin \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

(7)  $\arcsin 0.6959$

(8)  $\arcsin \left(-\frac{1}{3}\right)$

3. 求下列各式的值:

(1)  $\sin \left(\arcsin \frac{4}{5}\right)$

(2)  $\sin \left[\arcsin \left(-\frac{4}{5}\right)\right]$

(3)  $\cos \left[\arcsin \left(-\frac{1}{2}\right)\right]$

(4)  $\tan \left(\arcsin \frac{3}{5}\right)$

## B

4. 求下列函数的定义域和值域:

(1)  $y = \arcsin 2x$

(2)  $y = \frac{1}{2} \arcsin x$

(3)  $y = 3 \arcsin \frac{2x}{3}$

(4)  $y = 2 \arcsin(1 - x)$

5. 求下列各式的值:

(1)  $\sin \left(2 \arcsin \frac{1}{6}\right)$

(2)  $\cos(2 \arcsin 0.8)$

(3)  $\tan \left(2 \arcsin \frac{3}{4}\right)$

(4)  $\sin \left[\frac{\pi}{3} + \arcsin \left(-\frac{1}{3}\right)\right]$

6. 求下列各式的值:

(1)  $\arcsin \left(\sin \frac{3\pi}{4}\right)$

(2)  $\arcsin \left[\sin \left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right]$

(3)  $\arcsin \left(\sin \frac{15\pi}{4}\right)$

(4)  $\arcsin \left[\sin \left(-\frac{44\pi}{3}\right)\right]$

7. 求下列各式的值:

(1)  $\tan(\arcsin x)$

(2)  $\cos(2 \arcsin x)$

(3)  $\arcsin(\sin 5)$

(4)  $\arcsin(\sin x), \quad x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$

## 4.3 反余弦函数

类比反正弦函数研究的内容、程序和方法，试探索下面几个问题：

- (1) 反余弦函数如何定义？
- (2) 反余弦函数图象如何画？
- (3) 反余弦函数有哪些性质？如何证明？
- (4) 研究和运用反余弦函数理论的基本方法是什么？应该注意哪些问题？

在独立地得到结论后，再与下文做一对比.

### 1. 反余弦函数的建立

函数  $y = \cos x$  ( $x \in [0, \pi]$ ) 是从  $[0, \pi]$  到  $[-1, 1]$  上的一一映射，因此，函数  $y = \cos x$  ( $x \in [0, \pi]$ ) 存在反函数。

#### 定义 2

函数  $y = \cos x$  ( $x \in [0, \pi]$ ) 的反函数叫做反余弦函数，记作  $y = \arccos x$ ，它的定义域是  $[-1, 1]$ ，它的值域是  $[0, \pi]$ 。

### 2. 反余弦函数的图象

反余弦函数  $y = \arccos x$  的图象（如图 4.5 所示），它是与函数  $y = \cos x$  ( $x \in [0, \pi]$ ) 图象关于直线对称的图形。




图 4.5




图 4.6

### 3. 反余弦函数的性质

根据反余弦函数的定义，参看图 4.5 或图 4.6 可以得到：

- (1) 对应法则的基本公式：

(a) 当  $x \in [-1, 1]$  时,  $\cos(\arccos x) = x$ ; 当  $x \notin [-1, 1]$  时,  $\cos(\arccos x)$  无意义.

(b) 当  $\alpha \in [0, \pi]$  时,  $\arccos(\cos \alpha) = \alpha$ ; 当  $\alpha \notin [0, \pi]$  时,  $\arccos(\cos \alpha) \neq \alpha$ .

(2) 单调性: 反余弦函数  $y = \arccos x$  是  $[-1, 1]$  上的减函数。

(3) 奇偶性: 反余弦函数  $y = \arccos x$  是非奇非偶函数。而且有

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x, \quad x \in [-1, 1]$$

**例 4.8** 求证:  $\arccos(-x) = \pi - \arccos x, \quad x \in [-1, 1]$ .

**分析:** 本题可以从反余弦函数定义出发, 只需证明  $-\arccos x \in [0, \pi]$  且其余弦值为  $-x$  即可。

**证明:**  $\because x \in [-1, 1], \quad \therefore -x \in [-1, 1],$

等式两边均有意义,

$$\cos(\pi - \arccos x) = -\cos(\arccos x) = -x$$

$$\because 0 \leq \arccos x \leq \pi, \quad \therefore 0 \geq -\arccos x \geq -\pi$$

$$\pi \geq \pi - \arccos x \geq 0, \quad \text{即 } 0 \leq \pi - \arccos x \leq \pi$$

因此,  $\pi - \arccos x$  是属于  $[0, \pi]$  的角, 且它的余弦等于  $-x$ , 于是

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$$

**例 4.9** 求下列各式的值:

$$(1) \arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(4) \arccos \left[ \cos \left( -\frac{46\pi}{5} \right) \right]$$

$$(2) \arccos \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$(5) \arccos(\cos 10)$$

$$(3) \arccos \left( \cos \frac{6\pi}{7} \right)$$

$$(6) \arccos(\cos x), \quad x \in \left( -\frac{\pi}{2}, 0 \right)$$

**分析:** 后四小题是余弦的反余弦运算, 应用公式 (2) 去做, 解题时应判断角是否属于  $[0, \pi]$ 。

**解:**



$$(1) \because \text{在 } [0, \pi] \text{ 上, } \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$$

$$(2) \because \text{在 } [0, \pi] \text{ 上, } \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore \arccos \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{3\pi}{4}$$

或

$$\arccos \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \pi - \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$(3) \because \frac{6\pi}{7} \in [0, \pi]$$

$$\therefore \arccos \left( \cos \frac{6\pi}{7} \right) = \frac{6\pi}{7}$$

$$(4) \text{ 由于 } -\frac{46\pi}{5} \notin [0, \pi], \text{ 而 } -\frac{46\pi}{5} = -10\pi + \frac{4\pi}{5}$$

$$\therefore \cos \left( -\frac{46\pi}{5} \right) = \cos \left( -10\pi + \frac{4\pi}{5} \right) = \cos \frac{4\pi}{5}$$

$$\because \frac{4\pi}{5} \in [0, \pi]$$

$$\therefore \arccos \left[ \cos \left( -\frac{46\pi}{5} \right) \right] = \arccos \left( \cos \frac{4\pi}{5} \right) = \frac{4\pi}{5}$$

$$(5) \text{ 由于 } 10 \notin [0, \pi], \text{ 而 } 3\pi < 10 < 4\pi$$

$$\therefore 0 < 4\pi - 10 < \pi$$

$$\therefore \cos 10 = \cos(-10) = \cos(4\pi - 10)$$

$$\therefore \arccos(\cos 10) = \arccos[\cos(4\pi - 10)] = 4\pi - 10$$

$$(6) \because x \in \left( -\frac{\pi}{2}, 0 \right) \quad \therefore -x \in \left( 0, \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\therefore \cos x = \cos(-x)$$

$$\therefore \arccos(\cos x) = \arccos[\cos(-x)] = -x.$$

**例 4.10** 求下列各式的值:

$$(1) \cos \left[ \arccos \left( -\frac{2}{3} \right) \right]$$

$$(2) \sin \left[ \arccos \left( -\frac{4}{5} \right) \right]$$

(3)  $\tan(\arccos x)$

(4)  $\cos \left[ \arccos \frac{4}{5} + \arccos \left( -\frac{5}{13} \right) \right]$

**分析:** 这是反余弦的三角运算问题。利用反余弦函数定义或公式 (1), 转化为三角函数问题进行计算。

**解:**

(1)  $\because \left[ -\frac{2}{3} \right] \leq 1$

$$\therefore \cos \left[ \arccos \left( -\frac{2}{3} \right) \right] = -\frac{2}{3}$$

(2) 设  $\alpha = \arccos \left( -\frac{4}{5} \right)$ , 则  $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ ,  $\alpha \in [0, \pi]$

$$\therefore \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left( -\frac{4}{5} \right)^2} = \frac{3}{5}$$

$$\therefore \sin \left[ \arccos \left( -\frac{4}{5} \right) \right] = \frac{3}{5}$$

(3) 当  $|x| > 1$  时,  $\arccos x$  无意义, 原式无意义; 当  $|x| \leq 1$  且  $x \neq 0$  时, 由  $\arccos x \in [0, \pi]$ , 知  $\sin(\arccos x) \geq 0$

$$\therefore \tan(\arccos x) = \frac{\sin(\arccos x)}{\cos(\arccos x)} = \frac{\sqrt{1 - [\cos(\arccos x)]^2}}{\cos(\arccos x)} = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$$

当  $x = 0$  时,  $\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$ ,  $\tan(\arccos x)$  无意义.

(4) 设  $\alpha = \arccos \frac{4}{5}$ ,  $\beta = \arccos \left( -\frac{5}{13} \right)$ , 则:

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{4}{5}, & \alpha &\in [0, \pi], & \sin \alpha &= \frac{3}{5} \\ \cos \beta &= -\frac{5}{13}, & \beta &\in [0, \pi], & \sin \beta &= \frac{12}{13} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{原式} &= \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ &= \frac{4}{5} \times \left( -\frac{5}{13} \right) - \frac{3}{5} \times \frac{12}{13} = -\frac{56}{65} \end{aligned}$$

## 习题二

### A

1. 求下列各式的值:

(1)  $\arccos \frac{\sqrt{2}}{2}$

(3)  $\arccos(-1)$

(2)  $\arccos \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

(4)  $\arccos \left( -\frac{1}{2} \right)$

2. 下列哪些式子无意义, 为什么?

(1)  $\arccos \frac{\pi}{2}$

(3)  $\sin(\arccos 2)$

(2)  $\tan(\arccos 0)$

(4)  $\arccos \left( \cos \frac{\pi}{2} \right)$

3. 下列等式是否成立, 为什么?

(1)  $\cos(\arccos \pi) = \pi$

(3)  $\arccos \left( \cos \frac{4\pi}{3} \right) = -\frac{2\pi}{3}$

(2)  $\arccos(\cos \pi) = \pi$

(4)  $\arccos \left( \cos \frac{4\pi}{3} \right) = \frac{2\pi}{3}$

4. 求下列各式的值:

(1)  $\cos \left[ \arccos \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right]$

(3)  $\sin \left[ \arccos \left( -\frac{1}{3} \right) \right]$

(2)  $\cos \left( \arccos \frac{2}{7} \right)$

(4)  $\tan \left[ \arccos \left( -\frac{1}{4} \right) \right]$

5. 求下列各式的值:

(1)  $\arccos \left( \cos \frac{\pi}{2} \right)$

(4)  $\arccos \left( \cos \frac{25\pi}{3} \right)$

(2)  $\arccos \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{2} \right) \right]$

(5)  $\arccos \left( \cos \frac{23\pi}{7} \right)$

(3)  $\arccos \left( \cos \frac{2\pi}{3} \right)$

(6)  $\arccos \left[ \cos \left( -\frac{33\pi}{5} \right) \right]$

## B

6. 求下列函数的定义域、值域:

(1)  $y = \arccos 3x$

(3)  $y = \frac{1}{2} \arccos \frac{x}{4}$

(2)  $y = 1 - 5 \arccos x$

(4)  $y = 3 \arccos(2 - 3x)$

7. 求下列各式的值:

(1)  $\tan \left( 2 \arccos \frac{4}{5} \right)$

(5)  $\arccos(\cos x), \quad x \in \left( \pi, \frac{3\pi}{2} \right)$

(2)  $\cot(\arccos x), \quad x \in [-1, 1]$

(6)  $\sin \left[ \frac{\pi}{3} + \arccos \left( -\frac{1}{4} \right) \right]$

(3)  $\arccos[\cos(-2)]$

(4)  $\arccos \left( \sin \frac{3\pi}{5} \right)$

8. 证明:

(1)  $y = \arccos x$  是  $[-1, 1]$  上的减函数;

(2)  $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in [-1, 1]$

## 4.4 反正切函数与反余切函数

关于反正切函数与反余切函数的研究, 读者可以独立进行。把研究的结果与下文做一对比, 看看自己的水平。

### 1. 反正切函数

#### 定义 3

函数  $y = \tan x \left( x \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \right)$  的反函数叫做**反正切函数**, 记作  $y = \arctan x$ , 它的定义域是  $(-\infty, \infty)$ , 值域是  $\left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$

反正切函数的图象: 见图 4.7.

反正切函数的性质:

(1) 对应法则的基本性质:

(a)  $\tan(\arctan x) = x$ , 其中  $x \in \mathbb{R}$ .

(b) 当  $\alpha \in \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$  时,  $\arctan(\tan \alpha) = \alpha$ ; 当  $\alpha \notin \left( -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$  时,  $\arctan(\tan \alpha) \neq \alpha$ .

## 思考题

当  $\alpha \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  时,  $\arctan(\tan \alpha) = ?$

- (2) 单调性: 反正切函数  $y = \arctan x$  在  $(-\infty, \infty)$  上是增函数.
- (3) 奇偶性: 反正切函数  $y = \arctan x$  是奇函数, 即  $\arctan(-x) = -\arctan x$ ,  $x \in (-\infty, \infty)$ .




图 4.7

## 2. 反余切函数

## 定义 4

函数  $y = \cot x$  ( $x \in (0, \pi)$ ) 的反函数叫做**反余切函数**, 记作  $y = \operatorname{arccot} x$ , 它的定义域是  $(-\infty, \infty)$ , 值域是  $(0, \pi)$ .

反余切函数的图象: 见图 4.8。

反余切函数的性质:

- (1) 对应法则的基本性质:
- (a)  $(\operatorname{arccot} x) = x$ , 其中  $x \in \mathbb{R}$ .
  - (b) 当  $\alpha \in (0, \pi)$  时,  $\operatorname{arccot}(\cot \alpha) = \alpha$ ; 当  $\alpha \notin (0, \pi)$  时,  $\operatorname{arccot}(\cot \alpha) \neq \alpha$ .

(2) 单调性: 反余切函数  $y = \operatorname{arccot} x$  在  $(-\infty, \infty)$  上是减函数。

(3) 奇偶性: 反余切函数  $y = \operatorname{arccot} x$  是非奇非偶函数。




图 4.8

反余切函数有下述关系:

$$\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x, \quad x \in (-\infty, \infty)$$

这一点, 从图 4.9 可以看出。




图 4.9

## 思考题

证明:  $\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x, \quad x \in (-\infty, \infty)$

反正弦函数、反余弦函数、反正切函数、反余切函数, 统称**反三角函数**<sup>①</sup>。

**例 4.11** 求下列各式的值:

(1)  $\arctan 1$

(3)  $\operatorname{arccot} 0$

(2)  $\arctan\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

(4)  $\operatorname{arccot}(-\sqrt{3})$

解:

(1)  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$

(2)  $\arctan\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = -\arctan \frac{\sqrt{3}}{3} = -\frac{\pi}{6}$

(3)  $\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$

(4)  $\operatorname{arccot}(-\sqrt{3}) = \pi - \operatorname{arccot} \sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$

**评述:** 当  $m < 0$  时,  $\arcsin m$ 、 $\arccos m$ 、 $\arctan m$ 、 $\operatorname{arccot} m$  的求值, 可利用反三角函数的奇偶性或有关公式, 化归为  $m > 0$  的情况。

**例 4.12** 求下列各式的值:

(1)  $\tan(\arctan 5)$

(3)  $\operatorname{arccot}\left(\cot \frac{7\pi}{4}\right)$

(2)  $\arctan\left(\tan \frac{2\pi}{3}\right)$

(4)  $\sin[\arctan(-2)]$

解:

(1)  $\tan(\arctan 5) = 5$

(2)  $\because \frac{2\pi}{3} \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \tan \frac{2\pi}{3} = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right), \quad \text{而 } -\frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$\therefore \arctan\left(\tan \frac{2\pi}{3}\right) = \arctan\left[\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right] = -\frac{\pi}{3}$

<sup>①</sup>反三角函数还有反正割函数和反余割函数两种。

$$(3) \because \frac{7\pi}{4} \notin (0, \pi), \quad \cot \frac{7\pi}{4} = \cot \frac{3\pi}{4}$$

$$\therefore \operatorname{arccot} \left( \cot \frac{7\pi}{4} \right) = \operatorname{arccot} \left( \cot \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{3\pi}{4}$$

$$(4) \text{ 设 } \alpha = \arctan(-2), \text{ 则 } \tan \alpha = -2, \text{ 且 } \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right), \sin \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \sin[\arctan(-2)] = \sin \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

**例 4.13** 求证:  $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$

**分析:** 等式左边复杂, 此时往往证明其等价命题  $\arctan x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$

**证明:** **证法 1:**  $\tan \left( \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x \right) = \cot(\operatorname{arccot} x) = x$

$$\because 0 < \operatorname{arccot} x < \pi$$

$$\therefore \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

因此,  $\frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$  是  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  中的一个角, 且它的正切等于  $x$ , 于是

$$\arctan x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$$

$$\therefore \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$$

**证法 2:**  $\tan(\arctan x) = x, \quad \arctan x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\tan \left( \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x \right) = \cot(\operatorname{arccot} x) = x$$

$$\because \operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$$

$$\therefore \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\therefore \tan(\arctan x) = \tan \left( \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x \right)$$

根据正切函数在  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  上是单调函数, 可得

$$\arctan x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arccot} x$$

$$\therefore \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$$

**评述:** 证明两个角相等, 往往采用证明其三角函数值相等的方法。采用这种方法时, 必须保证两个角都在该三角函数的同一个单调区间内。

## 习题三

### A

1. 求下列各式的值:



(1)  $\arctan \frac{\sqrt{3}}{3}$

(2)  $\operatorname{arccot}(-1)$

(3)  $\arctan 0$

(4)  $\operatorname{arccot} \left( -\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$

(5)  $\tan \left( \arctan \frac{4\pi}{5} \right)$

(6)  $\arctan \left( \tan \frac{4\pi}{5} \right)$

(7)  $\cot \left[ \operatorname{arccot} \left( -\frac{1}{2} \right) \right]$

(8)  $\operatorname{arccot} \left[ \cot \left( -\frac{1}{2} \right) \right]$

2. 求下列各式的值:

(1)  $\cot \left[ \arctan \frac{2}{5} \right]$

(2)  $\sin(\operatorname{arccot} 2)$

(3)  $\tan \left( \arctan \frac{1}{4} + \arctan \frac{2}{5} \right)$

(4)  $\cos[2\operatorname{arccot}(-5)]$

## B

3. 求下列函数的定义域、值域:

(1)  $y = 2 \arctan \frac{x}{2}$

(2)  $y = \frac{1}{3} \operatorname{arccot}(1-x)$

4. 求值:  $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$

5. 证明:  $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ , 其中  $x \in [-1, 1]$ .

## 4.5 本章小结

### 4.5.1 知识结构分析

四个反三角函数从建立到性质的讨论, 都是在反函数一般理论和方法的指导下进行的。为便于对比, 也为了使知识系统化, 我们把这四个反三角函数的主要结论整理成表如下:

函数	$y = \arcsin x$	$y = \arccos x$	$y = \arctan x$	$y = \operatorname{arccot} x$
定义域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
值域	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	$[0, \pi]$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	$(0, \pi)$
图象				
对应	$\sin(\arcsin x) = x$	$\cos(\arccos x) = x$	$\tan(\arctan x) = x$	$\cot(\operatorname{arccot} x) = x$
法则	$( x  \leq 1)$	$( x  \leq 1)$		
基本	$\arcsin(\sin x) = x$	$\arccos(\cos x) = x$	$\arctan(\tan x) = x$	$\operatorname{arccot}(\cot x) = x$
公式	$( x  \leq \frac{\pi}{2})$	$(0 \leq x \leq \pi)$	$( x  < \frac{\pi}{2})$	$(0 < x < \pi)$
奇偶性	奇函数	非奇非偶	奇函数	非奇非偶
	$\arcsin(-x) = -\arcsin x$	$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$	$\arctan(-x) = -\arctan x$	$\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x$
单调性	$( x  \leq 1)$	$( x  \leq 1)$		
基本公式	增函数	减函数	增函数	减函数
	$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, ( x  \leq 1)$		$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$	

### 4.5.2 几点说明

#### 1. 反三角函数的建立及注意的问题:

由于确定四个三角函数的映射不是一一映射, 所以它们都不存在反函数。我们以三角函数为原型, 取它们定义域的子集及其映射, 这时它们的映射是一一映射, 存在反函数。由此, 我们分别定义了四个反三角函数。正因此, 我们在研究有关反三角函数的问题时, 特别要注意自变量的取值范围。

#### 2. 研究反三角函数的一般方法:

研究反三角函数的性质时, 要数形结合, 充分利用反三角函数的图象; 有时利用三角函数线也是比较直观和方便的。在解决有关反三角函数的问题时, 把问题转化为三角函数的问题, 是基本的方法。

## 复习题四

### A

#### 1. 求下列函数的反函数, 并写出反函数的定义域、值域:

$$(1) y = 2 \arccos \frac{x}{4}$$

$$(3) y = \sin x \quad \left( \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \right)$$

$$(2) y = \frac{\pi}{2} + \arctan 2x$$

$$(4) y = \cos x \quad \left( -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0 \right)$$

#### 2. 比较下列各组中两实数的大小:

$$(1) \arccos \left( -\frac{7}{8} \right) \text{ 与 } \arccos \left( -\frac{6}{7} \right)$$

$$(3) \arcsin(\cos 4) \text{ 与 } \arcsin(\cos 6)$$

$$(2) \arctan(-3) \text{ 与 } \arctan(-5)$$

$$(4) \operatorname{arccot}(\tan 6) \text{ 与 } \operatorname{arccot}(\tan 7)$$

#### 3. 用反三角中的锐角把下列各式中的 $x$ 表示出来。

$$(1) \sin x = -\frac{1}{4} \quad \left( -\frac{\pi}{4} < x < 0 \right)$$

$$(4) \cos x = \frac{2}{3} \quad (2\pi < x < 3\pi)$$

$$(2) \sin x = \frac{3}{5} \quad \left( \frac{\pi}{2} < x < \pi \right)$$

$$(5) \tan x + \sqrt{5} = 0 \quad \left( \frac{\pi}{2} < x < \pi \right)$$

$$(3) \cos x - \frac{3}{7} = 0 \quad \left( -\frac{\pi}{2} < x < 0 \right)$$

$$(6) 3 \cot x + 1 = 0 \quad (0 < x < \pi)$$

#### 4. 求下列各式的值:

$$(1) \sin \left( 2 \arcsin \frac{1}{4} \right)$$

$$(3) \cos \left( \arccos \frac{3}{5} - \arcsin \frac{5}{13} \right)$$

$$(2) \cos \left[ \frac{1}{2} \arcsin \left( -\frac{4}{5} \right) \right]$$

$$(4) \tan \left( \arcsin \frac{3}{5} - \arccos \frac{1}{2} \right)$$

5. 求下列各式中的  $x$ :

$$(1) \arcsin \frac{20}{29} = \arccos x$$

$$(3) \operatorname{arccot} \frac{11}{60} + \arctan x = 0$$

$$(2) \arcsin x = \arccos \frac{5}{12}$$

6. 求下列各式的值:

$$(1) \arcsin \frac{4}{5} + \arcsin \frac{3}{5}$$

$$(3) \operatorname{arccot} \frac{4}{7} + \operatorname{arccot} \frac{3}{11}$$

$$(2) \arccos \frac{1}{3} + \arccos \left( -\frac{1}{3} \right)$$

$$(4) \arctan \sqrt{3} + \arctan \sqrt{2}$$

7. 求证下列各式:

$$(1) \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (|x| \leq 1)$$

$$(2) \arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 = \pi$$

8. 已知等腰三角形的高与底的比为  $4:3$ , 用反三角函数把它的三个内角表示出来。

9. 若  $m$ 、 $n$  为方程  $6x^2 - 5x + 1 = 0$  的两个根,

$$\text{证明: } \arctan m + \arctan n = \frac{\pi}{4}$$

## B

10. 求下列函数的定义域、值域:

$$(1) y = \frac{1}{\arccos x}$$

$$(5) y = \sqrt{\arcsin \frac{1}{x}}$$

$$(2) y = \arctan \sqrt{x}$$

$$(6) y = \arccos(x^2 + x)$$

$$(3) y = \sqrt{\arctan x}$$

$$(7) y = \arccos(\arcsin x)$$

$$(4) y = \sqrt{\operatorname{arccot}(2x - 5)}$$

$$(8) y = \log_a \left( \arccos x - \frac{\pi}{3} \right)$$

11. 判断函数  $y = \arccos x - \frac{\pi}{2}$  的奇偶性。

12. 求满足下列不等式的  $x$  的取值范围；

(1)  $\arcsin(-x) < \arcsin x$

(2)  $\arccos x < \arccos(1 - x)$

## 第五章 三角方程

先看下面的实例。

若  $E$  是  $\angle BAC$  的角平分线上的一个定点，已知  $\angle BAC = 60^\circ$  (图 5.1)，过  $E$  点的动直线  $BC$  交  $\angle BAC$  的两边于  $B$ 、 $C$ 。试问当直线  $BC$  绕点  $E$  旋转到什么位置时， $AB = 2AC$ ？

**分析：**当直线旋转时（我们可以用旋转角  $x$  来刻画这个旋转）， $\triangle BAC$  是个可变图形。欲使  $AB = 2AC$ ，应设法分别找出边  $AB$ 、 $AC$  与变量  $x$  的函数关系（这本质上是一个解斜三角形的问题），然后用方程的方法解之。




图 5.1

**解：**由于  $E$  是  $\angle BAC$  的角平分线上的定点，故可用字母  $m$  表示  $AE$  的长。容易看出  $\triangle ABE$  是可解的： $\angle BAE = 30^\circ$ ， $\angle B = x - 30^\circ$ ， $\angle AEB = 180^\circ - x$ ， $AE = m$ ，由正弦定理，得

$$\frac{AB}{\sin(180^\circ - x)} = \frac{m}{\sin(x - 30^\circ)}$$

$$AB = \frac{m \sin x}{\sin(x - 30^\circ)}$$

同理，可得： $AC = \frac{m \sin x}{\sin(x + 30^\circ)}$ 。

欲使  $AB = 2AC$ ，应使

$$2m \sin x \sin(x - 30^\circ) = m \sin x \sin(x + 30^\circ)$$

显然  $m \sin x \neq 0$ ，上式可简化为

$$2 \sin(x - 30^\circ) = \sin(x + 30^\circ)$$

这种三角函数符号中含有未知数的等式称为**三角方程**，又如

$$\sin x = \frac{1}{3}, \quad \tan^2 x - 5 \tan x - 3 = 0, \quad 3 \cos \frac{x}{2} + \cos x - 1 = 0$$

$$\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = 1 + \sin 2x, \quad a \sin x + b \cos x = c, \quad \sin^{100} x + 8 \sin^5 x - 2 = 0$$

等都是三角方程。它们来自数学、物理和技术工程。

本章将研究一些简单三角方程的求解问题。

## 5.1 最简三角方程

在三角方程中， $\sin x = a$ ,  $\cos x = a$ ,  $\tan x = a$ ,  $\cot x = a$  是最简单的（称为**最简三角方程**），也是最基本的最重要的。其他三角方程的求解，往往是归结为这四种最简三角方程的求解。

### 5.1.1 方程 $\sin x = a$ 的解集

方程的解集自然依赖于常数  $a$  的取值和对变元  $x$  的限定范围。对于后者，若不附任何条件，就意味着是在  $(-\infty, +\infty)$  上求方程的解集（下同）。

(1) 当  $|a| > 1$  时，由于任取  $x \in \mathbb{R}$ ，都有  $|\sin x| \leq 1$

$\therefore$  方程无解，即解集为  $\emptyset$ 。

(2) 当  $|a| \leq 1$  时，我们先求出方程的特解（图 5.2）：

$$\alpha_1 = \arcsin a, \quad \alpha_2 = \pi - \arcsin a$$

然后，再加上“周期的整数倍”即得到方程的**通解**：

$$\begin{aligned} x_1 &= \arcsin a + 2k\pi, \\ x_2 &= (\pi - \arcsin a) + 2k\pi, \end{aligned} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$x_1, x_2$  的表达式有时合并写成

$$x = k\pi + (-1)^k \arcsin a, \quad k \in \mathbb{Z}$$

即方程的解集为

$$\{x \mid x = k\pi + (-1)^k \arcsin a, k \in \mathbb{Z}\} \quad (*)$$

应注意：(\*) 是在  $|a| \leq 1$  时的解集，若忘掉  $|a| \leq 1$  这个条件，说  $\sin x = a$  的解集是 (\*)，那就不正确。




图 5.2

### 5.1.2 方程 $\cos x = a$ 的解集

1. 当  $|a| > 1$  时,  $\cos x = a$  的解集为  $\emptyset$ ;
2. 当  $|a| \leq 1$  时,  $\cos x = a$  的特解为 (图 5.3)

$$\alpha_1 = \arccos a, \quad \alpha_2 = -\arccos a$$




图 5.3

通解为

$$\begin{cases} x_1 = \arccos a + 2k\pi \\ x_2 = -\arccos a + 2k\pi \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \text{合并为} \quad x = 2k\pi \pm \arccos a, \quad k \in \mathbb{Z}$$

写成解集的形式为

$$\{x \mid x = 2k\pi \pm \arccos a, \quad k \in \mathbb{Z}\}$$



### 5.1.3 方程 $\tan x = a$ 的解集

由于  $\tan x$  的值域为  $(-\infty, +\infty)$ , 所以对任意  $a \in \mathbb{R}$ , 方程都有解。其特解为 (图 5.4)

$$\alpha_1 = \arctan a, \quad \alpha_2 = \arctan a + \pi$$

其通解为

$$\begin{cases} x_1 = \arctan a + 2k\pi \\ x_2 = (\arctan a + \pi) + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{合并为} \\ \Longleftrightarrow \end{matrix} x = \arctan a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

写成解集的形式为  $\{x \mid x = \arctan a + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .




图 5.4

### 5.1.4 方程 $\cot x = a$ 的解集

$\cot x$  的值域也是  $(-\infty, +\infty)$ , 所以任意  $a \in \mathbb{R}$ , 方程都有解, 其特解为 (图 5.5)

$$\alpha_1 = \operatorname{arccot} a, \quad \alpha_2 = \operatorname{arccot} a + \pi$$

其通解为

$$\begin{cases} x_1 = \operatorname{arccot} a + 2k\pi \\ x_2 = (\operatorname{arccot} a + \pi) + 2k\pi \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{合并为} \\ \Longleftrightarrow \end{matrix} x = \operatorname{arccot} a + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

写成解集的形式为  $\{x \mid x = \operatorname{arccot} a + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .

例 5.1 解方程:




图 5.5

(1)  $2 \sin x + \sqrt{2} = 0$

(2)  $2 \cos 2x = 1$

(3)  $\tan(x + 15^\circ) + 1 = 0$

解:

1.  $2 \sin x + \sqrt{2} = 0 \iff \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{aligned} \therefore x_1 &= \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2k\pi = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ x_2 &= \pi - \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2k\pi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \end{aligned} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

写成解集<sup>①</sup>为

$$\left\{x \mid x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ 或 } x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$$

2.  $2 \cos 2x = 1 \iff \cos 2x = \frac{1}{2}$

$$\therefore 2x = 2k\pi \pm \arccos \frac{1}{2} \Rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

写成解集为  $\left\{x \mid x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\right\}$ 

注意: 下面的解法是错误的:

$$2x = \pm \arccos \frac{1}{2}, \quad x = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{2}$$

$$\therefore x = 2k\pi \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

<sup>①</sup>求方程解集的过程叫解方程. 为了书写简便, 也可以只列出所有的解而不必写成集合形式.

$$3. \tan(x + 15^\circ) + 1 = 0 \iff \tan(x + 15^\circ) = -1,$$

$$\therefore (x + 15^\circ) = \arctan(-1) + k \cdot 180^\circ = -45^\circ + 180^\circ \cdot k$$

$$\therefore x = -60^\circ + 180^\circ \cdot k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

写成解集为  $\{x \mid x = -60^\circ + 180^\circ \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$ 。

**注意：**在同一个表达式中应使用相同的单位。

如上面的式子不能写成  $x + 15^\circ = -\frac{\pi}{4} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 的形式。

**例 5.2** 若  $0^\circ < x < 360^\circ$ , 解方程  $\sin(3x - 105^\circ) = -\frac{1}{2}$ 。

解：

$$\therefore (3x_1 - 105^\circ) = \arcsin \frac{1}{2} + 360^\circ \cdot k = 30^\circ + 360^\circ \cdot k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$(3x_2 - 105^\circ) = 180^\circ - \arcsin \frac{1}{2} + 360^\circ \cdot k = 150^\circ + 360^\circ \cdot k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore x_1 = 45^\circ + 120^\circ \cdot k, \quad x_2 = 85^\circ + 120^\circ \cdot k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

考虑到  $0^\circ < x < 360^\circ$ ,

1. 在  $x_1$  中令  $k = 0, 1, 2$ , 得  $45^\circ, 165^\circ, 285^\circ$ ;

2. 在  $x_2$  中令  $k = 0, 1, 2$ , 得  $85^\circ, 205^\circ, 325^\circ$ 。

$\therefore$  原方程的解集为  $\{45^\circ, 165^\circ, 285^\circ, 85^\circ, 205^\circ, 325^\circ\}$ 。

## 习题一

### A

1. 口答下列方程的解集：

$$(1) \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(3) \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(5) \tan x = -\sqrt{3}$$

$$(2) \sin x = -\frac{1}{2}$$

$$(4) \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$(6) \cot x = \frac{1}{3}$$

2. 解下列方程：

$$(1) 2 \sin 2x + 1 = 0$$

$$(5) \frac{1}{2} \cot 2(x + 25^\circ) - 2 = 0$$

$$(2) \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(3) 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} + 45^\circ\right) = 1$$

$$(6) 3 \tan \frac{x + 20^\circ}{3} = \sqrt{3}$$

$$(4) \tan 2x - \sqrt{3} = 0$$

$$(-1000^\circ < x < 1000^\circ)$$

## 5.2 简单三角方程

一些简单的三角方程, 可以通过三角函数的恒等变形或代数方法, 化归上节研究过的四种最简三角方程, 从而获得其解。现举几类, 着重说明“化归”的思路和方法, 悟出了道理, 可见一般。

### 5.2.1 同角同名的三角函数方程

**例 5.3** 解下列方程:

$$(1) 2 \sin^2 x - 5 \sin x - 3 = 0$$

$$(3) 3 \cos \frac{x}{2} + \cos x = 1$$

$$(2) \sin^2 x - \cos^2 x = \cos x$$

$$(4) \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = 1 + \sin 2x$$

**分析:** 把新问题化归为已研究过的问题, 是数学研究中的通法。对于 (1), 实行换元, 即令  $\sin x = y$ , 可得到关于  $y$  的一元二次方程, 从而可以解出  $y$ , 这就化归为最简三角方程的第一种。其余几题, 只须稍作三角函数变换, 就可以实现化归。

**解:**

(1) 令  $y = \sin x$  ( $-1 \leq y \leq 1$ ), 有  $2y^2 - 5y - 3 = 0$ , 即

$$(y - 3)(2y + 1) = 0 \Rightarrow y_1 = 3, y_2 = \frac{-1}{2}$$

$\therefore \sin x = 3$  (无解);  $\sin x = \frac{-1}{2}$  解之, 得

$$x_1 = \frac{-\pi}{6} + 2k\pi, \quad x_2 = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

(2) 把  $\sin x$  化为  $\cos x$ , 得

$$2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$$

令  $\cos x = y$  ( $-1 \leq y \leq 1$ ), 有  $2y^2 + y - 2 = 0$ , 即

$$(y+1)(2y-1) = 0 \iff y_1 = -1, \quad y_2 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \cos x = -1 \iff x_1 = \pi + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \iff x_2 = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(3) 把  $\cos x$  写成  $2\cos^2 \frac{x}{2} - 1$ , 可得

$$2\cos^2 \frac{x}{2} + 3\cos \frac{x}{2} - 2 = 0$$

令  $y = \cos \frac{x}{2}$  ( $-1 \leq y \leq 1$ ), 有

$$2y^2 + 3y - 2 = 0 \iff y_1 = -2, \quad y_2 = \frac{1}{2}$$

即  $\cos \frac{x}{2} = -2$  (无解),  $\cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$

$$\therefore \frac{x}{2} = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z}) \iff x = 4k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(4) 把  $\sin 2x$  写成  $\frac{2\tan x}{1+\tan^2 x}$ , 有  $\frac{1+\tan x}{1-\tan x} = 1 + \frac{2\tan x}{1+\tan^2 x}$ ,

令  $y = \tan x$ , 有

$$\begin{aligned} \frac{1+y}{1-y} - 1 &= \frac{2y}{1+y^2} \iff \frac{2y}{1-y} - \frac{2y}{1+y^2} = 0 \\ &\iff 2y \left( \frac{1}{1-y} - \frac{1}{1+y^2} \right) = 0 \\ &\iff 2y \cdot \frac{y(y+1)}{(1+y^2)(1-y)} = 0 \\ &\iff y_1 = 0, \quad y_2 = -1 \end{aligned}$$

即

$$\tan x = 0 \iff x_1 = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\tan x = -1 \iff x_2 = -\frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

**评述:** 此例的特点和化归方法可以简捷地概括为“同角同名(包括可化为同角同名函数的方程)——换元就行”。此例中, 每小題都列出了所有的解, 而未写成解集的形式。

## 5.2.2 两同名函数相等的方程

这类方程的一般形式为

$$\sin f(x) = \sin g(x) \quad (1)$$

$$\cos f(x) = \cos g(x) \quad (2)$$

$$\tan f(x) = \tan g(x) \quad (3)$$

$$\cot f(x) = \cot g(x) \quad (4)$$

对于 (1), 可把  $g(x)$  看作是  $f(x)$  的特解 (图 5.6), 有

$$f(x) = g(x) + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \longrightarrow \text{解出 } x_1$$

$$f(x) = \pi - g(x) + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \longrightarrow \text{解出 } x_2$$

则方程 (1) 的解集为  $\{x \mid x = x_1 \text{ 或 } x = x_2\}$ ;




图 5.6




图 5.7

对于 (2), 仍然把  $g(x)$  看作是  $f(x)$  的特解 (图 5.7), 有

$$f(x) = 2k\pi \pm g(x) \quad (k \in \mathbb{Z}) \longrightarrow \text{由此解出 } x_1, x_2$$

则方程 (2) 的解集为  $\{x \mid x = x_1 \text{ 或 } x = x_2\}$ ;

同样, 对于 (3) 有  $f(x) = g(x) + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \longrightarrow \text{由此解出 } x$ ;

对于 (4) 有  $f(x) = g(x) + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \longrightarrow \text{由此解出 } x$ .

**例 5.4** 解方程:

$$(1) \tan 4x = \tan 3x$$

$$(2) \sin 4x + \sin 2x = 0$$

**解:**

$$(1) \text{ 由 } \tan 4x = \tan 3x \text{ 得: } 4x = 3x + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(2) 由题可得:  $\sin 4x = \sin(-2x)$

$\therefore 4x = (-2x) + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ , 或  $4x = \pi - (-2x) + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ , 有

$$\begin{aligned} 6x &= 2k\pi, & 2x &= \pi + 2k\pi \\ x_1 &= \frac{k\pi}{3} \ (k \in \mathbb{Z}) & x_2 &= \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

$\therefore$  原方程的解集为  $\left\{x \mid x = \frac{k\pi}{3} \text{ 或 } x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ .

## 习题二

### A

解下列方程:

1.  $2\sin^2 x + 3\sin x + 1 = 0$

2.  $4\sin^2 x + (2\sqrt{3} - 2)\cos x - (4 - \sqrt{3}) = 0$

3.  $\sec^2 x = 1 + \tan x$

6.  $\cot x + \cot 3x = 0$

4.  $\cos 2\theta - \cos 3\theta = 0$

7.  $\cos 2x + \sin 3x = 0$

5.  $\sin 3x + \sin 4x = 0$

8.  $\sin x = 2\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$

### 5.2.3 左边化积 (分解因式化积或和差化积) 右边方程

从代数上我们知道, 方程  $F(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) = 0$  在函数的定义域  $Q$  上 [不妨把  $Q$  也称为方程  $F(x) = 0$  的定义域], 若  $f_1(x) = 0$  和  $f_2(x) = 0$  的解集分别是  $A$  与  $B$ , 那么  $F(x) = 0$  的解集就是  $A \cup B$ , 即

$$F(x) = 0, x \in Q \iff f_1(x) = 0, x \in Q \text{ 与 } f_2(x) = 0, x \in Q$$

这里应该特别注意方程  $f_1(x) = 0$ ,  $f_2(x) = 0$  是在  $Q$  上求解, 如果忽略了  $x \in Q$  这个前提, 就可能导致错误。

**例 5.5** 解方程:

(1)  $\sin x \cdot \tan x \cdot \cot x = 0$

(2)  $\sin x \cdot \tan x \cdot \sec x = 0$

解:

(1) 方程的定义域为  $Q: x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。显然, 在  $Q$  上  $\sin x \neq 0, \tan x \neq 0, \cot x \neq 0$

$\therefore$  原方程无解 (或说解集为  $\emptyset$ )。

(2) 方程的定义域为  $Q: x \in \mathbb{R}$ , 且  $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。

$$\therefore \sin x = 0 (x \in Q) \iff x_1 = k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

$$\tan x = 0 (x \in Q) \iff x_2 = k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

$$\sec x = 0 (x \in Q) \iff \frac{1}{\cos x} = 0 (x \in Q) \iff x \in \emptyset$$

$\therefore$  原方程的解为  $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。

#### 思考题

对于  $\sin x \cdot \cot x = 0$ , 下述解法为什么不正确?

由  $\sin x \cdot \cot x = 0$  得

$$\sin x = 0 \iff x_1 = k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

或

$$\cot x = 0 \iff x_2 = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$  原方程的解为  $x_1$  与  $x_2$ 。

例 5.6 解方程  $\sin 4x + \sin 2x = 0$ 。

解: 解法 1: 左边分解因式化积,

$$2 \sin 2x \cos 2x + \sin 2x = 0 \iff \sin 2x(2 \cos 2x + 1) = 0$$

其定义域为  $Q: x \in \mathbb{R}$  (当  $Q = \mathbb{R}$  时, 有时可略去不写), 则

$$\sin 2x = 0, \text{ 或 } 2 \cos 2x + 1 = 0$$

$$2x = k\pi (k \in \mathbb{Z}), \text{ 或 } 2x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$$

$$x_1 = \frac{k\pi}{2} (k \in \mathbb{Z}), \text{ 或 } x_2 = k\pi \pm \frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$$



$\therefore$  原方程的解为  $x_1, x_2$

**解法 2:** 左边和差化积, 得

$$2 \sin 3x \cdot \cos x = 0 \iff \sin 3x = 0 \quad \text{或} \quad \cos x = 0$$

$$3x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \quad x_2 = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$x_1 = \frac{k\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z}); \quad (x_2 \text{ 也可写成 } \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}))$$

$\therefore$  原方程的解为  $x_1, x_2$ .

**解法 3:** 原方程为  $\sin 4x = \sin(-2x)$ ,

$$4x = (-2x) + 2k\pi, \quad \text{或} \quad 4x = \pi - (-2x) + 2k\pi$$

$$6x = 2k\pi, \quad \text{或} \quad 2x = \pi + 2k\pi$$

$$\therefore x_1 = \frac{k\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z}); \quad x_2 = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

这里, 应该注意: 由于解法不同, 解在形式上可能有差异。如方法 1 与方法 2 的结果虽然形式不同。我们分别在图 5.8 与图 5.9 上标出解法 1 与解法 2 的结果发现, 两种方法得到的**解集实质上相同**(利用代数上证明两个集合相等的方法可以作出证明)。




图 5.8




图 5.9

**例 5.7** 解方程:  $\sin x \cos x + 1 = \sin x + \cos x$

**解:** **解法 1:** 原方程即

$$(\cos x - 1)(\sin x - 1) = 0$$

$$\cos x - 1 = 0, \quad \text{或} \quad \sin x - 1 = 0$$

$$\cos x = 1, \quad \text{或} \quad \sin x = 1$$

$$x_1 = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \quad \text{或} \quad x_2 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$  方程的解为  $x_1$ 、 $x_2$ .

**解法 2:** 令  $y = \sin x + \cos x$ , 则  $y^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$

$\therefore \sin x \cos x = \frac{y^2 - 1}{2}$ , 代入原方程, 得  $y^2 - 2y + 1 = 0$ ,

$$(y - 1)^2 = 0 \iff y = 1$$

即

$$\sin x + \cos x = 1 \iff \sqrt{2} \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right) = 1 \iff \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

其解为

$$x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \iff x_1 = 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

或

$$x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \iff x_2 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$  原方程的解为  $x_1$ 、 $x_2$ .

**例 5.8** 解方程:  $\frac{\sin 2x}{\cos x} = \frac{\cos 2x}{\sin x}$

**解:** **解法 1:** 原方程  $\iff \frac{\sin 2x}{\cos x} - \frac{\cos 2x}{\sin x} = 0$ , 即

$$\begin{aligned} \frac{-\cos 3x}{\sin x \cos x} = 0 &\iff \begin{cases} \cos 3x = 0 \iff \cos x(4\cos^2 x - 3) = 0 \\ \sin x \cos x \neq 0 \end{cases} \\ &\iff \cos^2 x = \frac{3}{4} \iff \cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\text{图 5.10}) \end{aligned}$$

$$\therefore x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$




图 5.10

**解法 2:** 去分母, 得  $\sin 2x \sin x - \cos 2x \cos x = 0$ , 即  $-\cos 3x = 0$ ,

$$\therefore 3x = \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \iff x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \ (k \in \mathbb{Z}).$$

**评述:** 这里我们运用了一系列同解变形的步骤(关键的是哪几步?), 这就保证了最后得到的  $x$  是原不等式的解。下面的解法先去分母(会增解呢? 还是丢解? 你能讲清楚解方程时增解或丢解的最根本原由吗?)。

在单位圆上可以看得出,这里得到的解实际上可以写成  $x_1 = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 与  $x_2 = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ). 代入原方程可知  $x_2$  是增根, 所以  $x_1$  是原方程的解。

**评述:** 这里, 产生增根的原因是: “去分母”这一步扩大了方程的定义域 (因而, 去分母不是同解变形), 所以产生了增根。

在解三角方程中, 若出现了增 (减) 根, 处理起来往往很不容易。因此, 避免出现增 (减) 根——也就是注意步步要使用同解变形——可能是最佳选择。这时根本的原则是“保证方程的定义域既不扩大, 也不缩小”。

## 习题三

### A

解下列方程:

1.  $\sin 2x - \sqrt{2} \cos x = 0$

2.  $\sin 2x + \sqrt{3} \sin x - 6 \cos x - 3\sqrt{3} = 0$

3.  $\cos 2x = \cos x + \sin x$

6.  $\cos 2x - \cos x = 0$

4.  $\sin x = \cos \frac{x}{2}$

7.  $\tan 4x = \tan 2x$

5.  $\sin 3x - \sin 5x = 0$

8.  $\sin 3x + \cos 2x = 0$

### B

9.  $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$

10.  $\tan x + \tan 2x + \tan 3x = 0$

### 5.2.4 正弦、余弦的齐次方程

从代数上我们知道, 下列方程:

$$ax + by = 0 \quad (a, b \text{ 不同时为零})$$

$$ax^2 + bxy + cy^2 = 0 \quad (a, b, c \text{ 不同时为零})$$

$$ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3 = 0 \quad (a, b, c, d \text{ 不同时为零})$$

都是关于  $x, y$  的  $n$  次齐次方程 (要特别注意右边为零)。若同时以  $\sin x, \cos x$  分别去代替上述方程中的  $x, y$ , 就得到了关于  $\sin x, \cos x$  的  $n$  次 ( $n \in \mathbb{N}$ ) 齐

次方程 (各项系数不全为零):

$$a \sin x + b \cos x = 0$$

$$a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$$

$$a \sin^3 x + b \sin^2 x \cos x + c \sin x \cos^2 x + d \cos^3 x = 0$$

以下, 研究这类方程的解法。

**例 5.9** 解下列方程:

$$(1) \quad 5 \sin x + 2 \cos x = 0$$

$$(2) \quad 2 \sin 2x + 3 \sin x \cos x + \cos^2 x = 0$$

$$(3) \quad 3 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x = 2$$

**解:**

(1)  $\because \cos x = 0$  的解不是原方程的解, 方程两边同除以  $\cos x$ , 得

$$5 \tan x + 2 = 0 \iff \tan x = -\frac{2}{5}$$

$$\therefore x = \arctan\left(-\frac{2}{5}\right) + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(2)  $\because \cos x = 0$  的解不是原方程的解, 方程两边同除以  $\cos^2 x$ , 得

$$2 \tan^2 x + 3 \tan x + 1 = 0$$

$$\tan x = -1 \quad \text{或} \quad \tan x = -\frac{1}{2}$$

$$x_1 = -\frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$x_2 = \arctan\left(-\frac{1}{2}\right) + k\pi = -\arctan \frac{1}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

从而:  $x_1, x_2$  都是原方程的解.

(3) 原方程可以写成

$$3 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x = 2(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$\iff \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x = 0$$

(这就化归为齐次方程了)

$\therefore \cos x = 0$  的解不是原方程的解, 方程两边同除以  $\cos^2 x$ , 得

$$\tan^2 x - 4 \tan x + 3 = 0$$

由此  $\tan x = 3$  或  $\tan x = -1$ ,

$$x_1 = \arctan 3 + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$x_2 = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$  原方程的解为  $x_1, x_2$ .

**评述:** 关于  $\sin x$ 、 $\cos x$  的  $n$  次齐次方程, 都可以通过两边同除以  $\cos^n x$  化成只含  $\tan x$  的方程, 从而即可获解.

### 5.2.5 正弦、余弦的一次方程

关于正弦、余弦的一次方程

$$a \sin x \pm b \cos x = c \quad (a, b \neq 0) \quad (*)$$

根据 2.6 节的和差化积公式, 引入辅助角  $\varphi$  (图 5.11)  $(*)$  可化为

$$r(\sin x \cos \varphi \pm \cos x \sin \varphi) = c \quad \left(r = \sqrt{a^2 + b^2}\right)$$

即

$$\sin(x \pm \varphi) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

这就实现了“化归”.




图 5.11




图 5.12

**例 5.10** 解下列方程:

(1)  $5 \sin x - 12 \cos x = 6.5$

(2)  $6 \cos x - 8 \sin x = 9$

解:

(1) 如图 5.12,  $r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ , 原方程可化为

$$13 \left( \sin x \cdot \frac{5}{13} - \cos x \cdot \frac{12}{13} \right) = \frac{13}{2}$$

$$\therefore \sin(x - \varphi) = \frac{1}{2}, \varphi \text{ 为锐角, 且 } \tan \varphi = \frac{12}{5}$$

$$x - \varphi = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \quad \text{或} \quad x - \varphi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore x_1 = \frac{\pi}{6} + \arctan \frac{12}{5} + 2k\pi, \quad x_2 = \frac{5\pi}{6} + \arctan \frac{12}{5} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

 $\therefore$  原方程的解为  $x_1, x_2$ .

(2)  $8 \sin x - 6 \cos x = -9, \quad r = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$

$$\therefore \sin(x - \varphi) = -\frac{9}{10}, \varphi \text{ 为锐角, 且 } \tan \varphi = \frac{3}{4}$$

$$x - \varphi = \arcsin \left( -\frac{9}{10} \right) + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

或

$$x - \varphi = \pi - \arcsin \left( -\frac{9}{10} \right) + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

$$\therefore x_1 = -\arcsin \frac{9}{10} + \arctan \frac{3}{4} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

$$x_2 = \pi + \arcsin \frac{9}{10} + \arctan \frac{3}{4} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

 $\therefore$  原方程的解为  $x_1, x_2$ .

**注意:** 在解的表达式中, 若反三角函数的值为特殊角, 都必须表成特殊角的形式。

## 习题四

### A

1. 在下列  $x, y$  的齐次方程中 (设  $x \neq 0$ ) 能求出  $\frac{y}{x}$  吗? 试试看:

(1)  $3x - 5y = 0$

(3)  $x^3 - 4x^2y - xy^2 + 5y^3 = 0$

(2)  $6x^2 + 7xy - 3y^2 = 0$

2. 解下列方程:

(1)  $2\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0$

(2)  $3\sin x = \sqrt{3}\cos x$

(3)  $5\cos 2x + 2\sin 2x = 0$

(4)  $2\sin^2 x + 3\sin x \cos x + \cos^2 x = 0$

(5)  $2\sin^2 x = 4\cos^2 x - 7\sin x \cos x$

(6)  $\cos^2 x + \frac{2\sqrt{3}}{3}\sin x \cos x - \sin^2 x = 0$

(7)  $5\sin^2 x + 7\sin x \cos x + 4\cos^2 x = 1$

(8)  $6\sin^2 x + 3\sin x \cos x - 5\cos^2 x = 2$

(9)  $3\sin^2 x - \sin 2x - \cos^2 x = 0$

(10)  $\cos 2x + 3\sin 2x + 4\sin^2 x + 1 = 0$

3. 解下列方程:

(1)  $\sin x + \cos x = 1$

(4)  $3\cos x - 4\sin x + 2 = 0$


(2)  $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 1$

(3)  $2\sin x + 7\cos x = 6$

(5)  $\sqrt{5}\cos 3x - 2\sin 3x - 3 = 0$

## 5.3 本章小结

### 5.3.1 知识结构分析



### 5.3.2 几点说明

1. 四种最简方程是解三角方程的基础，也是求三角方程解的“化归”方向。其解集应掌握得十分熟练；
2. 解简单三角方程的基本思想是“化归”（按结构图中箭头指示的方向进行），即化为已经解决或易于解决的问题。这是数学中经常运用的思想方法。
3. 对于五类简单三角方程也应熟记其模式和求解方法。

以下补充几例，进一步说明之。

**例 5.11** 解方程： $8 \sin^2 \frac{x}{2} + 3 \sin x - 4 = 0$

**解：解法 1：**

$$8 \cdot \frac{1 - \cos x}{2} + 3 \sin x - 4 = 0 \iff 3 \sin x - 4 \cos x = 0$$

（这是正、余弦的齐次方程）

$$\therefore \tan x = \frac{4}{3}, \quad x = \arctan \frac{4}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

**解法 2：**

$$8 \sin^2 \frac{x}{2} + 6 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 4 \left( \sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} \right) = 0$$

即：

$$\begin{aligned} 4 \sin^2 \frac{x}{2} + 6 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 4 \cos^2 \frac{x}{2} &= 0 \\ 2 \sin^2 \frac{x}{2} + 3 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 2 \cos^2 \frac{x}{2} &= 0 \end{aligned}$$

（这是正、余弦的齐次方程）

$$\therefore 2 \tan^2 \frac{x}{2} + 3 \tan \frac{x}{2} - 2 = 0$$

$$\left( 2 \tan \frac{x}{2} - 1 \right) \left( \tan \frac{x}{2} + 2 \right) = 0$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad \tan \frac{x}{2} = -2$$

$$\frac{x}{2} = \arctan \frac{1}{2} + k\pi \quad \text{或} \quad \frac{x}{2} = \arctan(-2) + k\pi$$

$$\therefore x_1 = 2 \arctan \frac{1}{2} + 2k\pi \quad \text{或} \quad x_2 = 2 \arctan(-2) + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

**例 5.12** 解方程： $\cos^3 x - \cos x \sin x - \sin^3 x = 1$



解:  $(\cos^3 x - \sin^3 x) - \cos x \sin x - 1 = 0$

$$(\cos x - \sin x)(\cos^2 x + \cos x \sin x + \sin^2 x) - (\cos x \sin x + 1) = 0$$

$$(\cos x \sin x + 1)(\cos x - \sin x - 1) = 0$$

$$\therefore \frac{1}{2} \sin 2x + 1 = 0 \quad \text{或} \quad \sin x - \cos x = -1$$

$$\sin 2x = -2(\text{无解}) \quad \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{-1}{\sqrt{2}}$$

$$x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{或} \quad x - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$x_1 = 2k\pi \quad \text{或} \quad x_2 = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$  原方程的解是  $x_1$  与  $x_2$ .

例 5.13 求方程  $|2\sin^2 x - 1| - \cos x = 0$  的解集.

解: 利用  $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ , 得:

$$|2\sin^2 x - 1| = |-\cos 2x| = |\cos 2x|$$

原方程变为

$$|\cos 2x| = \cos x \iff \begin{cases} \cos x \geq 0 & (1) \\ \cos 2x = \pm \cos x & (2) \end{cases}$$

1. 对于  $\cos 2x = \cos x$ ,  $2x = 2k\pi \pm x$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )

$$\therefore x_1 = 2k\pi, \quad x_2 = \frac{2}{3}k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore x$  不满足 (1), 舍去.  $x_1$  是原方程的解.

2. 对于  $\cos 2x = -\cos x$ , 可得:  $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad \cos x = -1 \quad (\text{不满足 (1), 舍去})$$

$$\therefore x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

综上, 原方程的解集为  $\left\{x \mid x = 2k\pi \text{ 或 } x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

## 复习题五

### A

1. 解下列方程:

(1)  $6 \sin^2 2x = \sin 4x + 3$

(2)  $3 \sin 2x - 9 \cos x + 2 \sin x = 3$

2. 解下列方程:

(1)  $\sin x = 2 \sin \left( \frac{\pi}{3} - x \right)$

(2)  $\sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right) + \cos \left( x + \frac{\pi}{6} \right) = 0$

(3)  $\sin \left( 2x + \frac{\pi}{3} \right) + \sin \left( x - \frac{\pi}{6} \right) = 0$

(4)  $\cos \left( x + \frac{\pi}{4} \right) + \sec \left( x + \frac{\pi}{4} \right) + 2 = 0$

(5)  $\sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right) \cdot \sin \left( x - \frac{\pi}{12} \right) = \frac{1}{2}$

(6)  $\sin^4 x - \cos^4 x = \cos x + \sin x$  (7)  $\cos 2\theta = \cos \theta + \sin \theta$

3. 解下列方程:

(1)  $\sin 6x \cos x = \sin 4x \cos 3x$

(3)  $\sin 5\theta - \sin 3\theta = \sqrt{2} \cos 4\theta$

(2)  $\sin x \sin 7x = \sin 3x \sin 5x$

(4)  $\sin 7\theta - \sin 3\theta = \sin \theta$


4. 求证:

(1) 方程  $\sin^2 x = \sin^2 \alpha$  的解集是  $\{x \mid x = k\pi \pm \alpha, k \in \mathbb{Z}\}$

(2) 方程  $\cos^2 x = \cos^2 \alpha$  的解集是  $\{x \mid x = k\pi \pm \alpha, k \in \mathbb{Z}\}$

(3) 方程  $\tan^4 x = \tan^2 \alpha$  的解集是  $\{x \mid x = k\pi \pm \alpha, k \in \mathbb{Z}\}$

5. 如图有一块正方形钢板, 一个角上有伤痕, 要把它截成一块正方形钢板, 面积是原钢板的  $\frac{2}{3}$ , 应按怎样的角度  $x$  来截?



(第 5 题)

6. 解下列方程:

(1)  $\frac{\cos 2x}{1 - \sin 2x} = 0$

(2)  $\frac{\sin 3x}{\sin 2x} = \frac{\cos 3x}{\cos 2x}$

(3)  $\frac{1 - \cos 2x}{2 \cos x} = \frac{\sin 2x}{1 - \cos 2x}$

(4)  $\tan \left( \frac{\pi}{3} + x \right) + \tan \left( \frac{\pi}{6} - x \right) = \frac{4}{\sqrt{3}}$

7. 方程  $\cos 2x + \sin x + q = 0$ , 当  $q$  满足什么条件时才有解?

8. 设  $0 \leq \alpha < \beta \leq \pi$ , 问  $\alpha$ 、 $\beta$  为何值时下式的值与  $\theta$  无关:

$$F(\theta) = \sin^2 \theta + \sin^2(\theta + \alpha) + \sin^2(\theta + \beta)$$

9. 解方程  $\arctan x + 2 \arctan \frac{1}{x} = \frac{2\pi}{3}$

10. 解方程  $\cos^2 x + \cos^2 3x = 1$

11. 解不等式  $\arcsin(1-x) + \arcsin(1-x^2) < 0$

12. (选择题) 若  $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ , 则下列各式中成立的是 ( )

(A)  $\arcsin(\cos \varphi) > \arccos(\sin \varphi)$

(B)  $\arcsin(\cos \varphi) < \arccos(\sin \varphi)$

(C)  $\arcsin(\cos \varphi) = \arccos(\sin \varphi)$

(D) 大小关系由  $\varphi$  的大小而定。