

58 participants, ordered by fibrosis then NAS
MASLD (46) / control (12)
Fibrosis
NAS
adjusted NES
Lipid droplet
+2.6
q=5e-6
PLIN2
ABHD5
PLIN4
PLIN1
ACLY
ECM / BM
+2.1
q=2e-6
P4HA2
AGRN
LAMA5
LAMB2
CD151
Immune / inflammation
+2.0
q=1e-2
CAPG
CASP1
CORO1A
CD74
HLA-DQA1
Detox
-2.1
q=4e-6
GGT1
MAT1A
ADH1B
CYP4A11
CYP2C19
AA catabolism
-2.2
q=9e-10
AASS
HGD
ACADSB
HAL
GNMT
Mito / OXPHOS (no fixed protein)
-2.6
q=2e-14
-2 0 2
Protein z-score
Within 46 MASLD participants
Steatosis
Ballooning
Inflammation
Fibrosis
NAS
n=45
n=37
n=32
-1 0 1
0
Partial Spearman ρ (95% CI)
• q < 0.05
○ q ≥ 0.05
mRNA: 636 vs 138 units
protein: 46 vs 12 participants
mRNA log2FC
protein log2FC
padj < 0.05
and, for mRNA,
|log2FC| > 0.5
otherwise
-2 -1 0 1 2
log2FC, MASLD vs control