Free ICRP

Solid: known order. Dashed: not yet decided. No edge: incomparable (2154). Edge numbers are one separating model.



Unknown identities

(((x \ e) \ x) * (((x \ e) \ e) \ x)) = (((x \ e) \ (x \ x)) \ x).
((((x \ x) \ e) \ x) * (((x \ e) \ x) \ x)) = (((x \ e) \ e) \ x).
(((x \ e) \ e) \ x) <= ((((x \ x) \ e) \ x) * (((x \ e) \ x) \ (x \ x))).
((((x \ e) \ x) \ x) \ (x * (x \ e))) <= ((((x \ e) \ x) \ (x \ x)) \ x).
((((x \ e) \ x) \ x) \ (x * (x \ e))) = ((((x \ e) \ x) \ (x \ x)) \ (x * (x \ e))).
((((x \ e) \ x) \ x) \ (x * (x \ e))) <= ((((x \ e) \ x) \ (x \ x)) \ (((x \ e) \ e) \ x)).
((((x \ e) \ x) \ x) \ (x * (x \ e))) <= ((((x \ e) \ x) \ (x \ x)) \ (((x \ e) \ e) \ (x * (x \ e)))).
((((x \ e) \ x) \ x) \ (((x \ e) \ e) \ (x * (x \ e)))) <= ((((x \ e) \ x) \ (x \ x)) \ (((x \ e) \ e) \ x)).
((((x \ e) \ x) \ x) \ (((x \ e) \ e) \ (x * (x \ e)))) = ((((x \ e) \ x) \ (x \ x)) \ (((x \ e) \ e) \ (x * (x \ e)))).
(x * ((((x \ x) \ e) \ x) \ (x * ((x \ e) \ x)))) = (x * ((x \ e) \ x)).
((x \ e) * ((((x \ x) \ e) \ x) \ x)) = ((((x \ x) \ e) \ x) \ e).
((x \ e) * ((((x \ x) \ e) \ x) \ e)) = ((((x \ x) \ e) \ x) \ e).
((x \ e) * ((((x \ x) \ e) \ x) \ (x * ((x \ e) \ x)))) = ((((x \ x) \ e) \ x) \ e).
((x \ e) * ((((x \ e) \ x) \ x) \ (((x \ e) \ e) \ (x * (x \ e))))) = (((x \ e) \ e) \ (x * (x \ e))).
(x * (x \ e)) <= ((x \ e) * ((((x \ e) \ x) \ (x \ x)) \ (((x \ e) \ e) \ (x * (x \ e))))).