当院におけるバンコマイシン添加チョコレート寒天培地の導入効果

◎山崎 裕貴[1)]、川島 千亜紀[1)]、田邉 詩有[1)]、坂上 愛梨[1)]、鈴木 彩加[1)]、寺田 さと子[1)]、林 晃司[1)]
社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院[1)]

【はじめに】バンコマイシン添加チョコレート寒天培地（日本 BD、以下 VCM チョコ培地）は、グラム陽性菌の発育を抑制し、目的菌の視認性を高める選択培地である。当院では市中肺炎の主要な起因菌である *Haemophillus influenzae* と *Moraxella catarrhalis* の検出率向上及び検査効率の改善を目的として、2023 年 4 月より呼吸器系材料は、従来のチョコレート寒天培地を VCM チョコ培地へと置換している。今回、培地変更が上記 2 菌種の検出率に及ぼした影響を統計学的に検討した。

【対象と方法】2017 年 1 月から 2026 年 3 月までに当院へ提出された喀痰、咽頭拭い、吸引痰、気管支鏡（BF）吸引痰、鼻汁を対象とした。新型コロナウイルス流行による検出率の全国的変動を考慮し、2020 年 1 月から 2023 年 4 月を除外した。チョコレート寒天培地を使用した 2017 年 1 月～2019 年 12 月を「従来培地群」、VCM チョコ培地を使用した 2023 年 5 月～2026 年 3 月を「VCM 培地群」と定義し、*H. influenzae* と *M. catarrhalis* の検出状況を比較した。解析にはカイ二乗検定を用いた。

【結果】対象の材料全体における *H. influenzae* 検出率は従来培地群 3.8％（401/10650）に対し、VCM 培地群 5.0％（682/13462）と有意に上昇した（$p < 0.0001$）。
M. catarrhalis においても従来培地群 2.9％（305/10650）に対し、VCM 培地群 4.0％（540/13462）と有意に上昇した（$p < 0.0001$）。材料別では、両菌種ともに喀痰、咽頭ぬぐい、鼻汁で VCM 培地群で有意な上昇（$p < 0.05$）を認めたが、吸引痰、BF 吸引痰では有意差を認めなかった。また、喀痰では Geckler 3 での検出割合が増加した。

【考察】VCM チョコ培地の導入は両菌種の検出率を有意に向上させた。特に常在菌の混入が避けられない上気道由来の材料において VCM の選択作用が効果的に機能したと考えられた。喀痰等の検体採取が困難な小児において、鼻汁や咽頭から病原菌を検出できる利点は大きい。また、夾雑菌が抑制され釣菌しやすくなることで、同定や薬剤感受性検査に移行しやすくなった。

【結語】VCM チョコ培地は市中肺炎の主要な起因菌の検出率向上と業務の効率化に有用である。