ESBL 産生能が異なる腸管出血性大腸菌 O157 が同一便検体から検出された 1 例

◎黒田 志保[1)]、佐藤 政季[1)]、杉江 昌男[1)]、山﨑 啓介[1)]、上村 のり子[1)]、久留島 幸路[1)]
磐田市立総合病院[1)]

【はじめに】大腸菌の基質特異性拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生率は増加傾向である一方、ESBL 産生腸管出血性大腸菌(EHEC)の報告は少ない。今回、便培養で ESBL 産生能の異なる EHEC O157 が同時に分離された 1 例を経験したので報告する。

【症例】80 歳代女性。下腹部痛、下痢、血便にて当院救急外来に受診された。食中毒の原因となるエピソードがなく明らかな感染経路は不明であるが、ペットボトルに水をつぎ足しして飲んでいたとの申告があった。家族内には有症状者は見られなかった。

【結果】便培養を実施し、クロモアガーSTEC 培地に発育した藤色コロニーに対し同定検査を行い、*Escherichia coli* O157 VT-1&VT-2 が検出された。薬剤感受性検査で微量液体希釈法と ESBL 確認試験（CLSI 法）結果が解離したことから、クロモアガーESBL 培地にて再分離し、非産生と ESBL 産生の EHEC O157:H 7 が検出された。MLVA 解析では、非産生株の MLVA 型は 24m0600 で、比較した ESBL 産生株はリピート数が 1 遺伝子座のみ異なっていた。ESBL 産生 O157 株においては PCR 法で bla CTX-M-8 group の遺伝子が検出された。また 1 週間後に実施した陰性確認の便培養で同 group の遺伝子をもった ESBL 産生大腸菌が検出された。

【考察】ESBL 遺伝子はプラスミドを介して菌間に移行することが知られている。検出された EHEC O157 の 2 株は同起源である可能性が非常に高く ESBL 遺伝子が本患者の感染過程で O157 株の一部に伝播されたものと推測される。また O157 株と本患者の大腸菌間で ESBL 遺伝子が伝播されたものを捉えた可能性がある。重篤な症状を引き起こす ESBL 産生 EHEC は抗菌薬の選択域が狭くなり治療が困難になることが懸念されており、的確な細菌培養検査が求められる。

連絡先：0538-38-5000（内線 2850）