当院における乳腺 VAB 検体の固定後ホルマリン液を用いた細胞診の教育への活用

◎末武 祐介[1)]、池尾 玲那[1)]、道下 博史[1)]
高山赤十字病院[1)]

【はじめに】全国的に乳腺穿刺吸引細胞診の減少により日常業務の中で乳腺細胞診の標本を鏡検する機会が減少している。当院においても穿刺吸引細胞診からコア針生検、吸引式乳房組織生検（以下、VAB）に置き換わり、乳腺の症例を鏡検する機会が減少している。そこで、VAB の固定後の残検体が細胞診の教育に有用であるか検討を行ったので報告する。

【対象】2025 年 12 月～2026 年 5 月までに当院で行われた乳腺 VAB 検体 23 例。内訳は非腫瘍性病変 3 例、腫瘍性病変 20 例（良性腫瘍 3 例、悪性腫瘍 17 例）。

【方法】乳腺 VAB 検体固定後の 10%中性緩衝ホルマリン液を材料とした。VAB 検体を取り出した後の固定容器から残ホルマリン液 10ml を 2 本分注し、片方を①、他方を 2000rpm5 分遠心し上清除去後に BD サイトリッチレッド保存液を混和した浮遊液を②とし、それぞれ LBC 標本（BD SurePath 法）を作製した。①②の細胞像を比較、またそれぞれ細胞所見を観察し、検体の適否、良悪性の判定を行い、組織診断と比較した。

【結果】①②ともにホルマリン固定の影響を受けていたが①はより顕著で、核の詳細な観察が困難な症例もあった。また②は溶血により背景の観察が容易で細胞量も多く全体的に観察に優れていた。非腫瘍性病変の 3 例、良性腫瘍の 2 例､悪性腫瘍の 11 例は細胞量が多く良悪鑑別の判定が可能であり、組織診の良悪性の診断と一致した。一方、残りの 7 例は細胞量が少なく良悪の判定は困難であった。

【考察および結語】今回の検討により、乳腺 VAB 検体の残液でもサイトリッチレッド液により背景が浄化され細胞像が明瞭となり、良悪性の鑑別が可能であることが示された。一方で、ホルマリン固定の影響のため通常の乳腺細胞診標本とは異なる視点での観察が必要と考えられた。また病理医からは組織標本完成前に細胞像を確認できることから、免疫染色実施の判断に有用であるとの意見が得られた。乳腺細胞診症例が減少する中、本手法は教育資源として有用である可能性があり、今後さらに症例を蓄積して検討を継続したい。

連絡先 0577-32-1111（内線 3254）