甲状腺低分化癌の細胞形態的検討

◎石井 辰弥[1)]、児玉 千里[1)]、疋田 朝美[1)]、山本 光[1)]、羽田 萌香[1)]、加藤 莉奈[1)]、北條 亮祐[1)]、立川 悠太[1)]
大垣市民病院[1)]

【はじめに】

甲状腺低分化癌(Poorly differentiated thyroid carcinoma: PDTC)および甲状腺未分化癌(thyroid undifferentiated carcinoma:TUC)は、乳頭癌や濾胞癌などの高分化癌と比べ急速な増大と転移を示す予後不良な腫瘍である。国内外の研究によってその細胞形態的特徴や他腫瘍との鑑別点が明らかになってきているが、細胞診での術前診断は難易度が高いとされている。今回、当院で組織学的に診断されたPDTCおよびTUCについて細胞形態的に組織型推定につながる所見の検討を行ったため報告する。

【対象および方法】

当院にて2015年から2025年の10年間で病理組織検査にてPDTCまたはTUCと診断された症例の中で、術前に甲状腺穿刺吸引細胞診が実施されていた10症例を対象とした。染色標本を再鏡検し、①背景(壊死、コロイドの有無)、②出現パターン(STIパターン、濾胞構造、乳頭様構造)、③核所見(クロマチンパターン、核溝、核内細胞質封入体、核小体)、④異常核分裂像の有無について比較検討した。

【結果】

検討対象とした症例を特徴ごとに大別すると、3症例には顕著な核異型を示す異型細胞が認められ、背景の壊死や核分裂像の所見とともに、TUCを示唆する所見がみられた。3症例は乳頭癌に特徴的な所見がみられたが、PDTCを示唆する所見はみられなかった。2症例は集塊構造や核所見に高分化癌を示唆する所見がみられたが、一部のクロマチンや出現パターンにPDTCを示唆する所見がみられた。1症例は壊死性背景と少数の異型細胞がみられ、1症例は細胞成分過少のため検体不適正だった。

【考察】

TUCは細胞異型が顕著であるため高悪性度癌を推定することは難しくないが、PDTCについては乳頭癌などの高分化成分と同時に観察されるケースが少なくないため、低分化成分を示唆する所見を注意深く観察することが必要である。

【連絡先】
大垣市民病医院　病理細胞診室　0584-81-3341(内線 1281)