脳波上で低振幅背景活動を示した NPSLE の症例

◎渡邉 颯真[1)]、伊藤 亜子[1)]、井戸 捺海[1)]、出口 和樹[1)]、大島 康平[1)]、髙田 彩永[1)]、大澤 徳子[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【背景】神経精神性全身性エリテマトーデス（neuropsychiatric systemic lupus erythematosus：NPSLE）は，全身性エリテマトーデスに伴う中枢神経病変であり，意識障害，精神症状，けいれんなど多彩な神経症状を呈する。脳波所見としては全般性徐波化が認められることが報告されている。今回，脳波検査において全般性に低振幅背景活動を示した NPSLE の症例を経験したため報告する。

【症例】10 代男性。20XX 年 X 月下旬から発熱・倦怠感・脱毛・皮膚紅斑の症状が出現し，当院を受診後，精査目的で入院となった。血液検査では補体低下・血球減少・ANA 陽性・DNA 抗体陽性を認め，SLE と診断された。しかし，神経症状として不安症状が出現したため，NPSLE を疑い中枢神経病変の評価目的として脳波検査を実施した。

【結果】入院 5 日目の脳波検査では，覚醒時背景活動は後頭部優位の 7–8Hz と軽度の徐波化を認めたが，明らかな全般性高振幅徐波は認めなかった。全誘導で 20–40μV 程度の低振幅傾向を示し，全体として活動性の低い脳波であった。また開眼による α 波抑制は不良であり，てんかん性放電は認めなかった。入院 19 日目の脳波検査では，後頭部優位律動は年齢相応の周波数に回復し，振幅もやや低めではあるが正常化した。

【考察】NPSLE の診断は，特異的検査が存在しないため症状および各種検査所見を総合して行われる。脳波検査では全般性の徐波が代表的所見とされるが，本症例では若年者にもかかわらず背景活動が全般性に低振幅であり，老年性変化に類似した低活動性の脳波を呈した点が特徴的であった。このような低振幅化は，NPSLE における脳機能異常の多様性を示唆する所見の一つである可能性があると考えられる。

【結語】NPSLE における脳波異常は徐波化のみならず，背景活動の低振幅化として出現する可能性がある。脳波所見の解釈には臨床症状との対比および経時的評価が重要である。

連絡先：058-230-6000