# 整形外科術前検査における D ダイマーと下肢静脈エコーの必要性の有無

◎寺田 彩葉[1)]、興戸 友里[1)]、中谷 恭子[1)]、細川 愛子[1)]
社会医療法人清光会 岐阜清流病院[1)]

【はじめに】
整形外科下肢手術による合併症の一つに深部静脈血栓症(DVT)がある。当院では骨折や、人工関節置換術などの術前検査において DVT のスクリーニングとして D ダイマーの測定と下肢静脈エコー検査を行っている。本研究の目的は、術前下肢静脈エコー検査件数の増加に伴い、現状を把握して DVT 検出率や D ダイマーの有用性を再評価し、下肢静脈エコー検査の必要性について検討することである。
【対象と方法】
2023 年 4 月～2026 年 3 月に人工膝関節全置換術(TKA)および人工膝関節単類置換術(UKA)の術前検査として D ダイマーの測定と下肢静脈エコーを施行した 607 件を対象とした。下肢静脈エコー結果により DVT 群と非 DVT 群の 2 群に分け、年齢や性別、膝手術の既往および D ダイマー値について比較検討した。
【結果】
DVT 群と非 DVT 群の D ダイマー値は 2.94±3.20 と 1.28±1.61 μg/mL であり DVT 群で有意に高値であった($P<0.01$)。また、高齢で女性が有意に多く、置換手術の既往がある患者に高率に認められた($P<0.01$)。DVT に関連する因子についての多変量解析では、D ダイマーが最も有意であり、オッズ比 1.32 であった($P<0.01$)。D ダイマーによる DVT の検出能について ROC 解析の結果、cut-off 値は 0.9μg/mL で感度 71%、特異度 68%、陽性的中率 27%、陰性的中率 93%であった。
【考察と結語】
D ダイマーは DVT 群で有意に高値を示し、ROC 解析では陰性的中率 93%と除外診断としての有用性が支持された。しかし、D ダイマー値が基準値以下であっても血栓を有する症例もみられたため、D ダイマー単独では DVT を見逃すリスクがあることも示された。D ダイマーを測定し、一定の基準値を超える症例に対して下肢エコーを施行するという二段階検査が、効率的かつ実践的であると考えられる。また、高齢女性や置換手術の既往がある患者は DVT のリスクが高いため、臨床的判断により積極的なエコー検査が必要であると考えられた。　連絡先　058−239−8111（1500）