非浸潤性乳管癌における乳腺超音波所見と病理所見の乖離に関する検討

◎小林 優[1)]、佐々木 祐子[1)]、石丸 亜希子[1)]、布施 倫代[1)]、日比 奈央実[1)]、長屋 麻紀[2)]、後藤 美香[1)]
岐阜市民病院[1)]、地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[2)]

【背景】乳腺超音波検査は非侵襲的で繰り返し施行可能であり、日常診療においても有用な検査法である。しかし、病変の性状や大きさによっては典型的な悪性所見を示さず、評価が困難な場合がある。なかでも非浸潤性乳管癌(ductal carcinoma in situ : DCIS)は、乳腺超音波検査において悪性所見を示さないことがあり、画像評価に難渋する症例をしばしば経験する。近年早期乳癌に対する低侵襲治療が普及し、より正確な画像評価が求められているが、病理診断と超音波検査所見が一致しない症例が存在する課題がある。
【方法】2025 年 1 月から 2026 年 3 月までに、当院で摘出標本よる病理診断において DCIS と診断された 11 症例のうち、臨床検査技師が乳腺超音波検査を実施した 9 症例を対象とした。そのうち、乳腺超音波検査でカテゴリー2-3a と判定され、腫瘤径 10mm 以下または低エコー域を認め評価に難渋した 3 症例について後方視的に超音波所見を検討した。乳腺超音波診断ガイドラインに基づいて評価した。さらに、病理組織像と対比し、超音波画像所見の特徴について検討した。
【結果】3 症例を対象とした結果、超音波所見からは共通する明らかな悪性所見は認めなった。しかし、超音波画像を再評価すると、形状や境界、低エコー域の判断において悪性を示唆する所見が認められた。また、乳腺超音波検査のカテゴリー分類上は悪性を示唆しにくい症例を認めた。
【考察】DCIS は乳腺超音波検査において、典型的な悪性所見を示さない場合があり、特に小病変や非腫瘤性病変では評価に注意を要すると考えられた。微細な形状変化や低エコー域を慎重に評価することが、DCIS の見逃し防止につながる可能性が示唆された。