超音波検査が診断に有用であった Subcutaneous Dermoid cyst の 2 例

◎増田 柚紀[1)]、福本 義輝[1)]、林 豊[1)]、中川 真理子[1)]、小宮 彩加[1)]、堀内 明子[1)]、古川 万葉[1)]、欠田 成人[2)]
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 松阪総合病院[1)]、同 皮膚科[2)]

【はじめに】類皮嚢胞(Dermoid cyst)は、胎生期に外胚葉が迷入することにより発生する先天性の嚢胞性病変であり全身に発生しうる。多くは直腸部分や卵巣に認められ、頭頸部領域の発生例は比較的稀である。頭頸部領域に生じる皮下類皮嚢胞(Subcutaneous Dermoid cyst : SDC)は、胎生期の顔面閉鎖時に骨の縫合線に沿って皮膚が迷入して生じるとされ、内部に毛髪や皮脂腺、汗腺などの皮膚付属器を有することが特徴とされている。発生部位としては、眉毛外側など眼周囲が最も多く、直径 1～4 cm 程度の皮膚色や暗青色を示す軟部腫瘤であり、手術にて切除となる症例も存在する。今回我々は、超音波検査が診断に有用であり、切除に至った SDC の 2 症例を経験したので報告する。【症例 1】20 歳代男性、左眉毛外側に母指頭大の腫瘤を認め受診。超音波検査では、境界明瞭な嚢胞性病変として描出され、内部に線状高エコーおよび乳頭状の高エコー像をわずかに認めた。【症例 2】30 歳代女性、右耳後部に鶏卵大の腫瘤を認め受診。超音波検査では、境界明瞭な嚢胞性病変として描出され、内部に線状高エコーおよび嚢胞壁に沿って広基性に広がる高エコー像を認めた。

【考察】SDC の特徴的な超音波所見として、嚢胞内部に毛髪を反映した線状高エコーや、脱落した上皮や分泌物、脂肪などを反映した高エコー像がある。今回経験した 2 症例ともに、嚢胞内部に線状高エコーと分泌物などを疑う高エコー像を認めたことは本疾患の診断に有用な所見であったと考える。また、本 2 症例における内部エコーの形態の差異は、内容物の粘稠度や構成成分が関係している可能性が考えられた。SDC と鑑別すべき腫瘤性病変として、表皮嚢腫や毛母腫が挙げられる。表皮嚢腫は角質の貯留により内部に低～高エコーが充満している像として描出され、毛母腫は成長に伴い石灰化やそれに伴う後方エコー減衰を呈することが多く、内部は不均一な低エコーが充満した像を示す。表皮嚢腫や毛母腫には、毛髪を反映する線状高エコーを認めない点で SDC との鑑別が可能と考えられる。

【結語】超音波検査による腫瘤内部の評価が診断に有用であった SDC の 2 症例を経験した。

(0598-51-2626　内線 261)