お好み焼き粉から発生したダニによるアレルギーの 1 例

◎熊谷 慧人[1)]、川井 孝太[1)]、池田 美紀[1)]、久米 彩也香[1)]、北村 文香[1)]、岩﨑 琢真[1)]、上村 のり子[1)]、久留島 幸路[1)]
磐田市立総合病院[1)]

【はじめに】当院（病床数 500 床、市立基幹病院）の一般検査部門では、尿検査、体腔液検査、寄生虫検査を行っている。今回、姉妹でお好み焼きを摂取し発症したアレルギー症例でダニを検出し、パンケーキ症候群として報告例のある事例を経験したので報告する。【症例】姉(10 代) 主訴：喘鳴・全身発疹。既往歴：果物アレルギー、花粉症。妹(10 代) 主訴:呼吸苦、手足の膨疹、顔面浮腫。既往無し。自宅でお好み焼きを摂取後、姉は咽頭違和感と結膜充血、全身性の発疹、意識混濁を認め、妹は、手足の膨疹、顔面浮腫が出現した。自宅でアレロック 1 錠内服したが、呼吸苦症状が出現したため、姉妹共に、前医を受診し症状の改善がないため当院に救急搬送された。当院到着時、全身性発疹が残るがバイタルに異常はなく､管理目的で入院となった。
【検査結果】
姉　WBC 9900/μL,Hb 13.5g/dL,TP 7.0g/dL,ALB 4.3g/dL,LD 299U/L,CRP 0.02mg/dL,IgE 1468,ダニ 1 >=100 クラス,IgE 抗体価 <0.10UA/mL
妹　WBC 12700/μL,Hb 13.0g/dL, TP 7.3g/dL,ALB 4.8g/dL,LD 255U/L,CRP 0.02mg/dL,IgE 182,ダニ 1 36.4 クラス,IgE 抗体価 <0.10UA/mL
【お好み焼き粉の鏡検】お好み焼き粉からダニを検出した。
【まとめ】開封後、長期保存されたお好み焼き粉から発生したダニによるアレルギーの症例を経験した。自施設で可能な検査方法を部門担当者と臨床医で話し合い、お好み焼き粉からダニを検出し報告することで、早期診断・治療に繋げることできた。【考察】パンケーキ症候群などのアレルギー疾患では、アレルギー検査が一般的だが院内で実施している施設は少なく結果報告まで時間がかかってしまう。本症例では、一般検査担当者と臨床医がコミュニケーションをとり、検査方法を模索したことで迅速にダニの検出ができたため、アレルギー検査結果を待たずに診断につなげることができた。今後も診断に有用な検査結果報告を継続するために、経験した内容や検査方法などの情報を技師間で共有し知識や技術の向上につなげていきたい。
磐田市立総合病院　0538-38-5000