Klebsiella pneumoniae 臨床分離株の耐性化に関する研究

◎鈴木 万莉菜[1)]、渡邊 日那[1)]、加藤 璃々[1)]、中嶋 小町[1)]、野林 明日花[1)]、杉村 柚[1)]、齋木 萌衣[1)]、中山 章文[1)]
岐阜医療科学大学[1)]

【はじめに】近年、腸内細菌目細菌の抗菌薬に対する耐性化が問題となっている。中でもカルバペネム系抗菌薬に耐性を示す *Klebsiella pneumoniae* による感染症において、薬剤感受性試験では「感性」の結果であるが、抗菌薬投与によっても除菌されず継続的に *K. pneumoniae* が検出されるケースが見られる。このことから、*K. pneumoniae* に関するカルバペネム系抗菌薬に耐性化についての検討が求められている。

【目的】本研究では、*K. pneumoniae* のカルバペネム系抗菌薬に対する耐性化に関する特徴を調べるため、臨床分離株を用いた耐性化実験を実施した。

【方法】薬剤感受性試験においてメロペネムに感性を示した *K. pneumoniae* の 8 株について、8.0 mg/L から 0.03 mg/L までのメロペネムを含むミュラーヒントンブロスで、35±2 ℃で 16 から 20 時間培養後に MIC（最小発育阻止濃度）を判定し、Sub MIC 濃度のブロスに発育した菌液を用いた継代培養を 10 日間実施した。

【結果】耐性化実験を実施した 8 株のうち 7 株は、10 日後の MIC が 1.0 mg/L 以下であったが、1 株に明らかな耐性化が認められ 8.0 mg/L の MIC を示した。

【考察】耐性化を示した 1 株は、メロペネム投与後も除菌されず、継続して *K. pneumoniae* が検出された症例由来株であった。以上より、微生物検査で感性と判定された菌株の中にも、生体内でメロペネム曝露により耐性化する集団が存在する可能性が示唆された。今後は対象株数を増やし、耐性化機序を含めて詳細に検討する予定である。

連絡先：
岐阜医療科学大学（0575-22-9401　内：521）
中山章文　anakayama@u-gifu-ms.ac.jp