

**Tabelle 1: OQS-Parameter: Endständiges Ileostoma**

Punkte	Form	Lage	Prominenz	HSüg	Ø aussen
1	Rund	Präop. markiert	2 - 3 cm	Eben	2,5 - 3,5 cm
2	Oval	n.m. Rektus +	1 - <2 cm	„Stern“	< 2,5 cm > 1,5cm
3	U	n.m. Rektus -	0 – <1 cm	Dehiszent	> 3,5 cm < 4,5 cm
4	∩	In Falte	eingesunken	ausgerissen	< 1,5 cm > 4,5 cm

**Tabelle 2: OQS-Parameter: Doppelläufiges Ileostoma**

Punkte	Form	Lage	Prominenz	HSüg	Ø aussen
1	Rund	Präop. markiert	2 - 3 cm	Eben	2,5 - 3,5 cm
2	Oval	n.m. Rektus +	1 - <2 cm	„Stern“	< 2,5 cm > 1,5cm
3	U	n.m. Rektus -	0 – <1 cm	Dehiszent	> 3,5 cm < 4,5 cm
4	∩	In Falte	eingesunken	ausgerissen	< 1,5 cm > 4,5 cm

**Tabelle 3: OQS-Parameter: Endständiges Colostoma**

Punkte	Form	Lage	Prominenz	HSüg	Ø aussen
1	Rund	Präop. markiert	prominent	Eben	2,5 - 3,5 cm
2	Oval	n.m. Rektus +	nicht prominent	„Stern“	< 2,5 cm > 1,5cm
3	U	n.m. Rektus -		Dehiszent	> 3,5 cm < 4,5 cm
4	∩	In Falte		ausgerissen	< 1,5 cm > 4,5 cm

Um aus den Zahlenwerten nun zur Qualitätskategorie zu gelangen erfolgt die Übersetzung der Punktwerte in Stomakategorien wie unten aufgelistet:

- A optimal bis 6 Punkte
- B suboptimal 7 – 8 Punkte
- C möglich ab 9

Im Folgenden erfolgt eine Beschreibung der OQS-Parameter:

**Form:**

Für das endständige Ileostoma und Colostoma sowie deren doppelläufige Varianten wurden runde Formen als optimal definiert und mit einem Punkt bewertet. Ovale Formen mit 2 Punkten. Dezentral oben offene Formen erhalten 3 Punkte. Dezentral unten offene Formen erhalten 4 Punkte.

**Lage:**

Die Lage des Stomas an einer präoperativ markierten Stelle wird mit einem Punkt bewertet. Optimalerweise sollte die in Projektion auf den M. rectus abdominis hin erfolgen. Sollte aus Patientengründen die Lage außerhalb des rectus angezeichnet sein, ist dies zu bevorzugen und es wird mit einem Punkt bewertet. Nicht angezeichnete Stomata die sich Projektion auf den M. rectus abdominis befinden erhalten 2 Punkte. Außerhalb des M. rectus abdominis gelegene Stomata erhalten 3 Punkte (wenn nicht so explizit markiert). In Falten oder auf Hügel (z.B. Rippenbogen, Spina iliaca ant. sup., etc) erhalten 4 Punkte.

**Prominenz:**

Die Prominenz beim endständigen Ileostoma sowie dessen Doppelläufer soll 2-3 cm betragen und erhält einen Punkt. 1 – < 2 cm prominente erhalten 2 Punkte. 0-<1 cm erhalten 3 Punkte. Eingesunkene, also negativprominente Stomata erhalten 4 Punkte. Bei prominenten endständigen Colostoma, sowie dessen Doppelläufer wird ein Punkt vergeben. Flache oder eingesunkene, also negativprominente Stomata erhalten 2 Punkte.

**Haut-Schleimhautübergang (HSÜg):**

Eine ebener, gesunder HSÜg erhält einen Punkt. Einfurchungen am Stoma durch Fäden (Sternfigur) werden mit 2 Punkten bewertet. Bis zur Semizirkumferenz ausgerissene Stomata erhalten 3 Punkte. Ganz ausgerissene Stomata werden mit 4 Punkten bewertet.

**Außendurchmesser:**

Der Außendurchmesser beim endständigen Ileostoma sowie dessen Doppelläufer und beim endständigen Colostoma soll 2,5 – 3,5 cm betragen und wird dann mit einem Punkt bewertet. Ein etwas kleinerer Außendurchmesser >1,5 cm - <2,5 cm erhält 2 Punkte. Ein etwas größerer Außendurchmesser >3-5 – 4,5 erhält 3 Punkte. Stomata, die einen Außendurchmesser > 4,5 cm oder einen < 1,5 cm besitzen werden mit 4 Punkten bewertet. Beim doppelläufigen Colostoma soll der Außendurchmesser 3 – 4,5 cm betragen und wird dann mit einem Punkt bewertet. Ein etwas kleinerer Außendurchmesser >2,5 cm - <3 cm erhält 2 Punkte. Ein etwas größerer Außendurchmesser > 4,5 – 5,5 erhält 3 Punkte. Stomata die einen Außendurchmesser > 5,5 cm oder einen < 2,5 cm besitzen werden mit 4 Punkten bewertet.