

Pasto, ~~26 No. 664~~

~~27~~ de ~~septiembre~~~~octubre~~ de ~~2025~~~~2022~~

Boletín de prensa No. 345

Alcaldía de Pasto ha puesto en funcionamiento el botón PSE para realizar el pago de las contribuciones

La Secretaría de Infraestructura y Valorización de la Alcaldía de Pasto ha puesto en funcionamiento el botón PSE para realizar el pago de las contribuciones, esto con la finalidad de facilitarle al ciudadano hacer sus aportes por las obras que benefician a su sector. A través de este botón se podrá realizar el trámite de manera rápida, fácil y segura.

“El botón es permanente para el uso en el momento en que ustedes requieran para poder hacer el pago de su contribución. Para el caso de sectores como Pandiaco o Morasurco se puede hacer el pago mediante abonos o en su totalidad hasta el 31 de diciembre sin intereses”, señaló la subsecretaria de Valorización, Mónica Esparza.

Adicionalmente, la funcionaria comentó que las ventajas que brinda la activación del botón PSE es que los ciudadanos podrán realizar sus pagos desde cualquier lugar con acceso a internet, sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la Alcaldía o al banco. Así mismo, se garantiza la seguridad y confiabilidad de los pagos en línea, reduciendo el riesgo de errores o extravíos de pagos.

“Estamos complacidos de lanzar este nuevo servicio que beneficiará a los ciudadanos de Pasto. Nuestro objetivo es facilitar el pago de contribuciones y mejorar la experiencia de los contribuyentes”, concluyó la funcionaria.

CONFIRMADO PRIMER CASO DE VIRUELA SÍMICA EN PASTO

~~El Instituto Nacional de Salud confirmó hoy el primer caso positivo de viruela símica que se registra en un paciente en el Municipio de Pasto; la confirmación se realizó a través de pruebas PCR moleculares en exudado de lesión cutánea y en muestra respiratoria que resultaron positivas.~~

~~El caso se trata de una persona de género masculino de 38 años, quien presentó la sintomatología típica de viruela símica, asociada a manifestaciones en piel, fiebre, dolor~~



ALCALDÍA
DE PASTO

BOLETÍN DE PRENSA

Oficina de Comunicación Social

articular y de cabeza, sudoración y malestar general. El paciente se encuentra estable, aislado y con seguimiento al tratamiento médico instaurado en casa.

El caso fue detectado en consulta en institución prestadora de servicios de salud el día 19 de octubre, fecha en la cual se inició preventivamente el aislamiento preventivo de 21 días, que se mantiene en casa hasta que la Secretaría de Salud, a través de su equipo multidisciplinario, establezca terminarlo.

Adicionalmente, el Comité de Vigilancia Epidemiológica estableció hoy continuar con el seguimiento de manera diaria a los casos de contacto estrecho y fortalecer la identificación de otros contactos que pudiesen haberse presentado, con el fin de cortar la cadena de transmisión y frenar posibles nuevos contactos al determinarse diagnósticos tempranos e intervenciones específicas.

La invitación de la Administración Municipal es a que estos reportes sean tomados únicamente con fines preventivos por la población y reitera el llamado a la comunidad a estar vigilantes de la sintomatología y los contactos con personas sospechosas; es decir, si estuvo en contacto, es obligatorio llamar a su EPS y acudir al centro de salud más cercano, con el fin de adoptar las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la propagación de la enfermedad.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la sintomatología más común es fiebre (no en todos los casos), dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o lesiones que afectan principalmente la cara, extremidades, plantas de los pies, palmas de las manos y lesiones en el área genital y perianal.

Cabe recalcar que las erupciones suelen aparecer entre uno y tres días después del inicio de la fiebre, pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido claro o amarillento, y luego pueden formar una costra, secarse y caerse.

En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de tres semanas, pero en algunas personas pueden provocar complicaciones e incluso la muerte.

