

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

IČ : 72744430

Telefon: 412332730

Fax : 412315800

kontakt@zsunemocnice.cz

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

V souladu s aktualizovaným dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 “ ze dne 27. 5. 2020 je žákům 2. stupně umožněna od 8. 6. 2020 přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

- individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace
- setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
- socializační aktivity
- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
- odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
- předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hygienická pravidla

Jsou dána aktualizovanou verzí dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Aktualizovaná verze je dostupná na webových stránkách školy v odkazu Aktuality.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka o této skutečnosti, je důvodem k nepuštění žáka do školy.

Organizační pravidla

- žákům budou v období 8. 6. – 26. 6. nabídnuty:
 - a) pravidelné konzultace dle rozvrhu konzultací (dostupný na webových stránkách školy v odkazu On-line výuka a domácí příprava)
 - b) individuální konzultace
- na konzultace se žáci přihlašují s dostatečným předstihem vyučujícímu předmětu
- maximální počet žáků v konzultační skupině je 15
- při prvním vstupu do školy musí žák předložit písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsaná zákonným zástupcem. Pokud žák nepředloží toto prohlášení, nebude do školy vpuštěn. Čestné prohlášení je dostupné na webových stránkách školy v odkazu „Dokumenty školy“ a dále na recepci školy. Čestné prohlášení odevzdá žák na recepci školy.
- žáci se dostaví do budovy školy pět minut před začátkem konzultační hodiny
- v prostoru šaten si žáky vyzvedne vyučující, který odvede skupinu do vyhrazené konzultační místnosti
- škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
- po ukončení konzultační hodiny odvede vyučující žáky do vstupní haly školy, odkud žáci neprodleně odchází z budovy školy. Žáci, kteří v daný den absolvují více

konzultačních hodin, přechází samostatně do vyhrazených konzultačních místností dle rozvrhu konzultací.

• žáci si přinesou:

- psací potřeby, rýsovací potřeby, učebnice, sešity, pracovní listy a další pomůcky na daný předmět dle potřeby a pokynu vyučujícího
- minimálně dvě roušky a sáček na použitou roušku
- svačinu a pití dle vlastního uvážení



~~UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA~~

~~FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES~~

~~CURSO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS~~

~~MATERIAL PRÁCTICO~~

~~INGENIERÍA FORESTAL~~

~~UNIDAD DIDÁCTICA D9 (2 de 2)~~

~~Abonos Orgánicos~~

2020

Un establecimiento hortícola bajo cubierta en la localidad de Los Hornos, Partido de La Plata, posee suelos de tipo Argiudol vértico (Serie Arturo Seguí), cuyos datos se presentan a continuación:

Tabla 1. Descripción de la Serie Arturo Seguí.

Perfil LP 47. Datos morfológicos y analíticos	
A	0-22 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares finos, débiles; friable, plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite claro y plano.
BA	22-30 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares finos, moderados; firme; plástico y adhesivo; cutanes arcillo-húmicos escasos y finos; raíces abundantes; límite claro y plano.
Btss1	30-65 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcilloso; bloques angulares medios, moderados; muy firme; muy plástico y muy adhesivo; cutanes arcillo-húmicos abundantes y espesos; superficies de deslizamiento (slickensides) comunes; raíces comunes; límite gradual y plano.
Btss2	65-85 cm; pardo oscuro (7.5YR 3.5/2) en húmedo; arcilloso; bloques subangulares medios, moderados; muy firme, muy plástico, muy adhesivo; cutanes arcillo-húmicos abundantes y espesos; superficies de deslizamiento comunes; raíces comunes; límite claro y plano.
Btss3	85-100 cm; pardo oscuro a pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; bloques angulares cuneiformes, medios, fuertes; firme, muy plástico y muy adhesivo; cutanes de arcilla comunes y espesos; débil reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio escasas; superficies de deslizamiento abundantes; raíces escasas; límite claro y plano.
Bck1	100-160 cm; pardo (7.5YR 4.5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y medios, débiles; friable, plástico y adhesivo; cutanes de arcilla comunes a escasos y finos; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio comunes; raíces escasas; límite gradual y plano.
2Bck2	160-220+ cm; rosado (7.5YR 7/4) en seco y pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; cutanes de arcilla escasos y finos; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio comunes.

Horizonte		A	BA	Btss1	Btss2	Btss3	Bck1	Bck2
Profundidad (cm)		0-22	22-30	30-64	64-85	85-100	100-160	160-220+
pH (pasta)		5,7	5,9	6,2	6,8	7,2	7,3	7,6
CaCO ₃ (%)		-	-	-	-	2,6	6,1	3,5
Resistencia (pasta) (ohms)		966	302	387	374	314	350	302
Composición granulométrica (%)	Arcilla < 2 µm	26,55	26,90	62,50	54,44	48,07	39,03	36,25
	Limo 2 -50 µm	66,55	64,54	31,69	39,19	41,20	50,06	52,66
	Arena total 50-2000 µm	6,95	8,56	5,81	6,37	10,73	10,91	11,09
	Arena muy fina	5,63	6,86	5,09	5,97	10,22	10,27	10,23
	Arena fina	0,79	0,83	0,55	0,35	0,47	0,55	0,71
	Arena media	0,29	0,62	0,12	0,05	0,04	0,06	0,12
	Arena gruesa	0,24	0,17	0,05	0	0	0,03	0,03
	Arena muy gruesa	0	0	0	0	0	0	0
Carbono orgánico. (%)		2,55	1,60	0,68	0,45	0,25	0,21	0,15
Materia orgánica. (%)		4,40	2,76	1,17	0,78	0,43	0,36	0,26
N total (%)		0,22						
Relación C/N		11,6						
Capac. intercambio cat. (cmolc/Kg)		24,34	34,43	42,29	52,09	45,96		
Capacidad de campo (%)		42,24	44,57	56,91	54,91	54,76	42,26	52,99
Punto de marchitez permanente (%)		16,86	22,89	33,22	30,44	28,30	19,82	26,69
Agua útil (%)		25,38	21,68	23,69	24,47	26,46	22,44	26,30
Expansión libre (%)		90	90	150	140	130	90	110
Límite líquido (%)		38,72	50,80	74,96	70,81	63,07	40,57	59,27
Límite plástico (%)		21,86	21,67	27,67	25,58	24,32	16,63	27,19
Índice de plasticidad		9,86	28,53	47,29	45,59	40,87	23,94	31,03
Sistema de Clasif. de Casagrande		ML	CH	CH	CH	CH	CL	CH
Conductividad hidráulica (cm/hora) (*)	1a. hora	3,32		1,83				2,14
	2a. hora	2,42		0,60				1,43

(*) Determinaciones realizadas por la Ing.Agr. Margarita Alconada

Dentro del establecimiento se muestreó un suelo virgen y un invernáculo con 14 años de uso intensivo (Tabla 2).

Tabla 2. Datos analíticos del suelo virgen y bajo invernáculo con 14 años de producción.

SUELO	pH (1/2.5)	CE dS·m ⁻¹	RAS	COT %	Cp %	DMP mm
<i>Suelos virgen</i>	6,2	0,6	0,3	3,7	0,9	2,16
<i>Invernáculo 14 años</i>	7,8	11,8	12	1,8	0,22	1,13

Referencias: CE (conductividad eléctrica), RAS (relación de adsorción de sodio), COT (carbono total), Cp (carbono particulado), DMP (diámetro medio ponderado).

Se cuenta con la posibilidad de utilizar las siguientes enmiendas (Tabla 3).

Tabla 3. Características generales de los abonos orgánicos.

Abono orgánico	MO %	pH	Na total %	Humedad %
<i>Cáscara de arroz</i>	79,1	5,9	$8,8 \times 10^{-4}$	6,5
<i>Compost comercial</i>	29,2	4,4	0,1	5,0
<i>Cama de pollo estacionada a la intemperie por 6 meses</i>	51,4	8,4	0,42	6,7

Referencia: MO (materia orgánica)

Responda:

1. ¿Cuáles son las cualidades positivas y negativas de la Serie Arturo Seguí para este tipo de producción?
2. ¿Qué tipo de evolución ha tenido el suelo tras 14 años de uso y cuáles cree que son las razones?
3. Analice la conveniencia del empleo de un abono orgánico.
4. De acuerdo a los abonos disponibles, cuál le parece el más conveniente.
5. ¿Qué otro aspecto debería solucionarse?
6. De acuerdo a los resultados obtenidos por Andreau et al (2012) (Figura 1), ¿qué dosis emplearía del abono seleccionado y con qué frecuencia lo aplicaría?
7. ¿Podría suscitarse algún aspecto negativo con su empleo?
8. Si el productor estuviese dispuesto a elaborar su propio compost y cuenta con cáscara de frutas de una pequeña industria vecina, aserrín y gallinaza de un criadero de pollos, ¿en qué proporción convendría que

mezclara los productos para la elaboración del compost y qué recaudos debiera tener por el tipo de material empleado?

9. Si considera que algún material para hacer el compost es riesgoso, ¿cómo podría sustituirlo?