

01. Leia o texto a seguir:

A elevada prevalência de parasitos intestinais nos países subdesenvolvidos se deve, principalmente, às precárias condições de saneamento básico e ao baixo nível de escolaridade da população. Num estudo realizado com 200 escolares da periferia de Salvador (BA), os pesquisadores identificaram cinco parasitos com maior frequência. São eles: *Entamoeba coli* (43,5%), *Ascaris lumbricoides* (25%), *Endolimax nana* (22%), *Entamoeba histolytica*/E. *dispar* (21,5%) e *Giardia duodenalis* (12,0%). O resultado apontou para a necessidade de implantação de programas de educação em saúde para a prevenção de infecções parasitárias e para a adoção de medidas que melhorem o estado nutricional das crianças.


Disponível em:
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/iptsp/article/download/16762/10208>. Adaptado.

Sobre os parasitas mencionados no texto, observe a sequência a seguir que representa o seu ciclo de vida.

- 1- Ingerir água ou alimento contaminado.
- 2- Haver liberação dos ovos no intestino delgado.
- 3- As larvas penetram no revestimento intestinal e caem na corrente sanguínea, atingindo fígado, coração e pulmões, onde sofrem algumas mudanças de cutícula e aumentam o tamanho.
- 4- As larvas permanecem nos alvéolos pulmonares, podendo causar sintomas semelhantes de pneumonia.
- 5- Ao abandonar os alvéolos, as larvas passam para os brônquios, a traqueia, laringe e faringe.
- 6- Em seguida, as larvas são deglutidas e atingem o intestino delgado, no qual crescem e se transformam em vermes adultos.
- 7- Após o acasalamento, a fêmea inicia a liberação dos ovos.
- 8- Os ovos são eliminados com as fezes. Dentro de cada ovo, ocorre o desenvolvimento de um embrião que, após algum tempo, origina uma larva.
- 9- Ovos contidos nas fezes contaminam a água de consumo e os alimentos utilizados pelo ser humano.

É **CORRETO** afirmar que o ciclo de vida acima pertence, exclusivamente,

- a) *Entamoeba coli*.
- b) *Ascaris lumbricoides*.
- c) *Entamoeba histolytica*/E. *dispar*.
- d) *Endolimax nana*.
- e) *Giardia duodenalis*.

02.

Almanaque do Biotônico, 1935. Disponível em: www.miniweb.com.br. Acesso em: 22 abr. 2011 (adaptado).

O rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida com o(a)

- a) uso de calçados.
- b) aplicação de inseticida.
- c) utilização de mosquiteiros.
- d) eliminação de água parada.
- e) substituição de casas de barro por de alvenaria.

03. Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir.

Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico?

- a) Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito.
- b) Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida pela água contaminada.
- c) Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada por grandes mamíferos.
- d) Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária.
- e) Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao sedentarismo.

04. A ancilostomose (ou amarelão, opilação ou ainda "doença do Jeca Tatu") é uma doença ainda muito disseminada em nosso país, tendo como agentes patogênicos o *Necator americanus* e o *Ancylostoma duodenale*.

Com relação ao ciclo de vida desses helmintos e à doença causada por eles, podemos afirmar **CORRETAMENTE** que

- a) seu ciclo de vida é heteroxeno, porque possui dois hospedeiros: o homem, que age como hospedeiro intermediário, e o mosquito *Culex fatigans*, como hospedeiro definitivo.
- b) esses vermes são parasitas intestinais, porém alimentam-se de sangue, causando uma anemia profunda, típica da doença.
- c) a principal forma de contaminação no meio rural se faz pela ingestão de seus ovos embrionados, que foram eliminados pelas fezes de seus hospedeiros, tanto o definitivo quanto o intermediário.
- d) além da higiene alimentar e do uso de calçado, a vacinação da população também é uma importante medida profilática para se evitar a ocorrência dessa doença.

05. Os ovos são eliminados com as fezes e em condições ambientais ideais; tornam-se embrionados; a larva infestante penetra na pele, migra para os vasos linfáticos da derme, cai na corrente sanguínea, segue para o coração, pulmão e traquéia, desce para o esôfago, estômago, alcança o intestino delgado onde se torna adulta, perfura as paredes intestinais e provoca hemorragias e anemia.

Essa descrição diz respeito ao ciclo da:

- Wuchereria bancrofti*.
- Strongyloides stercoralis*.
- Entamoeba coli*.
- Ancilostoma duodenalis*.
- Ascaris lumbricoides*.

06. Várias espécies de helmintos são agrupadas dentro do filo Nematoda, ou vermes cilíndricos. As principais novidades evolutivas que surgiram nesse filo, em comparação com os vermes achatados (Platelmintos), foram

- a presença de três folhetos germinativos; uma cavidade interna chamada pseudo-celoma; e o sistema digestório completo.
- a presença de três folhetos germinativos; uma cavidade interna chamada celoma; e o sistema circulatório fechado.
- a presença de três folhetos germinativos; ausência de cavidade interna; e sistema digestório completo.
- a presença de dois folhetos germinativos; uma cavidade interna chamada pseudo-celoma; e o sistema digestório completo.
- a presença de três folhetos germinativos; uma cavidade interna chamada celoma; e o sistema digestório completo.

07. As verminoses representam um grande problema de saúde pública, especialmente nos países subdesenvolvidos. Dentre os vermes parasitas do ser humano podemos destacar os seguintes: *Schistosoma mansoni*, *Taenia solium* e *Wuchereria bancrofti*.


A respeito desses vermes ou as doenças causadas por eles, é correto afirmar que

- todos apresentam mais de um hospedeiro no seu ciclo.
- todas podem ser curadas definitivamente com o uso de vermífugos.
- todas se desenvolvem no aparelho digestório.
- todas podem ser transmitidas por transfusão sanguínea.
- todos pertencem ao Filo Platelmino.

08. O *Ascaris lumbricoides* é causador da verminose mais difundida no mundo: a ascaridíase. Sobre esses vermes, pode-se afirmar corretamente que

- possuem coloração que varia entre o branco e o amarelado, corpo liso e brilhante, alongado e achatado.
- os machos são maiores do que as fêmeas e apresentam a extremidade posterior do corpo fortemente encurvada para a face ventral.
- a intensidade das alterações provocadas independe do número de larvas presente no hospedeiro e mesmo as pequenas infecções causam sintomas graves, como lesões hepáticas e perfuração de órgão, levando à morte.
- em consequência de sua elevada prevalência e de sua ação patogênica, esse verme pode ser considerado uma das causas do subdesenvolvimento nutricional de grande parte da população de países subdesenvolvidos.

09.



(www.dpd.cdc.gov. Adaptado.)

Considerando o ciclo de vida do *Ascaris lumbricoides*, representado na figura, e conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o helminto

- a) migra pelo fígado, coração e alvéolos do hospedeiro, desenvolvendo-se nas diferentes fases larvais.
- b) é hermafrodita e produz ovos por autofecundação no intestino delgado do hospedeiro.
- c) libera proglotes, que podem ser ingeridas com a água ou verduras.
- d) se reproduz preferencialmente nos pulmões e as larvas são liberadas pelas vias aéreas do hospedeiro.
- e) se aloja preferencialmente no estômago do hospedeiro, local rico em nutrientes provenientes da digestão.

10. Em um centro de saúde, localizado em região com alta incidência de casos de ascaridíase, foram encontrados folhetos informativos com medidas de prevenção e combate à doença. Entre as medidas, constavam as seguintes:

- I. Lave muito bem frutas e verduras antes de serem ingeridas.
- II. Ande sempre calçado e não se alimente de carne crua.
- III. Verifique se os porcos não estão contaminados com larvas do verme.
- IV. Ferva e filtre a água antes de tomá-la.

Estão corretas apenas:

- a) I, III e IV.
- b) I e IV.
- c) I, II e III.
- d) II e III.
- e) I e III.